



CAROLI A LINNÉ
SYSTEMA
NATURÆ,

TOM. I. PARS II.

EDITIO DUODECIMA REFORMATA.

~~~~~  
H O L M I Æ,

IMPENSIS DIRECT. LAUR. SALVII, 1767.

*P*  
*1003 bis*





CAROLI A LINNÉ  
**SYSTEMA**  
**NATURÆ,**

TOM. I. PARS II.

---

EDITIO DUODECIMA REFORMATA.

---

H O L M I Æ,  
IMPENSIS DIRECT. LAUR. SALVII, 1767.

*P*  
*1803 bis*



Ad pag. 533

## CLASSIS V.

## INSECTA.

*In his tam parvis, atque tam nullis,*

*Quæ ratio? quanta vis!*

*Quam inextricabilis perfectio!*

PLIN. XI. 2.

**ANIMALCULA** polypoda, *Spiraculis* lateralibus respirantia, *Cute* ossea cataphracta; *Antennis* mobilibus sensoriis capitis instructuntur.

**CORPUS** horum dividitur in *Caput*, *Truncum*, *Abdomen*, *Artus*:

**CAPUT** plerisque distinctum, *instruitur* Oculis, Antennis, sæpiusque Ore; *destituitur* Cerebro, Naribus, Auribus.

*Oculi* plerisque bini, absque palpebris, simplices aut compositi, quibus vident colores.

*Antenne* binæ, articulatæ, sensu nobis ignoto, sunt *setaceæ*, *filiformes*, *moniliformes*, *clavatæ*, *capitatæ*, *fissiles*, *pectinatæ*, *barbatæ*, corpore breviores, longiores, mediocres.

*Palpi* articulati, ori affixi, plerisque quatuor s. sex: articulis 2, 4, 3.

*Os* plerisque sub capite, quibusdam in pectore; *Rostro*, *Labio*, *Maxillis* transversis, *Dentibus*, *Lingua*, *Palato*; nonnullis os nullum.

*Stemmata* verticis puncta tria elevata nitida.

**TRUNCUS**, inter Caput & Abdomen, pedatus, *Thorace* supra *Dorso*, postice *Scutello*, subius *Pectore* *Sternoque*.

**ABDOMEN** Ventriculo, Intestinis, Visceribusque factum, incisuris 5, annulatum, *Spiraculis* porosis lateribus pertusum, supra *Tergo*, subius *Ventre*, postice *Ano* terminatum.

M m

AR-



**ARTUS** sunt *Cauda*, *Pedes*, plurimisque *Alæ*:

*Cauda* abdomen terminans, est vel solitaria s. *bicornis*; simplex s. armata *Forcipe*, *Furca*, *Seta*, *Chela* s. *Aculeo* simplici s. composito, lævi s. serrato.

*Pedes* Trunci Femoribus, *Tibiis*, Plantæ *Tarsis*, *Digitis Unguibus*; Manus (*Chela*) nonnullis, simplex Pollice mobili; Posteriores pro usu *cursoris*, *saltatorii*, *natatorii*.

*Alæ* duæ s. quatuor, sunt vel *planæ*, *plicatiles*, *erectæ*, *patentes*, *incumbentes*, *deflexæ* s. *reversæ*, *dentatæ*, *caudatæ*, *reticulatæ*, *maculis*, *fasciis*, *strigis*, *lineis*, *punctis pictæ* s. *stigmatibus* notatæ, *ocellis* ornatæ, idque vel in *primoribus* vel *secundariis*, tam in *pagina superiore*, quam *inferiore*.

*Elytra* (alæ superiores) crustacea bina, sæpius mobilia, *truncata*, *spinosa*, *serrata*: *scabra*, *striata*, *porcata*, *sulcata*, *punctata*, tegentia alas inferiores. *Hemelytra* media quali alas inter & elytra.

*Halteres* sub alis dipterorum ex petiolo capitati.

**SEXUS** *Mas* & *Femina* generant Perfecta.

*Neutra* nonnullis societate foederatis.

**METAMORPHOSIS** plurimis triplex, mutanda structura, exutis ovi tunicis, una post alteram.

**OVUM** sub minima mole vesicaria excluditur.

**LARVA** (Eruca) successa, mollior, major, aptera, sterilis, tardior, apoda sæpe, sæpeque polypoda, vorax alimento proprio.

**PUPA** (Nympha) siccior, coarctata, durior, *nuda* s. *folliculata*, sæpe absque ore, quæ vel *Pedata* 1. 2. 3. vel *Apoda* 4. 5.

1. *Completa* omnibus partibus agilis. (Araea, Acarus, Oniscus.)
2. *Semicompleta* folis alarum rudimentis. (Gryllus, Cicada, Cimex, Libellula, Ephemera.)
3. *Incompleta* alis pedibusque immobilis. (Apis, Formica, Tipula.)
4. *Obtectæ* thorace abdomineque distincto corticata: (Lepidoptera) eaque vel *nuda*, vel *folliculata*.

5. *Coar-*

---

*Verboſitas*, præſentis ſæculi calamitas artis Inſectorum, ut pauciloquium *Vermium*

5. *Coarctata* intra globum. (Musca, Oestrus.)

IMAGO revelata, declatata, perfecta generans, agilis, antennis instructa.

triplex itaque structura & cognitio ejusdem animalis.

HÆC *Muta*, nisi alio proprio instrumento sonora; *Surda*, stridorem ætheris licet percipiant; *Plura* ubique plantarum speciebus, sed ob patentiore sibi regionem in orbe pauciora: *Tropica*, *Arctica* & hodie ignota *Antarctica*; singula demum *Minima* annua, exceptis aquaticis, sed universa maximæ molis animalia, effectuque pariter maxima, sed magis occulto magisque disperso, ideoque minus coercendo; totidem etenim sunt Naturæ annui ministri, propriis negotiis peragendis præfixi, quot minis sufficiant, proportionem inter plantas servando, erronea, superflua, mortua, putrida cum umendo, aliis demum, imprimis avibus, in alimentum cedendo.

HABITANT insecta in iis tantum plantis, e quibus victitant (non in quibus), occurrunt, unde sapius nomina *Tertialia* optima, et ars cum *Politia naturæ* combinetur; aliis alia muneribus præfixa præparant, purgant, destruant necessaria.

ENTOMOLOGI præstantiores figuris, proprietatibus, attributis inclaruere.

Veteres *Mouffetius*, *Alarowandus*, *Jonstionus*.

Metamorphosii *Gœdart*, *Meriana*, *Abinus*, *Frisch*, *Ræsel*, *Waikes*, *Ammiral*, *Harris*.

Philosophi *Swammerdam*, *Reaumur*, *De Geer*, *Bozzet*.

Iconographi *Clerck* (\*), *Hœffnagel*, *Bradleus*, *Robert*, *Petiver*, *Schæffer*.

Descriptores *Rajus*, *Fauna svecica* (edit. 2. Holm. 1761. oct.) *Museum Reginae*. Holm. 1764.

Monographi *Lister*, *Schæffer*, *Clerck*.

Systematici *Systema naturæ*, *Poda*, *Sulzce*, *Geoffroa*, *Scopoli*, *Gronovius*.

M m 2

OR-

(\*) *Clerckii* icones insectorum, pulcherrimum opus, quod etiamnum editis oris literaturæ. Acad. Reg. Scient. Holm. hoc ab interitu vindicavit.

Descriptiones specierum dedi in *Fauna svecica*, Amxunt. academ. & Museo Reginae.

ORDINES Insectorum ab Alis desumpti.

|                                 |              |                            |                    |    |
|---------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|----|
| Alæ 4                           | { Superiores | crustaceæ futura recta. -  | <i>Coleoptera</i>  | 1. |
|                                 |              | semicrustaceæ incumbentes. | <i>Hemiptera</i>   | 2. |
|                                 | { Omnes      | imbricatæ squamis -        | <i>Lepidoptera</i> | 3. |
|                                 |              | membranaceæ                |                    |    |
|                                 |              | ano { inermi               | <i>Neuroptera</i>  | 4. |
|                                 |              | { aculeato                 | <i>Hymenoptera</i> | 5. |
| Alæ 2, Halteres loco posticarum | - - -        |                            | <i>Diptera</i>     | 6. |
| Alæ 0 f. absque Alis & Elytris  | - - -        |                            | <i>Aptera</i>      | 7. |

CHA-

*Quæso ne hæc legentes,  
quoniam in his spernunt multa,  
etiam relata fastidio damnent,  
cum in contemplatione naturæ  
nil possit videri supervacaneum.*

Plin.

## CHARACTERES INSECTORUM.

## I. COLEOPTERA.

\* *Antennis clavatis extrorsum incrassatis.*

189. SCARABEUS *Antennae clava fissili. Tibiae anticae dentatae.*  
 190. LUCANUS *Antennae clava compressa: latere latiore fissili.*  
 191. DERMESTES *Antenna clava perfoliata. Caput inflexum*  
*sub thorace vix marginato.*  
 193. HISTER *Antenna clava solida. Caput retractile intra*  
*thoracem.*  
 195. BYRRHUS *Antennae clava solida, ovata.*  
 194. GYRINUS *Antennae rigidulae. Oculi quatuor.*  
 193. ATTELARUS *Caput pollice attenuatum.*  
 202. CUPCULIO *Antennae insidentes. Rostrum corneo.*  
 196. SILPHA *Thorax Elytraque marginata.*  
 198. COCCINELLA *Antenna clava obtusa. Palpi clava truncata.*

\* \* *Antennis filiformibus.*

201. BRUCHIUS *Antennae filiformes, extrorsum crassiores.*  
 197. CASSIDA *Corpus ovatum. Elytra marginata. Caput*  
*tectum clypeo.*  
 192. PTINUS *Thorax caput recipiens. Antennae articulis*  
*ultimis longioribus.*  
 199. CHRYSOMELA *Corpus ovatum, immarginatum.*  
 200. HISPA *Antennae porrectae, approximatae, fusiformes.*  
 215. MELOE *Thorax subrotundus. Caput gibbum, inflexum.*  
 214. TENEBRIO *Thorax marginatus. Caput extertum: Cor-*  
*pus oblongum.*  
 207. LAMPYRIS *Elytra flexilia. Thoracis clypeus caput obum-*  
*brans recipiensque.*  
 216. MORDELLA *Lamina ad basin abdominis. Caput inflexum.*  
 217. STAPHYLINUS *Elytra dimidiata alas tegentia. Vesiculae 2 su-*  
*pra caudam extenderae.*

\* \* \* *Antennis setaceis.*

204. CERAMBYX *Thorax lateribus mucronato-callosis.*  
 205. LEPTURA *Elytra apice attenuata. Thorax terotiusculus.*  
 M m 3 208. CAN-

Genera Naturalia Auctorum, metamorphosi demonstranda, vitare Scientia largiuntur.

Genera Falsa Tyronum, ex ludrico principio deducta totidem scitiliginis ulceribus artum pulcherrimam commaculant.

208. CANTHARIS *Elytra flexilia. Abdomen lateribus plicato-pil-  
losum.*  
 209. ELATER *Pectus mucro e dorso abdominis resiliens.*  
 210. CICINDELA *Maxillæ exertæ, dentatæ. Oculi prominuli.*  
 211. BUPRESTIS *Cornu intra thoracem retractedum.*  
 212. DYTISCUS *Pedes postici ciliati natatorii.*  
 213. CARABUS *Thorax obcordatus, pillice truncatus.*  
 206. NALCYDALIS *Elytra dimidiata: alis nudis.*  
 218. FORFICULA *Elytra dimidiata: alis tectis. Cauda forcipata.*

## II. HEMIPTERA.

219. BLATTA *Os maxillosum. Alæ coriaceæ, planæ. Pe-  
des cursorii*  
 220. MANTIS *Os maxillosum. Pedes antici ferrati: ungue  
unico.*  
 221. GRILLUS *Os maxillosum. Pedes postici saltatorii.*  
 222. FULGORA *Rostrum inflexum. Frons producta, inanis.  
Anthere capitatæ.*  
 223. CICADEA *Rostrum inflexum. Pedes postici saltatorii.*  
 224. NOCTONECTA. *Rostrum inflexum. Pedes postici natatorii  
(ciliati).*  
 225. NEPA *Rostrum inflexum. Pedes antici cheliferi.*  
 226. CIMEX *Rostrum inflexum. Pedes cursorii.*  
 227. APHIS *Rostrum inflexum. Abdomen bicornæ.*  
 228. CHERMES *Rostrum pectorale. Pedes postici saltatorii.*  
 229. COCCUS *Rostrum pectorale. Abdomen pillice setosum  
maribus.*  
 230. THRIPS *Rostrum obsoletum. Alæ incumbentes abdo-  
mini sedentili.*

## III. LEPIDOPTERA.

231. PAPILIO *Antennæ extorsum crassiores. Alæ erectæ.*  
 232. SPHINX *Antennæ medio crassiores.*  
 233. PHALÆNA *Antennæ intorsum crassiores.*

## IV. NEUROPTERA.

234. LIBELLA *Cauda forcipata. Os multi-maxillosum. \*Alæ  
extensæ.*

235. EPHEMERA *Cauda* setis 2 s. 3. *Os* edentulum. *Ala* erectæ.  
 238. MYMELEON *Cauda* forcipata. *Os* bidentatum. *Ala* deflexæ.  
 236. PHRYGANEÆ *Cauda* simplex. *Os* edentulum. *Ala* deflexæ.  
 237. HEMEROBII *Cauda* simplex. *Os* bidentatum. *Ala* deflexæ.  
 239. PANORPA *Cauda* chelata. *Os* rostratum. *Ala* incumbentes.  
 240. RAPHIDIA *Cauda* filoi. *Os* bidentatum. *Ala* deflexæ.

## V. HYMENOPTERA.

241. CYNIPS *Aculeus* spiralis!  
 242. TENTHREDO *Aculeus* ferratus! bivalvis.  
 243. SIREX *Aculeus* ferratus sub abdominis spina terminali.  
 244. ICHNEUMON *Aculeus* exsertus! triplex.  
 245. SPHEX *Aculeus* punctorius. *Ala* planæ. *Os* elingue.  
 246. CHRYSIS *Aculeus* punctorius. *Abdomen* subtus fornicatum.  
 247. VESPA *Aculeus* punctorius. *Ala* superiores plicatæ!  
 248. APIS *Aculeus* punctorius. *Lingua* inflexa!  
 249. FORMICA *Aculeus* obsoletus. *Ala* neutris nullæ!  
 250. MUTILLA *Aculeus* punctorius. *Ala* neutris nullæ.

## VI. DIPTERA.

251. OESTRUS *Os* clausum s. nullum.  
 252. TIPULA *Os* labiis lateribus. *Palpi* quatuor.  
 253. MUSCA *Os* proboscide edentulum.  
 254. TABANUS *Os* proboscide dentibusque conniventibus.  
 255. CULEX *Os* rostro nuncie siphoniformi. *Stemmata* 6.  
 256. EMPIS *Os* rostro inflexo.  
 257. CONOPS *Os* rostro porrecto geniculato.  
 258. ASILUS *Os* rostro porrecto subulato.  
 259. BOMBYLIUS *Os* rostro porrecto setaceo.  
 260. HIPPOBOSCA *Os* rostro subnutante brevissimo. *Stemmata* 6.

## VII. APTERA.

\* *Pedibus* sex; *Capite* a *Thorace* discreto.

261. LEPISMA *Cauda* setis exsertis.  
 262. PODURA *Cauda* bifurca indexa saltatrix.  
 263. TERMES *Os* maxillis duabus.

264. PEDICULUS    *Os aculeo exserendo.*  
 265. PULEX        *Os rostro inflexo cum aculeo. Pedes saltatorii.*

\* \* *Pedibus 8 -- 14, Capite Thoraceque unitis.*

266. ACARUS        Oculi 2. Pedes 8. Palpi.  
 267. PHALANGIUM    Oculi 4. Pedes 8. Palpi chelati.  
 268. ARANEA        Oculi 8. Pedes 8. Palpi clavati.  
 269. SCORPIO        Oculi 8. Pedes 8. Palpi chelati.  
 270. CANCER        Oculi 2. Pedes 10; primo chelato.  
 271. MONOCULUS    Oculi 2. Pedes 12; decem chelatis.  
 272. ONISCUS        Oculi 2. Pedes 14.

\* \* \* *Pedibus pluribus. Capite a Thorace discreto.*

273. SCOLOPENDRA    *Corpus lineare.*  
 274. JULUS            *Corpus subcylindricum,*

I. CO-

---

*In nova fert animus mutatas dicere formas  
 corpora.*

---



## I. COLEOPTERA.

*Elytra alas tegentia.*

189. SCARABÆUS. *Antennæ* clavatæ capitulo fissili.  
*Tibiæ* anticæ sæpius dentatæ.

\* *Thorace* cornuto.

Hercules. 1. *S. scutellatus*, thoracis cornu incurvo maximo: subtus barbato unidentato, capitis recurvato: supra multi dentato. *Mus. Lud. Utr.* 3. \* *Gron. zooph.* 412.

*Marcgr. bras.* 247. f. 3.*Fossl. inf.* t. 16. f. 1.*Olear. mus.* t. 16. f. 1.*Pet. gaz.* t. 70. f. 1.*Grew. mus.* 162.*Ræf. scar.* 1. t. *A.* f. 1. *inf.* 4. p. 45. t. 5. f. 3.*Edw. av.* t. 334.*Habitat in America: Brasilia.*

Gideon. 2. *S. scutellatus*, thoracis cornu incurvo maximo subtus lævi apice bifido, capitis recurvato supra unidentato.  
*Gron. zooph.* 413.

*Edw. av.* t. 40.*Swamm. bibl.* t. 30. f. 2.*Ræf. scar.* 1. t. *A.* f. 5.*Habitat in Indiis.**Utrum hic sexu aut specie a priori differat non dum constitit.*

Aëxon. 3. *S. scutellatus* thorace bicorni, capitis cornu unidentato: apice bifido. *Mus. Lud. Utr.* 4. \* *Gron. zooph.* 417.

*Marcgr. bras.* 246. *Euema.**Mer. sur.* t. 72.*Hoffn. pict.* 1. t. 1. in medio.*Pet. gaz.* t. 15. f. 12.*Olear. mus.* t. 16. f. 2.*Ræf. scar.* 1. t. *A.* f. 2.*Swamm. bibl.* t. 30. f. 4.

M m 5

*Habi-*

Scarabæorum Larvæ vivunt tranquille sub terra; harum pleræque fimo delectantur & eo pascuntur.

*Habitat in America*

Maximus omnium insectorum cognitorum exceptis *Canceris Monoculisque*. Thorax antice cornibus 2 conicis. Capitis labium emarginatum s. bidentatum. Cornu capitis apice bifido & dente supra basin.

- Simfon. 4. *S. scutellatus*, thorace bicorni, capitis cornu apice tantum bifurcato, labio denticulato. *Mus. L. U.* 5. \*  
*Sloan. jam.* 2. p. 205. t. 237. f. 4, 5.

*Brown. jam.* 428. t. 43. f. 6. Scarabæus 4.

*Habitat in America.*

Os dentibus prominens. Cornua Thoracis lanceolata. Simillio u. *S. Alcei*, sed quadruplo minor. Corpus supra laevi, rictum. Thoracis Cornua porrecta, lanceolata, capite non longiora. Caput antice bidentatum. Cornu capitis Thorace brevius, apice bifidum; præterea ad dorsum hujus basin minutissimum punctum elevatum (an itaque præcedentis max?) Os cinctum dentibus plurimis, prominentibus.

- Tityus. 5. *S. scutellatus* thorace cornu: intermedio maximo simplicissimo, capitis cornu recurvato simplicissimo. *Amæn. acad.* 6. p. 391. n. 1.

*Gron. zooph.* Scarabæus thorace tricorni laevi: intermedio maximo incurvo fectus barbato: capitis cornu maximo recurvo. *Tab.* 14. f. 8.

*Habitat in America septentrionali.*

Simillimus *Sc. Herculi*, sed parvus.

- Atlas. 6. *S. scutellatus*, thorace tricorni: antico brevissimo, capitis cornu adscendente. *Mus. Lud. Utr.* 6. \*

*Marcgr. bras.* 247. f. 1.

*Edw. av.* 105. t. 105. f. 1.

*Olear. mus.* t. 16. f. 3.

*Pet. gaz.* t. 49. f. 8. an t. 14. f. 12?

*Merian. surin.* in titulo *F. G.*

*Swamm. bibl.* t. 30. f. 3.

*Saltz. inf.* t. 1. f. 1.

*Habitat in America.*

- Alcæus. 7. *S. scutellatus*, thorace tricorni: intermedio longiore, capite mutico, elytris unistriatis. *M. L. U.* 7. \*

*Pet. gaz.* t. 24. f. 10.

*Raf. inf.* 2. scar. 1. t. A. f. 6.

*Habitat in America septentrionali & australi.*

*Simil-*

*Simillimus S. nasicorni, sed triplo major, tibiis anticis quinquedentatis.*

- Molos- 8. *S. exscutellatus*, thorace retuso bidentato utrinque im-  
fus. presso, clypeo unicorni lunato integro, elytris lævi-  
bus. *Mus. Lud. Ulr.* 11. \* *Amæn. acad.* 6. p.  
391. \*

*Habitat in China, ubi officinalis.*

Sexus alter caret capitis cornu & dentibus porrectis thoracis. Variat cornu & dentibus brevioribus. Femora ovata. Latus thoracis utrinque puncto impresso.

- Typhæus. 9. *S. scutellatus*, thorace tricorni: intermedio minore, lateralibus porrectis longitudine capitis, capite mutico. *Mus. Lud. Ulr.* 8. \* *Gron. zooph.* 423.

*Mouff. inf.* 152. f. 2. Tauroc ros.

*Raj. inf.* 103. Scarabæus ovinus 2.

*Frisch. inf.* 4. t. 8.

*Geoff. paris.* 1. p. 72. t. 1. f. 3.

*Habitat in Anglia, Hispania. Osbeck.*

Corpus magnitudine *S. stercorarii*, atrum. Caput angustum, muticum, depressum, lateribus villosum. Antennæ capitulo subgriseo. Thorax glaber spinis tribus: lateralibus porrectis, acutis, longitudine capitis; intermedia brevior, erectior. Elytra striata. Sexus alter loco spinarum gerit tantum rudimenta truncata. Tibiæ admodum pilosæ.

- lunaris. 10. *S. exscutellatus*, thorace bicorni: intermedio obtuso bifido, capitis cornu erecto, clypeo emarginato. *Fn. secc.* 379. \* *Scop. garn.* 22. *Gron. zooph.* 453. \* *Fann. suec.* 1. p. 341. Scarabæus thorace submutico, capite lunato: coniculo emarginato.

*Pet. gaz.* t. 83. f. 4.

*Frisch. inf.* 4. t. 7.

*Raj. inf.* 2. scar. 1. t. B. f. 2.

*Geoffr. paris.* 1. p. 88. n. 1.

*Scheff. scarab.* t. 3 f. 1, 2, 3.

*Habitat in Europa.*

Sexus varietas Thorace retuso lævi absque corniculis thoracinis. quare difficiliter primum dignoscitur. Omnibus Thorax linea exaratus. Clypeus lunaris, emarginatus tantum.

cylindri- 11. *S. scutellatus*, thorace antice truncato quinquedentato,  
cus. capite antice cornu erecto, corpore cylindrico. *Fn.*  
*secc.* 380. \*

*Habitat in Europa.*

*Scutellum minutum.*

\* \* *Thorace inermi, capite cornuto.*

bilobus. 12. *S. scutellatus*, thorace prominente bilobo, capitis cornu simplici, elytris striatis.

*Gron. zomph.* 414. t. 14. f. 1, 2.

*Swammerd. bibl.* t. 30. f. 5.

*Edw. av.* 105. t. 105. f. 2.

*Habitat in Europa australi.*

*Similimus S. nasicorni, piceus. Thorax antice exsertus, longitudine capitis, bifidus, obtusus, dorso glaber. Labium superius denticulatum. Cornu adscendens, compressum, simplicissimum; subtus non pilosus est.*

lancifer. 13. *S. exscutellatus violaceus*, capite cornu angulato, thorace inæquali, elytris fuleatis.

*Maregr. bras.* 247. Taurus.

*Vet. coleopt.* 2. t. 1. f. 1, 2. Lancifer violaceus.

*Habitat in Brasilia.*

Rhinoce- 14. *S. scutellatus* thorace inermi, capite cornu simplici,  
ros. clypeo bifido, elytris punctatis. *N. L. U.* 10. \*

*Pet. gaz.* t. 44. f. 9. & t. 100. f. 3.

*Raf. scarab.* 1. t. 4. f. 7.

*Barr. ic.* t. 163.

*Habitat in Asia.*

*Similis S. nasicorni, sed duplo major. Cornu capitis basi non compressa, sed depressa. Corpus piceum, subtus hirsutum. Sexus alter Thorace excavato notatus.*

nasicorn- 15. *S. scutellatus*, thorace prominentia triplici, capitis  
nis. cornu incurvato, antennis heptaphyllis. *Faun. secc.*  
378. *Scop. garn.* 14.

*Mouss. inf.* 53.

*Imperat. nat.* 924. f. 1, 2. & 925. f. 3, 4.

*Hass. pict.* t. 13. f. antepenult.

*Olear. mus.* 27. t. 16. f. 4.

*Jacob. mus.* 1. S. 5.

*Jeust.*

*Jonst. inf. t. 15. f. 2.*

*Swammerd. bibl. t. 27. f. 1, 2.*

*Rœf. inf. 2. scar. 1. t. 7. f. 8, 10.*

*Geoffr. paris 1. p. 68. n. 1.*

*Habitat in Europæ vaporariis.*

*Femina Thorace rotundato, vix retuso, minime cor-  
nuto.*

**carolinus.** 16. *S. exscutellatus, thorace retuso, capite ovali integro  
unicorni, elytris striatis.*

*Habitat in Carolina. D. Garden.*

*Corpus crassitie pollicis, gibbum, obtusum, atrum.  
Capitis clypeus semiovalis. Cornu brevissimum, erecto.  
Thorax antice retusus, lateribus magis cum foveola  
postice; supra lineâ antice excavata. Elytra abdo-  
mine paulo breviora, gibba striis 7 punctatis: qua-  
rum tres suturæ proxima sunt postice profundiores,  
cinereo repletæ. Femora octâ: intermedia remo-  
tissima. Tibiæ 2, truncatæ, angulis ciliatæ. Si-  
milis statura Moloisso.*

**Mimas.** 17. *S. exscutellatus, thorace inermi retuso angulato, capi-  
te obsolete bicorni, elytris inauratis striatis. Musf.*

*Lud. Ulr. 9. \**

*Væst. coleopt. 4. t. 1. f. 4. Copris viridis splendens.*

*Rœf. scarab. 1. p. 20. t. B. f. 1.*

*Habitat in America meridionali.*

**læcer.** 18. *S. exscutellatus, clypeo sexdentato, thorace inermi  
crenulato, tibiis posticis ciliatis, vertice subdidentato.  
Musf, Lud. Ulr. 13. \* Amœn. acad. 6 t. 3. f. 170.  
Osbeck. iter. 51. Scarabæus lævis, thorace inermi, ca-  
pite antice sexdentato.*

*Læff. it. 20. Scarabæus pilularius niger, clypeo anti-  
ce serrato, elytris nebulosè maculatis submollibus  
planiusculis.*

*Habitat in Ægypto, Mauritania, Italia, Hispania, Gallia.*

*Cornuum rudimenta in mare. Thoracis latera margi-  
ne obsolete crenulata & ciliata. Femora postica sæ-  
pius dente obtuso notata. Inter oculos puncta 2 pro-  
minula.*

*Hic in columnis antiquis Romæ exsculptus ab Ægyptiis.*

**didymus.** 19. *S. scutellatus, thorace inermi fossula exarato, capite  
tricuspidi, elytris striatis. Musf. Lud. Ulr. 14.*

*Gron.*

*Gron. zooph. 420.*

*Pet. gaz. t. 27. f. 7.*

*Habitat in America.*

*Sexus alter mucronem parvum habet in antica thoracis.*

valgus. 20. *S. exscutellatus*, thorace mutico, capite cornuto, femoribus secundi paris remotis. *Musl. Lud. Vir. 15.*

*Pet. gaz. t. 27. f. 8.*

*Il bitat in America.*

*Elytra brevia. Digniti magis hirsuti, quam in reliquis.*

hispanus. 21. *S. exscutellatus*, thorace mutico, clypeo cornuto emarginato, elytris striatis, femoribus secundis remotissimis. *Musl. Lud. Vir. 12. \**

*Pet. gaz. 13. t. 8 f. 4 Rhinoceros lusitanicus niger splendens, vaginis striatis.*

*Ræf. inf. scar. 1. t. B. f. 2?*

*Habitat in Hispania, Lusitania, Barbaria.*

*Similimus S. lunari, sed minor; Thorax transverse retusus absque sinibus, nec linea exaratus. Clypei emarginatura convenit, qua ambo differunt a S. Molosso.*

carnifex. 22. *S. exscutellatus*, thorace inermi plano angulato scabro, capitis cornu inflexo, corpore aeneo.

*Catech. car. 3. p. 11. t. 11. f. ult. Scarabæus pilularius americanus.*

*Gron. zooph. 450.*

*Pet. gaz. t. 27. f. 8.*

*Brown. jam. 428. t. 43. f. 5.*

*Habitat in Carolina D. Garden; formatam e stercore pilulam conjunctis viribus per totam astatem volunt volutantque, etiam non suam, usque in foveam determinatam, uti f. pilularis.*

*Corpus S. stercoreario brevius, latum, depressum, aeneum. Caput clypeo integro, semiovali, postice cornuto: Cornu in sexu altero obsoletum, in altero longitudine thoracis, incurvatum, nigrum, leve. Thorax depressus, planus, auratus: scaber planitie subtrigona, postice in angulos duo (Mori) emarginante. Elytra caeruleo-aenea, scabra, multipliciter striata, abdomine paulo breviora. Femora lata, aenea, ovata. Tibiæ nigrae. Palmæ digitis 3, quorum 2 fixi s. soli agnes; tertius articulus longior.*

23. *S.*

granarius 23. S. scutellatus niger, thorace inermi: clypeo tuberculato, elytris substriatis margine postico testaceis.

*Habitat in Europa.*

*Magnitudo Seminis Tritici. Clypeus tuberculo solitario.*

nuchicornis 24. S. exscutellatus, thorace inermi rotundato, occipite spina erecta armato. *Fn. suec.* 381. \*

*It. gotl.* 41. Scarabæus capite thoraceque atro opaco, elytris cinereis nigro nebulosis.

*Rat. inf.* 108. n. 12

*Schæff.* 1758. t. 3. f. 9 - - 15.

*Geoffr. parif.* 1. p. 89. n. 3.

*Raf. inf. scar.* t. A. f. 4.

*Gron. zooph.* 454.

*Habitat in Europa.*

*temina tantum a tergo cornuta; Mas muticus.*

Vacca. 25. S. exscutellatus, thorace inermi retuso, occipite spina gemina erecta.

*Habitat in Gallia australi D. Gouan. Borussia. F. C. Fabricius.*

*Simillimus S. nuchicorni Thorace aeneo, Elytris fuscis: atomis fuscis; sed differt Thorace antice retuso: medio prominulo submarginato; Capitis occipite non spina unica longa, sed 2 brevibus, erectis; nonnihil distantibus.*

Taurus. 26. S. exscutellatus, thorace inermi, occipite cornibus binis reclinatis.

*Scop. carn.* 25. Scarabæus illyricus.

*Schæff. scar.* 1758 t. 3. f. 7, 8

*Schreber. inf.* 1. f. 6, 6, 7. Scarabæus Taurus capite cornibus duobus lunatis lateralibus.

*Habitat in Germania. Schæff. Schreber., in Gallia. Gouan.*

*Simillimus S. nuchicorni, sed Spina 1. Cornua filiformia, distantia, arcuata, thoraci fere incumbentia.*

Bison. 27. S. exscutellatus, thorace antice mucronato, vertice capitis cornibus binis lunaribus.

*Habitat in Gallia australi. D. Gouan.*

*Corpus atrum, S. stercoreario minus. Caput semiovale, margine elevato fasciolaque elevata, cui insident Cornua 2, distantia, incurva, erectiuscula, capite longiora. Thorax levis, antici valde retusus, pro-*



*pra antrorsum exiens in mucronem obtusiusculum, longitudine capitis; ad scutelli locum in thorace puncta 2 impressa. Elytra striata, fere breviora. Abdomine, subtus ferrugineo-pubescente. Antennæ clava ferruginea.*

- subterra- 28. *S. exscutellatus*, thorace inermi glabro, capite tuberculis tribus, elytris finis crenatis. *Fn. succ. 382. \**  
neus. *Gadd satog. 76.* Scarabæus niger, capitis clypeo lunato tribus tuberculis notato.  
*Switz. inf. t. 1. f. 2.*  
*Habitat in Europa.*
- erraticus. 29. *S. thorace inermi lævi*, capite tuberculo unico, elytris testaceis. *Fn. succ. 383. \**  
*Habitat in Europa, forte ♂ in India.*
- maurus. 30. *S. scutellatus*, thorace inermi, capite mucronibus tribus, corpore violaceo, abdomine testaceo.  
*Habitat in Mauritania. Cl. Alströmer.*  
*Oblongus, viridi-carniæus. Abdomen sordide lutescens, villosum. Thorax convexus; mucrones 3 transversî in antica capitis.*
- Fossor. 31. *S. scutellatus*, thorace inermi subretuso, capite tuberculis tribus: medio subcornato. *Faun. succ. 384. \**  
*Geoffr. parif. 1. p. 82. n. 20.*  
*Faun. succ. 382.* Scarabæus ovatus ater glaber.  
*Habitat in Europæ collibus.*
- fimetarius. 32. *S. scutellatus*, thorace inermi, capite tuberculato, elytris rubris, corpore nigro. *Fn. succ. 385. \** *Geoffr. parif. 1. p. 81. n. 18. Scop. carn. 20, 21.*  
*Faun. succ. 1. p. 355.* Scarabæus capite thoraceque nigro, antennis elytrisque rubris.  
*Schæff. 1758. t. 3. f. 17, 18, 19.*  
*Frisch. inf. 4. t. 19 f. 3.*  
*Raf. inf. 2. scarab. t. A. f. 3.*  
β. Scarabæus capite thoraceque nigro glabro, elytris griseis, pedibus pallidis. *It. æl. 41.*  
*Uddm. diff. n. 2.*  
*Habitat in Europæ stercoratis.*
- hæmorrhoidalis. 33. *S. scutellatus*, thorace inermi, capite tuberculato, elytris apice rubris. *Fn. succ. 386.*

*Faun.*

*Fann. succ. 1. p. 358.* Scarabæus ater, elytris postice ferrugineis, pedibus rufis.

*Habitat in Europæ fungis & putridis.*

- conspicuos. 34. *S. scutellatus*, thorace inermi, marginibus lateralibus albidis, capite tuberculato, elytris lividis nigro maculatis. *Fn. succ. 387. \**

*Habitat in Europæ stercoreis primo vere.*

- varianus. 35. *S. scutellatus*, capite tuberculato, elytris lævibus glaucis fusco punctatis.

*Habitat in Carolina. D. Garden.*

Magnitudo *Luc. Cervi*. Caput subovatum, integrum, nigrum: vertice tuberculo brevissimo. Thorax glauco-fuscus, convexus, aequalis, marginatus, adpersus punctis excavatis obsoletis. Scutellum læve. Elytra colore *S. Herculis* s. glauca, temere adpersa punctis nigro-fuscis inaequalibus, non striata, longitudine abdominis. Antennæ & Femora ferruginea. Pedes nigri. Femora postice ciliata.

\* \* \* Mutici capite & thorace inermi.

- Gigas. 36. *S. thorace inermi* retuso, capite inermi supra margineque angulato. *Mus. Lud. Ulr. 16. \**

*Habitat in Egypto.*

*Magnitudinis primæ, ater.*

- scaber. 37. *S. scutellatus muticus*, thorace elytrisque antice scabris. *Mus. Lud. Ulr. 17. \**

*Habitat in India.*

*Magnitudo dupla S. nasicornis. Caput angulatum, retusum puncto in media prominulo.*

- laticollis. 38. *S. exscutellatus muticus niger*, clypeo sexdentato, elytris sulcatis.

*Habitat in China.*

Corpus *S. sacro* simillimum, sed  $\frac{1}{2}$  minus. Clypeus sexdentatus absque coram rudimento. Oculi dimidii supra & dimidii infra clypeum. Thorax suborbiculatus, valde convexus, lævis, colicoptris latior. Elytra sulcis septem.

- longimanus. 39. *S. muticus*, pedibus anticis arcuatis longissimis. *Mus. Lud. Ulr. 18. \**

N n

Habi-

*Habitat in India.*

*Thoracis margo crenulatus. Tibiæ antice longitudine corporis, ut in Cerambo longimano. Femora antica in medio dente valido. Ungues quasi duplicati.*

- pilularius.** 40. *S. exscutellatus muticus niger opacus lævis, subtus æneus, thorace postico rotundato. M. L. U. 19. \**

*Arist. lib. 5. c. 18.*

*Plin. nat. 11: 34. Pilularius.*

*Raj. inf. 105. n. 1.*

*Catesb. car. 3. t. 11. F. sinistra.*

*Habitat in Italia, Hispania; occupatus quotidie Sisyphi instar volvit globum e stercore imprimis humano confectum, se sæpius septies majorem, alter alterumve jucat vide Læst. it. 20.*

*Corpus magnitudine & statura S. stercorarii s. S. vernalis: supra atrum, opacum; subtus æneum. Elytra minime striata aut punctata. Clypeus capitis ovatus, maxillis brevior.*

- Schæfferi.** 41. *S. exscutellatus muticus, thorace rotundato, clypeo emarginato, elytris triangulis, femoribus posticis elongatis dentatis. Schæff. inf. 1758. t. 3. f. 20.*

*Scop. carn. 84. Scarabæus longipes.*

*Habitat in Germania. I. C. Schæfferus.*

*Corpus magnitudine S. horticole, nigrum. Capitis clypeus rotundatus, emarginatus. Thorax convexus. Elytra brevia, postice coarctata gibbaque, unde abdomen quasi in fance inter elytra & pedes. Pedes postici a modum longi: Femoribus subtus basi posticeque dente; Tibiis curvatis*

- stercorarius.** 42. *S. scutellatus muticus ater glaber, elytris sulcatis, capite rhombeo: vertice prominulo. Fn. suec. 388. \**

*Geoffr. parif. 1. p. 75. n. 9. Scop. carn. 26.*

*Mouff. inf. 151. Scarabæus stercorarius.*

*List. mut. 17. f. 4.*

*loqu. 380. n. 4.*

*Friseb. inf. 4. t. 13. f. 6.*

*Raj. inf. 90. n. 7. & 74. n. 1.*

*Banh. ballon. 212. f. ultim.*

*Habitat in Europa, America. Kalm. Perforat terram aridam sub stercore, Acaris obnoxius. Insurrexerunt volitante frequentique vespertino indicat proximum serenum fore diem.*

43. *S.*

- vernalis. 43. *S. scutellatus muticus*, elytris glabris lævissimis, capitis clypeo rhombeo: vertice prominulo. *Fn. succ.* 389. *Geoffr. paris.* 1. p. 77. n. 10.  
*Habitat in Europa. Trahit stercora ovium ad foramina, uti S. pilularius.*  
*Antennæ hinc nigrae, stercorario rubrae. Corpus nigro-cærulescens.*
- calcarius. 44. *S. muticus*, capite clypeato emarginato, femoribus posticis dentatis.  
*Habitat in Ægypto.*
- Schreber. 45. *S. exscutellatus muticus ater glaber*, elytris maculis duabus femoribusque rubris.  
*Habitat in Germania.*  
*Corpus fere S. nuchicornis. Capitis clyteus integer ruga transversa. Thorax gibbus & fere retusus. Elytra vix thorace longiora: macula purpurascens ad basin, aliaque ad apicem majore. Femora rubra.*
- varus. 46. *S. exscutellatus muticus niger*, clypeo emarginato, thorace subaeneo, elytris abbreviatis.  
*Habitat in Stercore Bovino Germaniæ. D. Schreber.*  
*Simillimus S. nuchicorni, sed magnitudine tantum oryzae.*
- amazonus. 47. *S. muticus testaceus*, thorace lituris duabus nigris, elytrisque margine exteriori callo fusco.  
*Habitat Surinami.*  
*Corpus laeve, testaceum, S. stercorario dimidio minus. Thorax a terga lineolis duabus, nigris, longitudinalibus, thorace brevioribus. Elytra margine exteriori versus posteriora notata callo fusco, ut in S. floridano.*
- fabulosus. 48. *S. scutellatus muticus niger opacus tuberculis rugosis*, antennarum basi pilosis. *Fn. succ.* 390. \*  
*Scop. carn.* 23. Scarabæus rugosus.  
*Habitat in Europæ terra sabulosa.*
- Chrysis. 49. *S. scutellatus muticus*, sterno porrecto, scutello elytris dimidio brevior. *Mus. Lud. Ulr.* 21. \*  
*Gron. zooph.* 428. t. 15. f. 8.  
*Habitat in America australi.*  
*Corpus magnitudine & colore S. aurati; sed pectus subtus antrorsum cornutum.*

furina-  
mus. 50. *S. scutellatus muticus niger*, thoracis incisurarumque marginibus flavis, sterno porrecto. *Amæn. acad.* 6.

p. 391. \*

*Habitat* Surinami.

Caput *linea flava*. Abdominis segmentum ultimum maculis 3 s. 4 flavis.

nitidus. 51. *S. scutellatus muticus*, thorace postice lobato, capite spina recumbente, sterno porrecto. *Mas. Lud. Ulr.* 26. \*

*Gron. zooph.* 455.

*Ræf. scar.* 1. t. B. f. 4.

*Habitat* in Carolina.

*Scutellum* minimum; *Tibia* non dentata. *Thoracis* & *elytrorum* margines testacei. *Pedes* parum pilosi. *Corpus* glabrum viride. *Abdominis* basis utrinque mucronata, ut *S. aurati*. *Labii superioris apex erecto-porrectus*.

festivus. 52. *S. exscutellatus muticus*, thorace nigro maculato, elytris rubro-æneis, sterno porrecto. *Gron. zooph.* 452.

*Ræf. scar.* 1. t. B. f. 8. mas.

*Habitat* in America. *Rolander*.

*Magnitudo S. Melolonthæ*, at brevior, niger. Caput nigrum, lunatum, integrum. *Thorax* laevis, convexus, rubro-æneus, postice rotundatus absque Scutello: Macula lobata nigra in disco; unica nigra utrinque ab angulo laterali thoracis exiens: unica utrinque nigra parva intra angulum thoracis ad punctum impressum. *Elytra* rubro-ænea, striata, longitudine thoracis.

lineola. 53. *S. muticus niger*, lineola flava a capite ad scutellum ducta.

*Ræf. inf.* 2. p. 23. t. B. f. 7. mas.

*Habitat* in America. *Rolander*.

*Minor S. stercorario*, niger. Lineola flava longitudinalis thoracis. *Maris Elytra* immaculata. *Femina* macula 3 flavæ, sparsæ in singulis elytris & postica abdominis, quæ pone elytra luteo maculata. *Femora* utrisque flavescentia.

nitidus. 54. *S. scutellatus muticus niger* glaber punctis albis sparsis, abdomine subtus punctis quaternis albis.

*Ha-*

*Habitat in Barbaria. Brander.*

Corpus nigrum, supra glabrum. Caput obtusum. Pedus pubescens. Elytra, pedex ultra elytra & thorax adspersa punctis albis copiosis, uti Abdominis segmenta subtus in singulis. Affinis Sc. hirtello, sed supra lavis.

sepicola. 55. S. scutellatus muticus ferrugineus, thorace elytrisque pilosis. *Mus. Lud. Ulr. 24. \**

*Habitat in India.*

*Habitus S. horticola, sed triplo major.*

syriacus. 56. S. scutellatus muticus, capite thoraceque piloso viridibus, elytris pilosis ciliatis. *Mus. Lud. Ulr. 25. \**

*Habitat in India.*

*Statura S. horticola.*

Fullo. 57. S. scutellatus muticus, antennis heptaphyllis, corpore nigro pilis albis, scutello macula duplici alba. *Fn. fec. 394. \* Scop. garn. 12.*

*Monff. inf. 160. f. 4.*

*Hoffm. pict. t. 7.*

*Raf. inf. 93. n. 9.*

*Frisch. inf. 11. t. 1. f. 1.*

*E. N. C. dec. 2. ann. 6. obs. 239.*

*Raf. inf. 4. t. 30.*

*Geoffr. parif. 1. p. 69. n. 2.*

*Habitat in Europæ & Barbariæ dunis arenosis, visitans Elym Arundineque arenariis, Quercu.*

Corpus nigrum adpersum pilis albis, subtus hirsutum. Capitis clypeus obtusissimus. Thorax linea alba longitudinali. Scutellum maculis 2, ovatis, albis, paribus. Abdominis incisuræ utrinque macula alba. Cauda acutiuscula. Antennæ lamellis 7, equalibus, longioribus quam in reliquis.

agricola. 58. S. scutellatus muticus, thorace villosus, elytris lividis limbo fuscæque arcuata nigris.

*Scop. carn. 6. Scarabæus cyatiger.*

*Pod. inf. 21. Scarabæus agricola.*

*Habitat in Europa australi. D. Afcanius.*

Statura S. horticola, sed minor, niger, villosus. Caput Thoraxque fusca anea, albo villosa. Elytra

Nm 3

gla-

Scarabæorum hirsutorum larvæ sub radicibus plantarum degunt & easdem consumunt; at declinatae solis Arborum pascuntur.

glabra, livida, macula scutellari ambitu nigro; fasciâ in medio recurvata nigra, quæ non tangit nigredinem lateralem. Ungues purpurei. Capitis labium adscendens.

Hortico- 59. *S. scutellatus muticus*, capite thoraceque cæruleo sub-  
la. piloso, elytris griseis, pedibus nigris. *Faun. suec.*

391. \* *Geoffr. parif.* 1. p. 75. n. 8.

*It. scan.* 116, 321. *Scarabæus trifidus.*

*Raj. inf.* 380. n. 3.

*Frisch. inf.* 4. t. 14.

*List. app.* 8. n. 3.

*Pet. gaz.* t. 22. f. 9.

*Habitat in Europæ hortis, Pomonam devastat, intacta Pyro communi.*

Melolon- 60. *S. scutellatus muticus testaceus*, thorace villosa, cau-  
tha. da inflexa, incisuris abdominis albis. *Fn. suec.* 392. \*

*Scop. carn.* 16.

*Monff. lat.* 160. f. 2.

*Aiar. inf.* 454. t. super. f. 2.

*Hoffm. inf.* t. 1. f. 11.

*Ged. inf.* 1. t. 78.

*Merian. europ.* 1. p. 2. f. 4.

*Frisch. inf.* 4. t. 14.

*Raj. inf.* 104. n. 1.

*Pet. gaz.* t. 9. f. 2.

*Alb. inf.* 60.

*Raf. inf.* 2. scarab. 1. t. 1.

*Lewwenb. epist.* 1. p. 18.

*Sultz. inf.* t. 1. f. 3.

*Schaff. elem.* t. 8. f. 3. & t. 109. f. 4.

*Habitat in Europa.*

*Vesperis circum volitans. Exedunt radices segetis Lar-  
væ; Scarabæi folia arborum, Fagi, aliarumque.*

*Meleagridibus gratus cibus & vespertilionibus.*

*Antennæ lamellis 6 f. 7, reliquis 3.*

Solstitia- 61. *S. scutellatus muticus testaceus*, thorace villosa, ely-  
lis. tris luteo pallidis: lineis tribus albis parallelis. *Faun.*

*suec.* 393. \* *Geoffr. parif.* 1. p. 74. n. 7. *Scop.*

*carn.* 3.

*Monff. inf.* 160. f. 3.

*Pet. gaz.* t. 22. f. 9.

*Raj. inf.* 380. n. 2.

*List.*



*List. mut.* 18. f. 17.

*Frisch. inf.* 9. t. 15. f. 3.

*Habitat in Europa. Politat vesperi imprimis.*

occidentalis. 62. *S. scutellatus muticus testaceus, thorace pubescente, elytris lineis quatuor niveis parallelis.*

*Habitat in Carolina.*

*Statura S. foissitialis, sed major, pubescens thorace scutello & elytris. Thorax linea alba, longitudinali. Elytra lineis tribus, albis, aequalibus; quarta vero conjungit utraque ad suturam.*

hemipterus. 63. *S. scutellatus muticus, thorace tomentoso rugis duabus longitudinalibus marginato, elytris abbreviatis.*

*Geoffr. parif.* 1. p. 78. n. 12.

*Habitat in Germania. P. Forskål; in Gallia.*

*Clypeus apice emarginato. Antennæ piceæ. Corpus nigrum. Thorax marginatus, planiusculus, rugis duabus longitudinalibus elevatis. Elytra abdomine dimidio breviora. Abdomen pone elytra saepe cinereum. Plantæ piceæ. Aculeus ani feminae serratus; exsertus.*

farinosus. 64. *S. scutellatus muticus niger polline virescente, elytris abbreviatis. Fn. suec.* 399. \*

*Scop. garn.* 9. Scarabæus argenteus.

*Pod. inf.* 20. Scarabæus argenteus.

*Habitat in Europa.*

aulicus. 65. *S. scutellatus muticus pilosus luteus, capite nigro, pedibus posticis elongatis uniungiculatis.*

*Habitat in Africa. Brander.*

*Corpus magnitudine Phaseoli. Caput obtusum, nigricans. Antennæ nigrae. Thorax flavissimus, in eo pubescens. Elytra flavissima, abbreviata. Subtus totus aureo-argenteus. Pedes rufescentes: Postici multo longiores.*

longipes. 66. *S. scutellatus muticus atrocyanens, pedibus nigris: posticis elongatis uniungiculatis. Mus. Lud. Ulr.* 20. \*

*Habitat ad Cap. b. spei. R. Tulbush.*

lanigerus. 67. *S. scutellatus muticus subtus lanatus, capite thoraceque auratis, elytris luteis. Mus. Lud. Ulr.* 22. \*

*Habitat in India.*

*Labium sutura distinctum a capite. Elytra sulphurea.*

squali- 68. *S. scutellatus muticus niger hirtus, thorace subcarinato.*  
 dus. *Scop. carn. 13. Scarabæus squalidus.*

*Habitat in Germania.*

*Simillimus S. hirtello, paulo maior, supra niger thoracis lateribus pilosis; Elytra immaculata, pilosa.*

hirtellus. 69. *S. scutellatus muticus hirtus testaceo nigricans, elytris pallido maculatis.*

*Scop. carn. 8. Scarabæus hirtus.*

*Pod. inf. 21. Scarabæus hirtus.*

*Habitat in Germania.*

*Corpus S. fasciato dimidio minus, nigricans, obtectum pilis flavicantibus, ut vix conspiciatur, elytra tamen minus. Elytra adpersa maculis parvis, difformibus, albicantibus, circiter septem. Clypeus emarginatus.*

fasciatus. 70. *S. scutellatus muticus niger tomentoso-flavus, elytris fasciis duabus luteis coadunatis. Fn. succ. 395. \**

*Scop. carn. 5.*

*Mouff. inf. 161. f. 6.*

*Geoffr. parif. 1. p. 80. n. 16.*

*Schæff. ic. t. 1. f. 4.*

*Habitat in Europæ floribus Syringæ, Filipendulæ.*

indus. 71. *S. scutellatus muticus, thorace hirsuto: elytris lividis fusco punctatis. Mus. Lud. Ulr. 27. \**

*Habitat in India.*

*Statura S. fasciati. Thorax postice emarginatus. Scutellum nudum.*

brunus. 72. *S. scutellatus muticus testaceus, elytris striatis, thorace utrinque puncto notato. Mus. Lud. Ulr.*

*Habitat in Europa.*

capensis. 73. *S. scutellatus muticus rufus hirtus adpersus punctis albis. Mus. Lud. Ulr. 30. \**

*Pet. gaz. t. 8. f. 6.*

*Raf. inf. 2. scar. 1. t. B. f. 6.*

*Habitat ad Cap. b. Spel.*

Eremita. 74. *S. scutellatus muticus aeneo-ater, thorace inæquali, scutello sulco longitudinali.*

*Scop.*

*Scop. carn. 15.* Scarabæus Eremita.

*Raf. inf. scar. 1. t. 3. f. 6.*

*Habitat in Europa australi, in ligno Salicis, fragrans corio ruffico.*

Clypeus quadratus marginibus elevatis. Thorax rugis duabus, elevatis, longitudinalibus. Elytra nigra, glabra. Tibiæ omnes aculeatae. Differt a *S. variabili*, quod triplo maior; quod Thorax antice rugis duabus elevatis; quod clypeus carinis non emarginatus, verum supra antennis interculo emittens; quod non pubescens sub pectore.

*infecula- 75. S. scutellatus muticus, thorace lineolis quatuor albis, rila. elytris viridibus, abdominis inclurari barbatis. Mus. Lud. Utr. 26. \**

*Habitat ad Cap. b. spec. Tullboh.*

*Corpus subtus lana helvola, in fasciculis digesta.*

*puncta- 76. S. scutellatus muticus testaceus, elytris punctis tribus tus. subfuscis obsoletis distantibus. Mus. Lud. Utr. 23. \* Gron. zooph. 438.*

*Habitat in Carolina. D. Garden*

*Corpus nigritudine S. audati, leve, testaceum. Pectus pubescens. Scutellum aurum. Clypeus integer, nitens. Thorax punctis duobus, impressis, obsoletis. Elytra minime striata, punctis 3 fusco-fuscaliosis: primo ad angulum anticam anteriorem; secundo in medio; tertio ad gibbum apicis. An. sufficenter distinctus a S. lanio?*

*Lanius. 77. S. exscutellatus muticus ruber adpersus punctis nigris. Sloan. jam. 2. t. 237. f. 7. 8. Raf. inf. 2. scar. 1. t. B. f. 3. Habitat in America.*

*auratus. 78. S. scutellatus muticus auratus, segmento abdominis primo lateribus unidentatis, clypeo planiusculo. Fa. secc. 409. \* Scop. carn. 17.*

*Hoffm. pi&. t. 6. f. prior.*

*Raf. inf. 76. n. 7.*

*Frisch. inf. 12. t. 3. f. 1.*

*Raf. scarab. 1. 2. f. 9, 8.*

*Pei. gaz. 1. 23. f. 12.*

*Worm. mus. 342.*

*Ann. inf. 1. 12.*

N n 5

Habi-

*Habitat in Europæ acervis formicarum, plantarum; delectatur floribus Pæoniæ, Sorbi aucupariæ, Succo stillante Quercus.*

*Pectoris latera postice in dentem exeunt. Sternum porrectum.*

variabilis. 79. *S. scutellatus muticus lævis opacus ater, elytris albo punctatis. Fn. succ. 402. \**

*Ræf. inf. 2. scarab. 1. t. 3.*

*Habitat in Europæ Quercubus varius.*

*Mas femina quintuplo minor est; variat colore aureo & rubro.*

æruginosus. 80. *S. scutellatus muticus auratus, supra viridis. Gron. mus. 424. t. 15. f. 7.*

*Habitat in regno Tunetano. \**

*Statura S. aurati, sed thorax elytraque viridia, immaculata. Scutellum ovatum, obtusum. Pectus non pilosum.*

nobilis. 81. *S. scutellatus muticus lævis auratus, abdomine postice albo punctato. Faun. succ. 401. \* Scop. carn. 18.*

*Ræf. inf. 2. scar. 1. t. 3. f. 3, 4, 5.*

*Uddm. diss. 1. Scarabæus viridi æneus, thorace fulcato, elytris rugosis.*

*Geoffr. parif. 1. p. 73. n. 6.*

*Habitat in Europæ Floribus.*

æneus. 82. *S. scutellatus muticus oblongus cyaneus glaber, abdomine testaceo, capitis apice tridentato. Mus. Lud. Utr. 29. \**

*Habitat - - -*

*Magnitudo Sc. f. brunni. Abdomen pubescens, elytris longius; supra labium oris dentes 3, transversim paralleli, parvi, ut in S. nitido.*

quisquiliosus. 83. *S. exscutellatus ater glaber, elytris livido-testaceis. Fn. succ. 397. \**

*Scop. carn. 29. Scarabæus minimus.*

*Habitat in Europæ quisquiliis.*

*Magnitudo feminis Milii. Pedes ferruginei.*

quadrimaculatus. 84. *S. scutellatus muticus niger oblongus, elytris maculis duabus rubris. Fn. succ. 398. \**

*Habi-*

*Habitat in Europa.*

*Magnitudo Oryzæ.*

plagiatus. 85. *S. muticus niger*, elytris plaga rufescente.

*Habitat in Europa: Upsalæ.*

*Corpus magnitudine oryzae, nigrum. Elytra striata, in singulis macula oblonga, purpurascens, juxta suturam dorsalem.*

rufipes. 86. *S. muticus ater*, antennis pallidis, elytris lævibus.

*Fn. suec. 403. \**

*Habitat in Europæ stercoreatis.*

*Simillimus S. subterraneo, sed elytra striis minime crenatis & thorax minus gibbus.*

Ceratonie. 87. *S. muticus*, thorace scabro lateribus tridentato, elytris griseis. *Mus. Lud. Utr. 31. \**

*Hasselq. iter. 409. n. 99. Scarabæus ceratonie.*

*Habitat in Ceratonia Cairi.*

190. LUCANUS. *Antennæ* clavatæ: clava compressa latere latiore pectinato-fissili.

*Maxillæ* porrectæ, exsertæ, dentatæ.

Cervus. 1. *L. scutellatus*: maxillis exsertis apice bifurcatis latere unidentatis. *Fn. suec. 405.*

*Faun. suec. 1. n. 377. Scarabæus cornibus duobus mobilibus æqualibus apice bifurcatis: introrsum ramis denticulisque instructis.*

*Scop. carn. 1. Lucanus Cervus.*

*Mouff. inf. 148. Cervus volans.*

*Aldr. inf. 151. f. 1.*

*Hoffm. inf. 1. 6.*

*Worm. mus. 242.*

*Fonst. inf. 1. 14. f. 1, 2.*

*Mer. eur. t. 168.*

*Raj. inf. 74.*

*Oleat.*

---

Lucani Larvæ in ligno putrido vitam degunt, structura simillimæ Scarabæis. *Læ. interruptus* & *Se. calvus* adeo inter se affines, ut demis antennis non de genere, sed specie etiam distingerentur; hinc ambo genera nimis inter se affinia.

*Olear. mus. t. 16. f. 5. Taurus volans.*

*Rosf. scar. 1. t. 4. 5. f. 7, 9.*

*Imperat. nat. 924. t. 3.*

*Saltz. inf. 1. 1. f. 4.*

- β. *Scarabeus maxillis lunatis prominentibus dentatis, thorace inermi. Fn. succ. 338. (rœmina).*

*Rosf. inf. 2. t. 5. f. 8.*

*Imperat. nat. 925. f. 1, 2.*

*Geoffr. parif. 1. p. 69. n. 2.*

*Gron. zool. 446.*

*Schaff. elem. 1. 9. f. 1.*

*Habitat in Europa ligno Quercina putrido.*

*Cornua ossifera sunt Maxillæ, in hac specie majores, simpliciter.*

*Varietas β pro distincta specie habetur a Geoffroa, quæ femina observante Roselio.*

- Capreo- 2. *L. foveellatus: maxillis externis apice tantum forcatis.*  
lus. *Ann. acad. 6. p. 397. n. 4. \* Mus. Lnd. Ulr. 30. \**

*Merian. curio. 165. quædam figuram.*

*Habitat in America septentrionali.*

*Similissimus L. Cerco, sed dimidio minor & Maxillæ absque dente isto laterali.*

- tridentatus. 3. *L. maxillatus depressus niger, thorace utrinque tridentato. Fann. f. 10. 446. Fr. ul. 152. \**  
*Habitat in Oelandia.*

- interrup- 4. *L. exfoveellatus, antennis arcuatis, corpore oblongo*  
tus. *depressio, vertice spina recumbente, thorace abdomi-*  
*neque remouis. Mus. Lnd. Ulr. 33. \* Mus. Ad.*  
*Fr. 52. Gron. zool. 447.*

*Merian. fur. 1. 50.*

*Pet. gar. 1. 27. f. 7.*

*Brown. jam. 429. t. 44. f. 7. Dermestes.*

*Habitat in America: Cai Pua.*

*Facies S. vulgi, & thorax affinitus. Thorax linea exaratus. Elytra striata.*

- carinatus. 5. *S. depressus, thorace nudo capite brevior: angulis*  
*posticis excavatis. Mus. Lnd. Ulr. 34. \**

*Habitat in India.*

*Abdomen brevissimum, non longius thorace cum capite.*

*Pectus postice terminatum angulo acuto.*

parallelipipedus. 6. *S. scutellatus depressus niger*, maxillis dente laterali elevato.

*Geoffr. parif. 1. p. 68. Platyceros 3.*

*Schæff. elem. t. 101. f. 1.*

*Habitat in Germania, Gallia.*

*Ita similis facie, structura, antennis & omnibus S. Cervo summa, ut nisi Scies minor esset, eundem dicerem; sed color ater, non purpurascens-niger, & corpus magis depressum.*

Caraboides. 7. *S. scutellatus cærulescens*, maxillis lunulatis, thorace marginato. *Faun. suec. 407. \**

*Uddm. diff. n. 40. Carabus cærulescens.*

*Geoffr. parif. 1. p. 63. Platyceros 4.*

*Scop. carn. 2. Lucanus Caraboides.*

*Schæff. ic. t. 6. f. 8.*

*Habitat in Europa.*

191. DERMESTES. *Antennæ clavatæ: capitulo perfoliato: articulis tribus crassioribus.*

*Thorax convexus, vix marginatus.*

*Caput sub thorace inflexum condens.*

lardarius. 1. *D. niger*, elytris antice cinereis. *Faun. suec. 403.*

*Geoffr. parif. 1. p. 100. n. 5. Scop. carn. 34.*

*Gæd. inf. 2. t. 41.*

*Blank. inf. t. 11. f. K. L. M.*

*Raj. inf. 107. n. 4.*

*Mer. inf. 2. t. 33.*

*Frisch. inf. 6. t. 9.*

*Habitat in Europæ animalibus, lardo, carnibus, repositoryis culinariis infestus.*

elongatus. 2. *D. niger*, elytris basi fasciæque postica lividis, antennis pedibusque ferrugineis. *Fa. suec. 409. \**

*Habitat in Europa.*

*Insectum serè filiforme est.*

3. *D.*

*Dermestis Larvæ exedunt & destrunt Animalium cadavera, res culinaries, Pelles, Cortices, Ligna, Semina & pleraque alia.*

- undatus. 3. *D. niger*, elytris fascia alba lineari duplici undulata. *Faun. suec.* 410. \*  
*Habitat in Europæ putridis.*
- pellio. 4. *D. niger*, coleoptris punctis albis binis. *Faun. suec.* 411. \* *Scop. carn.* 37.  
*Frisch. inf.* 5. t. 8.  
*Sultz. inf.* t. 2. f. 5, 6.  
*Habitat in Europæ cibariis, pellibus.*
- Capucinus. 5. *D. niger*, elytris abdomineque rubris, thorace emarginato retuso. *Fn. suec.* 416. \*  
*Habitat in Europæ truncis, parietibus ligneis.*  
*Böstrichio Geoff.* t. 5. 1. & *Schæff. elem.* t. 28.
- muricatus. 6. *D. niger*, elytris postice retusis dentatis, thorace muricato gibbo. *Brunnich.*  
*Habitat in Guinea.*  
*Corpus nigrum, nitidum, magnitudine D. violacei.*  
*Caput fronte fulva, villosa. Antennæ trinodes.*  
*Thorax gibbus, convexus, supra ad utrumque latus muricatus dentibus pluribus. Elytra postice retusa, ut fere truncata, dentibus 2 majoribus & 4 minoribus in parte retusa. Abdomen subtus villosum pilis flavescentibus.*
- typographus. 7. *D. testaceus pilosus*, elytris striatis retusis præmorfo-dentatis. *Fn. suec.* 418. *It. etl.* 26, 195.  
*Raj. inf.* 100. n. 10. *Scarabæus.*  
*Habitat in Europa intra cortices truncorum labyrinthos formans; in America. Kalm.*
- calcographus. 8. *D. ater*, elytris præmorfo-dentatis rufis: lateribus basique nigricantibus. *Fn. suec.* 417. \*  
*Habitat in Europæ truncis arborum.*
- micrographus. 9. *D. testaceus glaber*, thorace nigro, elytris apice retusofodentatis. *Fn. suec.* 419. \*  
*Habitat in Europa intra cortices arborum emortuarum.*  
*Corpus nigrum. Antennæ, Elytra, Pedesque testacea.*
- poligraphus. 10. *D. testaceus pilosus*, elytris glaucis obtusiusculis. *Fn. suec.* 420. \*  
*Habitat in Europa sub arborum corticibus: labyrinthis pinnatis.*



- piniperda.** 11. *D. niger* subvillosus, elytris piceis integris, plantis rufis. *Fn. suec.* 421. \*  
*Habitat in Europæ ramulis inferioribus Pini, quos perforat, exsiccat, unde naturæ hortulanus in hac arbore.*
- domestici-** 12. *D. niger*, elytris griseis margine nigris, thorace villosus.  
*so. Fn. suec.* 424. \*  
*Geoffr. parif. 1. p. 111. t. 1. f. 6. Byrrhus.*  
*Habitat in Europa.*  
*Thorax valde gibbus, fere hemisphæricus.*
- violaceus.** 13. *D. nigro-cærulescens*; thorace villoso. *Faun. suec.* 422. \* *Scop. carn.* 51.  
*Fn. suec.* 373. *Dermestes nigro-cæruleus.*  
*Habitat in Europa, cadaveribus inbians.*
- hirtus.** 14. *D. ater* hirtus.  
*Habitat in Europa.*  
*Magnitudo D. undulati, totus ater, capite thorace elytris pedibusque pilis erectis nigris hirtus.*
- fenestralis.** 15. *D. castaneus*, capite nigricante, thorace fusco. *Fn. suec.* 423. \*  
*Habitat in Europa.*
- melanocephalus.** 16. *D. niger* ovatus glaber, elytris griseis. *Faun. suec.* 425. \*  
*Habitat in Europa.*  
*Simillimus Scarabæa quisquilio. Elytra antice & Pedes fusca.*
- Scarabæoides.** 17. *D. ovatus* ater glaber, elytris maculis duabus obsolete ferrugineis. *Fn. suec.* 428. \* *Scop. carn.* 36.  
*Gadd satag. 76. Scarabæus ovatus niger glaber, maculis 2 rubris in singulo elythro.*  
*Habitat in Europa.*  
*Pedes setis rigidis spinosi.*
- marinus.** 18. *D. tomentosus* oblongus fusco cinereoque nebulosus, scutello luteo. *Fn. suec.* 426. \* *Scop. carn.* 35.  
*Frisch. inf. 4. t. 18.*  
*Habitat in Europæ cadaveribus.*  
*Subtus ex nigredine albus.*

19. *D.*

- paniceus. 19. *D. ferrugineus*, oculis rufis. *Fann. suec.* 431. \*  
*Habitat in Europæ pane, quod exedit.*  
*Magnitudo Milii, obtusus, totus castaneus, etiam antennis, vix villosus. Oculi magis rubent.*
- eustatius. 20. *D. ater* glaber obtusissimus, pedibus ferrugineis.  
*Habitat in insula Eustatii Fungis. Rolander.*  
*Magnitudo Pediculi, ater, glaberrimus, pollice valde obtusus, elytris tamen testis.*
- ferrugineus. 21. *D. oblongus ferrugineus semicylindricus*, elytris abbreviatis. *Fn. suec.* 433. \*  
*Habitat in Europa.*
- fumatus. 22. *D. oblongus glaber testaceus*, oculis nigris. *Fann. suec.* 432.  
*Geoffr. parif. 1. p. 104. n. 12.*  
*Habitat in Europæ viis, imprimis in fumo Equino.*
- pedicularius. 23. *D. oblongus testaceus*, elytris abbreviatis. *Fann. suec.* 434. \*  
*Fn. suec. 1. n. 441. Chrysomela dilute testacea hemiptera.*  
*Habitat in Europæ floribus frequens.*
- pulicarius. 24. *D. oblongus niger*, elytris abbreviatis, abdomine acuto. *Fn. suec.* 370.  
*Raj. inf. 108.*  
*Habitat in Floribus, cursitans, agile volans.*
- psyllius. 25. *D. ovatus niger*, abdomine obtuso, thorace elytrisque marginatis. *Fn. suec.* 436. \*  
*Habitat in Floribus.*
- scanicus. 26. *D. fuscus*, thorace testaceo. *Fn. suec.* 437. \*  
*Habitat in Europa.*
- Colon. 27. *D. thoracis lateribus flavis*, elytris griseis puncto nigro. *Fn. suec.* 438. \*  
*Habitat in Europa.*
- niger. 28. *D. oblongus pilosus niger*, elytris molliusculis. *Fn. suec.* 439. \*  
*Habitat in Europa.*

larina- 29. *D. testaceus*, elytris striatis, thorace striis tribus ele-  
mentis. vatis marginibusque denticulato.

*Habitat* Surinami. *Rolander*.

*Oblongus*, magnitudine *Pediculi*.

hemipte- 30. *D. elytris abbreviatis basi exteriore apiceque testaceis*.  
rus. *Habitat* Surinami. *Rolander*.

Magnitudo *Pediculi*. Antennæ capitatae. Pedes ferruginei. Elytra abdomine  $\frac{1}{2}$  breviora, singulis macula glauca cuneiformis in apice, & punctum glaucum ad basin exteriorem elytri,

192. PTINUS. Antennæ filiformes: articulis ultimis majoribus.

Thorax subrotundus, immarginatus, caput excipiens.

pectini- 1. *P. fuscus*, antennis luteis pectinatis.

cornis. *Fn. suec.* 412. *Dermestes pectinicornis*.

*Geoffr. parisi.* 1. p. 65. *Ptinus* 2.

*Habitat* in Europa.

Antennæ longitudinaliter pectinatae, luteae uti Pedes.

pertinax. 2. *P. fuscus unicolor*.

*Fn. suec.* 414. *Dermestes pertinax*.

*Geoffr. parisi.* 1. p. 112. *Byrrhus* 4.

*Habitat* in Europa, terebravit & destruxit sedilia mea: *Attelabus formicario* eradicatur. Captus mortui instar se contrahit immobilis, nec ulla tortura potest excitari in fugam aut motum.

mollis. 3. *P. testaceus*, oculis fuscis.

*Fn. suec.* 415. *Dermestes mollis*.

*Geoffr.* 1. p. 111. *Byrrhus* 2.

*Habitat* in Europa.

Elytra mollia sunt.

impe- 4. *P. fuscus*, thorace subcarinato, coleoptris macula al-  
lia. ba aquilam expansam referente.

*Habitat* in Scaniae arboribus. *D. C. Solander*.

Magnitudo sem. tritici. Antennæ ferrugineae, longitudine corporis. Thorax carina postice elevata. Scutellum nivens. Coleoptra nigra, macula communi

Q o

alba

*alba aquilam expansam quodammodo referente. Pedes ferruginei.*

**Fur.** 5. *P. testaceus sabapierus*, thorace quatuordecimdentato, elytris fasciis duabus albis.

*Scpp. carv.* 210. *Bipressis Fur.*

*Faun. suec.* 651. *Cerambyx Fur.*

*G offr. parif.* 1. p. 164. t. 2. f. 6. *Bruchus* 1.

*Immaturus in Museis pessimus, destruens Herbaria, Infesta, Aves, Pelles, utensilia, culinaria, imo Pulverem Tabaci; non pellitur ambrosiacis. Occiditur arsenico & Annice. Kramer.*

*Dentibus lateralibus thoracis convenit cum Cerambycibus, sed habitu; facie, moribus, metamorphosi Dermestidibus. Abdomen, elytri obiectum, ovatum, alis adeo parvis, ut volatus ineptus.*

**germanus.** 6. *P. fuscus*, thorace transversim rugoso, pedibus ferrugineis.

*Habitat in Germania. D. Schreber.*

*Facies P. testaceus, sed minor. Thorax gibbus, transverse sulcatus. Elytra striata. Pedes subnisi.*

**193. HISTER.** *Antennae* capitatae capitulo solidiusculo; infimo articulo compresso, decurvato.

*Caput* intra corpus retractile. *Os* forcipatum.

*Elytra* corpore breviora.

*Tibiae* anticae dentatae.

**maximus. 1.** *H. maximus.*

*Ninj. Lind. Ultr.* 36 \*. *Hister unicolor.*

*Habitat in India.*

*H. unicolori similis, decuplo maior, thoracis angulis rotundatis, Pectoris apice non ad os usque extenso.*

**major. 2.** *H. rufus ater*, elytris substriatis, thoracis marginibus subtis pilosis.

*Habitat in Barbaria, & India.*

*Similimus H. unicolori, sed duplo maior.*

3. *H.*

**unicolor.** 3. *H. totus ater, elytris substriatis. Faun. suec. 440. \**  
*Scop. carn. 30.*

*Fn. suec. 1. n. 410. Coccinella atra glabra, elytris abdomine brevioribus margine inflexis.*

*Sultz. inf. t. 2. f. 8, 9.*

*Geoffr. parif. 1. p. 94. t. 1. f. 4. Attelabus.*

*Habitat in Europæ arena, terra, stercore.*

**pygmaeus.** 4. *H. totus ater, elytris levissimis. Fn. suec. 441. \**

*Habitat in Svecia.*

*Simillimus precedenti, sed quadruplo minor, at elytra minime striata, si non unica tantum stria arcuata.*

**bimaculatus.** 5. *H. ater, elytris postice rubris. Fn. suec. 442. \**

*Uddm. diff. 20. Coccinella atra glabra, elytris abdomine brevioribus, maculis duabus rubris.*

*Habitat in Europa.*

**maculatus.** 6. *H. ater, elytris bimaculatis. Fn. suec. 443. \**

*Gadd. satog. 76. Scarabæus ovatus niger glaber, maculis duabus rubris in singulo elytro.*

*Schaff. ic. t. 3. f. 9. & t. 14. elem. t. 24.*

*Habitat in Europa.*

*In antica parte elytri macula rubra inaequalis, in postica vero macula rubra lunata, saepe maculae 2 ejusdem elytri cohaerent in lineam.*

194. **GYRINUS.** *Antennae* clavatae, rigidae, capite breviores.

*Oculi* IV: duobus supra, duobus infra.

**Nator.** 1. *G. substriatus. Geoffr. parif. 1. p. 194. t. 3. f. 3.*

*Fn. suec. 779. Dyniscus ovatus glaber, antennis capite brevioribus obtusis. Scop. carn. 299.*

*Merret. pin. 203. Pulex aquaticus.*

*Pet. gaz. 21. t. 13. f. 9. Scarabæus niger nostras, supra aquam velociter crenulatus.*

*Raj. inf. 89. n. 9. Scarabæus subrotundus e caeruleo viridi splendens undique tinctus.*

*Rösel. app. 1. p. 195. f. 31.*

*Sultz. inf. t. 6. f. 43.*

*Poda inf. 44. n. 4.*

Schæff. elem. t. 67.

Habitat in Europæ lacubus, velocissime supra aquam  
cursitans per orbes; dum vero urinatur bulliam æ-  
ream, hydargyrii coloris, secum trahit.

america- 2. G. lavis.

nus.

Habitat in America. L. Spengler.

Simillimus natatori pedibus etiam rubris, & (exceptis  
primis) abbreviatis; oculis 4; antennis similibus, sed  
duplo major; labio oris ciliato; Elytris minime stri-  
atis, cum in natatore sunt obsolete et punctis  
striata.

# 195. BYRRHUS. *Antennæ clavatæ, subsolidæ, sub- compressæ.*

Scrophu- 1. B. niger, elytris albo maculatis futura sanguinea.

lariæ.

Fn. succ. 429. Dermestes tomentosus maculatus, fu-  
tura elytrorum rubra.

Geoffr. parif. 1. p. 114. t. 1. f. 7. Anthrenus squa-  
mosus 1.

Schæff. elem. t. 17.

Habitat in Scrophulariis Europæ.

Museo- 2. B. nebulosus, elytris subnebulosis puncto albo.

rum.

Faun. succ. 430. Dermestes tomentosus maculatus, e-  
lytris puncto albo.

Habitat in Museis, insecta avesque destruens.

Similis precedenti, sed minor absque futura rubra.

Verbasci. 3. B. fuscus, elytris fasciis tribus undulatis pallidis.

Geoffr. parif. 1. p. 115. Anthrenus 2.

Habitat in Verbasco & Pimpinellæ floribus.

Thorax postice pallidus. Frons nigra.

Pilula. 4. B. fuscus, elytris striis atris interruptis.

Fn. succ. 427. Dermestes tomentosus ovatus fusco  
nebulosus.

Habitat in Europa.

Genus cum precedentibus idem suadent habitus & fe-  
mora, licet Antennæ nonnihil differant.

vagus. 5. B. cinereus, elytris fasciis nigris tribus obsolete.

Habitat in Europa: Suecia.

196. SIL-

196. SILPHA. *Antennæ* extrorsum crassiores.*Elytra* marginata.*Caput* prominens.*Thorax* planiusculus, marginatus.

germani- 1. *S. oblonga* atra, clypeo obrotundo inæquali margina-  
ca. nato, elytris obtulissimis margine laterali ferrugineis.

*Aldr. inf.* 454. *tab. infer. f.* 1.*List. loqu.* 381. Scarabæus majusculus ex toto niger.*Geoffr. paris.* 1. p. 99. Dermestes 2.*Habitat in Germania. P. Forstahl. Calmariae. Max. Wurtemberg.*

*Reliquis major. Tota atra, glabra. Clypeus figura sequentis, sed latior quam longus. Elytra obtusissima & fere truncata. Margo lucralis elytrorum inflexus & occultatus ferrugineus est.*

Vespillo. 2. *S. oblonga* atra, clypeo orbiculato inæquali, elytris fascia duplici ferruginea. *Fn. suec.* 444. \* *Mus. Lud. Ulr.* 37. \*

*Scop. carn.* 33. Dermestes Vespillo.*Geditsch. act. berol.* 1752. p. 53. Vespillo.*Mouff. inf.* 147. *lin.* 7. f. 3. & *app. tab. ult.**Imp. alt.* 692. t. 2. f. 2.*Blank. inf.* 168. t. 14. f. 1.*Frisch. inf.* 12. p. 28. t. 2. f. 2.*Ræf. inf.* 4. p. 3. t. 1. f. 1, 2, 3.*Schæff. elem.* t. 114.*Poda inf.* t. 1. f. 2.*Sultz. inf.* t. 2. f. 11.*Geoffr. paris.* 1. p. 98. t. 1. f. 6. Dermestes 1.*Raj. inf.* 106. Scarabæus fixidus 1 aldrovandi.*Habitat in Europæ, Americæ Cadaveribus; moschum redolet.**In America Septentrionali decuplo major.**Sepelitis cadavera minora sub terra, eadem desudando.**Gleditsch. act. berol.*

limacu- 3. *S. ovata* nigra, antennarum capitulis globosis, pedibus  
lata. ferrugineis.

*Habitat in Barbaria.*

*Magnitudo oryzae.* Thoracis margines subferruginei.  
Elytra fere in medio macula rubra. Antennarum  
clava globosa, perfoliata.

bipustulata. 4. S. oblonga nigra, elytris singulis puncto unico rubro.  
Fa. succ. 445. \*

Geoffe. parisi. t. p. 100. Dermestes 3.  
Habitat in Europæ Carnibus, Lardo.

4-pustulata. 5. S. oblonga nigra, elytris punctis duobus ferrugineis.  
Faun. succ. 446. \*

Faun. inf. 9. p. 36. t. 19. Scarabæus parvus luteo-  
maculatus, crucie lanigeræ.  
Habitat in Europæ arboribus putridis, fenestris.  
Glaber, statua Scarabæi

indica. 6. S. nigra, elytris fasciis duabus ferrugineis, thorace an-  
tice bidentato. Mus. Lud. Ulr. 38. \*  
Habitat in India.

americana. 7. S. ovata fusca, clypeo flavo: centro nigro intra an-  
nulum faviolum.

Cat. car. 3. p. 10. t. 10. f. 5. Blatta americana.  
Habitat in America.  
Magnitudo S. vespillionis.

femini- 8. S. ovata atra nitida immaculata, abdomine rubro.  
lum. Faun. 447. \*

Habitat in Europæ lino putrido Abietis. Rolander.  
Composit. testum, uti Ditypus, & similis semini ter-  
re. Ita coque & testibus ab homini applicat, ut exa-  
cto canum, rubrum, lucidum referat, facile inven-  
torem francens quiescere jacentio.

agaricina. 9. S. ovata atra glaberrima hemiptera. Fa. succ. 448.

Scop. carn. 43. Dermestes agaricinus.  
Habitat in Agaricis.

rusfica. 10. S. oblonga rufa, antennis elytris pectoreque nigris.  
Fa. succ. 449. \*

Ulter. diff. 7. Dermestes elytris nigris, capite clypeo  
& abdomine rubro.  
Habitat in Europa.

littoralis. 11. S. atra, elytris lævibus: lineis elevatis tribus, clypeo  
orbiculato nitido. Fa. succ. 450. \* Scop. carn. 55.  
Faun.



*Fn. succ.* 380. Cassida atra, elytris lineis tribus elevatis autenuis antice testaceis.

*Frisch. i. l. 6. p. 12. t. 5.* Scarabæus campestris.

*Habitat in Europa, sub Fœcis putridis.*

atrata. 12. *S. atra*, elytris subpunctatis: lineis elevatis tribus lævibus, clypeo antice integro. *Faun. succ.* 451. \* *Scop. carn.* 56.

*Geoffr. parif. 1. p. 118.* Peltis 1.

*Habitat in Europa.*

thoracica. 13. *S. nigra*, elytris obscuris: linea elevata unica, clypeo retulō testaceo. *Faun. succ.* 452. \* *Scop. carn.* 54. *Strim. ad. nidros. 3. p. 384. t. 6. f. 1.*

*Raf. inf.* 90. Scarabæus primo similis parum canaliculatus, scapulis croceis.

*Gadd. dist.* 25. Cassida nigra, clypeo latissimo pallide rufō, macula lata nigra nitida.

*Geoffr. parif. 1. p. 121.* Peltis 6.

*Habitat in Europa.*

quadri-punctata. 14. *S. nigra*, elytris pallidis puncto baseos medioque nigro, thorace emarginato. *Fn. succ.* 453. \*

*Pes. gaz. t. 12. f. 2.*

*Schæffer. inf.* 2 f. 5. Silpha quadripunctata nigra, elytris exalbidis; maculis 4. nigris.

*Geoffr. parif. 1. p. 122 n. 7.* Peltis nigra, thorace elytrisque testaceis, thoracis macula coleoptorumque 5 nigris.

*Habitat in Europa.*

opaca. 15. *S. fusca*, elytris concoloribus: lineis elevatis subternis, thorace antice truncato. *Fn. succ.* 454. \*

*Habitat in Europa.*

rugosa. 16. *S. nigricans*, elytris rugosis: lineis elevatis tribus, thorace emarginato. *Faun. succ.* 455. \* *Scop. carn.* 53.

*Faun. succ. 1. n. 379.* Cassida atra, elytris fuscis quinque punctisque elevatis.

*Raf. inf.* 90. Scarabæus niger inter cadavera frequens, depressus, parum canaliculatus, undique niger.

*Habitat in castis Lapponum, & alibi per Europam, devorans pisces exsiccatos aliasque.*

- fabulosa.** 17. *S. fusca*, elytris lineis elevatis tribus utrinque dentatis, thorace subemarginato. *Fn. succ.* 456. \* *Scop. carn.* 58.  
*Faun. succ.* 382. *Cassida nigra*, elytris striis quinque utrinque dentatis, clypeo emarginato.  
*Uddm. diss.* 5. *Dermestes niger*, inter elytrorum lineas quatuor elevatis scrobiculis exaratus.  
*Geoffr. paris* 1. p. 350. *Tenebrio* 7.  
*Habitat in Arena Europæ.*  
*Similis Scarabeo fabuloso.*
- obscura.** 18. *S. nigra*, elytris punctatis: lineis elevatis tribus, clypeo truncato. *Fn. succ.* 457. \* *Scop. carn.* 57.  
*Uddm. diss.* 8. *Cassida ovata nigra*, elytris lineis tribus elevatis: media longissima.  
*Habitat in Europa.*  
*Differt a S. atrata, quod Color non lucidus, & aliter punctata.*
- ferruginea.** 19. *S. ferruginea*, elytris lineis elevatis senis, thorace emarginato capite latiore. *Fn. succ.* 458. \* *Scop. carn.* 60.  
*Habitat in Europa.*  
*Thorax latitudine coleopterorum, capiteque multo latior.*
- reticulata.** 20. *S. ferruginea*, elytris lineis elevatis senis, thorace emarginato serrato.  
*Habitat in Europa: Upsalæ.*  
*Duplo angustior S. ferruginea & diversissima. Caput clypeo lunato, latitudine circiter thoracis & ultra thoracem exsertum. Thorax coleoptris angustior, marginibus lateralibus crenulatis. Elytra profunde sulcata sulcis elevatis & inter sulcos singulos ordine punctorum excavatorum, unde elytra quasi reticulata.*
- grossa.** 21. *S. nigra*, elytris confertim punctatis: lineis elevatis tribus, thorace emarginato. *Fn. succ.* 459. \*  
*Uddm. diss.* 9.  
*Habitat in Europa.*  
*Differt a sequenti, quod ovata, nec oblonga; puncta conferta confusa, nec serie longitudinali digesta.*
- oblonga.** 22. *S. nigra*, elytris striis punctatis: lineis elevatis senis, thorace emarginato. *Fn. succ.* 460. \*

Faun.

*Faun. suec.* 381. *Cassida atra*, elytris striis 10 elevatis, punctis excavatis striatis.

*Habitat in Europa.*

*Differt a precedenti, quod magis oblonga, minusque emarginata.*

scabra.

23. *S. nigra*, elytris scabris, thorace subemarginato.

*Habitat in Europa.*

*Media. Corpus oblongiusculum, gibbum. Elytra tota muricata.*

rufipes.

24. *S. nigra lævis*, thorace subemarginato, pedibus ferrugineis.

*Habitat in Europa.*

*Magnitudo S. colonis. Antennæ maxime clavatae clavus nigris.*

apatica.

25. *S. cinerea*, elytris substriatis, thorace emarginato longitudinaliter rugoso virescente. *Fn. suec.* 461. \*

*Geoffr. parif.* 1. p. 105. n. 10. *Dermestes viridiæ-næus*, thorace fasciis quatuor elevatis, elytris punctato-striatis.

*Habitat in Europæ aquis, Buprestis similis, sed parva, frequenter inter Conervas stabulans.*

laccincta.

26. *S. ferruginea nitida*, elytris medio nigris.

*Habitat in Svecia.*

*Corpus majus pediculo, totum rufo-ferrugineum, glaberrimum. Elytra rufo-ferruginea, fascia in medio nigra, lata,  $\frac{1}{2}$  elytri. Antennæ apice crassiores.*

colon.

27. *S. nigra*, elytris ferrugineo variis, thorace emarginato: tergo duplici puncto impresso. *Fn. suec.* 462. \*

*Habitat in Europa.*

fulva.

28. *S. fusca elongata*, subtus picea.

*Habitat in Svecia. Moder.*

*Corpus pediculo majus, oblongum ut ciccindela. Thorax oblongus, angustior, obsolete marginatus. Elytra obsolete marginata, tenuissime striata. Antennæ capitate, longitudine thoracis. Subtus tota picea.*

depressa.

29. *S. ferruginea*, elytris lævibus, thorace emarginato.

*Fn. suec.* 463. \*

*Habitat in Europa.*

O o 5

30. *S.*

- grisea. 30. *S. grisea*, elytris lævibus, thorace emarginato. *Fn. fecc. 464.* \*  
*Habitat in Europa.*
- testacea. 31. *S. testacea* thorace integro.  
*Habitat in Germania.*  
*Triplo maior S. æstiva. Thorax antice minime emarginatus.*
- æstiva. 32. *S. testacea* subto mentosa, thorace emarginato, oculis nigris. *Fn. fecc. 465.* \*  
*Habitat in Europæ floribus.*
- pulicaria. 33. *S. nigra* oblonga, elytris abbreviatis, abdomine acuto.  
*Sylt. nat. 10. p. 357. n. 26. Dermestes pulicarius.*  
*Geoffr. paris. 1. p. 308. Anthribus 4.*  
*Rav. inf. 108.*  
*Habitat in Europa, frequens in floribus cursitans.*  
*Thorax & Elytra parum marginata.*
- pedicula- 34. *S. nigra*, elytris lævibus, thorace marginato. *Faun. ria. fecc. 466.* \*  
*Habitat in Europa frequens in plerisque floribus.*  
*Magnitudo Pediculi, sed obtusa, pallidius nigra. Corpus ovato-oblongum. Thorax & Elytra marginata.*  
*Antennæ maxime clavate s. capitata: clava horizontaliter fissili.*
- atomaria. 35. *S. nigra* subovata, elytris immarginatis, pedibus pallidis.  
*Habitat in Suecia.*  
*Corpus nigrum, ovato-oblongiusculum, minimum, magnitudinis Lendæ, structura Dytisci s. thorace postice transverso; neque Thorax, neque elytra armato oculo conspiciuntur emarginata. Pedes pallidi s. subferruginei. Antennæ extrorsum crassiores.*

197. CASSIDA. *Antennæ* subfiliformes, extrorsum crassiores.

*Elytra* marginata.

*Caput* sub thoracis clypeo plano reconditum.

viridis. 1. *C. viridis.* *Fn. fecc. 467.* \* *It. xl. 153. Scap. carn. 117.*  
*G. d.*

*Gœd. inf.* 1. p. 94. t. 43.

*Blank. inf.* 89. t. 11. f. F.

*Merian. europ.* t. 115.

*Voik. hesp.* 1. p. 166. f. 4.

*Rai. inf.* 107. n. 5.

*Reaum. inf.* 3. t. 18.

*Raf. inf.* 2. *scar.* 3. p. 13. t. 6.

*Geoffr. parif.* 1. p. 312. n. 1.

*Schaff. elem.* t. 35.

*Habitat in Plantis verticillatis Europæ.*

*maræa.* 2. *C. nigra*, clypeo rubro, elytris sanguineis: punctis nigris sparsis.

*Habitat Gættingæ in Helenio. F. A. Murray.*

*Statura C. viridis. Elytra substriata punctis 3. f. 5 nigris ad saturam & unico ad basin maximo; reliquis in disco.*

*nebulosa.* 3. *C. pallido-nebulosa. Fn. suec.* 468. \*

*Frisch. inf.* 4. p. 30. t. 15.

*Gœd. inf.* 1. p. 96. t. 44.

*List. gœd.* 287. t. 117.

*Raf. scar.* 3. p. 13. t. 6.

*Raf. inf.* 88. n. 13. *Scarabæus minor sordide fulvus.*

*Habitat in Carduis.*

*nobilis.* 4. *C. grisea*, elytris linea cærulea nitidissima. *Fn. suec.* 469. \* *Aman. acad.*

*Geoffr. parif.* 1. p. 313. n. 3.

*Habitat in Europa.*

*Linea cærulea elytrorum perit cum vita.*

*vibex.* 5. *C. virens*, futura dorsali sanguinolenta.

*Habitat in Germania. D. Schreber.*

*Similis viridi, sed dorso coleoptorum fuscescente: statura sanguinolenta.*

*maculata.* 6. *C. viridis*, elytris rarius, futura dorsali confertius nigro maculatis.

*Geoffr. parif.* 314. t. 5. f. 6.

*Habitat in Germania. D. Schreber.*

7. *C.*

*Cassidæ Larvæ folia plantarum subtus exedunt, & proprio fœvere sese sæpius obtegunt.*

- spinifex*. 7. *C. ferruginea*, elytris angulo antico spina porrecta, thorace utrinque spina transversa. *Amæn. acad. 6. p. 392. n. 7. \**  
*Habitat in America calidiore.*  
*Sexus alter spinis longioribus; alter brevioribus.*
- bicornis*. 8. *C. cyanea*, elytris angulo antico spina truncata. *Amæn. acad. 6. p. 393. n. 9. \**  
*Habitat in America australi.*
- cruciata*. 9. *C. pallida*, elytris disco fusco-cruciato.  
*Habitat in America. Rolander.*  
*Elytra pallida, supra dorsum insecti fusca, inde brachium fuscum pictum excurret utrinque ad angulos thoracis & tertium brachium per utrumque elytron ad anum.*
- bifasciata*. 10. *C. pallida*, corpore fasciis duabus fuscis.  
*Habitat in America meridionali. Rolander.*
- flava*. 11. *C. flava immaculata*, corpore testaceo, puncto scutellari nigro.  
*Habitat in America. Rolander.*  
*Punctum scutelli loco nigrum. Antennæ nigrae.*
- purpurea*. 12. *C. flava*, supra corpus purpurea.  
*Habitat in America. Rolander.*  
*Parva testa omni flava, sed supra corpus insecta purpurea lata macula.*
- leuco-phæa*. 13. *C. testacea*, margine punctis flavis. *Amæn. acad. 6. p. 392. n. 8. \**  
*Habitat in America australi.*
- marginata*. 14. *C. testacea*, margine thoracis elytrorumque flavo.  
*Habitat in America. Rolander.*
- reticularis*. 15. *C. flava*, elytris caeruleo variegatis: lateribus unifasciatis.  
*Habitat in America. Rolander.*  
*Magna. Thorax antice emarginatus, testaceus linea dorsali nigra.*
- variegata*. 16. *C. rufa*, elytris caeruleo variegatis: lateribus bifasciatis.  
*Habitat in America. Rolander.*

*Magna. Thorax fuscus, lunatus. Elytra sanguinea, sutura antica gibba: disco excavato-punctato, cyaneo-variegato; lateribus dilatatis laevibus: lineis 2 transversis cyaneis & marginulo cyaneo.*

- grossa. 17. *C. sanguinea*, elytris disco punctis nigris sparsis, margine lineis ramosis nigris.

*Habitat in America meridionali. Dalberg.*

*Hec omnium maxima. Thorax immaculatus.*

- clatrata. 18. *C. ferruginea*, elytris margine omni, linea longitudinali, femique transversali nigris.

*Habitat in India. De Geer.*

*Thorax immaculatus. Elytra latissima, margine undique etiam sutura longitudinalis nigra. Linea longitudinalis nigra per medium singuli elytri. Linea inter precedentes longitudinales nigra utrasque combinat. Femina habet lineas dimidiatas transversales tres.*

- 7-guttata. 19. *C. nigra* coleoptris maculis septem albis. *Brunnich.*

*Habitat in India orientali.*

*Elytra singula maculis 3 albis, longitudinaliter digessis, rotundis & in medio unica utrinque elytris communi.*

- exclamatio- 20. *C. flava*, elytris lineis ternis nigris, intermedia signum ! referente.

*Habitat in America; e musco Rybergii. Brunniche.*

*Corpus paulo majus C. viridi, subtus lividum. Oculi nigri. Thorax lividus, postice lobatus. Scutellum nigrum. Elytra flava: singulis lineae 3 parallelae: intermedia brevior, pone quam punctum nigrum. Brunnich.*

- amticen- 21. *C. luteo-ænea*, elytris immaculatis excavato-punctatis.

*Sloan. jam. 2. p. 208. t. 233. f. 27, 28.*

*Habitat in America.*

*Gibba admodum ad suturam anteriorem.*

- cyanea. 22. *C. cyaneo-ænea*, elytris immaculatis excavato-punctatis. *Mus. Lud. Utr. 39. \**

*Pet. gaz. 2. 57. f. 6.*

*Habitat in Brasilia.*

23. *C.*

- marginata*. 23. *C. elytris testaceis, corpore elytrorumque margine nigro, thorace æneo.*  
*Habitat in India occidentali.*  
*Thorax antice truncatus. Elytra testacea margine omni nigro, angulo antico acuto: Punctum nigrum ubi elytra antrorsum prominentia.*
- inaequalis*. 24. *C. ferrugineo-ænea, elytris macula flava subovata disci.*  
*Mus. petrop. 650. n. 130.*  
*Habitat in America. Rolander.*  
*Elytrorum superficies inæqualis est, subtus cerulescens.*
- supposita*. 25. *C. elytris nigris antice annulatis puncto centrali fulvo.*  
*Lederm. microsc. t. 28. f. F; g, & t. 44. f. b, c, d.*  
*Habitat in America calidiore.*
- lateralis*. 26. *C. fusco-ænea, elytris macula flava laterali.*  
*Habitat in America. Rolander.*
- discoides*. 27. *C. viridi-ænea, elytris macula didyma flava disci.*  
*Habitat in America. Rolander.*
- petiveria*. 28. *C. nigra, elytris maculis quatuor flavescentibus.*  
*Pet. gaz. 7. t. 71. f. i. Aët. angl. 271. p. 861.*  
*Habitat in Asia.*
- bipunctata*. 29. *C. flavescens, elytris punctis duobus nigris. Brunnich.*  
*Habitat in India orientali.*  
*Magnitudo & facies C. nebulosæ. Elytra singula maculis 2: altero priore.*
- bipustula*. 30. *C. viridis, elytris maculis duabus lateralibus sanguineis. Amoen. acad. 6. p. 392. n. 8. \**  
*Habitat in America meridionali.*
- angustata*. 31. *C. flavescens, elytris postice angustatis. Brunnich.*  
*Habitat in India, c. mus. Rengers L. B.*



193. COCCINELLA. *Antennae subclavatae, truncatae.*

*Palpi clava femicordata.*

*Corpus hemisphaericum, thorace elytrisque marginatis, Abdomine plano.*

\* *Coleoptris rubris flavis: Punctis nigris maculatis.*

marginata. 1. *C. coleoptris flavis immaculatis margine nigro, thoracis margine punctis duobus albis.*

*Habita in America. Brunnke.*

*Corpus medium, nigrum. Elytra flava, summo margine nigra. Thoracis margines laterales cum puncto utrinque & punctis duobus capitis albis. Br.*

marginata. 2. *C. coleoptris rubris immaculatis, thorace capiteque nigris. Amer. acad. 6. p. 393. n. 12. \**

*Habitat Surinami.*

marginata. 3. *C. coleoptris sanguineis immaculatis, thorace maculis nigris. Amer. acad. 6. p. 393. n. 11. \**

*Habitat Surinami.*

marginata. 4. *C. coleoptris rubris: puncto nullo.*

*Habitat in Europa.*

*Minor. Elytra rubra, immaculata. Thorax ruber diffuso medio fusciscente. Scutus nigra. Pedes antici ferruginei.*

maculata. 5. *C. coleoptris rubris macula subannulari nigra.*

*Habitat in Germania. D. Schreber.*

*Media, nigra. Thorax marginibus lateralibus pallidis.*

*Elytra sanguinea in Medio fascia nigra, posterius fascia alia quae non tangit marginem exteriorem, sed exterius connectitur cum priore fascia.*

marginata. 6. *C. coleoptris flavescens: puncto communi nigro.*

*Faun. suec. 470. \**

*Habitat in Europa.*

Coccinellae Larvae Aphides consumunt, eoque plantas a Phthiriasi hac purgant.

- 2-puncta-7. *C. coleoptris rubris*: punctis nigris duobus. *Fn. suec.*  
ta. 471. \* *Scop. garn.* 234.  
*Pet. gaz.* 34. t. 21. f. 4.  
*Merian. inf.* 69. t. 136.  
*Raj. inf.* 86. n. 2.  
*List. loqy.* 383. n. 8.  
*Bradl. natur.* 1. 27. f. 4.  
*Reaum. inf.* 3. t. 31. f. 16.  
*Frisch. inf.* 9. p. 33. t. 16. f. 4.  
*Habitat in Europæ Alnetis.*  
*Puncta duo in medio coleoptrorum.*
- 3-puncta-8. *C. coleoptris rubris*: punctis nigris tribus. *Fn. suec.*  
ta. 472. \*  
*Habitat in Europa.*  
*Puncta duo ad apicem coleoptrorum.*
- 4-puncta-9. *C. coleoptris flavis*: punctis nigris quatuor.  
ta. *Habitat in Germania. D. Schreber.*  
*Media. Thorax flavus punctis 4 nigris. Elytra fla-*  
*va: punctis in medio 2, ad singulum marginem sin-*  
*gula, ita ut omnia 4 puncta in medio transversim*  
*posita sint. Subtus nigra, pedibus flavis.*
- hebræa. 10. *C. coleoptris luteis*: maculis nigris sex longitudinali-  
bus difformibus. *Fn. suec.* 473. \*  
*Habitat in Europa.*
- 5-puncta-11. *C. coleoptris sanguineis*: punctis nigris quinque. *Fn.*  
ta. *suec.* 474. \*  
*Habitat in Pruno spinosa.*  
*Elytra sanguinea sunt.*
- 6-puncta-12. *C. coleoptris fulvis*: punctis nigris sex.  
ta. *Habitat in Europa: Suecia.*  
*Media. Thorax pallidus maculis 5 subfuscis. Elytra*  
*fulva punctis 3 nigris, transversim positis in medio.*  
*Margo exterior elytrorum flavus.*
- trifascia-13. *C. coleoptris rubris*: fasciis nigris tribus. *Fn. suec.*  
ta. 475. \*  
*Habitat in Lapponia.*
- hierogly-14. *C. coleoptris luteis*: maculis duabus nigris longi-  
phica. talibus sinuatis. *Fn. suec.* 476. \*  
*Habi-*

*Habitat in Svecia.*

*Affinis 10-pustulata.*

7-puncta-15. *C. coleoptris rubris: punctis nigris septem. Fann.*  
*svec. 477. \* Scop. garn. 235.*

*Friseh. inf. 4. p. 1. t. 1. f. 4.*

*Pet. gaz. 33. t. 21. f. 3.*

*Gæd. inf. 2. p. 58. t. 18.*

*Raj. inf. 86. n. 1.*

*Merian. eur. 24. f. 11.*

*Alb. inf. 61. f. C.*

*Ræf. inf. 2. scar. 3. p. 7. t. 2.*

*Reaum. inf. 3. t. 31. f. 18.*

*Bradl. nat. t. 27. f. 4.*

*Ammir. inf. t. 14.*

*Sulz. inf. t. 3. f. 13.*

*Habitat in Europæ agris & plantis.*

9-puncta-16. *C. coleoptris rubris: punctis nigris novem. Fann.*  
*svec. 478. \* Scop. carn. 236.*

*Uddm. diff. 14. Coccinella nigra, elytris rubris, punctis novem nigris.*

*Habitat in Europæ Juniperetis.*

10-puncta-17. *C. coleoptris fulvis: punctis nigris decem. Fn. svec.*  
*479. \* Scop. carn. 237.*

*Habitat in Europa.*

11-puncta-18. *C. coleoptris rubris: punctis nigris undecim. Fann.*  
*svec. 480. \* Strom. act. nigr. 3. p. 388. t. 6. f. 2.*

*Merian. europ. 168.*

*Habitat in Europa.*

11-puncta-19. *C. coleoptris flavis: punctis nigris sex: extimo lineari repando.*

*Habitat in Europa.*

*Minuta. Thorax flavus punctis maculisque duabus nigris. Elytra flava; Puncta 5 nigra, præter anteriorem, quasi ex 4 punctis connatum, lineare, repandum, ad marginem anteriorem inter primum & ultimum punctum. Sutura longitudinalis nigra. Subtus nigra, tibis flavis.*

P p.

20. C.

*Species diversas conjunctas vidi, ut bipunctatam cum sexpustulata.*

- 13-punctata. 20. *C. coleoptris luteis*: punctis nigris tredecim. *Faun. suec.* 481. *Scop. carn.* 238.  
*Reaum. inf.* 3. t. 31. f. 19.  
*Habitat in Europæ Armoracia.*
- 14-punctata. 21. *C. coleoptris flavis*: punctis nigris quatuordecim: quibusdam contiguis. *Fn. suec.* 482. \* *Scop. carn.* 243.  
*Friseh. inf.* 9. t. 17. f. 4, 5.  
*Habitat in Europa.*
- 16-punctata. 22. *C. coleoptris flavis*: punctis nigris tredecim: tribus infimis connexis. *Fn. suec.* 483. \* *Scop. carn.* 240.  
*Habitat in Europa.*
- ocellata. 23. *C. coleoptris luteis*: punctis nigris quindecim. *Faun. suec.* 484. \*  
*Gadd sat.* 26. *Coccinella elytris flavo-luteis*, punctis 15 nigris oculo flavo cinctis.  
*Merian. inf.* 48. f. 5.  
*Sultz. inf.* t. 13. f. 14.  
*Schæff. ic.* t. 1. f. 2.  
*elem.* t. 47. f. 1.  
*Habitat in Europa.*  
*Hæc reliquis major.*
- 18-punctata. 24. *C. coleoptris flavis*: punctis nigris octodecim: ultimo arcuato.  
*Habitat in Europa.*  
*Mainfcula.* Thorax lateribus flavus. Elytra flava punctis oblongiusculis, nigris, 9, quorum ultimum hamosum; sutura communis nigra. Subtus nigra.
- 19-punctata. 25. *C. coleoptris flavis*, punctis nigris novendecim. *Fn. suec.* 485. \*  
*Habitat in Europa.*
- 22-punctata. 26. *C. coleoptris flavis*: punctis nigris viginti duobus. *Fn. suec.* 486. \* *Geoffr. paris.* 329. n. 17.  
*Habitat in Europa.*  
*Thorax punctatus est.*
- 27-punctata. 27. *C. coleoptris rubris*: punctis nigris viginti quinque.  
*Habitat in Germania.* *D. Schreber.*  
*Parva.* Thorax ruber punctis 3 nigris. Elytra rubra: puncta 3 nigra; dein 4; tum 3; ultimo punctum

*Hum transversum ex duobus connatum; accedit punctum scutellare commune; puncta omnia rotunda, distincta; Subtus etiam ruffa una cum pedibus.*

- 14-punctata. 28. *C. coleoptris rubris: punctis nigris viginti quatuor.*  
*Fann. suec. 487. \* Geoffr. paris. 1. p. 326. n. 11.*  
*Scop. carn. 239.*  
*Habitat in Europa.*

- 15-punctata. 29. *C. coleoptris rubris: punctis nigris viginti quinque.*  
*Fn. suec. 488. \**  
*Habitat in Europa.*  
*Puncta quadrata passim coalita.*

- conglobata. 30. *C. coleoptris rubris: punctis nigris plurimis subcontiguis.* *Fn. suec. 489. \* Geoffr. paris. 325. n. 12.*  
*Raj. inf. 87. n. 5.*  
*Frisch. inf. 9. p. 34. t. 17. f. 6.*  
*Habitat in Europa.*

- conglobata. 31. *C. coleoptris flavescens: punctis nigris plurimis contiguis.* *Fn. suec. 490. \**  
*Raj. inf. 87. n. 5.*  
*List. loqu. 383. n. 9.*  
*Frisch. inf. 9. t. 17. f. 4, 5.*  
*Habitat in Europa.*

*\* \* Coleoptris rubris flavisve: albo maculatis.*

- punctata. 32. *C. coleoptris rubris: punctis albis quatuordecim, nigris tribus.* *Fn. suec. 491. \**  
*Habitat in Europa.*  
*Similis 10-pustulata; an solo sexu differens?*

- 10-gutta. 33. *C. coleoptris luteis: punctis albis decem.*  
*Habitat in Suecia. Fabricius.*  
*Minor. Puncta in singulo elytro 5, scilicet 2, 2, 1.*

- 14-gutta. 34. *C. coleoptris rufis: punctis quatuordecim albis.* *Fn. suec. 492. \* Geoffr. paris. 1. p. 327. n. 13. Scop. carn. 248.*  
*List. loqu. 383. n. 10.*  
*Raj. inf. 86. n. 3.*  
*Habitat in Europæ Salicibus.*

*Color testaceo-luteus. Elytra punctis 7, scilicet 1, 3, 2, 1. Thoracis latera lunula alba. Caput nigrum, fronte testacea. Pedes testacei.*

16-gutta-35. *C. coleoptris luteis: punctis albis sedecim. Fn. suec. 493. Scop. carn. 249.*  
ta. *Habitat in Europa.*

18-gutta-36. *C. coleoptris rubris: punctis albis sedecim: duobus primis lunatis. Fann. suec. 494. \**  
ta. *Habitat in Svecia.*

20-gutta-37. *C. coleoptris rubris: punctis albis viginti. Fann. suec. 495.*  
ta. *Habitat in Europa.*

oblongo-38. *C. coleoptris rubris: lineis punctisque albis. Fann. suec. 496.*  
guttata. *Habitat in Europa.*

oblitera-39. *C. coleoptris flavis: punctis quatuor rufis: anticis ob-*  
ta. *soletis. Fn. suec. 497. \**  
*Habitat in Europa.*

\* \* \* *Coleoptris nigris: rubro maculatis.*

impustu-40. *C. coleoptris nigris puncto nullo.*  
luta. *Habitat in Germania. D. Schreber.*  
*Statura C. 4-pustulata, tota atra nitida. Thoracis*  
*margo anticus & latera, in quibus punctum nigrum,*  
*flava.*

Cacti. 41. *C. coleoptris atris: maculis rubris duabus. †*  
*Gron. zooph. 609. Coccinella coleoptris marginatis*  
*nitidis atris, macula solitaria subrotunda utrinque.*  
*Mer. surin. p. 2. t. 2. f. summa.*  
*Pet. gaz. t. 1. f. 5. Scarabæolus hemisphæricus co-*  
*chineelifer.*  
*Sloan. j-m. 2. t. 237. f. 31-33. & t. 9. f. 13.*  
*Habitat in America.*  
*Similis C. bipustulata, etiam abdomine rubro, sed ma-*  
*cula elytrorum longe major, simplicissima. Gr.*

42. *C.*

*Species maculi nonnumquam variant, unde incautus plures numerantur, nisi ven-*  
*tionem thoracis habeant.*

- 3-pustu- 42. *C. coleoptris* nigris: punctis rubris duobus, abdomi-  
lata. ne sanguineo. *Fn. suec.* 498. \*  
*Frisch. ins.* 9. p. 34. t. 16. f. 6.  
*Rees. inf.* 2. scar. 3. p. 10. t. 3.  
*Geoffr. paris.* 334. n. 26.  
*Habitat in Europa Sorbis; in America septentriona-*  
*li. Kalm.*  
*Singulum punctum e tribus componitur.*
- 4-pustu- 43. *C. coleoptris* nigris: punctis rubris quatuor: interio-  
lata. ribus longioribus. *Fn. suec.* 499. \* *Scop. carn.* 244.  
*Habitat in Europa Urticis, Rubis.*
- 6-pustu- 44. *C. coleoptris* nigris, punctis rubris sex. *Fn. suec.*  
lata. 500. \* *Geoffr. paris.* 331. n. 20. *Scop. carn.* 245.  
*Raj. inf.* 87. n. 4.  
*Habitat in Europa.*
- 10-pustu- 45. *C. coleoptris* nigris: punctis fulvis decem. *Fn. suec.*  
lata. 501. \*  
*List. loqu.* 383. n. 9.  
*Frisch. ins.* 9. t. 17. f. 4, 5.  
*Raj. inf.* 87. n. 15.  
*Habitat in Europa.*
- 14-pustu- 46. *C. coleoptris* nigris: punctis flavis quatuordecim. *Fn.*  
lata. *suec.* 502. \* *Geoffr. paris.* 330. n. 18. *Scop. carn.*  
246.  
*Uddm. diff.* 15. *Coccinella coleoptris* nigris, maculis  
decem pallide flavis.  
*Pod. inf.* 26. *Coccinella* 14 maculata.  
*Habitat in Europa; in floribus Centaurea Scabiosa*  
*frequens.*  
*Maculae aliis flavæ, aliis fulvæ, aliis rubræ.*
- 16-pustu- 47. *C. coleoptris* nigris, punctis fulvis sedecim. *Faun.*  
lata. *suec.* 503.  
*Habitat in Europa.*  
  
\* \* \* \* *Coleoptris nigris albæ flavove maculatis.*
- pantheri- 48. *C. coleoptris* nigris: punctis flavis octo. *Fn. suec.*  
na. 504. \*  
*Habitat in Europa.*

- tigrina. 49. *C. coleoptris nigris*: punctis albidis viginti. *Faun. suec.* 505. \*  
*Uddin. diss.* 11. *Coccinella coleoptris nigris*, punctis viginti albis.  
*Habitat in Europa.*

199. CHRYSOMELA. *Antennae* moniliformes, extrorsum crassiores.

*Thorax*, nec elytra, marginatus.

\* *Corpore ovato.*

- gigantea. 1. *C. ovata nigra*, coleoptris punctis fulvis numerosissimis.  
*Syst. nat.* 10. p. 368. *Coccinella gigantea.*  
*Sultz. inf. t.* 3. f. 15.  
*Habitat in India. De Geer.*  
*Alagnitudo Scarabaei peregrarii*; *Corpus nigrum*, *ovatum*. *Thorax marginatus*, *emarginatus*. *Antennae clavatae absque palpis coccinellae propriis*. *Elytra valde convexa, marginata, adpersa punctis numerosissimis, rufo-fulvis, in maculas saepe confluentibus.*
- gibbosa. 2. *C. ovata nigra*, elytris testaceis nigro punctatis: fascia media posticaque nigris. *Amoen. acad.* 6. p. 393. n. 13. \*  
*Gron. zooph.* 606. t. 14. f. 5. *Coccinella.*  
*Habitat Surinami.*
- 5 puncta-3. *C. ovata*, elytris nigris: punctis quinque rubris.  
*Gron. zooph.* 613. t. 16. f. 7. *Coccinella coleoptris nigris punctato-impresis*; *maculis decem rubris.* \*  
*Habitat in America.*  
*Thorax, Abdomen, Alaeque nigra. Elytra punctis magnis quinque: 2, 2, 1.*
- 56 tincta-4. *C. ovata atra*, pedibus violaceis. *Faun. suec.* 506. \*  
*Raf. inf.* 2. scar. 3. t. 5.  
*Habitat in Europa.*

5. C.

- *Chrysomelae Larvae* consumunt folia, relictis saepe eorum vasis, pulpa contenta.



Tanacet. 5. *C. ovata atra punctata*, antennis pedibusque nigris.  
*Fn. suec.* 507.

*It. garb.* 270.

*Geoffr. parif.* 1. p. 252. t. 4. f. 6. *Galericula* 17

*Habitat in Tanaceto vulgari.*

hemor- 6. *C. ovata nigra nitida*, antennis basi flavescentibus, ano  
moidalis. supra rubro. *Fn. suec.* 508. \*

*Scop. carn.* 225. *Coccionella hæmorrhoidalis.*

*Habitat in Betula Alno.*

Graminis. 7. *C. ovata viridi-cærulea nitida*, antennis pedibusque  
concoloribus. *Fn. suec.* 509. \*

*Geoffr. parif.* 1. p. 260. n. 10.

*Scop. carn.* 220. *Coccinella Graminis.*

*Habitat in Gramine praturn.*

Alni. 8. *ovata viridis nitida*, abdomine postice ferrugineo. *Fn.*  
*suec.* 510. \*

*Famn. suec.* 1. n. 420. *Chrysomela viridis nitida*, tho-  
race antice excavato.

*Geoffr. parif.* 1. p. 261. n. 12.

*Habitat in Betula Alno.*

*Hanc precedenti copula junctam vidit D. Mæller.*

Alni. 9. *C. ovata violacea*, elytris punctis excavatis sparsis,  
antennis pedibusque nigris. *Fn. suec.* 511. \*

*Frisch. germ.* 7. p. 13. t. 8. *Scarabæus alni cæruleus.*

*Geoffr. parif.* 232. *Cryptocephalus* 1.

*Habitat in Betula Alno.*

*Hanc antecedenti junctam vidi ipse.*

Betule. 10. *C. ovata violacea*, elytris punctis excavato-striatis.  
*Fn. suec.* 514. \*

*Raj. inf.* 90. f. 5.

*Ruf.* 2. *scarab.* 3. t. 1.

*Geoffr. parif.* 1. p. 464. n. 17.

*Scop. carn.* 221. *Coccionella Betulæ.*

*Habitat in Betulæ albe foliis, exedens paginam in-  
feriorem.*

hæmo- 11. *C. ovata violacea*, alis rubris. *Fn. suec.* 512. \*

picra. *Geoffr. parif.* 1. p. 258. n. 5.

*Pod. inf.* 26. *Chrysomela Graminis.*

*Habitat in Europa.*

- occidentalis. 12. *C. ovata viridi-ænea*, pedibus antennisque flavis.  
*Habitat in America. Kolander.*  
*Similis C. virentina.*
- Cerasi. 13. *C. ovata livida*, antennarum apicibus oculisque nigris. *Fn. suec. 570. \**  
*Habitat in Pruni Padi foliis, quæ cribri instar perforat subtus barens Larva, depressa, viridis, setosa. Tb. Bergman.*  
*Corpus magnitudine Cimicis lectularii, lividum s. obscure testaceum totum. Thoracis margo anticus nigricans. Oculi nigri. Antennæ apice nigrae.*
- Padi. 14. *C. ovata nigra*, elytris apice lividis. *Fn. suec. 513. \**  
*Habitat in Pruno Pado.*  
*Pulce major, tota nigra, elytris apice lividis.*
- minutissima. 15. *C. ovata nigra opaca.*  
*Habitat in Svecia.*  
*Pulce quadruplo minor, tota nigra, non nitens; Elytra abdomine breviora.*
- Armoracia. 16. *C. ovata nigra nitidissima subcærulefcens*, subtus nigra. *Fann. suec. 515. \**  
*Habitat in Cochlearia Armoracia, Ranunculo aquatili, Flammula.*
- cerealis. 17. *C. ovata aurata*, thorace lineis tribus, coleoptrisque quinque cæruleis.  
*Schaff. ic. 1. t. 3.*  
*Geoffr. parif. 1. p. 262. n. 15.*  
*Habitat in Segete Europæ australis. D. Schreber.*  
*Corpus medium, supra auratum; subtus obscure violaceum. Thorax lineis 3, cæruleis. Coleoptera lineis 5, cæruleis, quarum intermedia sutura communis.*
- fastuosa. 18. *C. ovata aurata*, coleoptris lineis tribus cæruleis.  
*Scop. carn. 232. Coccinella fastuosa.*  
*Gron. zooph. 561.*  
*Habitat in Svecia.*  
*Tota perfecta aurea: Linea cærulea longitudinalis in medio elytrorum & unica communis in sutura.*
- speciosa. 19. *C. ovata viridi-sericea*, elytris lineis duabus aureis.  
*Scop. carn. 231. Coccinella speciosissima.*

*Habitat in Germania. D. Blom.*

Corpus simile *C. segetalis*, dimidio minus, viride, nitens. Elytra lineis duabus aurcis: altera secundum marginem exteriorem, altera secundum marginem interiorem. Antennæ nigrae.

kalensis. 20. *C. ovata* flava, capite elytrisq. aurato-viridibus, antennis plantisque fuscis.

*Habitat in Germania. D. Schreber.*

Corpus majus *C. polygoni*, totum testaceum. Thorax inaequalis punctis 2 depressis.

Hypo- 21. *C. ovata* aurata, antennis nigris, elytris abbreviatis.  
chzridis. *It. scan. 210. Fn. suec. 516.*

*Scop. carn. 193. Baprettis syngeneliæ.*

*Habitat in Hypochæridis maculatæ floribus.*

vulgatis- 22. *C. oblongo-ovata* cærulea, antennis basi ferrugineis.  
sima. *Fn. suec. 517. \**

*Scop. carn. 222. Coccionella vulgatissima.*

*Habitat in Europa.*

*Differt a sequenti quod major, non aenea, sed cærulea & magis oblonga.*

vitellina. 23. *C. ovata* viridi-cærulea. *Fn. suec. 519. \**

*Chrysomela aenei coloris. Fn. suec. 426.*

*Raf. inf. 2. jar. 3. p. 5. t. 1.*

*Scop. carn. 224. Coccionella Vitellina.*

*Habitat in Salicibus glabris Populoque, folia subtus consumens. Dum pascuntur larvæ disponuntur per lineas parallelas.*

Polygo- 24. *C. ovata* cærulea, thorace femoribus anoque rufis.  
ni. *Fn. suec. 520. \**

*Raf. inf. 100. Scarabæus 4.*

*Geoffr. parif. 242. Crioceris 4.*

*Reaum. inf. 3. t. 17. f. 15.*

*Habitat in Polygono aviculari, Acetosa; ovis gravida ultra coleoptera ventricosa evadit.*

pallida. 25. *C. ovata* flavescens tota, oculis nigris. *Fann. suec. 521. \**

*Fn. suec. 1. n. 423. Chrysomela pallido-grisea.*

*Habitat in Salicibus.*

- staphy- 26. *C. ovata* obscure testacea tota. *Fn. suec.* 518. \*  
læa. *Habitat in Europa.*
- polita. 27. *C. ovata*, thorace aurato, elytris rufis. *Fn. suec.* 522. \*  
*Fn. suec.* 1. n. 427. *Chrysomela viridi-ænea*, elytris  
rubicundis.  
*Geoffr. paris.* 1. p. 257. n. 2.  
*Scop. carn.* 229. *Coccionella polita.*  
*Habitat in Salice, Populo.*
- lurida. 28. *C. ovata* nigra, elytris castaneis.  
*Habitat in Germania. D. Schreber.*  
*Statura C. polita, sed ½ minor. Elytra trifle lute-*  
*scientia s. fusco testacea. Thorax omnino niger.*
- clavicor- 29. *C. ovata* nigra, elytris abdomineque rubris, antennis  
nis. clavatis.  
*Habitat in America. Rolander.*  
*Facies C. populi. Antennarum caput articulis tribus*  
*nigris.*
- Populi. 30. *C. ovata*, thorace cærulefcente, elytris rubris apice  
nigris. *Fn. suec.* 523. \*  
*Merian. inf.* 14. t. 27.  
*Geoffr. paris.* 1. p. 256. n. 1.  
*Alb. inf.* 63. f. C.  
*Scop. carn.* 228. *Coccinella Populi.*  
*Pod. inf.* 27. *Chrysomela 7-punctata.*  
*Habitat in Populo tremula, folia sæpe devastans, que*  
*excorticata nudis vasis relinquunt.*
- Vimina- 31. *C. ovata* nigra, thorace bimaculato, elytris testaceis.  
lis. *Fn. suec.* 524. \*  
*Fn. suec.* 1. n. 429. *Chrysomela thorace elytrisque*  
*rubris.*  
*Habitat in Salicibus.*  
*Varietatem totam nigram, copula junctam vidi.*
- 10-pun- 32. *C. ovata*, thorace rubro postice nigro, elytris rufis:  
ctata. punctis subquinis nigris. *Fn. suec.* 525. \*  
*Fn. suec.* 1. n. 436. *Chrysomela supra rufa, thoracis*  
*punctis nigris duobus, elytrorum pluribus.*  
β. *Chrysomela rubra, elytro singulo maculis quinque ni-*  
*gris. Fn. suec.* 1. n. 1354.  
*Habitat in Populo tremula.*

- variolosa. 33. *C. ovata nigra*, elytris rubris: punctis sparsis impressis cæruleis.  
*Habitat in Africa. Brander.*  
*Corpus medium, nigrum. Thorax glaber. Elytra punctis impressis, minusculis, copiosis, sparsis, fundo cæruleo punctis minutissimis.*
- lapponica. 34. *C. ovata*, thorace viridi, elytris rubris: fascia inter punctum maculamque lunatam cærulea. *Fn. suec. 526. \**  
*Fn. suec. 1. n. 431. Chrysomela thorace viridi, coleoptris rubris cruce cærulea.*  
*Habitat in Europa.*
- undulata. 35. *C. ovata rufa*, elytris fasciis tribus atro-cæruleis undulatis. *Amen. acad. 6. p. 393. n. 14. \**  
*Habitat in Java.*
- Boleti. 36. *C. ovata nigra*, elytris fasciis tribus flavis repandis.  
*Fn. suec. 527. \**  
*Uddm diff. 4. t. 1. f. 3. Dermestes ater nitens, elytris nigris, fasciis duabus flavis undulatis.*  
*Geoffr. parif. 1. p. 337. t. 6. f. 3. Diaperis.*  
*Scop. garn. 247. Coccinella fasciata.*  
*Schæff. elem. 2. 58.*  
*Habitat in Boletis arborum.*
- collaris. 37. *C. ovata violacea*, thorace marginibus luteo: puncto nigro. *Fann. suec. 528. \**  
*Habitat in Salicibus.*
- sanguinolenta. 38. *C. ovata nigra*, elytris margine sanguineis. *Fann. suec. 529. \**  
*Geoffr. parif. 1. p. 259. t. 4. f. 7.*  
*Scop. carn. 203. Buprestis sanguinolenta.*  
*Habitat in Europæ Salicetis.*
- marginata. 39. *C. ovata nigro-ænea*, elytris margine luteis. *Fann. suec. 529. \**  
*Habitat in Europa.*
- marginata. 40. *C. oblongo-ovata nigro-cærulea*, thorace elytrisque margine luteis. *Fn. suec. 331. \**  
*Habitat in Europa; sæpe in Ranunculo echinato.*

- castanea. 41. *C. ovalis fusca*, elytris margine exteriori castaneo.  
*Amer. acad. 6. p. 394. n. 15.*  
*Habitat* Surinami.
- analis. 42. *C. ovata atra*, elytris fuscis margine exteriori testaceo.  
*Habitat in Europa; ad Hammarby. J. C. Fabricius.*  
*Corpus totum atrum, minus C. marginata. Caput*  
*& Thorax polita. Elytra fusca margine exteriori*  
*testaceo. Antennae vix basi ferruginea.*
- coccinea. 43. *C. ovata*, thorace emarginato sanguineo macula nigra, elytris sanguineis: maculis duabus nigris. *Fn. sce. 532. \**  
*Uddm. diff. 13. Coccinella coleoptris rubris, maculis 4 nigris.*  
*Habitat in Europa.*
- philadelphica. 44. *C. ovata viridis*, elytris flavis: punctis virescentibus oblongiusculis, antennis pedibusque ferrugineis.  
*Habitat in Pennsylvania. C. De Geer.*
- 3-maculata. 45. *C. ovata nigra*, elytris flavis: maculis tribus oblongis nigris: intermedia suturae communi.  
*Habitat in America calidiore.*  
*Corpus nigrum, minutum, forma Coccinella. Elytra*  
*pallide flava margine vix nigro: macula singulis ob-*  
*longa; intermedia communis suturam occupans ni-*  
*gra, reliquis aequalis.*
- americana-na. 46. *C. ovata viridi-ænea*, elytris lineis quinque rubris, alis sanguineis.  
*Sulz. inf. t. 3. f. 16*  
*Habitat in Barbaria, lecta inter Cocco officinarum.*  
*Corpus totum æneum, ceruleo-virescent, æneum, ovale;*  
*subtus totum piceo-æneum. Caput, Thorax & Elytra*  
*nigro viridi-carnescentia. Elytron singulum pi-*  
*ctum lineis 5 longitudinalibus non punctatis, a basi ad*  
*apicem elytri exaratis; harum interior recta a basi*  
*ad apicem excurrit; at tertia & quarta basi*  
*connexa.*
- lincola. 47. *C. ovata flava*, coleoptris punctis undecim lineisque duabus nigris.  
*Habitat in America. Brunniche.*

Corpus minutum pulicis, flavum. Elytra latea; singulis puncta nigra: 3 ad basin; 2 ad apicem; linea 1 nigra abbreviata in medio elytri; punctum nigrum commune ad suturam postice. Oculi nigri. Caput & Thorax pallida. Br.

affuans. 48. *C. ovata* ferruginea, elytris maculis quatuor flavicantibus differrimis. *S. N. Gron. zooph. 565.*

*Habitat in America.*

Corpus ferrugineum, magnitudine *Coccionelle* maxima. Thorax immaculatus, non nitens. Elytra glabra, obsolete punctis striata: singulis Maculae 4: Parva subrotunda ad angulum scutellarem; Lunaris ad angulum anteriorem, major; Ovata, minor, ad suturam mediam; Cordata, reliquis major, ad apicem. Oculi singuli pellucens pupillis 3 nigris, longitudinaliter positis.

lucra. 49. *C. ovata* supra rufa, thoracis linea punctis duobus elytrorumque sutura nigris. *Ausf. Lnd. Ulr. 40. \**

*Habitat in Palæstina. Hasselquist.*

Elytrorum linea extrema basi coeans cum intima; intermedia parum flexuosa ante apicem desinit; ramulus ruber in medio lineæ marginalis antrorsum spectans. Alæ sanguineæ.

minuta. 50. *C. ovata* nigra, elytris pedibus thoracisque lateribus griseis. *Fæ. succ. 533. \**

*Habitat in Europæ aquis.*

Gerit faciem simillimam *Dytiscis*, sed pedes unguiculati.

\* \* *Saltatoriae* femoribus posticis crassissimis.

oleracea. 51. *C. saltatoria* virescenti-cærulea. *Faun. succ. 534. \**  
*Scop. carn. 212.*

*Habitat in Europæ cotyledonibus plantarum.*

bicolor. 52. *S. saltatoria* ovata rufa, elytris femoribusque posticis cæruleis.

*Habitat in America. e Museo Rydbergii. Brunniche.*  
Corpus colore & magnitudine *C. Polygoni*, differt Capite, cum reliquo corpore rufo, femoribusque crassissimis cæruleis.

53. *C.*

- chrysoce- 53. *C. saltatoria* atro-cærulea, capite pedibusque quatuor  
phala. anterioribus luteis. *Fn. suec.* 535. \* *Scop. carn.* 213.  
*Habitat in Svecia.*
- Hyofcy- 54. *C. saltatoria* virefcenti-cærulea, pedibus testaceis, fe-  
ami. moribus posticis violaceis. *Fn. suec.* 536. \*  
*Fann. suec.* 540. *Mordella ovata* cærulea nitida, ti-  
biis ferrugineis.  
*Geoffr. paris.* 1. p. 248. *Altica* 11.  
*Habitat in Hyofcyamo nigro, Brassicæ cotyledonibus.*
- atricilla. 55. *C. saltatoria* nigra, thorace elytris tibiisque testaceis.  
*Fn. suec.* 537. \*  
*Habitat in Europa.*
- erythro- 56. *C. saltatoria* atro-cærulea, capite geniculisque pedum  
cephala. rufis. *Fn. suec.* 538. \*  
*Habitat in Svecia.*
- Modeeri. 57. *C. saltatoria* ænea nitida, elytris apice flavis, pedibus  
anterioribus tibiisque posticis luteis. *Fn. suec.* 539. \*  
*Habitat in Europa.*
- Halxines. 58. *C. saltatoria* viridi-ænea, antennis pedibusque o-  
mnibus testaceis. *Fann. suec.* 540.  
*Fn. suec.* 539. *Mordella atro-ænea* subrotunda.  
*Sultz. inf.* t. 3. f. 17.  
*Habitat in Polygono Fagopyro.*  
*Femora & caput magis fusca.*
- exfoleta. 59. *C. saltatoria* livida, pedibus testaceis, abdomine capi-  
teque fusco. *Fn. suec.* 541. \*  
*Fann. suec.* 533. *Mordella flava.*  
*Geoffr. paris.* 250. *Altica* 18.  
*Habitat in Europa in Echii floribus, quos consumit.*
- nitidula. 60. *C. saltatoria*, elytris cæruleis, capite thoraceque au-  
reo, pedibus ferrugineis. *Fn. suec.* 542. \*  
*Geoffr. paris.* 249. *Altica* 13.  
*Habitat in Europa.*
- trifascia- 61. *C. saltatoria* supra albida: fasciis tribus fuscis.  
ta. *Habitat in Europa.*

Cor-

---

*Chrysomelæ saltatoriæ plantarum cotyledonibus & tenellis foliis infestæ sunt.*



*Corpus medium. Caput albidum fascia fusca. Elytra albida fasciis 2 fuscis, quae non tangunt marginem exteriorem. Femora ferruginea.*

- nemor- 62. *C. saltatoria*, elytris linea flava, pedibus pallidis. *Fn. succ. 543. \* Scop. carn. 215.*  
*Faun. succ. 542. Mordella oblonga atra, elytris longitudinaliter in medio flavescens.*  
*Geoffr. parisi. 247. Altica 9.*  
*Habitat in Pulmonaria, Dentaria, Cardamine.*
- rufica. 63. *C. saltatoria atra*, antennis pedibus elytrorumque apicibus testaceis.  
*Habitat in Europa: ad Hammarby.*  
*Thorax lavis. Elytra subtilissime punctata, apice macula obovata pallida.*
- pulicaria. 64. *C. saltatoria nigra*, elytris macula ferruginea postica.  
*Habitat in Europa. Thunberg.*  
*Corpus ovatum, pulicis magnitudine; macula 2 cordata.*
- rufipes. 65. *C. saltatoria caerulea obovata*, capite thorace pedibus antennisque rufis. *Fn. succ. 545. \* Scop. carn. 212.*  
*Habitat in Europa.*
- fuscicornis. 66. *C. saltatoria caerulea obovata*, capite thorace pedibusque rufis, antennis fuscis.  
*Habitat in Germania.*  
*Simillima C. rufipedi, sed paulo major, nec elytra striata, nec antenna lutea.*
- holstetica. 67. *C. saltatoria nigra nitida*, elytris apice puncto rubro.  
*Fn. succ. 544. \**  
*Faun. succ. 544. Mordella nigra, elytris apice rubris.*  
*Habitat in Europa.*
- hemisphaerica. 68. *C. saltatoria nigra hemisphaerica*, tibiis piceis.  
*Habitat in Germania. P. Forskåhl.*
- surinamensis. 69. *C. saltatoria flavescens*, elytris margine fasciaque sanguineis.  
*Habitat Surinami. Rolander.*  
*Antecedentibus major. Antennae pedesque pallidi.*
- S. litora. 70. *C. saltatoria pallida*, elytris nigris: linea longitudinali flexuosa alba.

*Habi-*

*Habitat* Surinami. *Rolander.*

*Linea alba in singulo elytro refert S. literam; neque hac parva est.*

- æquino- 71. saltatoria, thorace rubro, elytris violaceis: maculis  
etialis. 4 albis alternis.

*Habitat in America. Rolander.*

*Magnitudo Coccinelle bipunctata. Antennæ & Pedes nigri; macula Elytrorum subrotunda.*

\* \* \* *Corpore cylindrico.*

- cyanea. 72. *C. cylindrica* fusco-cyanea, thorace lævi marginato, antennis nigris.

*Habitat in America.*

*Corpus magnitudine fere C. Graminis, totum nigricans viridi-cærulescent. Abdomen obtusissimum. Elytra rix conspicue excavato-punctata. Oculi fuscis. Femora subclavata.*

- tridentata. 73. *C. cylindrica*, thorace cæruleo, elytris testaceis. *Fn. succ. 546. \**

*Habitat in Lonicera Xylosteo.*

- Gorteria. 74. *C. cylindrica* atra glaberrima, thorace utrinque punctis 4 flaviscentibus. *Ainax. acad. 6. p. 394. n. 16.*

*Habitat in Gorteria Personata Cap. 6. spec.*

- aurita. 75. *C. subcylindrica* nigra, thorace utrinque macula lutea, tibiis flavis.

*Habitat in Germania. D. Schreber.*

*Macula rotunda, lutea, utrinque ad thoracis latera.*

- 4-puncta- 76. *C. cylindrica*, thorace nigro, elytris rubris: punctis  
ta. duobus nigris, antennis brevibus. *Fn. succ. 547. \**

*Faun. succ. 432. Chrysomela oblonga nigra, coleoptris rubris: maculis quatuor nigris.*

*Geoffr. parif. 1. p. 195. t. 3. f. 4. Melolontha.*

*Scop. carn. 206. Buprestis quadripunctata.*

*Habitat in Europa.*

- 4-macu- 77. *C. cylindrica*, thorace tibiisque luteis, elytris luteis  
lata. maculis duabus cærulescenti-nigris.

*Habitat in Germaniæ saxosis. D. Schreber.*

*Media.*

*Media. Thorax flavus. Elytra flava maculis duabus atro-cærulescentibus, rotundatis: priore ad basin; posteriore in medio. Tibiæ flavae. Reliqua nigra.*

12. puncta-78. *C. cylindrica*, thorace nigro nitido, elytris rubris: punctis duobus nigris, antennis longis. *Faun. suec.*

548. \*

*Uddm. diff. 22. Chrysomela atra*, elytris rubris, punctis 4 nigris.

*Geoffr. paris. 234. t. 4. f. 3. Cryptocephalus 6.*

- β. *Uddm. diff. 21. Chrysomela nigra*, elytris rubris macula nigra longitudinali.

*Gadd. diff. 25. Cassida nigra*, elytris flavis nitidis, maculis quatuor nigris, quarum duæ posteriores majores & quati ex duabus alijs connatæ.

*Habitat in Europa.*

12. punctata-79. *C. cylindrica nigra nitida*, elytris punctis quatuor flavis.

*Habitat in Hispania. Logie.*

*Elytra singula punctis 4, quorum 2 anteriora, 2 posteriora.*

4. postu-80. *C. subcylindrica supra nigra*, elytris rufo bima-  
lata. culatis. *Fa. suec. 549. \**

*Habitat in Europa.*

- Scopoli-81. *C. cylindrica*, thorace rufo, elytris rufis: fasciis dua-  
na. bus nigris.

*Habitat in Austria. D. Scopoli: similis ex America, Brunniche.*

*Corpus medium, nigrum. Thorax luteo-rufescens. Elytra luteo-rufescentia fasciis 2 nigris: priore ad basin; posteriore fere in medio.*

- Moræi. 82. *C. cylindrica*, thorace nigro, elytris nigris: maculis duabus rubris marginalibus. *Fa. suec. 550.*

*Gadd. diff. 28. Cassida nigra nitida, clypeo caput fere integrum tegente, macula ad apicem & basin elytrorum lutea.*

*Scop. carn. 202. Buprestis Moræi.*

*Habitat in Europa.*

- bilineata-83. *C. cylindrica nigra*, elytris lineis duabus flavescen-  
tibus, pedibus ferrugineis.

Q q

*Habi-*

*Habitat in Europa.*

Corpus minutum, atrum. Caput vertice punctis 2  
flavescentibus. Antennæ basi testaceæ. Thorax gla-  
berrimus. Elytra lineis flavescentibus, 2, apice ni-  
titis: harum exterior juxta marginem lateralem ex-  
currit per medium elytri.

nitens. 84. *C. cylindrica*, thorace cæruleo nitido, elytris cæru-  
leis, pedibus testaceis. *Fn. suec.* 551. \*

*Geoffr. parisi.* 197. *Melolontha* 4.

*Habitat in Europa.*

Barbareæ. 85. *C. cylindrico-ovata*, antennis basi oreque ferrugineis.  
*Fn. suec.* 552. \*

*Habitat in Barbareæ floribus.*

sericea. 86. *C. cylindrica*, thorace cæruleo, elytris pedibusque  
cæruleis. *Fn. suec.* 554. \*

*Faun. suec.* 418. *Chrysomela viridis nitida*, thorace  
æquali, elytris punctis excavatis contiguis.

*Pod. inf.* 27. n. 7.

*Habitat in Salicibus.*

labiata. 87. *C. subcylindrica atra*, thorace nitido, ore pedibus  
anticis basique antennarum lutescentibus. *Fn. suec.*  
553. \*

*Habitat in Europa.*

Coryli. 88. *C. cylindrica*, thorace elytrisque testaceis, pedibus  
nigris. *Fn. suec.* 555. \*

*Habitat in Europa.*

Pini. 89. *C. cylindrica testacea*, elytris pallidioribus, pedibus  
concoloribus, antennis fuscis. *Fn. suec.* 556. \*

*Habitat in Pino.*

bothnica. 90. *C. cylindrica atra*, thorace linea longitudinali rubra.  
*Faun. suec.* 557. \*

*Habitat in Westerbotnia. D. C. Solander.*

*Statura C. cordigera, sed atra. Thorac margine an-  
tico & linea longitudinali ruber. Caput in fronte  
macula quadrata rubra.*

cordige- 91. *C. cylindrica*, thorace variegato, elytris rubris: pun-  
ra. ctis duobus nigris. *Fn. suec.* 558. \*

*Uddm.*

*Uddm. diff.* 23. Chrysomela nigra, elytris subflavis punctis quatuor nigris.

*Habitat in Europa.*

*Macula media postica thoracis antrosum bifida est.*

6-puncta-92. C. cylindrica, thorace variegato, elytris rubris; maculis tribus nigris. *Fn. succ.* 559. \*

*Sulz. inf.* 2. 3. f. 18.

*Habitat in Europa.*

*Genicula tibarum puncto albo notata.*

10-maculata-93. C. subcylindrica, thorace pedibusque nigris. *Faun. succ.* 561. \*

*Habitat in Europa.*

14-punctata-94. C. cylindrica, femoribus posticis incrassatis dentatis, thorace rufo, coleopteris flavis punctis XIV nigris, *Brunnich.*

*Habitat in India; e museo D. Voet.*

Corpus C. 2-punctata, sed majus. Caput & Thorax immaculata, rufa. Elytra flava punctis nigris 6 & in sutura communi punctum unum ad basin, alterum ad apicem.

longimana-95. C. subcylindrica obscuro-ænea, elytris livido-flavis, pedibus anticis longissimis. *Fn. succ.* 562. \*

*Habitat in Trifolio montano.*

*Pedes in altero tantum sexu admodum longi; in altero modici.*

obscura-96. C. subcylindrica, thorace pedibusque nigris. *Faun. succ.* 561. \*

*Habitat in Europa.*

*Elytrorum anguli exteriores versus pectus gibbosiores sunt, ut in Curculionibus.*

\* \* \* \* Corpore oblongo, Thorace angustiore.

indigena-97. C. oblonga rubra, thorace cylindrica utrinque impresso. *Fn. succ.* 563. \*

*Scop. carn.* 112. Attelabus Lillii.

*Blank. inf.* 91. t. 11. f. 7.

*Mer. inf.* 71.

*Vallist. nat.* 1, p. 265. t. 32.

*Schaff. elem.* t. 52.

Q q 2

Resum

*Reaum. inf. 3. t. 17. f. 1, 2.*

*Geoffr. parif. 239. Cricoceris rubra.*

*Habitat in Lilio, Convallaria.*

*C. Lili pedibus nigris, Convallariæ rubris. D. Geer. Afinis Attelabæ.*

stercora- 98. *C. oblonga nigra, thorace subcylindrico impresso,*  
ria. *elytrisque rufis.*

*Habitat in Africa. Brander.*

*Simillima C. meridigeræ, a qua differt thorace toto & elytris rufis. Elytra punctis majusculis impressis rugosa.*

Nym- 99. *C. oblonga fusca, elytris margine prominulo flave-*  
phææ. *scenitibus. Fn. suec. 565.*

*Habitat in Nymphæis, tarda & ignava.*

Cupræa. 100. *C. oblonga, thorace nigro-punctato elytrisque gri-*  
*seis, antennis nigris longis. Fn. suec. 566.*

*Fann. suec. 1. n. 424. Chrysomela nigra, thorace elytrisque griseis.*

*Habitat in Salicibus.*

calmari- 101. *C. oblongiuscula ferruginea, elytrisque macula lon-*  
entis. *gitudinali nigricante.*

*Habitat in Europa. Modcer.*

*Statura C. Cuprææ. Antennæ fusca. Thorax testaceus, utrinque depressus medio longitudinali nigro.*

*Elytra testacea, tenia longitudinali nigra, a basi fere ad apicem ducta. Abdomen fuscum. Pedes pallidi.*

tenella. 102. *C. oblongiuscula ferruginea, elytris margine thora-*  
*ceque flavis. Fn. suec. 564.\**

*Habitat in Europa.*

4-macu- 103. *C. oblonga, thorace pedibus elytrisque flavis: ma-*  
lata. *culis duabus nigris remotissimis. Fn. suec. 571.\**

*Gadd sat. 77. Chrysomela fusco lutea, elytrorum punctis quatuor nigris.*

*Schaff. inf. 1. 6. f. 1, 2, 3.*

*Habitat in Europa.*

*Macula postica elytrorum in quibusdam gemina.*

cyanella. 104. *C. oblonga cærulea, thorace cylindrico lateribus*  
*gibbis. Fann. suec. 572.\**

*Habitat in Europa.*

105. *C.*

melano- 105. *C. oblonga cærulea*, thorace pedibusque rufis. *Fn.*  
pa. *svæc.* 573. \*

*Sultz. inf.* 3. t. 3. f. 19.

*Habitat in Europa.*

*Similis C. Polygoni, sed major.*

flavipes. 106. *C. oblonga nigra*, thorace pedibusque flavis.

*Habitat in Germania. P. torškabl.*

*Simillima C. melanopodæ, sed Thorax pallidior, planior. Elytra atra. Antennæ fusæ. Pedes flavi, excepta basi femorum.*

tomento- 107. *C. oblonga*, elytris subtomentosis nigris: linea longitudinali margineque pallidis.

*Habitat in Carolina. D. Garden.*

*Statura C. capree; facies Lampyridis. Caput lividum, occipite nigro. Antennæ nigre, corpore breviores. Thorax nudus, lividus maculis 3 nigris. Elytra nigra, subtomentosa: linea longitudinalis livida, in medio elytri, vix apicem attingens; margo ejusdem longitudinis lividus. Pedes & Abdomen livida.*

punctatis- 108. *C. oblongiuscula viridi-ænea punctatissima*, pedibus  
fima. ferrugineis. *Amæn. acad.* 6. p. 394. n. 18.

*Habitat Surinami.*

3-puncta- 109. *C. oblongiuscula nigra*, thorace testaceo, elytris  
ta. punctis quatuor flavis. *Amæn. acad.* 6. p. 394. n. 17. \*

*Habitat Surinami.*

12-punctata. 110. *C. oblonga rufa*, elytris punctis sex, pectore pedumque gemiculis nigris. *Fn. svæc.* 568. \*

*Scop. carn.* 115. *Atrelabus* 12-punctatus.

*Frisch. inf.* 13. t. 28.

*Geoffr. paris.* 1. p. 240. t. 4. f. 5. *Crioceris rubra* punctis 13 nigris.

*Habitat in Asparago.*

Phellandrii. 111. *C. oblonga nigra*, thorace elytrisque lineis duabus luteis. *Fn. svæc.* 569.

*Habitat in Phellandrio aquatico, ad radices.*

Asparagi. 112. *C. oblonga*, thorace rubro: punctis duobus nigris, elytris flavis: cruce punctisque quatuor nigris. *Fn. svæc.* 567. \*

*Scop. carn.* 113. *Attelabus Asparagi*.

*Frisch. inf.* 1. p. 27. t. 6.

*Röf. inf.* 2. scar. 3. p. 11. t. 4.

*Geoffr. paris.* 1. p. 241. *Crioceris* 3.

*Habitat in Asparago officinali, quem devastat.*

*Conf. Cancarellum Asparagi. Vallisn. oper.* 1. t. 7.

*Varietas gallica mihi est, quæ simillima, sed elytra sunt fasciis 2 angustis rubris.*

campe- 113. *C. oblonga nigro-virescens, elytris maculis tribus*  
stris. flavis adnatis margini exteriori flavo.

*Habitat in Barbaria.*

*Simillima C. Asparagi, sed dimidio minor, nigro-cæ-  
rulescens s. virescens. Antennæ nigrae. Thorax la-  
teribus margineque antico posticoque ruber. Elytra  
maculis 3, flavescentibus, adnatis margini exteriori.  
Pedes flavicantes, femoribus clavatis.*

\* \* \* \* \* *Elongatae.*

sulphu- 114. *C. oblonga flava tota.*  
rea. *Habitat in Norvegia. D. C. Solandar.*

cervina. 115. *C. oblonga livida, thorace postice transverso. Fn.*  
*svéc. 575. \**

*Habitat in Europa.*

*Color dorsii constat e pilis vix conspicuis glauco-fuscis.*

caraboï- 116. *C. oblonga nigra, elytris subcæruleis, plantis ferru-  
des. gineis. Fn. svéc. 574. \**

*Habitat in Europa.*

*Thorax postice obsolete trilobus.*

ceram- 117. *C. oblonga nigra, elytris testaceis, antennis ferratis.*  
boides. *Fann. svéc. 576. \**

*Habitat in Europa.*

murina. 118. *C. oblonga nigra, elytris pedibusque testaceis. Fn.*  
*svéc. 577. \**

*Habitat in Europa.*

hirta. 119. *C. oblonga villosa nigra, thorace teretiufculo, ely-  
tris testaceis. Fn. svéc. 578. \**

*Habitat in Europa.*

120. *C.*

*Elongatae Chrysomelæ facie a præcedentiis nonnihil recedunt, oblongæ magis &  
indique declives; limites vero quibus distinguerentur, non reperi.*



pube-  
scens.120. *C. elongata nigra*, thorace nigro villosa, elytris  
plantisque testaceis.*Habitat in Germania.**Similis C. hirtæ. Thorax subcylindricus villosus; re-  
liqua glabra.*

inda.

121. *C. oblonga cyanea*, pedibus longitudine corporis.*Mus. Lud. Ultr. 41. \***Habitat in India.**Magnitudo Scar. siccarii. Elytra levia. Pedes  
longiores quam in reliquis.*

elongata.

122. *C. elongata atra*, thorace rubro subvillosa.*Habitat in Germania. P. Forsk. bl.**Hæc reliquis longior & admodum angusta ratione con-  
generum; Thorax semicylindricus & valde angustus  
ratione C. elongatarum.*200. HISPA. *Antennæ fusiformes, basi approxima-  
tæ, inter oculos sitæ.**Thorax Elytraque aculeata sæpius.*

atra.

1. *H. corpore toto atro.**Geoffr. paris. 1. p. 243. n. 7. Crioceris tota atra spi-  
nis horrida.**Habitat in Europa australi & Africa boreali ad radi-  
ces graminum. Hanc in Suecia dimidio minorem  
reperi.**Corpus magnitudine Chrysomelæ cylindrica, atrum.**Caput ad antennas aculeum setaceum porrigit. An-  
tennæ filiformes, extrorsum fere crassiores, corpore  
 $\frac{1}{2}$  breviores, articulis brevissimis. Thorax utrinque  
spina triplici, & a tergo binis duplicibus. Elytra  
adpersa serie sextuplici longitudinali aculeorum.*

testacea.

2. *H. corpore testaceo, antennis aculeisque nigris.**Habitat in Barbaria. Brander.**Corpus magnitudine præcedentis, testaceum, sed An-  
tennæ, Oculi, lituræ quædam pectoris, abdominisque  
nigra. Thorax utrinque ad latera spina sextuplici.  
Elytra testacea, punctata & aculeis nigris adpersa  
ciliataque.*

bihamata. 3. *H. inermis nigra rubro maculata, elytris truncatis hamatis.*

*Habitat in India. e Museo D. Vœt; descripsit D. Brunniche.*

*Corpus oblongum, Chrysom. caprea magnitudinis, depressum, flavo rubens. Caput minimum, nigrum. Antennæ articulis 3: duobus inferioribus globosis minutis; tertio thorace longiore, medio crassiore, apice acuto. Thorax subcylindricus, corpore angustior, postice latior, disco planiore rubro, lateribus nigricans, excavatus punctis minutissimis. Elytra, sulcis 3, ex duplici ordine punctorum excavatorum, sed sulcus marginalis e simplici ordine; nigra, ad basin juxta suturam linea brevi rufa & pone eam macula transversa concolor. Singula elytra postice truncata, sed angulo exteriori terminato spina magna, incurva. Pedes flavo rubri: plantis nigris. Br.*

muticus. 4. *H. inermis, antennis pilosis.*

*Dermestes clavicornis niger, antennis clavatis pilosis. Fann. succ. 413.*

*Habitat in Europa.*

*Antennæ totæ clavatæ, atræ: articulis 3 valde pilosis. Caput exsertum. Thorax angulatus, marginatus. Elytra striis 5, elevatis, interstinctis ordine punctorum excavatorum. Antennæ fusiformes, s. filiformes, medio sensim crassiores.*

## 201. BRUCHUS. *Antennæ filiformes, sensim crassiores.*

Pisi. 1. *B. elytris griseis albo punctatis, podice albo maculis binis nigris. Mus. Lud. Ultr. 35. \**

*Syst. nat. 10. p. 356. Dermestes Pisorum.*

*Amm. nead. 3. p. 347. Curculio Pisorum.*

*Kalm. it. 2. p. 294. Bruchus americana septentrionalis.*

*Lederm. micr. 195. t. 100.*

*Scop. carn. 63. Larva Salicis.*

*Geoffr. parif. 1. p. 267. t. 4. f. 9. Mylabris 1.*

*Gron. zooph. 569. \**

*Habitat in America septentrionali, devastans agrorum Pisi; nunc in Europa australiore, devastatur a Gracula Quiscalia.*

*Femora sub apice dente notata.*

2. *B.*

- Theobroma.** 2. *B. elytris canescentibus nigro punctatis, pedibus anticis rufis, scutello albo.*  
*Habitat in Theobromæ seminibus, India orientalis.*  
*Præcedenti dimidio minor, nigro-canescens. Elytra punctis oblongis nigris subsæciata. Pedes antichi & basis antennarum rufo-ferruginea. Punctum scutellare album. Femora sub apice dente notata.*
- Gleditsiæ.** 3. *B. elytris striatis longitudine abdominis, corpore piceo, antennis nigris.*  
*Aman. acad. 6. p. 392. n. 5. Dermestes Gleditsiæ.*  
*Habitat in Americæ septentrionalis seminibus Gleditsiæ.*  
*Femora ovata absque omni dente.*
- Bætris.** 4. *B. elytris levibus, corpore subincano, femoribus posticis ovatis.*  
*Aman. acad. 6. p. 392. n. 6.*  
*Jacqu. hist. t. 170.*  
*Habitat in Nucleis Bætris Palmæ Americæ.*  
*Femora mutica.*
- granarius.** 5. *B. elytris nigris: atomis albis, pedibus anticis rufis; posticis dentatis.*  
*Faun. suec. 628. Curculio atomarius. \**  
*Habitat in Europæ seminibus plantarum.*
- seminarius.** 6. *B. ater, antennarum basi pedibusque anticis testaceis.*  
*Habitat in Europa. Kækeritz.*  
*Magnitudo Pediculi. Thorax submarginatus. Elytra striata. Pedes inermes: primi parvis testacei.*
- pectinicornis.** 7. *B. antennis pectinatis corpore longioribus.*  
*Syst. nat. 10. p. 386. n. 79. Curculio chinensis.*  
*Habitat in Barbaria, China; intra Pisa.*  
*Corpus magnitudine Byrrhi Scrophulariæ, subcinereum. Elytra abdomine breviora, cinerea, adpersa punctis obsolete ferrugineis. Podex subcinereus maculis 2 obsolete. Antennæ ferrugineæ, compressæ, pectinatae dentibus 8. Femora mutica. Verbo simillimus B. Pisorum, sed parvus, antennis distinctissimis pectinatis.*

202. CURCULIO. *Antennæ subclavatæ, rostro infidentes.**Rostrum corneum prominens.*\* *Longirostres femoribus simplicibus.*

Palmarum.

1. C. longirostris ater, thorace ovato planiusculo, elytris abbreviatis striatis. *Mus. Lud. Ulr.* 42. \*  
*Rumph. amb.* 1. p. 79, 83. t. 17. f. G. *Costus Saguaris.**Pet. gaz.* 1. 35. f. 5.*Gron. zooph.* 578, 577. t. 16. f. 4.*Merian. sur.* 1. 48. f. 3.*Sultz. ias.* 1. 3. f. 20.*Habitat in Indiæ Palmis: in Carolina dimidio minor Javano.**Antennæ apice quasi bifariam truncatæ. Rostrum supra scabrum. Larvæ assatæ in deliciis habentur. Jacq. amer.* 278.

indus.

2. C. longirostris ater, thorace subovato excavato-punctato, elytris rugoso-fulcatis, tibiis spinosis. *Mus. Lud. Ulr.* 43. \**Habitat in India.**Magnitudo præcedentis. Rostrum apice bilobum.*

hemipterus.

3. C. longirostris obscure purpurascens, elytris abbreviatis maculatis. *Mus. Lud. Ulr.* 44. \**Habitat in India.**Thorax lineis tribus nigris longitudinalibus.*

Alliarum.

4. C. longirostris violaceus totus. *Fn. succ.* 580. \**Fann. succ.* 468. *Curculio nigro-cæruleus.**Habitat in Erythimo Alliarum & affinis, caules perforans.*

cyaneus.

5. C. longirostris ater, elytris violaceis, scutello albo.

*Fann. succ.* 581. \**Habitat in Europa, imprimis in Salicibus.*

Cracæ.

6. C. longirostris niger ovatus, rostro subulato, abdomine pallido.

*Habi-*

---

*Curculionum longirostrum larvæ pleræque fructus & semina, brevirostrum vero folia consumunt; variae etiam caules perforant.*

*Habitat in Viciæ Craccæ seminibus. Yckenberg. Geod.*  
*Corpus magnitudine Pediculi, nigrum. Elytra striata striis latitudine interstitiorum. Antennarum primus articulus testaceus. Oculi subtus ciliati, imprimis in masculis. Femora mutica.*

- Campanulæ. 7. *C. longirostris niger ovatus, elytris striatis.*  
*Habitat in Campanulæ rotundifoliæ pericarpis incrassatis, corolla non rite debescente, stylo incrassato.*  
*Corpus totum nigrum, magnitudine Pediculi. Femora mutica.*
- badensis. 8. *C. longirostris niger, pedibus piceis.*  
*Habitat in Germania. Dr. Blom.*  
*Magnitudo C. Cerasi. Antennæ longitudine  $\frac{1}{2}$  corporis. Thorax lævisculus, ovatus. Elytra obsolete striata. Femora clavata, mutica. Pedes ferruginei, piceis: Digitis nigris.*
- æquatus. 9. *C. longirostris æneus, elytris rubris, rostro nigro elongato.*  
*Habitat in Germania. D. Schreber.*  
*Statura C. Nucum, sed dimidio minor. Color obscure æneus. Femora mutica.*
- aterrimus. 10. *C. longirostris ater, elytris nitidis. Fn. suec. 582. \**  
*Habitat in Europa.*
- Cerasi. 11. *C. longirostris ater, elytris opacis oblongis. Faun. suec. 583. \* It. scan. 355. Scop. carn. 84.*  
*Habitat in foliis Cerasi & Pyri, epidermidem exedens, commaculans, frequentissimus nobis 1750.*
- Pruni. 12. *C. longirostris ater, antennis ferrugineis, thorace bituberculato.*  
*Habitat in Foliis Cerasi.*  
*Totus ater. Elytra striata. Antennæ subferrugineæ. Femora mutica. Thorax a tergo tuberculis 2, elevatis, vix mucronatis.*
- acidulus. 13. *C. longirostris piceus, abdomine ovato. Faun. suec. 584. \**  
*Habitat in Europæ plantis tetradynamia.*
- purpureus. 14. *C. longirostris purpureus nitens, rostro longissimo. Fn. suec. 585. \* Scop. carn. 86.*

*Pot.*

*Pet. gaz. t. 22. f. 5.* Scarabæus miniatus minimus  
*List. loqu. 394.*  
*Habitat in Europa.*

- frumen- 15. *C. longirostris fanguineus.* *Fn. succ. 586.*  
 tarius. *Act. stockh. 1750 p. 186. n. 1.*  
*Leuwenb. arc. 168. aug. 6. p. 83. f. 1.*  
*Habitat in Europæ frumento, diutius asservato pes-*  
*simus.*
- granarius. 16. *C. longirostris piceus oblongus, thorace punctato*  
*longitudine elytrorum.* *Faun. succ. 587. \* Scop.*  
*carn. 89.*  
*Raj. inf. 88.* Scarabæus parvus sordide s. obscure  
 fulvus, proboscide longa deorsum arcuata.  
*Geoffr. parif. 1. p. 285. n. 18.*  
*Habitat frequens in granulis avenaceis decorticatis, in*  
*mercatorum tabernis frequens.*
- dorsalis. 17. *C. longirostris, elytris rubris: futura nigra.* *Fn. succ.*  
*588. \**  
*Faun. succ. 1. n. 475.* Curculio niger, elytris in me-  
 dio rufescentibus.  
*Habitat in Ranunculo Ficaria.*
- melano- 18. *C. longirostris cinereus, coleoptris fascia cordata fu-*  
 cardius. *sea. Mus. Lud. Ulr. 45. \**  
*Habitat in Indiis.*  
*Macula utraque elytra combinans literam V refert.*
- Pini. 19. *C. longirostris, elytris testaceis: fasciis nebulosis.* *Fn.*  
*succ. 589. \**  
*Habitat in Pini sylvestris cortice & resina.*  
*Vidi copula junctos C. Pini & Abietis.*
- Lapathi. 20. *C. longirostris albedo nigroque varius muricatus.* *Fn.*  
*succ. 591. \**  
*Habitat in Rumicibus Lapathis.*  
*Pectoris latera & Elytra postice albida.*
- cupreus. 21. *C. longirostris obscure æneus, subtus obscurior.* *Fn.*  
*succ. 593. \**  
*Habitat in Europa.*

- scaber. 22. *C. longirostris cinereus*, pedibus rufis, elytris scabris.  
*Faun. suec.* 592. \*  
*Habitat in Europæ Urticis. Gronov.*
- T. album. 23. *C. longirostris ater*, abdominis lateribus posticisque  
 lacteis. *Fn. suec.* 594. \*  
*Habitat in Westerbothnia. D. Solander.*
- ruficollis. 24. *C. longirostris ferrugineus*, elytris capitisque basi a-  
 trocæruleis. *Fn. suec.* 595. \*  
*Habitat in Europa.*
- Quercus. 25. *C. longirostris pallide flavus*, oculis nigris. *Faun.*  
*suec.* 596. \*  
*Uddm. diff.* 25. \*  
*Habitat in Quercus Roboris foliis, inter venas majo-*  
*res subcutaneus, folia maculans.*  
*Magnitudo Pediculi.*
- Polygoni. 26. *C. longirostris testaceus*, coleoptorum sutura nigra,  
 repanda. *Fn. suec.* 597. \*  
*Habitat in Polygono aviculari.*
- Viscariz. 27. *C. longirostris subrotundus cinereus*, thorace elytris-  
 que cinereo-virentibus. *Fn. suec.* 598. \*  
*Habitat in Lychnis viscariz fructificationibus.*
- punctatus. 28. *C. longirostris cinereus*, elytris macula nigra, tibiis  
 flavescens. *Fn. suec.* 599. \*  
*Habitat in Europa.*
- 4-maculatus. 29. *C. longirostris nigricans*, coleoptris maculis quatuor  
 albidis. *Fn. suec.* 600. \*  
*Habitat in Europa.*
- 5-maculatus. 30. *C. longirostris griseus*, coleoptris maculis quinque al-  
 bidis. *Fn. suec.* 601. \*  
*Habitat in Europa.*
- pericarpus. 31. *C. longirostris subglobosus nebulosus*, coleoptris ma-  
 cula cordata alba. *Fn. suec.* 602. \*  
*Habitat in Scrophulariis.*
- Sprengle. 32. *C. longirostris fuscus*, elytris flavis: lineis atris glaber-  
 rimis abbreviatis inæqualibus, pedibus ferrugineis.  
*Mali-*

*Habitat in America. L. Spengler.*

Corpus statura C. Pini. Rostrum nigrum. Antennæ nigrae, clavatae. Thorax niger punctis excavatis, confertis, pallidioribus. Elytra rorae s. tomento flavo tecta: Lineae longitudinales utrisque tres, nigrae, elevatae, glaberrimae, quarum exterior s. lateralis fere longitudinalis; media elytris dimidio brevior: interna brevissima, nec ad basin extensa. Pedes mutici, fusco-ferruginei.

vittatus. 33. C. longirostris, elytris lineis albis luteisque.

Sloan. jam. 2. p. 210. Scarabæus curculio proboscide longa deorsum arcuata, elytris fasciis albis & luteis variegatis.

*Habitat in Europa.*

paraplecticus. 34. C. longirostris cylindricus subcinereus, elytris mucronatis. Fn. suec. 604. \*

Faun. suec. 445. It. scan. 184. Curculio fuscus oblongus elytris rectis acuminatis.

*Habitat in Phellandrio, Sio.*

Larva intra caulem, sæpe sub aqua hæret. Equis Paraplegiam causari creditur; antidotum sterces Suis.

anguinus. 35. C. longirostris cylindricus canus fusco lineatus.

*Habitat in Germania.*

Corpus tota structura C. paraplectici, fuscum, subtus canum, nigro punctatum. Rostrum magis arcuatum. Thorax lineis 4 exalbidis. Elytra lineis 5, canescentibus, parallelis, exteriore latiore; insuper longitudinaliter punctata duplici serie punctis excavatis, vix conspicuis. Apices elytrorum mucronati, nec dehiscentes. Pedes cani, mutici, nigro punctati, Antennæ clavatae, acutiusculæ.

ascanii. 36. C. longirostris cylindricus ater lateribus subcærulescentibus.

*Habitat in Europa australi. D. Ascanius.*

Corpus tota structura C. paraplectici, sed totus ater, at latera thoracis & elytrorum linea canescente s. cærulescente ab oculis secundum latera thoracis marginemque exteriorem elytrorum ducta. Apex elytrorum acutus, sed non mucronatus. Subtus totus canescens.

37. C.



- algirus. 37. *C. longirostris subcylindricus lævis fuscus punctis prominulis adpersus.*  
*Habitat Algiriæ. E. Brander.*  
*Statura C. paraplectici; sed postice minus acutus & subcinerascens.*
- Bacchus. 38. *C. longirostris aureus, rostro plantisque nigris.*  
*Habitat in Vite.*  
*Corpus rubro aureum supra subvillosum.*
- Betula. 39. *C. longirostris, thorace antrorsum sæpe spinoso, corpore viridi aurato, subtus concolore. Fn. suec. 605. \**  
*Faun. suec. 1. n. 486. Curculio cæruleo-viridis nitens, antennis atris.*  
*Schaff. ic. t. 6. f. 4.*  
*Habitat in Betula, Alno.*  
*Alter sexus thoracis spinas habet; alter non.*
- Populi. 40. *C. longirostris, thorace antrorsum spinoso, corpore viridi ignito: subtus atro-cærulescente. Faun. suec. 606. \**  
*Habitat in Populo, Corylo.*  
*Mas thorace utrinque spinoso, Femina vero non.*
- Beccabunga. \* \* *Longirostres, saltatorii femoribus posticis crassis.*  
 41. *C. longirostris fuscus, elytris subfanguineis margine anoque fuscis. Fn. suec. 607. \**  
*Habitat in Veronica Beccabunga.*
- Alni. 42. *C. longirostris, pedibus saltatoriis, elytris lividis: maculis duabus obscuris. Fn. suec. 608. \**  
*Faun. suec. 1. n. 473. Curculio lividus, coleoptris maculis quatuor obscuris.*  
*Geoffr. paris. 1. p. 286. n. 20.*  
*Habitat in Alno Betulae.*
- Salicis. 43. *C. longirostris, pedibus saltatoriis, elytris atris: fasciis duabus albis. Fn. suec. 610. \**  
*Geoffr. paris. 1. p. 245. Altica 1.*  
*Habitat in Salicis floribus.*
- Fagi. 44. *C. longirostris, pedibus saltatoriis, corpore atro, femoribus pallidis. Fn. suec. 609. \* It. scan. 111.*  
*Scop. carn. 73.*  
*Habitat in Fagi foliis.*

Segetis. 45. *C. longirostris*, pedibus saltatoriis, corpore piceo, elytris oblongis. *Fn. suec.* 611. \*  
*Habitat in agris super spicas.*

\* \* \* *Longirostres femoribus dentatis.*

Pomorum. 46. *C. longirostris*, femoribus anticis dentatis, corpore griseo nebuloso. *Fn. suec.* 612. \*  
*Frisch. inf.* 1. p. 32. t. 8. Curculio in floribus arborum.  
*Habitat in Floribus Pomonæ.*

ovalis. 47. *C. longirostris*, femoribus omnibus dentatis, corpore ovato nigro albo maculato. *Fn. suec.* 613.  
*Habitat in Europa.*

carbonarius. 48. *C. longirostris*, femoribus omnibus dentatis, corpore nigro oblongo, elytris striatis. *Faun. suec.* 614. \*  
*Scop. carn.* 79.  
*Habitat in Europa. D. C. Solander.*

mucronatus. 49. *C. longirostris*, femoribus quatuor anterioribus dentatis, elytris polline flavescens: supra apicem gibbosis. *Mus. Lud. Utr.* 53. \* *Gron. mus.* 589. \*  
*Habitat in India.*

pufio. 50. *C. longirostris*, femoribus quatuor posterioribus dentatis, elytris nigris striatis linea repanda grisea. *Mus. Lud. Utr.* 46. \*  
*Habitat in Indiis.*  
*Linea grisea repanda in singulo elytro longitudinaliter excurrit.*

vaginalis. 51. *C. longirostris*, femoribus dentatis, elytris striatis: tuberculis sparsis juxta apicem mucronatis. *Mus. Lud. Utr.* 47. \*  
*Habitat in America, Surinami.*  
*Thoracis fossula pro rostro. Elytrorum striæ ex punctis cavis villosis.*

stigma. 52. *C. longirostris*, femoribus dentatis, elytris macula ferruginea. *M. L. U.* 48. \*  
*Habitat in Indiis.*  
*Fossula inter pedes pro rostri receptione, ut in antecedente.*

depressus. 53. *C. longirostris*, femoribus dentatis, thorace depresso lateribus obtuse angulato. *Mus. Lud. Utr.* 49. \*  
*Habi-*

*Habitat in America.*

*Corpus griseum punctis nigris glabris prominulis.*

- annulatus. 54. *C. longirostris*, femoribus dentatis, thorace elytrisque fasciis linearibus nigris. *Mus. Lud. Uir.* 51. \*
- Habitat in Indiis.*  
*Thorax linea unica, elytra duabus cinguntur; oculi annulo albo.*
- dispar. 55. *C. longirostris*, femoribus dentatis, elytris emarginatis rubro-striatis. *Mus. Lud. Uir.* 50. \*
- Habitat in Indiis.*  
*Corpus nigrum. Femina rostro brevi valide forcipato. Antennae filiformes, moniliformes.*
- anchora-co. 56. *C. longirostris*, femoribus dentatis, elytris flavo striatis, thorace elongato. *Mus. Lud. Uir.* 52. \*
- Gron. zooph.* 583. t. 15. f. 4. \*
- Habitat in Indiis.*  
*Thorax longitudine saepe abdominis, unde structura singularis, & rostrum longitudine thoracis. Antennae moniliformes s. filiformes. Pedes medii brevissimi.*
- Abietis. 57. *C. longirostris*, elytris fuscis: fasciis duabus linearibus interruptis griseis, femoribus dentatis. *Fn. suec.* 615. \*
- It. xl.* 26. *Curculio subfuscus.*  
*Pet. gaz.* 14 t. 8. f. 9. *Curculio norvegicus.*  
*Habitat in Pini sylvestris Cortice & resina. Similis C. Pini.*
- germanus. 58. *C. longirostris*, femoribus subdentatis, corpore ovato nigro punctis testaceis adperso.
- Habitat in Germania. P. Forstahl.*  
*Inter maximos Europaeos. Rostrum crassiusculum. Thorax subrotundus utrinque punctis 3 ferrugineis. Coleoptera abdomen tegentia, ovata, nigra punctis ferrugineis adpersa. Femora postica obsolete dentata; anteriora 4 mutica cum rudimento dentis. Similis C. pini.*
- Nucum. 59. *C. longirostris*, femoribus dentatis, corpore griseo longitudine rostri. *Fn. suec.* 616. \* *Scop. garn.* 105.

*Uddm. diff.* 24. *Curculio ovatus* griseus, rostro filiformi longitudine corporis.

*Sultz. inf. t.* 3. f. 22.

*Geoffr. parif.* 1. p. 295. n. 42.

*Poda inf. t.* 1. f. 3.

*Raf. inf. suppl.* 385. t. 67. f. 5, 6.

*Habitat in* Nucibus Coryli *Avellanae*.

*Rostrum ante antennas sanguineum. Scutellum cordatum, album.*

**Rumicis.** 60. *C. longirostris* griseus nigro nebulosus oblongus, pedibus dentatis, antennis subfuscis. *Fn. succ.* 590.

*Habitat in* Rumicibus *Lapathis*, folia, subtus exedendo, commaculans.

**Scrophulariæ.** 61. *C. longirostris* subglobosus, coleoptris maculis duabus atris dorsalis. *Fn. succ.* 603. \*

*Faun. succ.* 1. n. 460. *C. punctis* 2 nigris, thorace exalbido.

*Geoffr. parif.* 1. p. 296. n. 44. Idem.

*List. loqn.* 395. *Scarabæus exiguus* cinereus, duabus maculis nigris.

*Reaum. inf.* 3. t. 2. f. 12.

*Habitat in* Scrophulariis *Larva*, pericarpia exedens, suosque folliculos substituens; in *Verbascopallidior*.

**Druparum.** 62. *C. longirostris*, femoribus dentatis, rostro rubro, elytris testaceis obsolete fasciatis. *Fn. succ.* 617.

*Syst. nat.* 10. p. 383. n. 54. *Curculio rectirostris*.

*Sultz. inf. t.* 3. f. 21.

*Schaff. ic. t.* 1. f. 11.

*Habitat in* Cerasi *Padi Nucleis*.

**violaceus.** 63. *C. longirostris* violaceus, femoribus dentatis, proboscide thoracis longitudine. *Fn. succ.* 579. \*

*Habitat in* Pinu, frequens super turiones.

**3-punctatus.** 64. *C. longirostris*, femoribus dentatis, elytris sutura alba maculisque duabus. *Fn. succ.* 618. \*

*Habitat in* Europa.

**hispidus.** 65. *C. longirostris*, femoribus dentatis, corpore sulcato adsperso squamis erectis. *Fn. succ.* 619. \*

*Habitat in* Europa.

, 66. *C.*

- pedicula- 66. *C. longirostris*, femoribus dentatis, corpore rubro,  
rius. elytris albidis-subfasciatis. *Fn. suec.* 620. \*  
*Habitat in Europa.*
- torrix. 67. *C. longirostris*, femoribus dentatis, corpore testaceo,  
pectore fulco. *Fn. suec.* 622. \*  
*Habitat in Populi tremulæ foliis, quæ conserquet.*
- \* \* \* \* *Brevirostres femoribus dentatis.*
- Ligustici. 68. *C. brevirostris*, femoribus subdentatis, abdomine sub-  
ovato murino. *Fn. suec.* 621. \*  
*Habitat in Ligustico Levistico.*
- ovatus. 69. *C. brevirostris*, femoribus dentatis, abdomine ovato  
nigro, pedibus antennisque rufis. *Fn. suec.* 626. \*  
*Habitat in Europa.*
- cervinus. 70. *C. brevirostris*, femoribus dentatis, antennis basi ru-  
fescens. *Fn. suec.* 627. \*  
*Habitat in Europa.*
- oblongus. 71. *C. brevirostris oblongus*, femoribus dentatis, anten-  
nis elytris pedibusque ferrugineis. *Fn. suec.* 625.  
*Habitat in Europa.*
- Pyri. 72. *C. brevirostris*, femoribus dentatis, æneo-fuscus. *Fn.*  
*suec.* 623. \*  
*It. scan.* 355. *Curculio viridis opacus*, pedibus anten-  
nisque magis fuscis.  
*Habitat in Pyri foliis Larva, in Pruni corollis declaratus.*  
*Pedes alius rubri, aliis nigri.*
- argenta- 73. *C. brevirostris*, femoribus dentatis, corpore viridi-ar-  
tus. genteo. *Fn. suec.* 624. \* *Scop. carn.* 91  
*Fann. suec.* 459. *Curculio femoribus omnibus denti-  
culo notatis, corpore viridi oblongo.*  
*Geoffr. paris.* 1. p. 293. n. 38.  
*Habitat in Europæ Urtica, Betula, Corylo.*  
*Affinis valde C. Pyri.*
- \* \* \* \* *Brevirostres femoribus muticis.*
- argyæus. 74. *C. brevirostris*, femoribus submuticis, corpore toto  
viridi - argenteo - aureoque maculato. *Mus. Lnd.*  
*Ulr.* 54. \*

*Habitat in Indiis.*

*Facies C. argentati. Sub femoribus primoribus spina obsoleta.*

- regalis. 75. *C. brevirostris*, femoribus muticis, corpore viridi-sericeo: fasciis rubro-aureis repandis. *Brunnich.*  
*Habitat in Peru. e Museo Lesnei & Crameri.*  
*Corpus magnitudine & statura C. germanici, nitidissimum, sericeo-viride fasciis aureis.*

- viridis. 76. *C. brevirostris*, femoribus muticis, corpore viridi supra obscuro, subtus flavidiore. *Fn. suec. 629. \**  
*Sultz. inf. t. 3. f. 24.*  
*Habitat in Europa.*  
*Magnitudo & statura C. Pyri, supra totus e viridi fuscus, subtus e flavo viridis, quo colore etiam latera elytrorum lucent. Antennae & Pedes nigri.*

- speciosus. 77. *C. brevirostris*, femoribus muticis, corpore luteo viridit-niente, elytris spinis sparsis. *Mus. Lud. Ulr. 55. \**  
*Habitat in Indiis.*  
*Elytra singula in dorso protuberant spinis quinque.*

- ruficornis. 78. *C. brevirostris*, femoribus muticis, corpore atro, thorace bituberculato, antennis rubris. *Fn. suec. 636. \**  
*Habitat in Europa.*

- albinus. 79. *C. brevirostris niger*, fronte anoque albis, thorace tuberculato. *Fn. suec. 632. \* Scop. carn. 66.*  
*Uddm. diff. 27. Curculio niger, aculeis thoracis tribus, elytrorum sex.*  
*Habitat in Europa.*  
*Color fere Curculionis Lapathi.*

- lineatus. 80. *C. brevirostris griseus*, thorace striis tribus pallidioribus. *Fn. suec. 630. \**  
*Habitat in Europa.*

- incanus. 81. *C. brevirostris cinereus oblongus*, elytris obtusiusculis. *Fn. suec. 631. \**  
*List. loqu. 394. n. 30.*  
*Groffr. parif. 1. p. 282. n. 10. alis carens.*  
*Habitat in Europa.*

82. *C.*

- cloropus.** 82. *C. brevirostris niger*, antennis tibiisque ferrugineis.  
*Fn. svec. 635. \**  
*Habitat in Europa.*  
*Magnitudo Pollicis.*
- rufipes.** 83. *C. brevirostris cinereus oblongus*, pedibus rufis. *Fn. svec. 634. \**  
*Habitat in Europa.*
- nebulosus.** 84. *C. brevirostris oblongus canus*, elytris fasciis obliquis nigris. *Fn. svec. 635. \**  
*Fann. svec. 1. n. 448.* Curculio albo nigroque varius, proboscide planiuscula carinata thoracis longitudine.  
*Frisch. inf. 11. p. 32. t. 23. f. 3.*  
*Geoffr. parif. 1. p. 278. n. 1. t. 4. f. 8.*  
*Habitat in Europa.*
- fulcirostris.** 85. *C. brevirostris oblongus cinereus subnebulosus*, rostro trifurcato.  
*Habitat in Europa.*  
*Simillimus C. nebuloso, at Rostrum non dorso carinatum, sed 3 sulcis parallelis excavatum.*
- ater.** 86. *C. brevirostris oblongus ater*, antennis rufis. *Fann. svec. 637. \**  
*Habitat in Europa.*
- emeritus.** 87. *C. brevirostris niger*, thorace elytrisque spinosis, fronte excavata. *Mus. Lud. Ulr. 56. \**  
*Habitat in Indiis.*  
*Facies tristis arabei. Elytra adspersa verrucis pilosis. Abdomen multum elytris tectum.*
- barbarus.** 88. *C. brevirostris ater*, thorace subspinoso, elytris angulo duplici crispato.  
*Habitat in Barbaria, Gallia.*  
*Magnitudo fere Scarabaei stercorarii. Corpus totum aerrimum. Caput, Thorax, Pectus, Pedes punctis excavatis adspersa. Elytra coalita vix debescunt, ad latera inferiora punctis gibbis adspersa; supra in singulo linea duae elevatae undulatae punctis muricatae. Thorax varie excavatus, ad latera quasi spina rotundata utrinque notabilis.*  
*Mas? dimidio minor. Thoracis rugae dorsales rectae, nec undulatae excurrunt in totidem rugas coleo.*

*rum, quarum media in sutura communi, laterales in singulo elytro; insuper in elytro ruga exterior undulata, carinata & longior.*

**capensis.** 89. *C. brevirostris ater, thorace elevato-punctato, coleoptris striis crenatis. Mus. Lud. Utr. 59.*

*Habitat ad Cap b. spei. D. Tulbagh.*

*Rostrum crassius, non brevissimum, distinctum a capite, quod singulare. Elytrorum striæ utrinque elevato-punctatæ.*

**verrucosus.** 90. *C. brevirostris æneo-niger elevato-punctatus, elytris postice biverrucosis. Mus. Lud. Utr. 60. \**

*Habitat ad Cap b. spei. Tulbagh.*

*Hic cum precedente gerit rostrum minus breve, sed crassius respectu longitudinis, unde ad hanc sectionem ambo spectant. Thorax punctis adpersus eminentibus, obtusissimis. Elytra striis 3 elevatis & punctis majoribus oblongis, quibus utrinque adjacet ordo punctorum minutissimorum; cæterum color elytrorum niger est, sed obsolete ex æneo resplendens.*

**cornutus.** 91. *C. brevirostris cinereus, thorace elytrisque subspinosus, capite cornuto. Mus. Lud. Utr. 57. \**

*Habitat in Indiis.*

*Caput angulo utrinque supra antennis & alio utrinque supra basin; elytra quasi echinata punctis cum fasciculo pilorum adjecto.*

**16-punctatus.** 92. *C. brevirostris cærulescens, thorace punctis nigris quatuor, coleoptris duodecim. Mus. Lud. Utr. 58. \**

*Habitat in Indiis.*

*Magnitudo Crabronis. Caput sulco notatum. Abdomen etiam subtus una alterave macula nigra.*

**granulatus.** 93. *C. brevirostris viridis striatus punctis nigris elevatis. Mus. Lud. Utr. 61. \**

*Habitat in Indiis.*

*Magnitudo Scar. stercorarii.*

**abbreviatus.** 94. *C. brevirostris subfuscus, elytris griseis: striis atris glabris elevatis abbreviatis. Mus. Lud. Utr. 62. \**

*Gron. zooph. 597. \**

*Habitat in Martinica.*

*Ely-*



*Elytra griseo vellere quasi obducta præter strias & margines.*

apterus. 95. *C. brevirostris*, pedibus muticis, corpore atro, thorace spinoso, elytris coadunatis, abdomine punctato. *Habitat in India. De Geer.*

*Maximus. Thorax punctatus cruce quasi innatus. Abdomen subtus trifariam rubra punctatum. Corpus nigrum.*

203. ATTELABUS. *Caput* postice attenuatum, inclinatum.

*Antennæ* apicem versus crassiores.

Coryli. 1. *A. niger*, elytris rubris. *Fann. suec. 638. \* Amm. acad. 5. t. 3. f. 171.*

*Scop. carn. 71. Curculio collaris.*

*It. æl. 153. Curculio niger, elytris rubris, capite postice elongato.*

*Sultz. inf. t. 4. f. 25. f. 1.*

*Geoffr. paris. 1. p. 273. Rinomacer 11.*

*Habitat in foliis Coryli, quæ in cylindrum convolvit & utrinque claudit.*

Avellana. 2. *A. niger*, elytris thorace pedibusque rubris.

*Habitat in Corylis Germaniæ. D. Schreber.*

*Similis A. Coryli, sed Thorax & Pedes exceptis genibus nigra.*

curculionoides. 3. *A. niger*, thorace elytrisque rubris.

*Scop. carn. 72. Curculio nitens.*

*Habitat in Corylis Germaniæ. D. Schreber.*

*Similis A. Coryli, sed minor.*

forinensis. 4. *A. elytris apice bidentatis.*

*Habitat Surinami. Rolander.*

*Similis A. pensylvanico, minor A. coryli. Caput & Thorax nigra. Antennæ albo fuscoque annulatæ. Pedes ferruginei: Femora annulo bascos albo. Elytra fusca, striata, apice bidentata.*

R r 4

5. A.

*Genus Attelabi etiamnam inter obscura est, nec aptius reperi.*

- pennsylvanicus. 5. *A. niger*, elytris rubris: fascia media apicisque nigra.  
*Habitat in Philadelphia. Kalm.*  
*Statura praeceantis omnino, sed alius & minor. Caput depressum, nigrum, postice elongatum, maxillae rufae. Antennae filiformes, obtusae, basi flavescentes. Thorax oblongus, niger, glaber. Elytra rufa, fascia in medio nigra & alia ad apicem. Pedes rufi.*
- melanurus. 6. *A. niger*, elytris testaceis apice nigris.  
*Habitat Upsaliae. C. G. Kakeritz.*  
*Similis A. pennsylvanico, sed major. Nigra sunt Caput, Thorax, Abdomen, Antennae, Genua, Elytrorumque apices. Testacea basis antennarum, basis abdominis, Pedes, Elytra.*
- Betulae. 7. *A. pedibus saltatoriis, corpore toto atro. Faun. Suec. 640. \**  
*Habitat in Betulae foliis, quae pulchre crispa rodendo reddit. Ralander.*
- formicarius. 8. *A. niger*, elytris fascia duplici alba basique rubris. *Fa. Suec. 641. Scop. carn. III.*  
*Forst. inf. - - t. 15.*  
*List. nat. t. 31. f. 1.*  
*Sultz. inf. t. 4. f. a.*  
*Raj. inf. 103. n. 29.*  
*Habitat in Europa, devastans Dermest. pertinacem.*
- sipylus. 9. *A. viridis*, elytris fascia duplici flava interrupta, thorace hirsuto. *Mus. Lud. Utr. 63. \**  
*Habitat in Sipylo. Hasselqvist.*  
*Statura & magnitudo A. formicarii.*
- apiarius. 10. *A. caerulescens*, elytris rubris, fasciis tribus nigris.  
*Svamm. bibl. - - t. 26. f. 3.*  
*Reaum. inf. 6. t. 8. f. 10.*  
*Sultz. inf. t. 4. f. b.*  
*Geoffr. parisi. 1. p. 304. t. 5. f. 4. Clerus 1.*  
*Schaff. elem. t. 46.*  
*Habitat in Germania. P. Forskühl.*  
*Facies A. formicarii, sed duplo major. Corpus totum atro-caeruleum, sed Caput & Thorax pilis nigris pubescentia. Pectus & Abdomen nitidius caeruleum, ut & Femora postica, quae longiora. Elytra rubra, fasciis tribus margine repandis atris; quarum prima*

*prima vix marginem lateralem attingit; postrema in ipso apice elytri, carulescens. Antennæ nigrae, clavatae.*

- mollis. 11. *A. griseus pubescens, elytris fasciis tribus pallidis. Fn. succ. 642.*  
*Uddm. diff. 28. t. 1. f. 9. Curculio oblongus ruber, elytris nigris, fascia triplici albicante.*  
*Habitat in Europa.*  
*Elytra fasciis tribus: α ad basim; β in medio; γ in apice. Abdomen rubrum. Antennæ testaceae. Femora basi alba.*
- Ceram- 12. *A. ater, elytris rugosis. Fn. succ. 643. \**  
 boides. *Uddm. diff. 26. t. 1. f. 1. Curculio maximus ater oblongus, elytris irregulariter reticulatis.*  
*Habitat in Boletio fomentario.*
- Bupre- 13. *A. ater, elytris nervosis, thorace subgloboso. Fn.*  
 stoides. *succ. 644. \**  
*Faun. succ. 1. n. 554. Buprestis ater.*  
*Frisch. inf. 13. p. 23. t. 19. Scarabæus arboreus collo crasso.*  
*Habitat in Europa.*

#### 204. CERAMBYX. *Antennæ attenuatae.*

*Thorax spinosus aut gibbus.*

*Elytra linearia.*

\* *Thorace spinis lateralibus mobilibus.*

- longima- 1. *C. thorace spinis mobilibus, elytris basi unidentatis apiceque bidentatis, antennis longis. Mus. Lud. Ulr. nus. 64. \* Gron. zooph. 522. \**  
*Sloan. jam. 2. p. 209. Scarabæus Capricornus maximus nigricans, fasciis elytrorum coccineis & flavis.*  
*Merian. Jurin. t. 28.*  
*Grew. mus. 163. t. 13. Nococonaca.*  
*Vincent. mus. t. 1. fig. infim. media.*  
*Raf. inf. 2. scar. 2. p. 11. t. 1. f. a.*  
*Habitat in America.*  
*In altero sexu tibiæ anticae longissimae, ut in Scar. longimana.*

*trochlearis*. 2. *C. thorace spinis mobilibus, elytris fusco canoque variis: punctis elevatis.*

*Habitat in India. De Geer.*

\* \* *Thorace marginato dentibus lateralibus.*

*cervicornis*. 3. *C. thorace marginato dentato; maxillis porrectis corniformibus utrinque spinosis, antennis brevibus. Musf.*

*Lud. Ulr. 65. Gron. zooph. 523. \**

*Sloan. jam. 2. t. 237. f. 6.*

*Merian. jurin. t. 48.*

*Pet. gaz. t. 44. f. 8?*

*Raf. inf. 2. scar. 2. p. 12. t. 1. f. B.*

*Brown. jam. 429. t. 44. f. 8.*

*Habitat in America ligno Bombacis Larva, qua exempta edulis in deliciis.*

*Antennae corpore breviores. Thoracis dentes 3 validi.*

*Elytra lineata.*

*armillatus*. 4. *C. thorace marginato utrinque quadridentato, elytris ferrugineis nigro marginatis, femoribus pollicis unidentatis. Gron. zooph. 525. t. 15. f. 6.*

*Habitat in India.*

*Maximus. Antennae mediocres. Tibiae posticae armillata rubra.*

*imbricatus*. 5. *C. thorace marginato bidentato, corpore ferrugineo, elytris mucronatis, antennis perfoliato imbricatis brevioribus.*

*Gron. musf. 529.*

*Raf. inf. scar. 2. t. 1. f. 1.*

*Habitat in Carolina. D. Garden.*

*Statura C. coriarii. Antennae subtus imbricatae 17 laminais ovato-oblongis. An mas coriarii in indiis?*

*Faber*. 6. *C. thorace marginato utrinque unidentato rugoso, elytris piceis, antennis mediocribus. Fn. suec. 646. \**

*Habitat in Europa.*

*coriarius*. 7. *C. thorace marginato tridentato, corpore piceo, elytris mucronatis, antennis brevioribus. Faun. suec. 647. \**

*Scop. carn. 161. Gron. zooph. 528.*

*Fa. suec. 480. Cerambyx niger, thorace planiusculo: margine utrinque tridentato, coleopteris piceis.*

*Raf. inf. 2. scar. 2. t. 1. f. 1, 2.*

*Schaff.*

*Schæff. elem.* 1. 103.

*Gadd sat.* 79. *Cerambyx cinereo nigricans*, antennis & pedibus rufis.

*Frisch. inf.* 13. t. 9.

*Schultz. inf.* t. 4. f. 26.

*Geoffr. parif.* 198. t. 3. f. 5. *Prionus*.

*Habitat in Betulis putridis.*

melano- 8. *C. thorace marginato ferrulato*, corpore nigro, anten-  
pus. nis brevibus, elytris mucronatis.

*Gron. zooph.* 531.

*Merian. surin.* t. 24. f. 1.

*Habitat in Carolina.*

Corpus *C. coriario* duplo majus, nigrum. Maxillæ la-  
nares, validæ, interne dente instructæ. Caput nu-  
dum, retusum. Oculi fusci, punctis tecti. Thorax  
convexus, medio glaberrimus, lateribus dilatatus,  
scaber, ferrulatus, postice angulatus. Scutellum se-  
miovale. Elytra obsolete punctata, stria una altera-  
re elevata, latere exteriori marginata. Antennæ  
corpore  $\frac{1}{2}$  breviores, articulis XI, primo clavato re-  
curvo. Pedes nigri: palmis piceis.

thomæ. 9. *C. thorace marginato denticulato*, corpore nigro, ely-  
tris ferrugineis margine luteis.

*Habitat in insula s. Thomæ. L. Spengler.*

Corpus nigrum, pollices 2 longum, vix 1 latum. An-  
tennæ piceæ, compressæ, corpore breviores. Caput  
supra canaliculatum. Thorax scabriusculus, margi-  
nibus dilatatis, crenulatis, pollice spinosis; margo  
posticus testaceo-tomentosus. Elytra ferruginea, mar-  
gine exteriori lutea, nigredine marginem distinguen-  
te, apice vix spinosa. Pedes laeves, ferrugines.

cinnamo- 10. *C. thorace marginato denticulato*, corpore ferrugi-  
meus. neo, elytris mucronatis. *Mus. Lud. Ulr.* 66. \*

*Merian. sur.* t. 24. f. 1, 2.

*Habitat in America.*

Thoracis denticulus lateralis posticus validior. Elytra  
colore cort. cinnamomi.

festivus. 11. *C. thorace utrinque bidentato*, elytris bidentatis viri-  
dibus: linea laterali lutea.

*Gron. zooph.* 541. t. 16. f. 5. \*

*Habitat in America. Rolander.*

Tho-

Thorax macula dorsali nigra postice trifida. Pedes & Corpus totum subtus testacea. Antennæ nigrae, basi rubrae, vix corpore longiores. Elytra apice bidentata, viridia, stria duplici elevata; Linea longitudinalis lutea juxta marginem anteriorem.

- depfarius. 12. C. thorace marginato unidentato, corpore piceo, antennis rubris brevioribus.

*Habitat in Svecia.*

*Similis C. coriario, & pro hujus mare a nonnullis habetur, at differt Corpore ferrugineo, dimidio angustiore. Oculis subrotundis, nec reniformibus; Pedoris villo testaceo, nec pallido. Thorace supra subpubescente, nec laevi. Elytris longitudinaliter rugosis. Pedibus testaceo ferrugineis; nec fusco-piceis. Antennarum articulis simplicibus, nec turbinatis.*

- atratus. 13. C. thorace marginato utrinque bidentato, corpore atro, antennis mediocribus antrosum aculeato-terratis. *Gron. zooph. 524. t. 14. f. 9.*

*Habitat in Zeylona.*

- lineatus. 14. C. thorace marginato ferrulato dentato, elytris nigris linea alba, antennis compressis brevioribus.

*Sloan. jam. 2. p. 209. t. 237. f. 34.*

*Brown. jam. 430. t. 43. f. 7.*

*Habitat in Jamaica.*

- spinibarbis. 15. C. thorace marginato subcrenulato, capite submaxillis spinoso scabro, antennis brevibus. *Mus. Lud. Ulr. 67. \**

*Merian. surin. 24. t. 24.*

*Habitat in America.*

*Corpus nigrum. Antennæ corpore breviores.*

- bifasciatus. 16. C. thorace marginato denticulato, corpore nigro, elytris rubris: fasciis duabus atris.

*Gron. zooph. 532. t. 14. f. 4. \**

*Habitat in America.*

*Antennæ breviores. Elytrorum fascia prior media; posterior terminalis.*

- planatus. 17. C. thorace marginato scabro antice dentato, corpore nigro, antennis pedibusque ferrugineis. *Fa. suec. 645. \**

*Habi-*

*Habitat in Europa.*

*Magnitudo Pediculi dupla. Antennæ mediocres.*

\* \* \* *Thorace rotundato, spinis fixis lateralibus mucronato.*

- barbicornis. 18. *C. thorace spinoso, antennarum quatuor primis articulis nigro-barbatis, corpore testaceo nigro variegato, Mus. Lud. Utr. 68.*  
*Habitat in Asia. Filius.*

- ammiralis. 19. *C. thorace subspinoso, antennarum quarto articulo barbato, secundo spinoso.*

*Habitat Surinami, figuram mist D. P. Ammiral.*

*Corpus nigrum. Antennæ nigrae, longitudine corporis: articulus 2 apice aculeo recurvato, 4 barbatus pilis nigris pallidisque. Thoracis latera rufa. Elytra basi rufa; medio fascia lata alba.*

- Batus. 20. *C. thorace spinoso rugoso, elytris bidentatis, antennis longis uncinato-aculeatis. Mus. L. U. 69.*

*Mus. petrop. 652. n. 154. Capricornus niger cornutus.*

*Habitat in Indiis.*

*Antennæ articulis 1-5 subtus aculeo recurvo armatis.*

- Rubus. 21. *C. thorace spinoso, antennis subtus hispidis longis, elytris bidentatis basi mucronatis albo bimaculatis.*

*Habitat in India. De Geer.*

*Corpus magnitudinis C. Sutoris, fuscum. Latera ab oculis per thoracem & hypochondria alba. Antennæ corpore longiores, subtus scabrae. Tibiæ antice subscabrae. Labium oris mystaceis setis 4. Thorax utrinque mucronatus, dorso maculis 2, arenatis, albis, conniventibus. Elytra laevia, basi exasperata punctis elevatis; angulus elytrorum mucronatus; apex vero truncatus mucronibus 2 distantibus; macula elytrorum 2 alba: posteriore minore. Scutellum niveum.*

- araneiformis. 22. *C. thorace spinoso, antennis longis: articulo quinto barbato, elytris porosis.*

*Habitat in America. Brunniche.*

*Corpus duplo majus C. edili, griseum. Thorax duplici serie tuberculis muricatus, circulo fusco notatus. Elytra fastigiata, undique porosa, ad latera*

*pub.*

punctis clavatis scabra, postice tomentoso-fulva. Antennarum articulus 5 cirro s. fasciculo plurium pilorum. Femora clavata. Tibiæ plantæque anticorum hirsutissimæ: tibiæ antica intus; intermediae extus subdentatæ. Elytra macula laterali fusca & extremitatibus fuscescentibus.

Sentis. 23. *C. thorace spinoso lævi, elytris fastigiatis biguttatis, antennis subtus aculeatis longioribus.*

*Habitat in India.*

Antennæ corpore sesquilingiores. Corpus griseum. Elytra antice punctis elevatis subscabra: Macule duæ albæ parvæ longitudinales. Linea alba ab antennis per latera thoracis & abdominis versus anum ducta.

farinosus. 24. *C. thorace spinoso niger, elytris punctis albis sparsis farinosis.*

*Merian. surin. t. 24. f. infima.*

*Habitat in America. De Geer.*

ferrugineus. 25. *C. thorace spinoso rugoso, elytris fastigiatis subferrugineis, antennis longis. M. L. U. 70. \**

*Habitat in India.*

depressus. 26. *C. thorace quadrispinoso, dorso depresso, elytris fastigiatis nebulosis: antice punctis elevatis sparsis, antennis longis.*

*Schreb. inf. 8. f. 10. Cerambyx lepturoides thorace mucronato, elytris apice emarginatis, punctis elevatis scabris.*

*Habitat in India. De Geer. Coromandel.*

4-maculatus. 27. *C. thorace supra spinoso rufescens, elytris bidentatis maculis duorum parium glabris. Gron. zooph. 542. \**

*Sloan. jam. 2. t. 237. f. 21.*

*Habitat in America.*

Antennæ mediocres. Thorax subcylindricus, scaber, in summitate spinis 2 elevatis. Elytra bidentata dente exteriori majore; macule s. lineæ geminae, convexæ, nitidæ, flavescentes; & gemina in medio, prioribus longiores; omnes macule terminatæ atra macula.

glaucus. 28. *C. thorace quinquespinoso glaucus, elytris muricatis latere fasciaque nigris, antennis longioribus.*

*Habitat in America. Rolander,*

In-



*Insectum supra albidoglaucum, subtus fuscum. Thorax supra spinis 4 & quinto medio posterius. Elytra truncata, unidentata, antice echinato-muricata, lateribus nigra cum lineola, postice quasi fascia elytra secante. Antennæ corpore vix duplo longiores.*

- nebulosus. 29. C. thorace spinoso, elytris fastigiatis punctis fasciisque nigris, antennis longioribus. *Fn. suec. 650. \* Scop. carn. 173. It. goth. 273.*

*Sultz. inf. t. 4. f. c.*

*Habitat in Abietum truncis.*

- hispidus. 30. C. thorace spinoso, elytris subpræmorsis, punctisque tribus hispidis, antennis hirtis longioribus. *Fn. suec. 651. \**

*Fn. suec. 1. n. 484. t. 1. Cerambyx cinereus, elytris præmorsis nigris fasciaque alba, antennis sesquilon-gioribus.*

*Raj. inf. 97. n. 4.*

*Frisch. inf. 13. p. 22. t. 16.*

*Geoffr. parif. 1. p. 206. n. 9.*

*Habitat in Europa.*

- desertus. 31. C. thorace spinoso albo-lineato, elytris bidentatis albo fasciatis, antennis longioribus. *M. L. U. 71. \**

*Habitat in America.*

*Thorax lineis 5 albis, quarum laterales sub thoracis mar-gine sunt.*

- faccin-  
osus. 32. C. thorace bispinoso rugoso, elytris fastigiatis fascia fla-  
va, antennis longioribus compressis. *M. L. U. 72. \**

*Gron. zooph. 535.*

*Marcgr. bras. 254. Quici.*

*Habitat in America: Surinami, Brasilia.*

*Corpus fuscum. Antennæ nigre articulis basi sangui-neis. Pedes rufi: geniculis nigris.*

- virens. 33. C. thorace spinoso, elytris obtusis, corpore viridi, anten-  
nis longioribus, femoribus unidentatis. *M. L. U. 71. \**

*Sloan. jam. 2. . . t. 237. f. 39. 40.*

*Brown. jam. 439. t. 43. f. 8.*

*Habitat in India.*

- moscha-  
tus. 34. C. thorace spinoso, elytris obtusis viridibus nitentibus,  
femoribus muticis, antennis mediocribus. *Fn. suec. 652. \* Scop. carn. 165.*

*Fn. suec.* 1. n. 478. *Cerambyx viridi cærulefcens*, antennis corpus subæquantibus.

*Mouff. inf.* 133. f. *ultima*.

*Raj. inf.* 31. n. 17.

*List. loqn.* 384. n. 11. *Scarabæus suaviter olens*.

*Frisch. inf.* 13. t. 11.

*Ammiral. inf.* t. 33.

*Sultz. inf.* t. 4. f. e.

*Geoffr. parif.* 203. n. 5.

*Habitat in Europa.*

**alpinus.** 35. *C. thorace spinoso*, coleoptris obtusis fascia maculisque quatuor atris, antennis longis. *Fn. suec.* 654.  
*Scop. carn.* 166.

*It. scan.* 260. *Cerambyx subcærulefcens*, fascia maculisque 4 nigris.

*Fonst. inf.* t. 15. f. 3.

*Schenck. itin.* 1. t. 1. f. 5.

*Mouff. inf.* 150. f. 2.

*Rob. ic.* 8.

*Sultz. inf.* t. 4. f. d.

*Poda. inf.* 32. n. 3. *Cerambyx pilosus*.

*Geoffr. parif.* 202. t. 3. f. 6. *Cerambyx* 4.

*Habitat in Helvetia, Sveciæ rarior.*

**capensis.** 36. *C. thorace spinoso niger*, elytris fasciis quatuor rufis, antennis mediocribus. *M. L. U.* 74. \*  
*Habitat ad Cap. b. spei. D. Tulbagh.*

**ædilis.** 37. *C. thorace spinoso*: punctis quatuor luteis, elytris obtusis nebulosis, antennis longissimis. *Fn. suec.* 653. \*  
*It. æl.* 8. *Cerambyx nebulosus*, antennis corpore longioribus, thoracis punctis quatuor luteis.

*Pet. gaz.* t. 8. f. 8. *Capricornus ruficollis*.

*Mouff. inf.* 151. f. 2. *Frisch. inf.* 13. t. 12.

*Sultz. inf.* t. 4. f. 27.

*Habitat in truncis arborum Europæ.*

**lutor.** 38. *C. thorace spinoso*, elytris obtusis atris subnebulosis, scutello luteo, antennis longissimis. *Fn. suec.* 655. \*  
*Scop. carn.* 162.

*Fn. suec.* 1. n. 482. *Cerambyx ater*, elytris punctatis maculis pallidis sparsis, antennis corpore longioribus; thorace spinoso.

*Gadd*

---

*Cerambycis Larvæ Ligna rodunt, perforant, penetrant.*

*Gadd. diff.* 27. *Cerambyx nigro nebulosus*, scutello pallido, elytris fusco æneis.

*Habitat in Europa.*

*Nigricans elytris fasciis obsoletis 2, albidis.*

- cerdo. 39. *C. thorace spinoso rugoso nudo, corpore nigro, antennis longis; articulis quatuor primis clavatis.*

*Mouff. inf.* 149. f. 2.

*Frisch. inf.* 13. t. 8.

*Scop. carn.* 163. Heros.

*Habitat in Italia. M. Kähler; in Germania. Forskåhl*

*Statura præcedentis; Corpus & artus nigra. Elytra fuscigata, apice pallidiora s. picea. Antennæ corpore longiores: articulis 4 primis brevioribus clavatis s. apice rotundatis; reliquis compressis. Minor (an Mas) antennis mediocribus, elytris pæssice non piceis, qui Scop. carn. 162; non videtur Specie diversa.*

- aurico-  
mms. 40. *C. thorace quadrispinoso ater, elytris tæniis geminis aureis, pedibus pollicis latissimis compressis. Gron. zooph.* 534. t. 16. f. 1. \*

*Habitat in America meridionali.*

*Antennæ corpore paulo longiores.*

- textor. 41. *C. thorace spinoso, elytris obtusis convexis atris punctatis, antennis mediocribus. Fn. swec.* 656. \*

*Scop. carn.* 164.

*Uddm. diff. n.* 29. *Cerambyx sordide niger, punctis elevatis sparsis, antennis crassis corporis longitudinem subæquantibus.*

*Habitat in Europa.*

- tristis. 42. *C. thorace spinoso niger, elytris fuscis maculis duabus atris, antennis mediocribus.*

*Habitat Monspelii in ligno Cupressi. D. Gouan.*

*Corpus statura C. textoris. Antennæ atra. Thorax supra fuscescens. Elytrorum macula altera anterior, altera posterior.*

- fuligina-  
tor. 43. *C. thorace subspinoso niger, elytris cinerascens, antennis brevioribus.*

*Habitat in Germania. P. Forskåhl.*

S f

Minor

*Cerambyceum Larvæ perforant ligna, extrahuntur a Picis.*

- Minor Ape; totus ater. Antennæ vix corporis longitudine. Thorax rotundatus, parce spinosus. Elytra minus acuta, rore cinereo sordide inquinata.*
- coquus. 44. *C. thorace subspinoso hirsuto, elytris obtusis sulcatis atris antice ferrugineis, antennis mediocribus. Habitat in Canada. Kalm. Spina thoracis villosi potius digitis quam oculis observantur.*
- cursor. 45. *C. thorace spinoso, elytris obtusis rufis margine lineaque nigris, antennis mediocribus. Faun. suec. 658. \* Scop. carn. 167. Fn. suec. 1. n. 481. Cerambyx rufus, coleopterorum lineis tribus nigris longitudinalibus. Habitat in Europa.*
- lamed. 46. *C. thorace spinoso pubescente, elytris fastigiatis lividis: tænia obscura longitudinali sinuata, antennis brevioribus. Fn. suec. 649. \* Faun. suec. 1. n. 498. Leptura nigra, elytris nigricante lividoque variis. Geoffr. parif. 1. p. 226. Stenocorus 6. Habitat in Europa.*
- meridiana. 47. *C. thorace subspinoso, elytris subfastigiatis fuscis antice testaceis, pectore nitente. Fn. suec. 648. \* Syst. nat. 10. p. 398. n. 7. Leptura meridiana. Habitat in Europa. Femina tota nigricans.*
- noctis. 48. *C. thorace spinoso totus niger, antennarum basi ferruginea. Habitat in Europa. Thunberg. Simillimus C. Cursori excepto colore & quod ipsa basis, cui insident Antennæ, ferruginea sit.*
- inquisitor. 49. *C. thorace spinoso, elytris nebulosis fusco subfasciatis, antennis brevioribus. Fn. suec. 659. \* Faun. suec. 1. n. 485. Cerambyx cinereus nigro nebulosus, antennis corpore dimidio brevioribus, thorace spinoso. Frisch. inf. 13. t. 14. Geoffr. parif. 223. Stenocorus 2.*

B. Faun.

- β. *Fann. suec.* 1. n. 486. *Cerambyx cinereus*, coleoptris fasciis duabus flavis, antennis corpore dimidio brevioribus, thorace spinoso.

*Geoffr. paris.* 222. *Stenocorus* 1.

*Schaff. elem.* t. 118. f. 1.

*Habitat in Europa.*

- izhleri. 50. *C. thorace spinoso niger, thorace elytrisque sanguineis; macula magna nigra, antennis mediocribus.*

*Schaff. ic.* t. 1. f. 1.

*Habitat in Italia. M. Kabler.*

*Magnitudo media. Corpus & artus nigra. Thorax sanguineus macula in tergo magna, rotundata, nigra.*

*Elytra sanguinea: macula magna, ovali, nigra, utroque elytro communis, a medio ad apices fere extensa.*

*Femora apice emarginata, acuta. Antennæ vix corporis longitudine.*

*Variat. Thorace nigro, Elytris immaculatis. Geoffr.*

- pedestris. 51. *C. thorace spinoso apterus niger, elytris tomentosis atris: sutura alba, antennis mediocribus.*

*Scop. carn.* 168. *Cerambyx arenarius.*

*Gron. zooph.* 540. \*

*Pod. inf.* 34. n. 9. *Cerambyx pedestris.*

*Habitat in Hispania D. Z. Hallman; in Gallia German, tarde incedens, larvis & formicis infestus.*

*Linea alba ab apice capitis per suturas elytrorum ad anum excurrens & margo elytrorum exterior albus.*

*Alæ nullæ.*

\*\*\*\* *Thorace inermi subcylindrico.*

- carchari- 52. *C. thorace mutico cylindrico, corpore griseo nigro punctato, antennis mediocribus. Fn. suec.* 660.

*Gæd. inf.* 2. t. 51.

*Pet. gaz.* t. 2. f. 1.

*List. gæd.* f. 106.

*Geoffr. paris.* 208. *Leptura* 1.

*Habitat in Europa.*

- juvencus. 53. *C. thorace mutico cylindrico rugoso, elytris lævibus ferrugineis lanuginoso-caneiscentibus mucronatis, antennis longioribus. Brunnich.*

S f 2

Habi-

*Antennæ Breves, quæ corpore brevior; Mediocræ quæ longitudine corporis; Longæ quæ corpore longiores sunt, nobis dicuntur.*

*Habitat in America.*

Corpus ferrugineum magnitudine *C. carchariae*. Caput & Thorax magis fusca. Elytra vestita, non tecta, lanugine canescente; apice truncata sutura prominente dentiformi; hinc clausis elytris dens apparet unicus ad apicem sutura.

furina-  
mus,

54. *C. thorace mutico subcylindrico, corpore subferrugineo, elytris litura una alterave fusca, antennis mediocribus.*

*Habitat Surinami.*

Corpus mediae magnitudinis. Elytra adpersa lituris 1 f. 2 irregularibus, terminata spina acutissima. Antennae apice sesquilongiores.

fcalaris.

55. *C. thorace mutico subcylindrico, coleoptris linea suturali dentata punctisque flavis, antennis mediocribus.*

*Fr. suec. 697. \* Scop. carn. 175.*

*Frisch. inf. 12. t. 3. f. 3.*

*Habitat in Europa.*

*Cerambycis generi proprius quam Leptura accedit, ob thoracem non ovatum.*

Cardui.

56. *C. thorace mutico cylindrico, corpore fusco linea longitudinali flavicante, antennis longioribus.*

*Habitat in Carduis Europa australioris, quos mense maio devastat. D. Gouan.*

Corpus fuscum, statura *C. populnei*. Linea flavicans a capite per thoracem & suturam elytrorum. Thorax etiam lineis lateralibus flavis. Antennae corpore sesquilongiores articulis basi pallidis.

populne-  
us.

57. *C. thorace mutico cylindrico flavo-lineato, elytris punctis quatuor flavis, antennis mediocribus.*

*Fann. suec. 661. \**

*Gadd. sat. 79. Cerambyx fusco-cinereus, antennis nigro alboque variegatis, elytrorum punctis octo luteis.*

*Habitat in Europa.*

linearis.

58. *C. thorace mutico cylindrico niger, pedibus omnibus totis luteis, antennis mediocribus.*

*Fann. suec. 663. \**

*Scop. carn. 153. Leptura parallela.*

*Habitat in Europa.*

*Abdominis dorsum supra testaceum est versus basin.*

59. *C.*

- cylindri- 59. *C. thorace mutico cylindrico linea albida, elytris fasti-*  
cus. *gatis nigris, pedibus anticis pallidis. Faun. suec.*  
662. \*  
*Scop. carn. 157. Leptura cylindrica.*  
*Röf. inf. 2. scar. 2. z. 3.*  
*Habitat in Pyri Prunique ramis.*  
*Antenna vix corpore longiores.*
- oculatus. 60. *C. thorace mutico cylindrico luteo: punctis duobus*  
*nigris, elytris fastigiatis linearibus nigris. Fa. suec.*  
664. \*  
*Uddm. diff. 31. Cerambyx ferrugineo-rufus, elytris*  
*nigro-cinereis punctis excavatis nigris.*  
*Scop. carn. 152. Leptura oculata.*  
*Habitat in Europa.*  
*Antennae mediocres.*
- ramphy- 61. *C. thorace mutico subcylindrico bipunctato, corpore*  
geus. *livido, elytris maculis duabus flavis apice bidentatis.*  
*Brunnich.*  
*Habitat in America.*  
*Magnitudo C. festivi. Caput Thorax Elytraque livi-*  
*da. Thorax punctis binis, paribus, nigris, elevatis.*  
*Antennae mediocres & Pedes ferruginei. Oculi ni-*  
*gri. Elytra maculis duabus flavis, oblongis, quasi*  
*ex duabus connatis, harum una ad basin minor; al-*  
*tera in medio; apex elytri truncatus, bidentatus:*  
*interiore minore.*
- irroratus. 62. *C. thorace mutico cylindrico inaequali, elytris apice*  
*bidentatis albo irroratis, antennis longioribus aculea-*  
*tis. Brunnich.*  
*Habitat in America. e Museo Rydbergii.*  
*Corpus ferrugineum magnitudine C. inquisitoris. Ca-*  
*put, Thorax, Elytraque nigra, albedine varie irro-*  
*rata, punctis excavatis aspersa. Elytrorum apex*  
*bidentatus. Antennarum articuli inferiores, non in-*  
*fimus, subtus aculeo armati.*
- zonarius. 63. *C. thorace mutico cylindrico rugoso, antennis lon-*  
*gioribus, elytris obtusis fuscis; fascia lineari albida.*  
*Mus. Lud. Ulr. 75. \**  
*Marogr. bras. 254. Quici.*  
*Habitat in America.*

\* \* \* \* \* *Thorace inermi subrotunda f. ex globoso depresso.*

curculio- 64. *C. thorace mutico ocellis quatuor nigris, elytris o-*  
noides. cello sesquialtero, antennis longis.

*Habitat in Germania, Calmariae Suecorum. Modeer.*

*Statura C. tristis, cinereus striis flavis undulatis sparsis. Ocelli nigri iride ferrugineo, in thorace 4 f. utrinque 2, in Elytris unicus, cum rudimento alterius in anteriore parte.*

ferraticor- 65. *C. thorace mutico subovali, corpore lurido fusco,*  
nis. antennis compressis antice serratis mediocribus. *Fn. suec. 665. \**

*Habitat in Europa.*

hispicor- 66. *C. thorace mutico subrotundo, corpore subfusco, e-*  
nis. lytris fastigiatis bidentatis, antennis mediocribus postice dentatis.

*Habitat in America.*

*Similis C. rustico, sed duplo major. Antennarum articuli apice postico spina minutissima. Corpus testaceo fuscum.*

rusticus. 67. *C. thorace mutico subrotundo nudo, corpore lurido,*  
antennis subulatis brevioribus. *Fn. suec. 666. \**

*Fann. suec. 492. Cerambyx fuscus, punctis thoracinis impressis.*

*Sulz. inf. t. 4. f. 9.*

*Schæff. elem. t. 76. f. 1.*

*Habitat in Europa.*

luridus. 68. *C. thorace mutico subrotundo, corpore nigro, ely-*  
tris luridis.

*Habitat in Europa.*

*Simillimus C. Baiulo, sed triplo minor, immaculatus.*

*Elytra lurida seu minus nigra, quam reliquum corpus. Thorax subtus nulla linea rubra.*

femora- 69. *C. thorace mutico subrotundo, corpore atro, femo-*  
tus. ribus rubris, antennis mediocribus.

*Habitat in Germania.*

*Sequenti dimidio minor, angustior; sola femora rubra.*

*Antenna vix corporis longitudine.*

70. *C.*



- violaceus*. 70. *C. thorace mutico subrotundo pubescente, corpore violaceo, antennis mediocribus.* *Fann. suec.* 667. \*
- Fann. suec.* 1. n. 495. *Cerambyx violaceus nitens, antennis nigris, femoribus clavatis.*
- Gadd diff.* 28. *Cantharis nigra, thorace rotundato, elytris cærulefcentibus.*
- Frisch. inf.* 12. t. 3. ic. 6. f. 1.
- Habitat in Europa.*
- auratus*. 71. *C. thorace dente laterali depresso viridi-inauratus, antennis nigris, femoribus posticis cæruleis.*
- Habitat in America. Rolander.*
- Similis C. violaceo. Caput & Thorax viridi-aurata. Dens thoracis utrinque postice a basi sinu excavatus. Elytra rubro-viridi-aurata. Antennæ nigrae, vix corpore longiores. Abdomen & totum corpus subtus viridi-aeneum. Pedes purpurei: Femora postica cærulea.*
- stigma*. 72. *C. thorace submutico subrotundo excavato-punctato, corpore atro, elytris lævibus: stigmate albo.*
- Habitat in America. Rolander.*
- Totus niger. Thorax hemisphaericus, submarginatus, punctis numerosis excavatus, postice ad angulum lateralem vix dentibus duobus utrinque excavatus. Scutellum leve, longius quam in reliquis. Elytra lævia, nigra, singula pone scutellum lineola extrorsum obliqua alba.*
- striatus*. 73. *C. thorace mutico subrotundo, corpore nigro, elytris striatis, antennis brevibus.* *Fn. suec.* 668. \*
- Habitat in Europa.*
- variabilis*. 74. *C. thorace mutico subrotundo inæquali glabro, petore anoque ferrugineo, antennis mediocribus.* *Fn. suec.* 669. \*
- Frisch. inf.* 12. p. 345. t. 6. f. 3, 4.
- Habitat in Europa.*
- testaceus*. 75. *C. thorace mutico subrotundo glabro, corpore testaceo, antennis mediocribus.* *Fn. suec.* 670. \*
- Geoffr. paris.* 218. *Leptura* 18.
- Habitat in Europa.*

- bajulus.** 76. *C. thorace mutico subrotundo villosa tuberculis duobus, antennis brevibus.* *Mus. Lud. Ultr.* 76. \* *Fn. succ.* 672. \*
- Faun. succ.* 1. n. 489. *Cerambyx nigricans*, thorace villosa cinereo, punctis duobus glabris.
- Scop. carn.* 156. *Leptura bajula.*
- Schaff. elem.* 1. 76. f. 4.
- Frisch. inf.* 13. t. 10.
- β. *Fn. succ.* 1. n. 490. *Cerambyx testaceus*, thorace villosa cinereo lineolis duobus glabris.
- Habitat in Europa; in America septentrionali.* *Kalm.*
- Perforat Ligna, parietes, afferes e Pino desumpta.*
- fennicus.** 77. *C. thorace mutico subrotundo tuberculis subferrugineo-obsoletis, elytris violaceis, antennis longiusculis.*
- Fn. succ.* 674. \*
- Uddm. diff.* 33. *Cerambyx elytris nigro cæruleis, apice abdominis ferrugineo.*
- Habitat in Europa.*
- licatus.** 78. *C. thorace mutico subrotundo niger cinereo-nebulosus, antennis brevibus.*
- Habitat in Europa: in Suecia.* *Thunberg.*
- Corpus magnitudine fere C. Bajuli, nigricans, cinereo nebulosus, sed Thorax magis rotundatus lineolis 2, subgriseis. Elytra strigis 2, undulatis, cinerascens, obsoletis. Femora postica longitudine abdominis.*
- undatus.** 79. *C. thorace mutico subrotundo tuberculato, elytris fasciis duabus undulatis, antennis submediocribus.* *Fn. succ.* 675. \*
- Habitat in Europa.*
- sanguineus.** 80. *C. thorace mutico subrotundo, elytrisque sanguineis, corpore nigro, antennis mediocribus.* *Faun. succ.* 673.
- Geoffr. parisi.* 226. n. 21.
- Habitat Upsaliæ in parietibus.* *Isac. Uddman.*
- castaneus.** 81. *C. thorace mutico subrotundo, corporeque nigro, elytris antennis pedibusque ferrugineis, antennis brevioribus.* *Fn. succ.* 676.
- Habitat in Europa.*
- Latere inferiora thoracis linea rubra longitudinali.*

canthari- 82. C. thorace submutico, corpore rufo, oculis femori-  
nos. busque nigricantibus, elytris mollibus, antennis lon-  
gioribus.

*Habitat in Germania. D. Schreber.*

*Corpus totum rufo-ferrugineum. Antennæ pallidiores.*

ebulinus. 83. C. thorace mutico, corpore nigro, elytris viridi-ce-  
ruleis, antennis mediocribus.

*Habitat in Gallia. D. Gouan.*

*Magnitudo præcedentis, minor castaneo. Antennæ fer-  
rugineæ articulo infimo nigro. Thorax utrinque  
mucrone obsolete.*

## 205. LEPTURA. *Antennæ setaceæ.*

*Elytra apicem versus attenuata.*

*Thorax teretiusculus.*

\* *Thorace ovato s. antrorsum oblongiusculo angustiore.  
Elytris apice truncatis.*

aquatica. 1. L. deaurata, antennis nigris, femoribus posticis denta-  
tis. *Fn. suec. 677. \* Scop. carn. 147.*

*Raj. inf. 100. n. 3. Cantharis arundines frequentans.  
Geoffr. parisi. 229. n. 12.*

β. Leptura subæneo-violacea, femoribus posticis dentatis.  
*Fn. suec. 510.*

*Habitat in plantis aquaticis, Nymphæis, Caricibus,  
Phellandrio, cujus radici adhæret pupa intra globum  
brunneum.*

melanura. 2. L. nigra, elytris rubescentibus lividisve sutura apice-  
que nigris. *Fn. suec. 678. \**

*Friseh. inf. 12. t. 3. ic. 6. f. 6. Scarabæus arboreus  
major violaceo-ruber.*

*Raj. inf. 499. Cerambyx niger, elytris flavis extre-  
mitatibus nigris.*

*Pet. gaz. t. 30. f. 5. Capricornus exiguus, vaginis  
rubentibus apice nigro.*

*Gadd. diff. 27. Leptura thorace nigro nitido, elytris  
obsolete fordideque flavescens.*

*Geoffr. parisi. 226. t. 4. f. 1. Stenocorus 7.*

*Habitat in Europa.*

*Mas Elytris apice nigris, Femina unicoloribus.*

- rubra. 3. *L. nigra*, thorace elytris tibiisque purpureis. *Fn. succ.* 500. *Scop. carn.* 148.  
*Frisch. inf. 12. t. 3. ic. 6. f. 6.* *Scarabæus arboreus*  
*major purpureo-ruber.*  
*Sultz. inf. 1. 5. f. 30.*  
*Habitat in Europa.*
- sanguino-4. *L. nigra*, elytris sanguineis. *Faun. succ.* 579. \* *Scop.*  
lenta. *carn.* 150.  
*Habitat in Europa.*
- testacea. 5. *L. nigra*, elytris testaceis, tibiis rufis, thorace postice rotundato. *Fn. succ.* 680. \*  
*Habitat in Europa.*
- revestita. 6. *L. testacea*, elytris pectore antennisque atris.  
*Habitat in Germania. D. D. Schreber.*  
*Statura L. sanguinolentæ s. testacæ. Caput, Thorax,*  
*Abdomen Pedesque ferruginea. Elytra glabra, atra,*  
*apice bidentata. Pectus atrum. Antennæ atræ, sed*  
*primo articulo testaceo. Thorax ad latera utrinque*  
*mucrone plane obsoleto & postico margine laterali*  
*acuto.*
- virens. 7. *L. viridi-flava*, antennis luteo viridique variis. *Faun.*  
*succ.* 682. \*  
*Habitat in Europa.*
- sericea. 8. *L. viridi-cærulea*, elytris subfastigiatis. *Faun. succ.*  
683. \*  
*Habitat in Europa.*
- 4-macu-9. *L. nigra*, elytris lividis: maculis quatuor nigris. *Fn.*  
lata. *succ.* 684. \*  
*Schæff. elem. 1. 118. f. 2.*  
*Habitat in Europa.*
- interroga-10. *L. nigra*, elytris lividis: fascia longitudinali arcuata  
tionis. maculisque quatuor nigris. *Fn. succ.* 685.  
*Uddm. diss. 35. t. 1. f. 2.* *Leptura nigra*, elytris fusco  
flavis: maculis octo nigris.  
*Habitat in Europa.*
- 6-macu-11. *L. nigra*, coleoptris testaceis: maculis sex nigris mar-  
lata. gine connexis. *Fn. succ.* 686. \*  
*Habitat in Europa.*

- 4-fasciata. 12. *L. nigra*, elytris testaceis, fasciis quatuor nigris. *Fn. suec.* 687. \*  
*Scop. carn.* 172. *Cerambyx fasciatus*.  
*Habitat in Europa.*  
*Feminam sequentis esse monet D. Scopoli.*
- attenuata. 13. *L. elytris fastigiatis attenuatis fulvis: fasciis quatuor nigris, pedibus testaceis.* *Fn. suec.* 688. \*  
*Habitat in Europa, an præcedentis mas?*  
*Femora postica apice nigra.*
- nigra. 14. *L. elytris fastigiatis, corpore nigro nitido, abdomine rufo.* *Fn. suec.* 689. \*  
*Habitat in Europa.*  
*Thorax utrinque postice mucronatus ut L. attenuata, melanura.*  
 \* \* *Thorace subgloboso, nec antice attenuato. Elytris apice obtusis, nec truncatis.*
- virginæ. 15. *L. thorace globoso nigro, elytris violaceis, abdomine rufo.* *Fn. suec.* 690. \*  
*Gadd. diff.* 26. *Leptura nigra, elytris cæruleiscentibus, toto abdomine rubro.*  
*Habitat in Europa.*
- collaris. 16. *L. thorace globoso abdomineque rubris, elytris nigris.* *Fn. suec.* 691. \* *Scop. carn.* 159.  
*Geoffr. parif.* 228. *Stenocorus* 11.  
*Habitat in Europa.*
- rustica. 17. *L. thorace globoso tomentoso, elytris cinereis: fasciis linearibus albidis undatis.* *Fn. suec.* 692. \*  
*Habitat in Europa.*
- mystica. 18. *L. thorace globoso tomentoso, elytris fusco-cinereis antice rufis: fasciis linearibus arcuatis lataque canis.* *Fn. suec.* 693. \*  
*Scop. carn.* 177. *Cerambyx quadricolor.*  
*Schæff. ic. t. 2. f. 9.*  
*Habitat in Europa.*
- Alni. 19. *L. nigra, elytris fasciis duabus albis, elytrorum basi antennæ tibiisque ferrugineis.*  
*Habitat in Europa. in Suecia. Max. v. Wurttemberg.*  
*Aff-*

*Affinis L. mystecæ, sed officis minor. Elytra basi ferruginea, medio fascia lineari arcuata alba, postice lineae albae oblique transversa.*

- detrita. 20. *L. thorace globoso nigricante, elytris fuscis: fasciis quatuor transversis flavis, pedibus rufis. Faun. suec. 694. \**

*Schæff. elem. t. 76. f. 2.*

*Habitat in Europa.*

*Antennæ ferrugineæ. Fascia thoracis lineola interrupta.*

- arcuata. 21. *L. thorace globoso nigra, elytris fasciis linearibus flavis: tribus retrorsum arcuatis, pedibus ferrugineis. Faun. suec. 696. \**

*Frisch. inf. 12. t. 3. ic. 4. f. 1. Scarabæus arboreus luteo pictus.*

*Raj. inf. 83. n. 23.*

*Uddm. diss. 30. Cerambyx nigris elytris: fasciis 4 flavis arcuatis.*

*Sultz. inf. t. 5. f. 31.*

*Geoffr. parif. 212. n. 23.*

*Habitat in Europa.*

*Antennæ ferrugineæ. Fascia Thoracis lutea interrupta.*

*Femora anteriora fusca. Punctum scutellare flavum.*

- Verbasci. 22. *L. thorace subovato nigro, elytris fasciis tribus nigris: prima semiannulata.*

*Habitat in Verbasco Gallie. D. Gouan; Germanie. D. Schreber.*

*Statura L. arietis. Corpus viride, subtomentosum. Thorax fascia nigra e 3 maculis transversim positus. Elytra virescentia in quibus primo arcus subannulatus niger; dein due fascie nigre. Antennæ corpore paulo breviores. Femora linearia.*

- arietis. 23. *L. thorace gibboso nigro, elytris nigris: fasciis flavis: secunda antrorsum arcuata, pedibus ferrugineis. Fa. suec. 695. \**

*Act. nidros. 3. p. 394. t. 6. f. 4.*

*Faun. suec. t. n. 507. Leptura nigra, elytrorum lineis transversis flavis, pedibus testaceis.*

*Raj. inf. 82. n. 22. Scarabæus niger, lineolis luteis pulchre variegatis.*

*Frisch. inf. 12. t. 3. ic. 5. f. 3.*

*Pet. gaz. t. 63. f. 6.*

*List.*

*List. mus. t. 31. f. 1.*

*loqu. 385. n. 14.*

*Geoffr. parif. 214. n. 11.*

*Habitat in Europa.*

*pruſſia.* 24. L. thorace ſubgloboſo fulco, elytris flavis apice nigris, pedibus quatuor pallidis. *Fn. ſvec. 698. \**

*Faun. ſvec. 506. Leptura nigra, elytris flavis apice nigris.*

*Geoffr. parif. 209. n. 4.*

*Habitat in Europa.*

*linearis.* 25. L. thorace ovato, corpore cyaneo lineari, antennis longioribus. *Muf. Lud. Ultr. 77. \**

*Habitat in india.*

*Antenna corpore ſeſquilongiores. Variat ſemoribus clavatis & linearibus.*

106. NECYDALIS. *Antenna ſetaceæ.*

*Elytra alis minora: breviora*

*& anguſtiora.*

*Cauda ſimplex.*

*\* Elytris ala abdomineque multo brevioribus.*

*major.* 1. N. elytris abbreviatis ferrugineis immaculatis, antennis brevioribus. *Fn. ſvec. 838. \**

*Schæff. monogr. 1753. f. 1, 2. Muſca-cerambyx major. elem. t. 13. f. 2. & elem. t. 88.*

*Habitat in Europa.*

*minor.* 2. N. elytris abbreviatis teſtaceis apice lineola alba, antennis longioribus. *Fn. ſvec. 837. \* Scop. carn. 179.*

*It. æl. 74. Necydalis elytris flavis lineola alba.*

*Schæff. monogr. 1753. f. 6, 7. Muſca-cerambyx minor. Sultz. inf. t. 7. f. 51.*

*Habitat in Europa.*

*umbellæ-arcum.* 3. N. elytris abbreviatis teſtaceis immaculatis, antennis longis.

*Schreber. inf. 4. Necydalis elytris apice nigris.*

*Scop. carn. 180. Necydalis minima.*

*Habitat in Germania. D. Schreber.*

*Simil-*

*Simillima N. minori sed dimidio minor & absque lineola alba ad apicem.*

\* \* *Elytris subulatis longitudine abdominis.*

cærulea. 4. *N. elytris subulatis cærulea, femoribus posticis clavatis arcuatis.*

*Scop. carn. 146. Cantharis nobilis.*

*Habitat in Africa, Italia.*

*Tota cærulea, nitidissima. Femora tantum postica incrassata, magna, curva. Tibiæ plantæque omnes nigrae.*

atra. 5. *N. elytris subulatis nigra, femoribus omnibus clavatis.*

*Habitat in Europa australi. D. Aescanius.*

*Tota nigra, opaca. Femora omnia apice clavata.*

rufa. 6. *N. elytris subulatis nigra, femoribus omnibus clavatis, elytris antennisque rufis.*

*Habitat in Europa australi. D. Aescanius.*

*Corpus nigrum. Antennæ excepto infimo articulo rufæ. Elytra rufa, apice nigricantia. Pedes clavati rubri, sed clava pedum 4 priorum nigra.*

glaucescens. 7. *N. elytris subulatis glauco-flavescentibus, femoribus clavatis.*

*Syst. nat. 10. p. 399. n. 17. Leptura necydalea.*

*Habitat in Surinami.*

*Caput nigrum. Abdomen nigrum incisuris albis. Antennæ nigrae, corpore  $\frac{1}{2}$  breviores.*

flavescent. 8. *N. elytris subulatis testaceis, corpore nigro, femoribus posticis clavatis arcuatis.*

*Scop. carn. 145. Cantharis femorata.*

*Habitat in Europa.*

*Tota nigra exceptis elytris. Femora postica incrassata, magna, tota atra ut corpus.*

Podagra. 9. *N. elytris subulatis testaceis, corpore nigro, femoribus posticis clavatis basi testaceis.*

*Habitat in Ægopodio Podagraria. D. Schreber.*

*Corpus nigrum. Antennarum basis, palpi, elytra excepto apice, pedes 4 anteriores, femorum posticorum basis testacea.*



**implex.** 10. *N. elytris subulatis testaceis, pedibus simplicibus.*  
*Scop. carn. 144. Cantharis phthysica.*  
*Habitat in Europa. D. Gouan.*  
*Corpus nigrum. Femora nulla clavata. Elytra ex-*  
*cepto margine exteriori, Tibia antica, Abdomen*  
*(exceptis maculis nigris) testacea.*

**brevicor-** 11. *N. elytris minutissimis, capite thoraceque fuscis li-*  
*nea longitudinali flava, antennis brevissimis crassiu-*  
*sculis. Brunnich.*

*Habitat in Guinea.*

*Corpus elongatum, magnitudine N. majoris. Anten-*  
*næ vix thoracis longitudine, medio crassiores. Ocu-*  
*li magni, non prominuli. Caput & Thorax e rufo*  
*fusca: linea longitudinali flava, inde ab interstitio*  
*oculorum usque ad scutellum ducta. Elytra minu-*  
*tissima, brevissima, e rufo fusca. thorace breviora.*  
*Abdomen respectu thoracis longissimum, tectum alis*  
*nudis. Pedes graciles testacei, horum 2 postici re-*  
*moti.*

**107. LAMPYRIS.** *Antennæ filiformes.*

*Elytra flexilia.*

*Thorax planus, semiorbiculatus,*  
*caput subtus occultans cin-*  
*gensque.*

*Abdominis latera plicato-papil-*  
*losa.*

*Femina aptera plerisque.*

**Noctilu-** 1. *L. oblonga fusca, clypeo cinereo. Fn. suec. 699.*

2.

*Aldrov. inf. 492.*

*Mouff. inf. 109. f. 1. 2.*

*Raj. inf. 78, 79.*

*Column. ecphr. 1. f. 38. t. 36.*

*Fonst. inf. t. 14. f. 2.*

*Bradl. nat. 26. f. 3.*

*Geoffr. paris. 167. t. 2. f. 7.*

*Habitat in Europæ juniperetis graminosis.*

*Syn-*

*Larva similes feminis, phytophaga sunt.*

*Synonima data inter reliquas species forte distribuenda.*

corrusca. 2. *L. oblongiuscula fusca*, clypeo utrinque intra marginem fulvo.

*Uddm. diff. 47.*

*Habitat in Finlandia, Russia.*

*Magnitudo. L. noctiluca vel paulo latior. Clypeus intra margines laterales utrinque arcu connivente clypeo f. luteo-rubro.*

splendida. 3. *L. oblongiuscula fusca*, clypeo supra oculos fenestrato.

*Scop. carn. 118. Cassida noctiluca.*

*Pod. inf. 39. Cantharis noctiluca.*

*Schaff. elem. 2. 74.*

*Habitat in Germania.*

*Similis Noctiluca, sed Thoracis clypeus supra utrumque oculum hyalinus & pellucidus, quo facile distinguitur. Pedes lurido-ferruginei. Abdominis segmenta 2 prostrema lucentia.*

Pyralis. 4. *L. oblongiuscula fusca*, elytris margine rufescentibus, clypeo intra marginem purpurascente. *M. L. U. 78. \**

*Habitat in America septentrionali.*

marginata. 5. *L. oblonga nigra*, thoracis elytrorumque margine omni, scutello abdominisque postica flavis. *Brunnich.*

*Habitat in America; Brunniche.*

*Corpus nigrum, magnitudine L. Noctiluca. Caput & Pectus flavo maculata. Antennæ basi flavæ. Elytra fusca margine undique flavo. Alæ nigre. Scutellum flavum. Thorax marginibus flavis disco macula magna triangulari fusca. Femora Tibiæque flavo nigroque dimidiata. Abdominis segmenta intermedia flava.*

Hespera. 6. *L. ovata*, elytris fuscis: macula marginali triangulari flava.

*Habitat in America. Rolander.*

*Clypeus thoracis flavus; macula fusca in fronte. Elytra fusca: macula flava in medio marginis lateralis. Antennæ subtus apice flavus.*

- ignita.** 7. *L. ovata*, elytris fuscis: macula marginali ovata lutea. *Habitat in America. Rolander.*  
*Clypeus antice maculis 2 fuscis. Corpus fuscum. Alæ nigrae. Abdomen totum subtus flavum.*
- lucida.** 8. *L. oblonga*, elytris fuscis margine exteriori luteis, abdomine toto subtus flavo.  
*Sulc. inf. 2. 5. f. 32.*  
*Habitat in America.*  
*Simillima C. noctiluca, sed pallidior, & Abdomen totum flavum. Antennæ & Caput nigra.*
- phosphoræa.** 9. *L. oblonga subtestacea*, abdomine atro: postice flavissimo.  
*Habitat in America. Rolander.*  
*Abdominis segmenta duo ultima flavissima, porisque duobus pertusa. Antennæ nigrae.*
- mauritania.** 10. *L. elytris lividis, corpore flavo.*  
*Habitat in Algeria. E. Brander.*  
*Duplo major prima. Clypeus s. thorax, Pectus, Abdomen obsolete flava. Elytra exolete fuscis. Femina s. Aptera triplo major nostrate cum puncto flavo ad angulum anteriorem cuiusvis segmenti corporis.*
- italica.** 11. *L. elytris fuscis, clypeo antice transverso rufo: medio nigro.*  
*Habitat in Italiæ arboribus lucens. J. Rathgeb Equ.*  
*Minor reliquis. Fusca sunt Elytra, Coxæ, Antennæ, Abdomen, exceptis 2 ultimis segmentis fuscis. Thorax antice etiam truncatus rufus, medio macula nigra. Pectus, & Pedes lutei. Femina nigra, singulo segmento supra ad angulum marginalem macula testacea, in segmentis tribus primis majora.*
- chinensis.** 12. *L. elytris testaceis apice nigris. Obs. etc. 224.*  
*Habitat in Asia.*
- minuta.** 13. *L. testacea, abdomine alisque nigricantibus.*  
*Habitat in Europa.*  
*Corpus totum flavum s. testaceum, magnitudine vix Pediculum superans, ovali-oblongum. Antennæ filiformes, corpore paulo breviores. Abdomen subtus nigricans. Alæ fusca. Elytra apice vix fusca. Thoracis clypeus hemisphaericus.*

T t

14. C.

latissima. 14. *L. flava*, elytris postice nigris margine laterali maximo dilatato. *Brunnich.*

*Habitat in Guinea.*

Magnitudo & Statura *Silphæ majoris*. Thorax semi-orbiculatus, flavus linea longitudinali nigricante. Elytra singularia: margo enim exterior statim post basin finitur in costam elevatam elytri, & novus margo continuatur dilatatus, maximus; postice rotundantur elytra & nigra evadunt, ut in rostrato & bicolore; hinc insectum antice angustum, postice latissimum. Alæ uti reliquum corpus nigrum. Antennæ serratæ.

rostrata. 15. *L. elytris testaceis antice posticeque nigris. M. L. U. 78. \**

*Habitat ad Cap. b. spei, sequenti simillima.*

bicolor. 16. *L. sanguinea*, elytris postice violaceis.

*Amæn. acad. 6. p. 395. n. 21. \** *Cantharis bicolor.*

*Habitat in Africa.*

Corpus rubrum. Antennæ compressæ, Plantæ Alæque nigrae. Elytra rubra, angulato striata; dimidia parte postica atro-violacea, nitidissima.

sanguinea. 17. *L. nigra*, thoracis lateribus elytrisque sanguineis. *Fn. suec. 704. \** *Scop. carn. 119.*

*Raj. inf. 101. n. 4.*

*Frisch. inf. 12. t. 3. ic. 7. f. 2.*

*Geoffr. parif. 1. p. 168. Lampyrus 3.*

*Habitat in Europæ lapidosis.*

*Feminas sanguineæ, bicoloris, minutæ non vidimus.*

coccinea. 18. *L. nigra*, thorace elytrisque sanguineis, elytris striatis. *Fn. suec. 705. \**

*Habitat in Europa præcedenti similis, sed duplo major.*

208. CANTHARIS. *Antennæ* setaceæ.*Thorax* marginatus, capite brevior.*Elytra* flexilia.*Abdominis* latera plicato-pappillosa.\* *Thorace* depresso.sanguino-1. *C. supra* rubra, elytris bimarginatis.

lenta.

*Habitat in* Rùtheno. *Joh. Beckman, Hannoveranus.*

*Facies Lampyr. sanguinea.* Caput depressum, rubrum, cordatum, pone oculos admodum angulatum. Maxillæ prominulæ, nigræ. Antennæ nigræ, moniliformes, subpilosæ, articulo ultimo ovato, thorace fere longiores. Thorax ruber, depressus, inæqualis, subtus lateribus niger. Elytra rubra, lavia, marginata quasi duplici margine. Abdomen atrum. Pedes atri femoribus clavatis; a congeneribus nonnihil discrepat caractere.

fusca 2. *C. thorace* marginato rubro macula nigra, elytris fuscis. *Fn. suec. 700. \* It. æl. 38. Scop. carn. 120.*

*Raj. inf. 84. n. 29. ♂ 101. n. 2.**Frisch. inf. 12. t. 3. icon. 6. f. 5.**Sulz. inf. t. 5. f. 33.**Geoffr. parif. 170. t. 2. f. 8.**Pod. inf. 40. n. 4.**Schæff. elem. t. 123. f. 1.**Habitat in* Europa, frequens.*Sævit sæpe in propriam speciem.*

livida 3. *C. thorace* marginato, tota testacea. *Fn. suec. 701. \* Scop. carn. 122.*

*Raj. inf. 84. n. 26. Cantharis sepiarius major e rufo flavicans.**Geoffr. parif. 1. p. 171. n. 2.**Habitat in* Europa.*Feminam precedenti connexam vidi.*

rufa 4. *C. thorace* marginato, tota rufa, epigastrio alisque nigris. *Fn. suec. 703. \**

*Habitat in* Europa.

T t 2

5. C.

*Cantharidis Larvæ, etiamnum fere ignotæ.*

- obscura. 5. *C. thorace marginato marginibus rubris, elytris nigris.*  
*Fn. suec. 706. \* Act. nãres. 3. p. 396. t. 6. f. 5.*  
*Habitat in Europa.*  
*Similis C. fusca, sed duplo minor; abdominis ultima*  
*segmenta subtus non rubra, sed nigra, quamvis la-*  
*tera segmentorum rufa. Thorax non rufus macula*  
*media fusca, sed niger solis marginibus lateralibus*  
*rubris.*
- lateralis. 6. *C. thorace marginato rubro, corpore fusco, elytris*  
*marginè exteriore flavescentibus. Fn. suec. 707. \**  
*Habitat in Europa.*
- ænea. 7. *C. thorace marginato, corpore viridi-æneo, elytris*  
*extrorsum undique rubris. Fn. suec. 708. \* Scop.*  
*carn. 126.*  
*Raj. inf. 77. Scarabæus minor, corpore longiusculo,*  
*elytris rubicundis.*  
*Scheff. monogr. 1754. t. 2. f. 10, 11.*  
*Geoffr. paris. 1. p. 174. n. 7.*  
*Habitat in Europa.*
- bipustula. 8. *C. thorace marginato, corpore æneo-viridi, elytris a-*  
*picè rubris. Fawn. suec. 709. \* It. æl. 127. Scop.*  
*carn. 127.*  
*Raj. inf. 101. n. 7.*  
*Geoffr. paris. 1. p. 175. n. 8.*  
*Habitat sæpe in Carectis. Larva rapax minorum in-*  
*sectorum.*
- pedicula. 9. *C. thorace marginato, corpore atro, elytris apice ru-*  
*bris. Fn. suec. 710. \**  
*Habitat in Europa.*  
*Pedicula æqualis, quater minor præcedente.*
- fasciata. 10. *C. thorace subrotundo virescente, elytris nigris: fa-*  
*sciis duabus rubris. Fn. suec. 711. \* Scop. carn. 129.*  
*Geoffr. paris. 1. p. 177. n. 12.*  
*Habitat in Europa.*
- biguttata. 11. *C. thorace marginato: medio atro, elytris abbreviatis*  
*nigris apice flavis. Fn. suec. 712. \**  
*Geoffr. paris. 1. p. 176. n. 11.*  
*Habitat in Europa*  
*Abdominis segmenta margine flava subtus.*

- minima.** 12. *C. thorace marginato rufo macula nigra, corpore fusco, elytris apice flavis.* *Faun. suec.* 713. \* *Scop. carn.* 128.  
*Faun. suec.* 598. *Necydalis elytris apice puncto flavo.*  
*Geoffr. paris.* 1. p. 176. n. 10. ♂ p. 372. t. 7. f. 2.  
*Necydalis.*  
*Habitat in Europa.*
- Cardiacz.** 13. *C. thorace submarginato, corpore atro, antennis pectinatis, elytris apice puncto sanguineo.* *Faun. suec.* 720. \*  
*Habitat in Europa, in Leonuro Cardiacæ.*
- albicans.** 14. *C. thorace orbiculato margine luteo, corpore nigro, fronte flava.*  
*Habitat in Germania.* *P. Forstål.*  
*Statura C. cardiacæ; magnitudo Pediculi. Tibiæ anteriores antice flavæ.*
- testacea.** 15. *C. thorace marginato flavo macula nigra, corpore nigro, elytris pedibusque lividis.* *Fa. suec.* 714. \*  
*Scop. carn.* 123.  
*Faun. suec.* 593. *Cantharis nigra, elytris lividis.*  
*Habitat in Europa.*
- atra.** 16. *C. thorace marginato, corpore toto atro.*  
*Habitat in Europa; ad Hammarby.* *A. Kubn.*  
*Magnitudo C. testacæ.*
- pectinata.** 17. *C. atra, clypei lateribus basique exteriore elytrorum luteis, antennis pectinatis.*  
*Habitat in America.* *Rolander.*  
*Antennæ atra, pectinato-ferrata. Elytra atra, striata punctis excavatis.*
- ferrata.** 18. *C. flavescens, elytris striatis: fasciisque tribus nigris, antennis ferratis.*  
*Habitat in America.* *Rolander.*  
*Antennæ compressæ, ferrata, nigra, longitudine corporis.*
- tropica.** 19. *C. thorace marginato lateribus rubro, elytris nigris fascia alba, antennis pectinatis.* *Mus. Lud. Utr.* 80. \* *Gron. scop.* 515. t. 14. f. 7.  
*Habitat in Indiis.*

*Elytra lata, submembranacea, apicem versus latiora  
& rotundata.*

- pectini- 20. *C. thorace orbiculato, elytris rufo-testaceis, antennis*  
cornis. *pectinatis. Fn. suec. 715. \**  
*Habitat in Europa.*

\* \* \* *Thorace teretiusculo.*

- violacea. 21. *C. violacea, antennis pectinatis, femoribus anticis*  
*crassissimis dentatis. Brunnich.*  
*Habitat in Guinea.*

*Corpus violaceum, magnitudine Dermestidis violacei.*  
*Caput, Thorax, Elytraque violacea. Pectus Abdo-*  
*minisque antica violacea. Anus ferrugineus. Pedes*  
*ferruginei. Femora antica crassissima, dente armata.*

- cærulea. 22. *C. thorace teretiusculo, corpore cæruleo subopaco.*  
*Fn. suec. 716. \**  
*Habitat in Europa.*

- viridissi- 23. *C. thorace teretiusculo, corpore viridi. Fann. suec.*  
ma. *717. \**  
*Habitat in Europa.*

*Hæc dimidio præcedenti minor, cum qua convenit fi-*  
*gura thoracis subcylindrica ad Cicindelas accedente,*  
*sed neque oculi prominentes, neque maxillæ exsertæ,*  
*neque cursus celer & expeditus. Variat pedibus*  
*concoloribus & ferrugineis.*

- virescens. 24. *C. thorace teretiusculo, corpore virescenti-fusco, fe-*  
*moribus posticis clavatis.*  
*Habitat in Europa.*  
*Antennæ nigrae. Elytra striis tribus elevatis.*

- derme- 25. *C. testacea, oculis alis pectoreque nigris, antennis*  
stoides. *longitudine thoracis. Fn. suec. 702. \**  
*Habitat in Europa.*  
*Thorax vix marginatus est.*

- navalis. 26. *C. thorace teretiusculo, corpore luteo, elytris mar-*  
*gine apiceque nigris. Fn. suec. 718. \**  
*It. wgoth. 153. t. 2. \**  
*Frisch. inf. 13. p. 24. t. 20.*  
*Habitat intra Querci lignum.*

27. *C.*



melanura. 27. C. thorace rotundato, corpore luteo, elytris apice nigris. *Fn. svec.* 719. \*  
*Habitat in Europa.*

209. ELATER. *Antennæ fetaceæ.*

*Corpus dorso impositum exiliens  
 mucrone pectoris e foramine  
 abdominis resiliente.*

flabelli- 1. E. niger, antennarum fasciculo flabelliformi. *Brunnich.*  
 cornis. *Habitat in India.*

*Corpus inter maxima generis, nigrum totum. Elytra  
 nervis tribus obscuris. Antennæ breves: tertio ar-  
 ticulo ♂ ultra ornantur extrorsum ingenti, ex la-  
 mellis 8, constructo flabello.*

speciosus. 2. E. albus lineis punctis maculisque nigris. *Brunnich.*  
*Habitat in India. e Museo Meuschen.*

*Corpus album, majus E. noctiluco. Thorax linea lon-  
 gitudinali, cui utrinque adstant vel adhaerent pun-  
 cta 2. Elytra margine laterali maculis nigris 3 &  
 sutura communi macula una scutellari & una in  
 medio; præterea punctum solitarium juxta antero-  
 rem partem suturae communis, in utroque elytro.*

oculatus. 3. E. thorace ocellis binis atris: iridibus albis, corpore  
 nigricante. *Mus. Lud. Utr.* 81. \*

*Pet. gaz. t. 10. f. 4. Scarabæus elasticus major, ca-  
 pite bimaculato.*

*At. anglic. 246. p. 396. n. 13. ♂ 271. p. 842. n. 32.  
 Habitat in America septentrionali.*

noctilu- 4. E. thoracis lateribus macula flava glabra. *Mus. Lud.*  
 cus. *Utr.* 82. \* *Gron. zooph.* 474. \*

*Sloan. jam. 2. p. 206. t. 237. f. 1. Scarabæus me-  
 dius fuscus, thorace angulato lucem emittente.*

*Brown. jam. 432. t. 44. f. 10. Elater major fuscus  
 phosphoricus.*

*Pet. gaz. t. 27. f. 10?*

*Mouff. inf. 112. Cocujas.*

*Gron. zooph. 474.*

*Habitat in America.*

- Thoracis ocellis, uti Lampyrides & Fulgoræ, noctu  
lucet quando vult, alias non, sub vitro dat lucem  
sufficientem lectori; abdomen diffractum intus lucet.  
Brown.*
- phospho- 5. *E. fuscus, thorace postice maculis duabus flavis glabris.  
reus. Habitat in America. Rolander.  
Similis precedenti, sed dimidio minor. Antennæ se-  
taceæ. Elytra pilis adpressis fusca, striata. Macu-  
læ s. puncta lutea thoracis, non ad latera, sed intra  
marginem posticum s. inter dentes thoracis posticos,  
noctū etiam lucent.*
- porcatus. 6. *E. fuscus, elytris nigris porcatis: sulcis elevatis glabris.  
Habitat in America. Brunnich.  
Corpus europæis minus, fuscum ex pilis alio parvis ut  
non conspicuit. Antennæ serratæ. Thorax postice  
recipit fentellum duobus dentibus. Elytra profunde  
sulcata: singula sulcis 4; interjectis striis elevatis,  
lævigatis, acris.*
- ligneus. 7. *E. ferrugineus, elytris mucronatis, antennis nigris. A-  
mon. acad. 6. p. 395. n. 24.  
Gron. zooph. 477. Elater testaceus, thorace antice  
truncato, elytris postice acuminatis?  
Habitat Surinami.  
Magnitudine fere accedit ad *E. oculatum*. Antennæ  
subserratæ.*
- striatus. 8. *E. niger opacus, elytris striatis: striis subpubescentibus,  
ano villosis.  
Gron. zooph. 475. Elater virefcens, elytris atris sul-  
cis albis striatis, ano barbator  
Habitat Surinami  
Magnitudo fere *E. oculati*. Thorax lævis, vix cari-  
natus. Elytra exarata striis 9, cavitatibus non læ-  
vibus. Antennæ serratæ. Anus pilis brevissimis  
hirsus.*
- bipustula- 9. *E. niger nūdus, elytris utrisque puncto bascos rubro.  
rus. Brunnich.  
Geoffr. in, 1. p. 136. Elater niger, elytrorum basi  
maculis rubris.*

Habi-

Elateris Larvæ et immaturæ larvæ.

*Habitat in Europa.*

Corpus magnitudine *E. brunnei* f. *medium*. Caput, Antennæ, Thorax, Elytra, Abdomenque atra, nitida. Thorax glaber. Elytra striata, ad basin punctato sanguineo. Pedes picei.

brunneus. 10. *E. thorace nigro utrinque rufo, elytris corporeque ferrugineis. Fn. suec. 721. \**

*Habitat in Europa.*

lyriacus. 11. *E. thorace rufo, elytris fascia duplici alba, corpore nigro. Mus. Lud. Ulr. 83. \**

*Habitat in Syria. Hasselqvist.*

cruciatus. 12. *E. thorace nigro lateribus ferrugineo, coleoptris flavis: cruce margineque nigris. Fn. suec. 722. \**

*Gadd. satag. 27.*

*Habitat in Europa.*

linearis. 13. *E. thorace nigro lateribus rufis, elytris testaceis linearibus. Fn. suec. 723. \**

*Fn. suec. 1. n. 582. Elater thorace rubro, elytris griseis.*

*Udén. diss. 46. Elater canthariformis niger, ano rufo, elytris ex rufo pallide fuscis striatis.*

*Habitat in Europa.*

ruficollis. 14. *E. thorace rubro nitido antice nigro, elytris corporeque nigris. Fn. suec. 724. \**

*Fann. suec. 576. Elater niger, thorace rubro.*

*Geoffr. parif. 1. p. 132. n. 5.*

*Habitat in Europa.*

lineatus. 15. *E. niger, elytris obscure lividis fusco sublineatis.*

*Habitat in Germania. D. Schreber.*

Corpus mediocre, fuscum. Antennæ subserrugineæ.

Elytra obscure livida lineis 2 nigricantibus, versus futuram dorsalem positis.

mesomelus. 16. *E. thorace margineque elytrorum ferrugineis, corpore elytris nigris. Fn. suec. 725. \**

*Habitat in Europa.*

*Antecedenti paulo major. Pectus in medio nigrum, Anus flavus. Thorax rugis aliquot impressis.*

aterimus. 17. *E. ater, thorace opaco punctato, elytris striatis. Fn. suec. 726. \**

T t 5

Udén.

*Uddm. diff.* 45.

*Habitat in Europa.*

castaneus. 18. *E. thorace testaceo pubescente, elytris flavis apice nigris, corpore atro. Fn. suec.* 727. \* *Scop. carn.* 286.

*List. loqu.* 387. *Scarabæus ex fulco rufescens f. castaneus.*

*Raj. inf.* 92. n. 6.

*Geoffr. paris.* 1. p. 132. n. 4.

*Habitat in Europa. Antennæ maris pectinatae.*

livens. 19. *E. niger, thoracis glaberrimi margine antico rubro, elytris testaceis. Fn. suec.* 728. \*

*Habitat in Europa.*

ferrugineus. 20. *E. thorace elytrisque ferrugineis, corpore thoracisque margine postico nigris. Fn. suec.* 729. \*

*Habitat in Svecia.*

*Reliquis nostratibus major. Antennæ serratae, thorace paulo longiores.*

sanguineus. 21. *E. thorace atro, elytris rubris, corpore nigro. Faun. suec.* 731. \*

*Scop. carn.* 287.

*Geoffr. paris.* 1. p. 131. *Elater* 2.

*Schæff. ic. t.* 2. f. 6.

*Habitat in Europa.*

balteatus. 22. *E. thorace atro, elytris antice dimidiato-rubris, corpore nigro. Fn. suec.* 732.

*Raj. inf.* 78. n. 13. *Scarabæus minor, longo & angusto corpore, elytris bicoloribus e fulvo & nigro, saltatrix.*

*Habitat in Europa.*

marginatus. 23. *E. thorace subfusco, elytris testaceis margine undique nigris. Fn. suec.* 733. \*

*Habitat in Europa.*

sputator. 24. *E. thorace fusco nitido, elytris testaceis, corpore nigro. Faun. suec.* 734. \* *Scop. carn.* 285.

*Faun. suec.* 583. *Elater niger, elytris fuscis, antennis pedibusque rufis.*

*Habitat in Europa.*

25. *E.*

- obscurus. 25. E. thorace fusco obscuro, elytris obscure testaceis.  
*Fann. suec.* 735. \*  
*Sultz. inf. t. 5. f. 35.*  
*Habitat in Europa.*  
*Simillimus precedenti, sed latior antennisque brevioribus.*
- tristis. 26. E. thorace atro nitido, elytris basi margineque exteriore lividis. *Fn. suec.* 736. \*  
*Habitat in Europæ lignis putridis.*
- fasciatus. 27. E. thorace nigro pallidoque vario, elytris nigricantibus: fascia alba undulata. *Fn. suec.* 737. \* *Scop. carn.* 281.  
*Habitat in Europa.*
- murinus. 28. E. thorace obscure cinereo, elytris cinereo-nebulosis, plantis rufis. *Fn. suec.* 738. \*  
*Habitat in Europa.*
- tessellatus. 29. E. thorace obscure æneo, elytris fuscis: maculis pallidioribus confertis, unguibus rubris. *Fann. suec.* 739. \*  
*Gadd sat.* 80. Elater niger, pilis minimis flavo-æneis junctim intermixtis.  
*Habitat in Europa.*
- germanus. 30. E. thorace elytrisque atro-cæruleis, corpore toto pedibusque nigris. *Fn. suec.* 730. \*  
*Habitat in Europa.*
- æneus. 31. E. thorace elytrisque cærulescenti-æneis, pedibus sanguineis. *Fn. suec.* 740. \*  
*Fann. suec.* 578. Elater viridi-æneus, pedibus fulvis.  
*Habitat in Europa.*
- pectinicornis. 32. E. thorace elytrisque æneis, antennis maris pectinatis. *Fn. suec.* 741. \* *Scop. carn.* 278.  
*Fann. suec.* 575. Elater fusco-viridi-æneus.  
*List. loqu.* 387. *mut. t. 17. f. 14.* Scarabæus nigro-virescens, corniculis altero tantum versu pectinatis.  
*Sultz. inf. t. 5. f. 36.*  
*Pod. inf. t. 1. f. 4.*  
*Geoffr. paris.* 133. n. 7.  
*Schæff. ic. t. 2. f. 4.*

Schæff.

*Schaff. elem. t. 11. f. 1. ♂ t. 60.*

*Habitat in Europa.*

- niger. 33. *E. thorace laevi elytris pedibus corporeque nigris.* *Fn. succ. 743. \**

*Faun. succ. 577. Elater totus nigro-fuscus.*

*List. mut. t. 17. f. 14.*

*Raj. inf. 92. n. 1, 2, 3.*

*Geoffr. parif. 134. n. 8.*

*Habitat in Europa.*

- minutus. 34. *E. thorace nigro nitido, elytris nigris obscuris.* *Fn. succ. 744.*

*Habitat in Europa.*

*Magnitudo vix dupla Pediculi.*

- pulchellus. 35. *E. thorace capiteque atris, elytris nigris: maculis flavicantibus, pedibus flavis.* *Fn. succ. 745. \**

*Habitat in Scania. D. C. Solander.*

- tetrastrichon. 36. *E. niger luteo maculatus, elytris maculis confluentibus, abdomine quadrisarium punctato.*

*Habitat in Africa. Brander.*

*Corpus medium. Caput retusum Buprestidis, fronte lutea punctis 2 s. 4 nigris. Thorax submarginatus, lateribus luteis, postice vix mucronatis. Elytra fastigiata, subtilissime striata maculis 4 longitudinaliter digestis. Abdomen 4 punctorum luteorum ordinibus.*

- buprestoides. 37. *E. thorace caput recipiente, antennis pectinatis, corpore toto nigro.* *Fn. succ. 742. \**

*Habitat in Europa.*

*Singularis capite a Thorace recepto ut in Dermestide; Antennæ ferrugineæ. Thorax postice utrinque dentatus, ut in Elateribus.*

- dermestoides. 38. *E. subpubescens subfuscus, antennis subclavatis.*

*Habitat Upsaliæ.*

*Facies Dermestidis, magnitudo Elateris minuti. Elytra fordide fusca, subpubescentia.*

210. CICINDELA. *Antennae* setaceae.  
*Maxillae* prominentes, denticulatae.  
*Oculi* prominuli.  
*Thorax* rotundato-marginatus.

campestris. 1. *C. viridis*, elytris punctis quinque albis. *Faun. suec.* 746. \* *Scop. carn.* 181.  
*Monff. inf.* 145. f. *infima*.  
*List. loqu.* 386. *mut. t.* 17. f. 12.  
*Fonst. inf. t.* 16.  
*Geoffr. paris.* 153. *Buprestis* 27.  
*Habitat in Europæ campis arenosis.*

hybrida. 2. *C. subpurpurascens*, elytris fascia lunulisque duabus albis. *Fa. suec.* 747. \* *Scop. carn.* 183.  
*Schaff. elem. t.* 43.  
*Habitat in Europa.*

capensis. 3. *C. subænea*, elytris albis linea fusca triramosa. *Mus.* *Lud. Ulr.* 84. \*  
*Habitat ad Cap. b. spei. Tulbagh.*

germanica. 4. *C. viridis*, elytris puncto lunulaque apicula albis. *Scop. carn.* 182.  
*Pod. inf.* 42. n. 3.  
*Gron. zooph.* 167.  
*Schreber. inf.* 10. n. 5. *Cicindela obscurior* viridis, elytris punctis 4 lineolaque alba.  
*Geoffr. paris.* 1. p. 155. *Buprestis* 29.  
*Habitat in Germania. P. Forstahl.*  
*Simillima C. campestris, sed triplo minor, tota aenea-viridis. Elytra viridia apice lineola albicante & punctis 2 albis ad marginem exteriorum.*

virginica. 5. *C. nitida*, ore antennis pedibusque testaceis.  
*Habitat in Carolina.*  
*Similis C. carolinae, violacea. Thorax laevis. Elytra punctis excavatis.*

carolina. 6. *C. cyanea nitida*, elytrorum apicibus antennis pedibusque flavis. *Amer. acad.* 6. p. 395. n. 23. \*  
*Gron.*

*Cicindela* insectorum *Tigrides* veloces; larvæ etiamnum latent.

*Gron. zooph.* 576. \*

*Habitat in Carolina.*

- equino- 7. *C. flava*, elytris fasciis duabus nigris latis. *Amæn. a-*  
ctialis. *cad.* 6. p. 395. n. 22. \*  
*Habitat* Surinami.
- sylvatica. 8. *C. nigra*, elytris fascia punctisque duobus albis. *Fn.*  
*svec.* 748. \*  
*Faun. svec.* 1. n. 549. *Cicindela atra*, coleoptris maculis sex fasciisque albis.  
*Habitat in Europæ Pinetis.*
- maura. 9. *C. nigra*, elytris punctis sex albis: tertio & quarto parallelo.  
*Habitat* Algeriæ. *E. Brander*; in Sicilia. *D. Cyrillus.*  
*Statura C. campestris. Frons alba. Elytra punctis 6*  
*albis longitudinalibus, ad marginem exteriorum: sed*  
*3 & 4 transverse positis super confluentibus.*
- riparia. 10. *C. viridi-ænea*, elytris punctis latis excavatis. *Faun.*  
*svec.* 749. \* *It. æl.* 38, 121.  
*Geoffr. parisi.* 156. *Buprestis* 30.  
*List. loqu.* 385. *Scarabæus parvus inauratus.*  
*Habitat in Europæ humentibus.*
- flavipes. 11. *C. obscure ænea*, elytris subnebulosis, pedibus luteis.  
*Fn. svec.* 750. \*  
*Habitat in Europa.*
- rupestris. 12. *C. nigra*, thorace globoso, coleoptris punctis duobus fasciisque ferrugineis.  
*Habitat in Europæ rupibus, frequentius sub Lichenibus.*  
*Magnitudo Pediculi majoris, tota nigra, etiam pedibus.* *Elytra antice macula ferruginea, in singulis singula, postice fascia utrisque communi triloba, ferruginea.*
- 4-maculata. 13. *C. nigra*, elytris fuscis: maculis duabus pallidis, tibis rufis. *Fn. svec.* 751. \*  
*Habitat in Europa.*
- aquatica. 14. *C. ænea nitida*, capite striato. *Fn. svec.* 752. \*  
*Faun. svec.* 558. *Buprestis fusco-ænea nitida, thorace submarginato.*

*List.*



*List. mut. t. 31. f. 13.*

*Schrab. inf. 6. Cicindela pusilla.*

*Geoffr. paris. 157. Buprestis 31.*

*Habitat in Europæ aquis.*

## III. BUPRESTIS; *Antennæ setaceæ, longitudine thoracis.*

*Caput dimidium intra thoracem retractum.*

### \* *Elytris fastigiatis.*

*gigantea. 1. B. elytris fastigiatis bidentatis rugosis, thorace marginato lævi, corpore inaurato. Mus. Lud. Ulr. 85. \**

*Sloan. jam. 2. p. 210. t. 236. f. 1, 2. Cantharis maxima, elytris cuprei coloris fulcatis.*

*Merian. sur. t. 50. f. infima.*

*Grew. mus. 165. t. 13. Cerambyx ind. orient. maximus.*

*Sultz. inf. t. 6. f. 38.*

*Habitat in America, Asia.*

*8-guttata. 2. B. elytris fastigiatis muticis maculis quatuor albis, corpore cæruleo. Fw. suec. 753.*

*It. scan. 23.*

*Uddm. diss. 42.*

*Geoffr. paris. 126. Cucujus 2.*

*Habitat in Europa.*

*Magnitudine cedit nostratibus majoribus. Antennæ nigrae, longitudine thoracis. Caput nigrum aut cæruleum, lineola alba ante oculos. Thorax niger aut cæruleus margine albo. Elytra nigra aut cærulea striata, obtusissima, maculis octo albis longitudinaliter digestis. Abdomen cæruleum cum linea alba utrinque versus basin transversa, & in singulo segmento utrinque par punctorum alborum, ut sint sub abdomine maculae 18 albæ. Pedes cærulei cum puncto albo in femoribus quatuor posterioribus. Variat colore cæruleo, nigro, aureo absque vel cum maculis.*

### \* \* *Elytris versus apicem serratis.*

*ignita. 3. B. elytris serratis, thorace impresso, corpore inaurato, tibiis teretibus. Mus. Lud. Ulr. 86. \**

*Grew.*

*Grew. mus.* 166. t. 13. Beetle.

*Pet. gaz.* t. 20. f. 8.

*Kampb. jap.* 1. p. 132. t. 10. f. 7.

*Habitat in Indiis.*

*Elytra, apice imprimis, colore auri candefacti:*

**Arista.** 4. *B. elytris ferratis sulcatis, tibiis angulatis, abdomine glabro.* *Mus. Lud. Utr.* 87. \*

*Habitat in Indiis.*

*Thorax a tergo minime impressus.*

**Gernicor-nis.** 5. *B. elytris ferrato-tridentatis, thorace punctato, sterno perfecto, corpore inaurato.* *M. L. Utr.* 88. \*

*Monff. inf.* 160. f. *infim.*

*Grew. mus.* 167. t. 13. *Carabus orientalis crassus.*

*Habitat in India.*

*Elytra basi notata puncto depresso latiore, colore variant. Thorax postico subtrilobus.*

*Ad basin tibarum pollicarum inseruntur aliquot setae, equinae instar, insecto duplo longiores.* *Brunnich.*

**mariana.** 6. *B. elytris ferratis longitudinaliter rugosis; maculis duabus impressis, thorace sulcato.* *M. L. U.* 89. \* *Fn. succ.* 754. \*

*Faun. succ.* 557. *Buprestis aeneo-nitida* supra cinerea, coleoptris apice attenuatis.

*Pet. gaz.* t. 2. f. 2. *Cantharis marianus* viridis perelegans, vaginis sulcatis signaturis flavescens notatis.

*Habitat in Europa, America: Carolina.*

**chryso-lligina.** 7. *B. elytris ferratis longitudinaliter sulcatis, maculis duabus aureis impressis, thorace punctato.* *Faun. succ.* 755. \*

*Fn. succ.* 1. n. 556. *Buprestis fusco-aenea*, elytris maculis aeneis impressis.

*Saltz. inf.* 1. 6. f. 39.

*Geoffr. parif.* 125. *Cucujus* 1.

*Habitat in Europa.*

**rustica.** 8. *B. elytris striatis fastigiatis, thorace punctato.* *Faun. succ.* 756. \*

*Fn. succ.* 1. n. 555. *Buprestis viridi-aenea* immaculata.

*Geoffr. parif.* 127. *Cucujus* 3.

*Scop. carn.* 188. *Mordella rustica.*

*Habitat in Europa.*

9. *B.*

\* \* \* *Elytris integris.*

austriaca. 9. *B. elytris striatis æneis bidentatis, capite thoraceque viridi, abdomine violaceo.*

*Scop. carn.* 187. *Mordella gigantea.*

*Habitat in Austria. D. Scopoli.*

*Corpus magnitudine B. rustica. Caput & Thorax viridia, nitida, lævia. Elytra non serrata, sed apice fastigiata, bidentata, immaculata, ænea. Abdomen violaceum, nitidissimum.*

aurulentus. 10. *B. elytris fastigiatis bidentatis viridibus margine corporeque auratis, thorace subpunctato.*

*Habitat in Carolina. D. Garden.*

*Corpus oblongum, angustum, viridi inauratum. Thorax teretiusculus, vix marginatus, obsolete punctatus. Elytra cærulea, nitida, punctis excavata, striata, sutura & margine exteriori auricolaria. Subtus tota nitidissima aurea, uti etiam Pedes.*

Tenebrionis. 11. *B. atra, elytris integris lineato-punctatis, thorace varioloso dilatato. Fæ. swed.* 761. \*

*Habitat in Europa, Africa.*

fasciculata. 12. *B. elytris integerrimis striatis: punctis fasciculato-villosis, corpore inaurato hirsuto. Mus. L. U.* 90. \*

*Gron. zoonph.* 493. \*

*Seb. mus.* 2. p. 22. t. 20. f. 5. *Scarabæus amboinensis.*

*Pet. gaz.* t. 13. f. 5. *Scarabæus obscure viridis aureus papillis pilis albis obticis undique hirtus.*

*Sultz. inf.* t. 6. f. 40.

*Habitat in Cap. b. Ipei. Tulbagh.*

*Elytra punctis quintuplici serie digestis, barbato-fasciculatis.*

hirta. 13. *B. elytris integerrimis, pedibus ferrugineis, corpore hirsuto. Mus. Lud. Uir.* 91. \*

*Habitat in Africa: Cap. b. Ipei.*

*Thorax & Elytra hirta.*

Rubi. 14. *B. nigra, elytris fasciis cinereis undulatis.*

*Habitat in Gallia. D. Gouan.*

*Corpus paulo majus B. 4-punctata. Elytra fasciis cinerascensibus quatuor.*

U u

15. B.

- nitidula.** 15. *B. elytris integerrimis, thorace marginato utrinque depresso, corpore nitidissimo. Fn. suec. 757. \**  
*Habitat in Europæ aquosis.*  
*Magnitudo Culicis. Corpus undique nitidissimum & colore varians e viridi, carulco aut aureo.*
- bimacula-** 16. *B. elytris integerrimis striatis macula rubra, corpore ta. fusco-viridi. Mus. Lud. Ulr. 92. \**  
*Habitat in India.*  
*Elytra striis elevatis glabris cum interjectis minoribus crenulatis.*
- 9-macu-** 17. *B. elytris integerrimis maculis tribus longitudinalibus, lata. fronte thoracisque lateribus luteis.*  
*Habitat in Barbaria. E. Brander.*  
*Corpus nigrum totum, oblongum, mediocre. Maculæ luteæ: 1 in medio frontis, cum punctis; 2 ad thoracis latera, 3 in singulis elytris seu longitudinali, quarum anterior basi biloba. Abdominis segmenta punctis 4 luteis.*
- tristis.** 18. *B. elytris integerrimis marginatis, corpore cupreo, abdomine punctis decem nigris. M. L. U. 93. \**  
*Habitat in Indiis.*
- ænea.** 19. *B. elytris emarginatis: punctis excavatis cicatricantibus apice striatis. Fn. suec. 758. \**  
*Habitat in Europa.*
- cuprea.** 20. *B. elytris integerrimis, thoracis lateribus scabris, scutello tuberculari, corpore cupreo lævi. Mus. Lud. Ulr. 94. \**  
*Habitat in Indiis.*  
*Scutelli loco punctum prominens. Abdomen supra cæruleum.*
- nobilis.** 21. *B. elytris integerrimis: fasciis linearibus duabus undatis inauratis, corpore fusco.*  
*Habitat in Indiis.*
- 4-puncta-** 22. *B. elytris integerrimis punctatis, thorace punctis qua- ta. tuor impressis, corpore obscuro. Fn. suec. 759. \**  
*Faun. suec. 559. Buprestis atra, thorace punctis impressis.*  
*Habitat in Europa.*

- minuta. 23. *B. elytris integerrimis transverse rugosis, thorace subtrilobo lævi æneo. Fn. suec. 760. \**  
*Habitat in Europa.*
- minuta. 24. *B. elytris integerrimis transverse rugosis, thorace subtrilobo lævi, corpore ovato nigro. Faun. suec. 760. \**  
*Habitat in Europa.*
- viridis. 25. *B. elytris integerrimis sublinearibus punctatis, thorace deflexo, corpore viridi elongato. Fn. suec. 762. \**  
*Habitat in Betula alba foliorum margines exedens.*
- atra. 26. *B. elytris integerrimis sublinearibus punctatis, thorace deflexo, corpore atro elongato.*  
*Habitat in Germania. D. D. Schreber.*  
*Simillima B. viridi, ut vix distinguatur nisi colore.*
- festiva. 27. *B. elytris integerrimis maculis sex cæruleis, corpore viridissimo elongato.*  
*Habitat in Barbara. Brander.*  
*Corpus magnitudine B. viridis, undique sericeo-viridissimum, subtus magis nitens. Thorax non glaber, punctis impressis 2 s. 3 cæruleis. Elytra striata; singula notata cæruleis punctis: 1 ad basin externam; tum 2, demum 2 subconfluentibus; ultimo apice cæruleo; his accedit punctum cæruleum ad scutellum.*
- linearis. 28. *B. lineari-oblonga murino-ænea, thorace postico trilobo.*  
*Habitat in America. Rolander.*
- granularis. 29. *B. æneo-nebulosa, antennis clavatis. Fn. suec. 763. \**  
*Habitat in Europa.*

212. DYTISCUS. *Antennæ* setaceæ aut clavato-perfoliatæ.

*Pedes* postici villosi, natatorii, submutici.

\* \* *Antennis perfoliatis.*

piceus. 1. *D. antennis perfoliatis*, corpore lævi, sterno carinato postice spinoso. *Fn. suec.* 764. \* *Scop. carn.* 293. *Lyonnet leff. tab.* 1. f. 15, 16, 12. *Geoffr. parif.* 1. p. 182. t. 3. f. 1. *Hydrophilus* 1. *Habitat in Europa.* *Nidus natans mucrone eminente instructus.*

*Antennæ clava ovata: articulo ultimo atro glabro, reliquis fuscis, non glabris. Pectus submentosum: Sternum carinatum, compressum, valde prominens, antice obtusum, subtus canaliculatum, postice subulatum. Elytra lævia, vix manifeste striata.*

caraboides. 2. *D. antennis perfoliatis*, corpore glabro striis aliquot recurvis. *Fann. suec.* 765. \* *Ræf. aqu.* 1. t. 4. f. 1, 2. *Frisch. inf.* 13. p. 24. t. 21. *Sultz. inf.* t. 6. f. 41. *Geoffr. parif.* 183. *Hydrophilus* 2. *Habitat in Europa.*

Scarabæoides. 3. *D. ovalis convexus ater lævissimus*, antennis filiformibus triarticulatis. *Ræf. inf.* 2. *aquat.* 1. t. 4. *Habitat in Europæ aquis.* *Varietas forte D. Caraboides? ejusdemque magnitudinis.*

fuscipes. 4. *D. antennis perfoliatis*, elytris striatis margine lividis, pedibus fuscis. *Fn. suec.* 766. *Geoffr. parif.* 184. *Hydrophilus* 4. *Habitat in Europæ aquis.*

5. *D.*

---

*Dytisci Larvæ subaquaticæ sunt voracissimi aquatilium Crocodyli. Occidunt Pisces innumeros uti Baruthi 1762 teste Schreber. neu sambl. 1763. part. 3. p. 688. de D. semistriato. Dorsum impositi circumgyrando exsiliunt; in umbra quiescunt; nocturne volitant; diutius in sicco servati difficulter submergi possunt.*

luridus. 5. *D. antennis perfoliatis luridis, elytris punctis tribus fusciscentibus, thorace lateribus flavicantibus. Fn. suec. 767. \**

*Habitat in Europæ aquis.*

*\*\* Antennis setaceis.*

latissimus. 6. *D. niger, elytrorum marginibus dilatatis linea flava. Fann. suec. 768. \**

*Frisch. inf. 2. t. 7. f. 1, 2. Scarabæus aquaticus magnus niger margine luteo.*

*Habitat in Europæ aquis.*

marginatus. 7. *D. niger, thorace elytrorumque margine flavis. Fn. suec. 769. \* Scop. carn. 294.*

*Raj. inf. 93. n. 1.*

*Aldr. inf. 707.*

*Mouff. inf. 164. f. bona.*

*List. mut. t. 5. f. 2.*

*Raf. inf. 2. aquat. 2. p. 7. t. 1. f. 9, 10.*

*Sultz. inf. t. 6. f. 42.*

*Geoffr. parif. 186. n. 2.*

*Schaff. elem. t. 7. f. 1.*

*Habitat in Europæ, Americæ septentrionalis aquis.*

semistriatus. 8. *D. fuscus, elytris sulcis dimidiatis decem villosis. Fn. suec. 772. \* Geoffr. parif. 1. p. 187. n. 3. t. 3. f. 2.*

*Fann. suec. 1. n. 568. Dytiscus supra fuscus, sub-  
tus ater.*

*β. Fann. suec. 1. n. 567. Dytiscus elytris striis 20 di-  
midiatis.*

*Raj. inf. 94. n. 2. Hydrocantharus elytris striatis f.  
canaliculatis.*

*Frisch. inf. 2. t. 7. f. 4.*

*Raf. inf. 2. aquat. 1. t. 1. f. 10.*

*Bradl. nat. t. 26. f. 2.*

*Habitat in Europæ aquis.*

*Femina D. marginalis?*

striatus. 9. *D. fuscus, elytris transverse subtilissime striatis. Fn. suec. 770. \**

*Habitat in Europæ aquis.*

fuscus. 10. *D. fuscus, elytris transverse substriatis.*

*Habitat in Europæ aquis.*

U u 3

11. D.

**cinereus.** 11. *D. cinereus*, elytrorum margine thoracisque medietate flavis. *Faun. suec.* 771. \*

*Hoffm. inf.* 2. t. 12.

*Rösf. inf.* 2. aqu. 1. t. 3. f. 6.

*List. mus.* t. 5. f. 1.

*Pet. gaz.* t. 70. f. 3.

*Geoffr. parif.* 1. p. 188. n. 4.

*Habitat in Europæ aquis.*

**siaticus.** 12. *D. pallens*, elytris griseis puncto oblongo laterali nigro impresso.

*Habitat in Barbaria.*

*Magnitudo Fœbæ.* Thorax pallidus litura transversa nigra. Elytra linci 2 e punctis obscuris vix conspicuis & præterea ad marginem exteriorum punctum oblongum, depressum, nigrum.

**fulcatus.** 13. *D. elytris sulcis decem longitudinalibus.* *Faun. suec.*

773. \*

*Geoffr. parif.* 1. p. 189. n. 5.

*Frisch. inf.* 13. p. 13. t. 7.

*Rösf. aquat.* 1. t. 3. f. 7.

*Bradl. nat.* t. 26. f. 2. A.

*Raj. inf.* 569. Hydrocantharus minor, corpore rotundato plano.

*Raj. inf.* 94. n. 3.

*Schæff. ic.* t. 3. f. 3.

*Habitat in Europæ aquis.*

*Femina D. cinerei?*

**erythrocephalus.** 14. *D. ovato-oblongus niger*, antennis rufis, pedibus piceis. *Faun. suec.* 774.

*Habitat in Europæ aquis.*

**maculatus.** 15. *D. ovatus niger*, thorace nigro fascia pallida, elytris albo-maculatis. *Faun. suec.* 777. \*

*Uddm. diff.* 43.

*Habitat in Europæ aquis.*

**ferrugineus.** 16. *D. ferrugineus totus.*

*Habitat in Europa. D. Ascanius.*

*Magnitudine Cimicis, totus rufus f. ferrugineus.*

17. *D.*

*Notis pedum anteriorum plantæ hemisphaerice. Feminis sæpius elytra sulcata. Priores Dermestidi, posteriores Carabi affines videntur. Sexus difficulter dignoscitur, species difficiliter determinantur.*



- bipustula- 17. *D. ater lævis*, capite postice punctis duobus rubris.  
 rus. *Habitat in Europa: Suecia.*  
*Parvus, non tamen minimus, totus niger. Antennæ*  
*Palpi Pedesque picea. Caput postice juxta thoracem*  
*punctis 2, sanguineis, paribus.*
- ovatus. 18. *D. ovatus fuscus*, capite thoraceque rubris. *Faun.*  
*svec. 2282. \**  
*Habitat in Europæ aquis.*
- palustris. 19. *D. niger lævissimus*, elytris lituris duabus lateralibus  
 albidis. *Faun. svec. 775. \**  
*Habitat in Europæ aquis.*
- uliginosus 20. *D. ater nitidus*, antennis pedibus elytrorumque latere  
 exteriore ferrugineis. *Fn. svec. 776. \**  
*Habitat in Europæ aquis.*
- bimacu- 21. *D. testaceus*, elytris macula nigricante.  
 latus. *Habitat in Gallia. D. Gouan.*  
*Magnitudo oryzae. Corpus testaceum, subtus obscu-*  
*rum magis. Thorax lævis. Elytra substriata, in me-*  
*dio macula magna nigra.*
- granula- 22. *D. niger*, elytris lineis duabus flavescens, pedi-  
 ris. bus rufis.  
*Habitat in Europa: Upsalia.*  
*Magnitudo Pulicis. Elytra singula lineis 2, diaphanis,*  
*longitudinalibus, apice concurrentibus, quæ dum in*  
*aquis versatur aureæ apparent.*
- minutus. 23. *D. elytris fuscis basi lateribusque pallidis*, thorace  
 flavo immaculato, corpore ovato. *Fn. svec. 778. \**  
*Habitat in Europæ aquis.*  
*Elytra punctis vix conspicuis adpersa.*

213. CARABUS. *Antennæ* setaceæ.*Thorax* obcordatus apice truncatus, marginatus.*Elytra* marginata.\* *Majores.*coriaceus. 1. *C. aterus* ater opacus, elytris punctis intricatis subrugosis. *Scop. carn.* 265.*Sultz. inf.* 1. 6 f. 44.*Pod. inf.* 45.*Geoffr. parif.* 141. *Buprestis* 1.*Habitat in Germania.* *P. Forskühl.**Inter maximos Europæos numerandus. Totus ater, lævis. Elytra absque sulcis ex punctis confusis, excavatis confluentibus, confertis. Antennæ corpore breviores.*granulatus. 2. *C. aterus*, elytris longitudinaliter convexe punctatis. *Fn. succ.* 780. \* *Scop. carn.* 263.*Faun. succ.* 511. *Carabus ater*, elytris convexe punctatis striatisque.*Geoffr. parif.* 1. p. 143. n. 3.β. *Carabus niger*, elytris subvirescentibus convexe punctatis striatisque. *Fn. succ.* 512.γ. *Carabus purpurascens-niger*, elytris convexe punctatis striatisque. *Fn. succ.* 513.*Hoffm. inf.* 2. t. 3.*Habitat in Lignis putridis.*hortensis. 3. *C. aterus*, elytris punctis æneis excavatis triplici serie. *Faun. succ.* 783. \* *Ström. æt. nigr.* 3. p. 401. t. 6. f. 7.*List. mant.* 1. 8. f. 4.*Raj. inf.* 96. n. 2. *Cerambyx purpurea* punctata.*Habitat in Europa.*leucophthalmus. 4. *C. elytris lævibus: striis obsoletis octo.* *Faun. succ.* 784. \* *Scop. carn.* 266.*Fn. succ.* 515. *Carabus ater*, elytro singulo striis octo.*Geoffr. parif.* 1. p. 146. n. 7.

Ha-

---

*Carabi Larvæ sape intra Ligna putrida, muscos, terram &c. degunt; Volatilia vero insectorum imprimis Larvarum Leones sunt, cursu festinantes.*

*Habitat in Europa.*

*Thorax, ratione magnitudinis insecti, minor quam in reliquis.*

claratus. 5. *C. apterus nigricans*, elytris porcatis: interjectis punctis excavatis longitudinalibus. *Fn. succ. 782. \**  
*Habitat in Europa.*

atens. 6. *C. apterus*, elytris porcatis: striis passim interruptis sulcisque scabriusculis inauratis. *Fann. succ. 185. \**  
*It. xl. 96. Scop. carn. 262.*  
*Raj. inf. 96. n. 6. Cerambyx dorso in longas rugulas diviso, omnium pulcherrimus.*  
*Habitat in Europæ sylvis.*

suratus. 7. *C. apterus*, elytris porcatis: striis sulcisque lævibus inauratis. *Fn. succ. 786. \**  
*Habitat in Europa.*

violaceus. 8. *C. alatus*, elytris læviusculis nigris margine aureo, thorace subviolaceo. *Fn. succ. 787. \**  
*Frisch. inf. 13. t. 23. Scarabæus terrestris nigricans.*  
*Rai. inf. 96. n. 1. Scarabæus major, corpore oblongo, e purpura nigricans.*  
*Schæff. inf. t. 3. f. 1.*  
*Habitat in Europæ sylvis.*

cephalotes. 9. *C. apterus*, elytris atris lævibus, thorace exserto oblongo. *Fn. succ. 788. \**  
*Frisch. inf. 13. p. 25. t. 22. Scarabæus.*  
*Habitat in Europa.*

10-guttatus. 10. *C. apterus ater*, coleoptris novemfulcatis punctisque decem albis. *Mus. Lud. Ulr. 96. \**  
*Habitat ad Cap. b. spei. D. Tulbagh.*  
*Variat puncto albo utrinque ad Thoracis angulum lateralem anticum. Brunnich.*  
*Maximus maxillis porrectis. Thorax latere angulatus. Elytra striis inter profundos sulcos acutis: puncta nivea majuscula: primum ad basin anteriorem; secundum in medio interius; tertium quartumque paulo posterius, parva; quintum versus apicem. Apex coleoptri coalitus est emarginatus.*

inquisitor. 11. *C. elytris striatis viridi-æneis: punctis triplici ordine.*  
*Fn. succ. 789. \**

*Roland. inf. Stockb. 1750. p. 292. t. 7. f. 3. Carabus alatus viridi-æneus, concave punctatis striatisque, pedibus antennisque nigris.*

*Habitat in Europæ arboribus, larvis Papilionum Phalaenarumque victitans.*

*Elytra aurata margine viridi, Thorax brevissimus.*

**sycophan-12.** *C. aureo-nitens, thorace cæruleo, elytris aureo-viridibus striatis, abdomine subatro. Mus. Lud. Ulr.*

*95. \* Fn. succ. 790. \**

*Reaum. inf. 2. t. 37. f. 18.*

*Rob. ic. t. 20. f. 2.*

*Pod. inf. 46. Carabus alatus, thorace violaceo, elytris aureo-viridibus: striis 15 crenatis; subtus violaceus.*

*Geoffr. inf. 144. n. 5.*

*Schaff. elem. t. 2. f. 1.*

*Habitat in Europa, noctu devastans larvas lepidopterorum.*

*Maximus europæus. Caput & Antenna nigra; margines thoracis elytrorumque aurei. Elytra striis 15 crenatis.*

*\* \* Minores.*

**buprestoi-13.** *C. niger, capite recepto, antennis palpisque ferrugineis, pedibus piccis.*

*Habitat in Europa australi.*

*Medius. Elytrorum striae, 3 & 4 interruptæ, per paria cœquant. Caput a thorace receptum. Maxillæ prominentes.*

**fastigiatus-14.** *C. ferrugineus, abdomine elytrisque fastigiatis nigris. Mus. L. U. 97. \**

*Habitat ad Cap. b. spei. D. Tulbagh.*

**lividus. 15.** *C. thorace pedibusque ferrugineis, elytris nigris: lateribus lividis. Fn succ. 791. \**

*Habitat in Europa.*

**marginatus-16.** *C. niger, elytris margine tibiisque testaceis. Faun. succ. 804. \**

*Habitat in Europa.*

*Variat colore supra nigro & viridi. Caput & Thorax ænea. Antennæ ferrugineæ. Elytra pubescentia.*

- complanatus. 17. *C. pallidus* elytris fasciis duabus undulatis nigricantibus.  
*Habitat in Hispania. Fr. Logie.*  
*Corpus medianum, planiusculum. Elytra substriata: fasciæ e lituris s. lineis compositæ. Maxillæ prominentes.*
- crepitans. 18. *C. thorace* capite pedibusque ferrugineis, elytris nigris *Faun. suec. 272. \**  
*Roland. act. stockh. 1750. p. 292. t. 7. f. 2. Cicindela capite thorace pedibusque rufis; elytris nigro-cæruleis*  
*Geoffr. parif. 151. n. 19.*  
*Habitat in Europa.*
- americanus. 19. *C. niger*, thorace pedibus antennisque ferrugineis.  
*Habitat in America. Rolander.*  
*Similis C. crepitanti, sed quadruplo major.*
- spinipes. 20. *C. piceus*, thorace linea excavata longitudinali, manibus spinosis. *Fn. suec. 793. Scop. carn. 267.*  
*Habitat in Europa; super Triticæ spicas frequens. Scop.*  
*Postice pallidior est.*
- cyanocephalus. 21. *C. thorace* pedibusque ferrugineis, elytris capiteque cyaneis. *Fn. suec. 794. \**  
*Faun. suec. 525. Carabus capite elytrisque cæruleis, thorace rubro.*  
*Habitat in Europa.*
- melanocephalus. 22. *C. thorace* pedibusque ferrugineis, elytris capiteque atris. *Fn. suec. 795. \**  
*Fn. suec. 1. n. 526. Carabus capite elytrisque atris, thorace rubro.*  
*β. Faun. suec. 524. Carabus niger, thorace antennis pedibusque ferrugineis.*  
*Geoffr. parif. 162. n. 42.*  
*Habitat in Europa.*
- vaporariorum. 23. *C. thorace* fusco, pedibus antennis elytrisque antice ferrugineis. *Fn. suec. 796. \**  
*Faun. suec. 1. n. 529. Carabus ater, elytris antice griseis.*  
*Habitat in Europa.*  
*Hic C. meridiano quadruplo major.*

- latus. 24. *C. niger*, pedibus antennisque rufis. *Fn. suec.* 521.  
*Habitat in Europa; in America septentrionali. Kalm.*
- ferrugineus. 25. *C. ferrugineus*, thorace glaberrimo. *Fn. suec.* 798. \*  
*Habitat in Europa.*
- germanus. 26. *C. niger*, capite pedibus elytrisque testaceis, elytris apice violaceis.  
*Habitat in Germania. P. Forstabl.*
- vulgaris. 27. *C. nigro-æneus*, pedibus antennisque nigris. *Faun. suec.* 799. \* *Scop. carn.* 268.  
*Habitat in Europa.*
- cæruleus. 28. *C. nigro-cæruleus*, antennis basi rubris. *Faun. suec.* 800.  
*Habitat in Europa.*
- cupreus. 29. *C. æneus*, antennis basi rubris. *Fn. suec.* 801. \*  
*Habitat in Europa.*
- piceus. 30. *C. niger*, pedibus antennisque piceis. *Fn. suec.* 802. \*  
*Gron. zooph.* 501. *C. apterus niger.*  
*Habitat in Europa.*
- velox. 31. *C. nigricans*, pedibus tibiisque pallidis. *Faun. suec.* 803. \* *It. gott.* 207.  
*Habitat in Arena volatili agilissimus.*
- multipunctatus. 32. *C. subæneus*, elytris punctis vagis plurimis impressis.  
*Fn. suec.* 805. \*  
*Habitat in Europa.*
- 2-punctatus. 33. *C. subæneus*, elytris punctis duobus impressis. *Fn. suec.* 806.  
*Habitat in Europa.*
- 4-punctatus. 34. *C. capite ferrugineo*, thorace atro, elytris maculis duobus flavis. *Fn. suec.* 811. \*  
*Habitat in Europa.*
- 6-punctatus. 35. *C. subæneus*, elytris punctis longitudinalibus sex impressis. *Fn. suec.* 807. \*  
*Fn. suec.* 1. n. 519. *Carabus nitens*, capite thoraceque cyaneo, elytris purpureis.

*Gerd. inf.* 2. p. 126. t. 31.

*Geoffr. parif.* 149. n. 4.

*Habitat in Europa.*

- meridia- 36. *C. niger*, elytris antice pedibusque testaceis.  
nus. *Habitat in Europa.*
- testaceus. 37. *C. pallide testaceus*, elytris glabris. *Fn. succ.* 812. \*  
*Habitat in Europa.*
- fulvus. 38. *C. thorace nigricante*, elytris obscuris ferrugineo bi-  
fasciatis. *Fn. succ.* 810. \*  
*Fann. succ.* 528 *Carabus niger*, coleoptris pone fa-  
scia ferruginea; lateribus macula ferruginea.  
*Geoffr. parif.* 151. n. 20.  
*Habitat in Europa.*  
*Pedes testacei.*
- crux ma- 39. *C. thorace capiteque nigro-rubescente*, coleoptris fer-  
rior. rugineis cruce nigra. *Fn. succ.* 808. \*  
*Geoffr. parif.* 151. n. 18.  
*Schaff. ic. t. 1. f. 13.*  
*Habitat in Europa.*
- crux mi- 40. *C. thorace luteo glabro*; elytris postice nigris: ma-  
nor. culis duabus flavis. *Fn. succ.* 809. \*  
*Habitat in Europa.*
- 4-macu- 41. *C. thorace flavo*, elytris obtusissimis fuscis: maculis  
latus duabus albis. *Fn. succ.* 813. \*  
*Fann. succ.* 1. n. 532. *Carabus niger*, thorace ferru-  
gineo, elytrorum maculis 4 lividis.  
*Geoffr. parif.* 152. n. 24.  
*Habitat in Europa.*
- stricapil- 42. *C. flavus*, capite nigro, elytris obtusissimis.  
lus. *Habitat in Germania.* *P. Forstabl.*
- truncatel- 43. *C. niger supra æneus*, elytris apice subtruncatis. *Fn.*  
lus. *succ.* 814. \*  
*Habitat in Europa.*  
*Magnitudo Cimicis.*

214. TENEBRIO. *Antennæ* moniliformes articulo ultimo subrotundo.

*Thorax* plano-convexus, marginatus. *Caput* exsertum.

*Elytra* rigidiuscula.

\* *Alati*.

Gigas. 1. *T. alatus ater*, elytris striatis, thorace lævi. *Amæn. acad.* 6. p. 396. n. 26.

*Habitat* Surinami.

*Magnitudo* *Lucani Cervi*. *Antennæ* subclavatae.

molitor. 2. *T. alatus niger totus*, femoribus anticis crassioribus. *Faun. suec.* 815. \* *Scop. carn.* 259.

*Fa. suec.* 547. *Mordella* antennarum articulis lentiformibus: ultimo globoso.

*Frisch. inf.* 4. p. 1. t. 1.

*Sulz. inf.* 7. f. 52.

*Geoffr. parif.* 1. p. 34. t. 6.

*Habitat* in Farina pistorum, Molendinis, Pane sicco, saccharato.

*Larva* pallida, 13 segmentis, glabra, *Lusciniis* accepta.

chalybeus. 3. *T. alatus violaceus*, antennis pedibus piceis. *Brunnich.* *Habitat* in Guinea.

Corpus magnitudine & statura omnino *T. molitoris*, colore tantum diversum. Caput nigrum. Thorax & Elytra e nigro s. viridi violacea chalybis instar candefacti, e quo elateres spirales horologiorum conficiuntur. Thorax punctis minutissimis excavatis. Elytra singula notantur striis 8, & alia brevissima, utrinque juxta scutellum incepta, per  $\frac{1}{2}$  elytrorum oblique versus suturam ducta. Antennæ & Pedes picei.

mauritanicus. 4. *T. alatus niger subtus piceus*, thoracis marginibus antice posticeque dente angulatis.

*Habitat* Algeriæ. *E. Brander.*

*Similis* precedenti, sed quintuplo minor, supra totus niger, subtus, pedibus antennisque, piceus. Elytra

stria-

---

*Tenebrionis Larva* vivunt in suffocatis locis & quisquilis; plures in farina aliisque cibariis.



*friata.* Thoracis margo antice dente utrinque prominulo, & postice dente obsoleto.

culinaris. 5. *T. alatus ferrugineus*, elytris striatis. *Fn. suec.* 816. \*  
*Faun. suec.* 546. *Mordella ferrugineo-rufa*, thorace antice depresso.  
*Habitat in quisquiliis; inque frumentorum acervis copiose.*

barbarus. 6. *T. alatus ater glaberrimus*, thorace orbiculato, capitis clypeo antice margine elevato.  
*Habitat in Mauritania.* *E. Brander.*  
*Glaber & nitidus, magnitudine Carabi mediocris; Elytra coherent postice vix acuta.*

Fossor. 7. *T. alatus piceus*, tibiis anticis palmato-digitatis. *Fn. suec.* 817. \*  
*Habitat in collibus arenosis, quos perfodit Upsaliæ.* *Rolander.*  
*Pedes anteriores Scarabæi, dentati; Thorax postice magis elongatus. Præcedentibus quadruplo minor.*

Cursor. 8. *T. alatus fuscus*, thorace oblongo: angulis quinque denticulatis. *Fn. suec.* 818. \*  
*Habitat in Sveciæ domibus.*  
*Longitudo Pediculi, subcylindricus, angustus.*

erraticus. 9. *T. alatus niger*, antennis thorace suborbiculato elytris-que ferrugineis, elytris apice fuscis. *Fn. suec.* 819. \*  
*Habitat in Europa.*

pallens. 10. *T. alatus pallide testaceus.* *Fn. suec.* 820. \*  
*Habitat in Europa.*

depressus. 11. *T. alatus niger*, elytris cærulescentibus, antennis tibiisque sanguineis, thorace depresso.  
*Habitat in Svecia.* *Marks v. Württemberg.*  
*Corpus nigrum, simile Carabo minori, magis oblongum. Thorax subcordatus, depressus quasi cavitatibus duabus. Elytra striata, atro-cærulescentia. Tibiæ omnes ferrugineæ. Antennæ ferrugineæ, moniliformes, vix thorace longiores.*

minutus. 12. *T. alatus niger*, thorace marginato, antennis clavatis pedibusque piceis.  
*Habitat Upsaliæ.*

Cor-

Corpus Pulice  $\frac{1}{2}$  minus. Thorax margine acuto, integro. Elytra striata, subverrucosa. Antennæ thorace paulo longiores.

- quiesquilius. 13. *T. alatus niger*, ore pedibusque ferrugineis. *Faun. suec.* 821. \*  
*Habitat in Europa.*

\* \* *Apteri.*

- gigas. 14. *T. apterus niger*, thorace æquali, coleoptris lævibus truncatis.  
*Habitat in Hispania, Barbaria.*  
*Simillimus T. mortifago, sed duplo major.*

- mortifagus. 15. *T. apterus*, thorace æquali, coleoptris lævibus mucronatis.  
*Faun. suec.* 594. *Tenebrio ater*, coleoptris acuminatis. *Fn. suec.* 822. \* *Scop. carn.* 252.  
*Mouff. inf.* 139. *Blatta foetida.*  
*Jonst. inf. t.* 16. f. - - -  
*Aldr. inf.* 499.  
*Frisch. inf.* 13. t. 25.  
*Pet. gaz. t.* 24. f. 7. *Scarabæus impennis tardipes.*  
*Habitat in umbrosis suffocatis.*

- grossus. 16. *T. apterus niger glaber*, coleoptris nervosis: nervis lateralibus scabris, thorace emarginato.  
*Habitat in Africa.*  
*Magnitudo T. mortifagi, sed latior, niger, glaberrimus.* Thorax marginatus, dilatatus, antice excisus, postice fere truncatus. Elytra nervis quatuor obsoletis, quorum duo laterales postice crenati exstantibus punctis.

- muricatus. 17. *T. apterus*, coleoptris obtusis: striis muricatis. *Mus. Lud. Utr.* 100. \*  
*Pet. gaz. t.* 11. f. 92. f. 14.  
*Habitat in Hispania.*

- gibbus. 18. *T. apterus niger lævis*, thorace orbiculato convexo antice truncato. *Faun. suec.* 824. \*  
*Habitat in Europa, Africa.*  
*Distinguitur summa dorsi totius glabrisie. Thorax & lateribus & postice marginatus.*

19. *T.*

- cæruleus. 19. *T. apterus cærulescens*, thorace suborbiculato, coleoptris obtusis. *Mus. Lud. Ulr.* 98. \*  
*List. angl. app.* 4. f. 14.  
*Pet. gaz.* t. 22. f. 6.  
*Habitat in Hispania.*
- rostratus. 20. *T. apterus niger*, elytris læviusculis uniangulatis, thorace angustiore, capite angustissimo. *Fann. suec.* 823. \*  
*Habitat in Europa.*  
*Thorax cordatus, latior quam caput.*
- collaris. 21. *T. apterus niger*, elytris læviusculis uniangulatis, thorace angustiore, capite depressiusculo carinato.  
*Habitat in Africa. Brander.*  
*Thorax teretiusculus, capite angustior, sed crassior.*  
*Elytra supra plana.*
- angulatus. 22. *T. apterus*, thorace teretiusculo, elytris striis quatuor elevatis: tertia crenata. *M. L. U.* 99. \*  
*Habitat in Ægypto.*  
*Elytra singula striis 4 elevatis: tertia laterali elevata carinata crenata.*
- linearis. 23. *T. apterus niger lævis*, pedibus ferrugineis, antennis brevissimis.  
*Habitat in Svecia.*  
*Minutus magnitudine culicis. Elytra non carinata.*  
*Thorax teretiusculus, angustus. Antennæ thoracæ breviores.*
- spinosus. 24. *T. apterus*, thoracis lateribus antice posticeque acuminatis, elytris striis tribus elevatis. *Mus. Lud. Ulr.* 101. \*  
*Habitat in Europa australi.*
- Caraboides. 25. *T. apterus*, thorace ovali marginato, coleoptris carinatis. *Fn. suec.* 825. \*  
*Fn. suec.* 595. *Tenebrio ater*, coleoptris pone rotundatis, maxillis prominentibus.  
*Habitat in Europa.*
- Silphoides. 26. *T. apterus*, thoracis lateribus postice acuminatis, antice excisis, elytris striis tribus elevatis.

*Syst. nat.* 10. p. 360. n. 9. *Silpha maura oblongiuscula atra*, thoracis marginibus elevatis, elytris sulcatis.

*Habitat in Mauritania. E. Brander.*

Thorax lateribus margine dilatato, postice utrinque acuminato. Elytra sulcis profundis, postice connexis, singulis 3 præter suturam & marginem.

rugosus. 27. *T. apterus niger*, elytris rugosis, abdomine pedibusque cæruleis, thorace lunato.

*Habitat in Africa, Hispania, Gallia.*

Statura fere *Chrysomela*, sed major. Elytra absque angulis rugosissima. Thorax lunatus.

variabilis. 28. *T. apterus niger lævis*, elytris elevato-punctatis angulatisque.

*Habitat in Gallia australi. Gouan.*

Statura præcedentis, sed Thorax vix marginatus, antice posticeque fere truncatus. Elytra undique elevatis punctis tecta & singula striis 4 minutis; at in altero sexu striæ tantum 2, versus posteriora conspicue.

lævigatus. 29. *T. apterus niger lævis*, elytris lævibus, thorace lunato, subtus cæruleus.

*Habitat in Africa.*

Statura & summa similitudo *T. rugosi*, sed elytra lævia.

latipes. 30. *T. apterus niger lævis*, elytris lævibus, thorace sublunato; subtus ater.

*Habitat in Africa.*

Statura & similitudo præcedentis, sed duplo minor. Dignoscitur primo intuitu plantis, imprimis prioribus, a reliquis coleopteris proportionem latioribus & ovatis ex articulis valde approximatis.

tibialis. 31. *T. apterus niger lævis*, tibiis anticis compressis unidentatis.

*Habitat in Africa, Hispania. Logie, Brander.*

Corpus vix *Chrysomela majus*, totum opacum. Thorax antice lunatus, postice transversus, sed versus elytra in medio dilatatus. Tibiæ anticæ compressæ cum dente s. sinu a latere exteriori. Elytra habent striam elevatam, sed adeo obsoletam, ut vix conspiciatur.

32. *T.*

femoralis. 32. *T. apterus niger lævis*, femoribus crassiusculis sub-  
tus canaliculatis.

*Habitat in Germania. D. Schreber.*

*Corpus statura minoris Chrysomelæ, læve, glabrum.*

*Thorax utrinque truncatus, ut postice sutura tantum  
ab elytris distinguatur.*

nitidulus. 33. *T. apterus niger*, coleoptris ovato-oblongis striatis.

*Habitat in Hispania. Logie.*

*Thorax lævis, convexus, postice rotundatus. Coleo-  
ptera longa ♂, versus posteriora elongata, striata.*

215. MELOE. *Antennæ moniliformes articulo ulti-  
mo ovato.*

*Thorax subrotundus.*

*Elytra mollia, flexilia.*

*Caput inflexum, gibbum,*

*\* Apteris elytris abbreviatis absque alis.*

Proscara- 1. *M. apterus*, corpore violaceo. *Fa. suec. 826. \* Scop.*  
baeus. *carn. 184.*

*Mouff. inf. 162. f. med.*

*Gœd. inf. 2. t. 42.*

*List. gad. f. 120.*

*Fonß. inf. t. 15.*

*Frisch. inf. 6. t. 6. f. 5.*

*Clut. hemerob. 81, 73. Vermis majalis.*

*Schæff. ic. t. 3. f. 5. elem. 82.*

*Habitat in apricis campis, edit Ranunculos, Veratrum;  
vernalis; tactus oleum e geniculis pedum emittit, u-  
ti sequens.*

majalis. 2. *M. apterus*, segmentis dorsalibus abdominis rubris.

*Frisch. inf. 6. t. 6. f. 4. Proscarabeus apter.*

*Schæff. ic. t. 3. f. 6.*

*Habitat in Europa australiore, in America. Kalm;  
in Africa. E. Brander.*

*\* \* Alati elytris longitudine corporis alas tegentibus.*

vesicato- 3. *M. alatus viridissimus nitens*, antennis nigris. *Faun.*  
rius. *suec. 827. \* Scop. carn. 185.*

X x 2.

It.

*Meloes Larvæ foliis plantarum pascuntur, uti etiam declinata.*

*It. scan.* 186. *Cantharis officinarum*.

*Mouff. inf.* 144.

*Raj. inf.* 101.

*Fonst. inf. t.* 7.

*Aldr. inf.* 276.

*Habitat in Ligustro, Fraxino, Sambuco, Syringa.*

*Officinalis pro vesicatorio. vide Diff. nostr. de Cantharid: vesicat.*

*syriacus.* 4. *M. alatus viridi-cæruleus, thorace luteo. Mus. Lud.*

*Ulr.* 102. \*

*Gron. zooph.* 620.

*Habitat in Syria.*

*Cichorii.* 5. *M. alatus niger, thorace hirsuto, elytris fasciis tribus flavis, antennis clavatis. M. L. U.* 103. \*

*Hasselqv. iter.* 410. n. 101. *Chrysomela cichorii.*

*Imperat. nat.* 78. *Cantharis fasciata.*

*Habitat in Cichoriis totius orientis.*

*Magnitudine accedit ad Proscarabæum. Fascia prima elytrorum ad eorum basin; ultima ante eorum apicem, reliquis magis undata.*

*4-puncta.* 6. *M. alatus niger, elytris flavis maculis quinque nigris, antennis clavatis.*

*Habitat in Europa.*

*Simillimus M. Cichorii, sed Elytra punctis 2 ad basin; 2 in medio, & 1 macula lunari, terminali.*

*capensis.* 7. *M. alatus niger, elytris maculis sex flavis: prima arcuata, antennis clavatis. Mus. Lud. Ulr.* 104. \*

*Habitat ad Cap. b. speci. Tulbagh.*

*chryso-meloides.* 8. *M. alatus viridi-cærulescens, subtus nigro-violaceus. Amæn. acad.* 6. p. 396. n. 25.

*Habitat Surinami.*

*bimaculatus.* 9. *M. alatus niger, elytris luteis macula nigra postica. Fn. succ.* 828. \*

*Uddm. diff.* 32.

*Habitat in Europæ arenosis primo vere. Antennæ setaceæ fere sunt.*

*afer.* 10. *M. alatus niger, thorace rufo.*

*Habitat in Barbaria. Brander.*

*Simi-*

*Similis M. vesicatorio, similiter caput inflectens, sed dimidio minor. Elytra flexilia. Thorax solus rufus s. ferrugineus.*

algiricus. 11. *M. alatus niger, elytris testaceis.*

*Habitat Algeriæ.*

*Statura Cantharidis. Elytra flexilia.*

Schæfferi. 12. *M. alatus viridis, pedibus luteis, antennis mari abbreviatis clavatis brevibus irregularibus.*

*Schæff. elem. t. 37.*

*Habitat in Germania. Schæffer.*

*Statura M. vesicatorii, sed dimidio minor. Antennæ luteæ, vix thorace longiores, terminatæ capitulo compresso fusio, infimo articulo crasso. Palpi gibbi.*

Marci. 13. *M. alatus niger, pedibus ferrugineis, palpis clavatis crispis.*

*Habitat Calmariz Suecorum. Marcks v. Wårtenberg.*

*Corpus nigrum, sed maxilla, anus, pedes 4 priores ferrugineæ. Thorax teretiusculus, submarginatus.*

*Elytra & Abdomen mollia, flexilia. Antennæ submoniliformes, longitudine thoracis. Palpi 2, nigri, capitati; capitillo magno singulari, basi persiliato, apice crispo, cui assimile non vidi. Insectum aliquatenus simile Carabo buprestoidi.*

Monoce- 14. *M. alatus, thorace in cornu supra caput protenso.*

ros. *Fn. suec. 638. \* Attelabus Monoceros.*

*Geoffr. parif. 1. p. 356. t. 6. f. 8. Notoxus.*

*Habitat in Delphini & Umbellatarum floribus vagus.*

*Genus difficile determinatur, forte huic proximum.*

floralis. 15. *M. alatus niger, elytris maculis duabus pallidis obsoletis. Fn. suec. 829. \**

*Habitat in Floribus Cardui Europæ.*

*Vix Pediculo major.*

antheri- 16. *M. alatus niger, elytris fasciis duabus ferrugineis.*

nos. *Fn. suec. 829. \**

*Syst. nat. 10. p. 418. n. 7. Tenebrio pedicularius.*

*Habitat in Europa.*

216. MORDELLA. *Antennae* filiformes, serratae.  
*Caput* deflexum sub collo; in  
 territo.  
*Palpi* compresso-clavati, obli-  
 que truncati.  
*Elytra* deorsum curva apicem  
 versus.  
*Ante* femora lamina lata ad  
 basin abdominis.

paradoxa. 1. *M. antennis pectinatis, thoracis lateribus elytrisque testaceis. Fn. suec. 831. \**

*Habitat in Europa: Germania, Calmaria.*

*Reliquis maior Thoracis dorso canaliculato.*

aculeata. 2. *M. atra, ano spina terminato. Fn. suec. 832. \* Scop. carn. 192.*

*Faun. suec. 534. Mordella oblonga atra, cauda aculeo terminata.*

*Sultz. inf. t. 7. f. 46.*

*Geoffr. paris. 353. Mordella 1.*

*Schaff. elem. t. 84.*

*Habitat in Europa, in floribus Semifosculosis frequens.*

*Variat coleoptris basi & medio fascia cinerea.*

humeralis. 3. *M. atra, lateribus thoracis basisque elytrorum flavescens. Fn. suec. 833. \**

*Habitat in Europa.*

frontalis. 4. *M. atra, fronte pedibusque flavescens. Fn. suec. 834. \**

*Habitat in Europa.*

thoracica. 5. *M. atra, capite thoraceque flavis. Fn. suec. 835. \**

*Habitat in Europa. T. Holm.*

flava. 6. *M. flava, elytrorum apicibus nigris. Fn. suec. 836. \**

*Habitat in Europa.*



217. STAPHYLINUS. *Antennæ* moniliformes.  
*Elytra* dimidiata. *Alæ* tectæ.  
*Cauda* simplex, exferens duas vesiculas oblongas.

- hirtus. 1. *S. hirsutus niger*, thorace abdomineque postice flavis.  
*Fn. suec.* 839. \*  
*Schæff. monogr.* 1754. t. 2. f. 12.  
*Habitat in locis arenosis.*
- marinus. 2. *S. pubescens cinereus nigro-nebulosus.* *Faun. suec.* 840. \*  
*Schæff. inf. t.* 4. f. 11.  
*Habitat in fimo equino.*
- maxillo- 3. *S. pubescens niger*, fasciis cinereis, maxillis longitu-  
 fus. dine capitis. *Fn. suec.* 841. \*  
*Geoffr. parif.* 360. t. 7. f. 1. *Staphylinus* 1.  
*Raj. inf.* 109. n. 1. *Staphylinus major totus niger.*  
*List. loqn.* 391. *Scarabæus majusculus niger forcipibus infestis.*  
*Mouff. inf.* 197.  
*Gron. zooph.* 630.  
*Fonst. inf. t.* 17. f. 1, 2, 3.  
*Bocc. mus* 2. t. 31. f. A. A.  
*Habitat in sylvis Europæ.*  
*Junior undique tomentosus per elytra & abdomen, cum fascia cinerea elytrorum & abdominis; proventus glaber & totus ater evadit.*
- erythropterus. 4. *S. ater*, elytris pedibusque rufis. *Faun. suec.* 842. \*  
*Scop. carn.* 306. *Ström. act. nidros.* 3. p. 404. t. 6. f. 8.  
*Frisch. inf.* 5. t. 25. *Scarabæus rapax*, elytris brevibus.  
*Geoffr. parif.* 364. *Staphylinus* 9.  
*Schæff. ic. t.* 2. f. 2. & *elem. t.* 117.  
*Habitat sæpius in fimo.*
- politus. 5. *S. niger*, thorace elytrisque nigricantibus nitidis. *Fn. suec.* 843. \* *Scop. carn.* 304.  
*Fn. suec.* 605. *Staphylinus niger*, thorace æneo nitido, elytris atro-cæruleis.

X x 4

Ha-

---

*Staphylini Larvæ subterrestres sunt, humentibus pleræque delectantur.*

*Habitat in Europa.*

*Variat capitis thoracis elytrorumque colore nigro & viridi s. cærulefcenti-æneo.*

- rufus.** 6. *S. rufus*, capite elytrorum abdominisque posticis nigris, femoribus basi nigris. *Fn. suec.* 844. *Scop. carn.* 307.  
*Gadd sat.* 80. *Staphylinus* pallide rufus, elytris cærulefcentibus, capite & apice abdominis nigro.  
*Geoffr. paris.* 370. *Staphylinus* 22.  
*Habitat in Europa.*
- lunulatus.** 7. *S. rufus*, capite abdominis elytrorumque posticis nigris, femoribus totis rufis. *Fn. suec.* 845. \*  
*Habitat in Europa.*
- riparius.** 8. *S. rufus*, elytris cæruleis, capite abdominisque apice nigris. *Fn. suec.* 846. \*  
*It. goll.* 173.  
*Geoffr. paris.* 369. *Staphylinus* 21.  
*Scop. carn.* 308. *Staphylinus* gregarius.  
*Habitat in Europa.*
- obtus.** 9. *S. testaceus*, elytris antice fuscis.  
*Habitat in Germania.* *P. Forshåhl.*  
*Magnitudo Pediculi. Pectus inter femora posteriora fuscum.*
- lignorum.** 10. *S. fuscus*, elytris sutura abdomine pedibusque ferrugineis. *Fn. suec.* 848. \*  
*Habitat in Europa.*
- Silphoides.** 11. *S. niger*, thoracis lateribus pedibusque lividis, elytris lividis margine maculaque longitudinali nigris.  
*Habitat in Europa.*  
*Similis St. obtuso, etiam abdomine piloso.*
- subterraneus.** 12. *S. niger*, elytris antice extorsum flavis, pedibus nigris. *Fn. suec.* 849. \*  
*Habitat in Europa.*
- flavescens.** 13. *S. ater*, pedibus rufis, elytrorum margine flavo. *Fn. suec.* 850. \*  
*Habitat in Europa.*

- elongatus. 14. *S. niger*, elytris postice pedibus antennisque ferrugineis.  
*Habitat in Europa.*  
*Oblongus, glaber. Elytra testacea, antice tantum nigra.*
- 1-guttatus. 15. *S. niger*, elytris puncto fulvo. *Fann. succ. 851.*  
*Habitat in Europa.*  
*Statura Cicindela Thorace cylindrico, Oculis magnis exsertis.*
- 2-pustulatus. 16. *S. niger*, elytris puncto ferrugineo. *Fn. succ. 847. \**  
*Habitat in Europa.*  
*Antenna clavata. Elytra in medio puncto ferrugineo.*
- cantharel-lus. 17. *S. niger*, elytris glaucis apice flavicantibus.  
*Habitat in Svecia, ad Hammarby meum.*  
*Simillimus Cantharidi biguttatae, sed antennae filiformes. Corpus nigrum, pediculo  $\frac{1}{2}$  minus. Elytra abdomine dimidio breviora, mollia, fusco-glaucescentia apice puncto flavo. Abdomen molle, glaucum.*
- litoreus. 18. *S. niger*, elytris antice griseis, pedibus rufis. *Fann. succ. 852. \**  
*Lt. gotl. 173.*  
*Habitat in littoribus.*
- sanguineus. 19. *S. niger*, elytris sanguineis. *Fn. succ. 853. \**  
*Habitat in Europa.*
- Caraboides. 20. *S. flavus. Fn. succ. 854.*  
*Fn. succ. 613. Staphylinus totus testaceus.*  
*Habitat in Europa.*
- chryso-melinus. 21. *S. niger*, thorace elytris pedibusque subtestaceis. *Fn. succ. 855. \**  
*Geoffr. parisi. 1. p. 368. n. 18.*  
*Habitat in Europa.*
- flavipes. 22. *S. niger*, elytris antennis pedibusque ferrugineis. *Fn. succ. 856. \**  
*Habitat in Europa.*
- fuscipes. 23. *S. niger*, elytris tibiisque fuscis. *Fn. succ. 857. \**  
*Habitat in Europa.*
- rufipes. 24. *S. ater glaber*, pedibus rufis. *Fn. succ. 858. \**  
*Habitat in Europa.*

X 15

25. S.

- piceus. 25. *S. niger*, elytris piceis, thorace depresso striis tribus longitudinalibus.  
*Habitat* Upsaliæ. *C. G. Kækeritz.*  
*Corpus nigrum, magnitudine Pediculi, sed oblongius. Thorax subrotundus, planus, depressus, in medio striis 3. Elytra brevissima, truncata, picea. Antennæ longitudine thoracis, obtusæ. Pedes pallidi.*
- Boleti. 26. *S. fuscus*, elytris pallidioribus, antennis pedibusque lividis. *Fn. succ. 859. \**  
*Habitat in Boletis abietinis gregarius, cujus fistulas, tamquam Apis suos favos cellulosos, intrat jucundo spectaculo. Rolander.*  
*Pulice dimidio minor & inter minima insecta.*

218. FORFICULA. *Antennæ setaceæ.*

*Elytra dimidiata. Alæ testæ.*  
*Cauda forcipata.*

- auricula- 1. *F. elytris apice albis. Fn. succ. 860. \* Scop. carn. 312.*  
 ria. *Mouff. inf. 171. f. infima. Forficula f. Auricularia vulgaris.*  
*Frisch. inf. 8. p. 31. t. 15. f. 1, 2. Vermis auricularias.*  
*Fonst. inf. t. 16. f. 2.*  
*Pet. gaz. t. 74. f. 5.*  
*Merion. inf. t. 30.*  
*Liszt. loqu. 391. mut. t. 31. f. A. Scarabæus subrufus, cauda forcipata.*  
*Sultz. inf. t. 7. f. 50.*  
*Geoffr. parif. 375. t. 7. f. 3. Forficula antennæ articulis XIV.*  
*Schaff. elem. t. 63.*  
*Habitat in Europa.*
- minor. 2. *F. elytris testaceis immaculatis. Fn. succ. 861. \**  
*Fn. succ. 600. Forficula alis elytro concoloribus.*  
*Geoffr. parif. 376. Forficula antennæ articulis XI.*  
*Habitat in Europa.*

## II. HE-

---

*Forficula Larvæ agiles crescentes sunt.*

## II. HEMIPTERA.

Os Rostrumque inflexum versus pectus.

*Alæ* hemelytratae: superioribus semicoriaceis (per futuram rectam minime conniventibus) sed margine interiore impositis.

219. BLATTA. *Caput* inflexum.

*Antennæ* setaceæ.

*Elytra* Alæque planæ, subcoriaceæ.

*Thorax* planiusculus, orbiculatus, marginatus.

*Pedes* cursorii.

*Cornicula* duo supra caudam.

gigantea. 1. *B. livida*, thoracis clypeo macula quadrata fusca. *Mus.*

*Lud. Ulr.* 106. *Gron. zooph.* 633. t. 16. f. 3. \*

*Habitat* in America, Asia.

*Diametro* ovi gallinacci.

egyptiaca. 2. *B. atra*, thoracis margine antico albo. *M. L. U.* 107. \*

*Gron. zooph.* 637. t. 15. f. 2. \*

*Habitat* in Ægypto.

surinamensis. 3. *B. livida*, thoracis margine antico albo.

*Habitat* Surinami.

americana. 4. *B. ferruginea*, thoracis clypeo postice exalbido.

*Merian. surin.* 1. t. 1.

*Geoffr. paris.* 381. *Blatta* ferruginea, elytris sulco ovato impressis abdomine longioribus.

*Habitat* in America; in Gallia australi. *Geoffr.*

Major *B. orientali*, sed simillima. *Elytra* Alæque corpore longiores. *Antennæ* longæ. *Sulcus* elytrorum impressus, ut in Orientali.

5. *B.*

*Blattæ* incisuræ cum larvis suis rodunt cibaria, coria, putridaque varia, ceteri cursu se subtrahentes. Fumo Lithantracis occiduntur *Blattæ*, *Gryllique*. *Scop.*

- nivea. 5. *B. alba*, antennis flavis.  
*Habitat in America.*  
*Magnitudo Tabani.*
- africana. 6. *B. cinerea*, thoracis clypeo villoso. *Mus. Lud. Utr.*  
 108. \*  
*Habitat in Africa.*  
*Similis B. aegyptiaca, sed minor & villosa.*
- orientalis. 7. *B. ferrugineo-fusca*, elytris abbreviatis sulco oblongo impresso. *Fn. succ.* 862. \* *Scop. carn.* 313. *Gron. zooph.* 635, 636.  
*Geoffr. parif.* 1. p. 380. t. 7. f. 5. Blatta elytris sulco ovato impressis abdomine brevioribus.  
*Mouff. inf.* 138. f. 2, 3. Blatta molendinaria.  
*Col. ceph.* 1. p. 40. t. 36.  
*Raj. inf.* 68. n. 1.  
*Fonst. inf.* t. 13. f. A.  
*Frisch. inf.* 5. t. 3.  
*Sultz. inf.* t. 7. f. 47.  
*Kalm. itin.* 2. p. 406.  
*Habitat in America. Hospitatur in Oriente: imprimis in farina, Pane &c. hodie in Russia adjacentibus regionibus frequens; incepit nuperis temporibus Holmiae 1739, uti dudum in Finlandia. Consumit Panem, cibaria, calceos &c; lucifuga velocissime ad lucem aufugit.*  
*Femina aptera solis alarum rudimentis, tamquam Larva, parit ovum magnitudine  $\frac{1}{2}$  abdominis, subcylindricum carina crenulata.*
- lapponi- 8. *B. flavesceus*, elytris nigro maculatis. *Fann. suec.*  
 ca. 863. \*  
*Schaff. elem.* t. 26. f. 2.  
*Geoffr. parif.* 381. Blatta elytris ad angulum acutum striatis.  
*Habitat in Lapponia imprimis Casis, consumit Pisces.*
- germani- 9. *B. livida*, corpore flavescente, thorace lineis duabus  
 ca. nigris parallelis.  
*Habitat in Dania. Brunniche.*  
*Corpus flavesceus, magnitudine B. lapponica, Thorax uti elytra magis liventia: lineae 2 thoracis longitudinaliter, parallelae, nigrae, latinsculae.*

oblonga- 10. *B. oblonga livida*, thorace punctis duobus lunulaque  
nigris.

*Habitat in America. Rolander.*

*Oblonga uti Cantharis, pallide testacea s. livida. Antennæ clavatæ, atræ. Pedes valde hirti. Clypeus thoracis orbiculatus, convexus, glaber, lividus, postice lunula nigra, in medio punctis 2 nigris instar oculorum.*

20. **MANTIS.** *Caput* nutans, maxillosum, palpis instructum.

*Antennæ* sericeæ.

*Alæ* 4, membranaceæ, convolutæ: inferiores plicatæ.

*Pedes antici* compressi, subtus serrato-denticulati, armati ungue solitario & digito fetaceo laterali articulado.

*postici* 4, læves, gressorii.

*Thorax* linearis, elongatus, angustatus.

gigas. 1. *M. thorace teretiusculo scabro, elytris brevissimis, pedibus spinosis. Mus. Lud. Ulr. 109. \**

*Raf. inf. 2. gryll. t. 19. f. 9, 10.*

*Bradl. natur. t. 27. f. 6.*

*Pet. gaz. t. 60. f. 2.*

*Marcgr. bras. 251. Arumatia.*

*Habitat in Amboina.*

*Elytra abdomine multoties breviora. Alæ maximæ.*

phyllica, 2. *M. thorace teretiusculo muricato, elytris brevissimis, pedibus inermibus. Mus. Lud. Ulr. 110. \**

*Habitat in Indiis.*

*Elytra brevissima, medio carina gibba, extus s. posteriorius nigra.*

siccifolia. 3. *M. thorace denticulato, femoribus ovatis membranaceis. M. L. U. 111. \**

*Raf. inf. 2. gryll. t. 17. f. 4, 5.*

*Edw.*

*Edw. av. t. 258.*

*Habitat in Indiis.*

*Abdomen ovatum, membranaceo-planum. Elytra vire-scentia, facie foliorum lauri, parallela.*

gongylo- 4. *M. thorace subeiliato, femoribus anticis spina termi-*  
*des. Mus. Lud. Ulr. 112. \* Gron.*  
*zooph. 639. \**

*Amœn. acad. 1. p. 504. Gryllus thorace lineari ala-*  
*rum longitudine: margine denticulis ciliato.*

*Aldr. inf. t. 13. f. 21. Mantis.*

*AÆ. angl. 301. t. 20. f. 3.*

*Marcgr. bras. 246. Gaayara.*

*Rœf. inf. 2. gryll. t. 7. f. 1, 2, 3.*

*Sultz. inf. t. 8. f. 56.*

*Habitat in Africa.*

*Larvæ pedes lobis membranaceis alati. Mus. L. U.*  
*113, modo huius.*

*Capitis vertex in acumen subulatum, membranaceum,*  
*sæpe bifidum desinens. Antennæ vertici acuminato*  
*breviores spina frontis infra antennas, sub cornu*  
*capitis.*

religiosa. 5. *M. thorace lævi subcarinato, elytris viridibus imm-*  
*culatis. Scop. carn. 315.*

*Rœf. inf. 2. gryll. t. 1, 2.*

*Schæff. elem. t. 81.*

*Habitat in Africa. E. Brander. in Austria. Scop.*

*Corpus totum viride. Thorax & elytrorum exterior*  
*margo luteus. Femora antica interius albo punctata.*

oratoria. 6. *M. thorace lævi, elytris viridibus, alis macula nigra*  
*antice rufescentibus. M. L. U. 115. \**

*Mouff. inf. 118. f. 3.*

*Rœf. inf. 2. t. 2. f. 6.*

*Geoffr. paris. t. 8. f. 4.*

*Habitat in Africa. E. Brander. in Europa Franco-*  
*surtum usque; macula magna nigra in medio ale*  
*fusco reticulata.*

irrorata. 7. *M. thorace lævi subcarinato, elytris viridibus: punctis*  
*ferrugineis vagis. Amœn. acad. 6. p. 397. n. 29. \**

*Habitat in Carolina.*

*Similis G. presario. Elytra Alæque abbreviata.*

8. M.



- precaria. 8. M. thorace subciliato, elytris flavis ocello ferrugineo.  
*Mus. Lud. Ulr. 114. \**  
*Merian. sur. t. 66.*  
*Habitat in America, Africa; ane hac Hottentottorum*  
*idolum?*
- carolina. 9. M. thorace subciliato carinato, elytris albidis fusco  
 nebulosis. *Aman. acad. 6. p. 396. n. 28. \**  
*Habitat in Carolina.*  
*Similis G. precario. Elytra Alaeque abdomine breviora.*
- pectini- 10. M. thorace lævi, elytris viridibus, alis oblique stria-  
 cornis. tis, vertice subulato, antennis pectinatis. *Aman. a-*  
*cad. 6. p. 396. n. 27. \**  
*Habitat in China.*  
*Antenna pectinata notabiles.*
- bicornis. 11. M. thorace lævi, capite bipartito subulato. *Mus.*  
*Lud. Ulr. 116. \**  
*Habitat in Indiis.*  
*Caput vertice bipartito, subulato, divaricato. Pedes*  
*inermes.*
- tricolor. 12. M. thorace lateribus expanso-lobato, capite cornuto,  
 pedibus anticis latissimis. *M. L. U. 117. \**  
*Habitat in Indiis.*  
*Oculi in cornicula lateralia auriformia acuminata de-*  
*finiunt.*
- strumaria. 13. G. thorace utrinque membranaceo-dilatato obcordato.  
*Raf. inf. 2. gryll. t. 3.*  
*Merian. surin. 27. t. 27.*  
*Habitat in Indiis.*
- necyda- 14. M. thorace scabro, elytris ovatis angulatis brevissimis,  
 loides. alis elongatis. *Aman. acad. 6. p. 397. n. 32. \**  
*Raf. locust. t. 19.*  
*Habitat Surinami.*  
*Dignoscitur elytris ovatis, brevissimis, viridibus, ex-*  
*tus nigris. Mas longe angustior Thoracis linea dor-*  
*sali bifariam dentata, a Femina crassiore & Thorace*  
*lævi differt.*

221. GRYLLUS. *Caput inflexum, maxillosum, palpis instructum.*

*Antennae setaceae s. filiformes.*

*Ala 4, deflexa, convoluta: inferiores plicatae.*

*Pedes postici saltatorii. Ungues ubique bini.*

\* ACRIDA. *Caput conicum thorace longius. Antennae ensiformes.*

nasutus. 1. G. A. capite conico, antennis ensiformibus, corpore viridi. *Mus. Lud. Ulr.* 118. \*

*Mouff. inf.* 119. *Mantis africana.*

*Raf. inf.* 2. *gryll.* 2. 4.

*Sultz. inf.* 2. 8. f. 57. (*antennis setaceis.*)

surritus. 2. G. A. capite conico, antennis ensiformibus, elytris viridibus, alis hyalinis. *Syst. nat.* 10. p. 427.

*Habitat in Africa: ab Algeria in Cap. b. Spei; inque Sicilia. Cyrill.*

*Hac singularis Capite conico, thorace ipso longiore, apice antennis, basi ore instructo. Antennae etiam admodum diversae a reliquis, quod thorace non longiores, latae, ensiformes, articulae.*

*Antennae in meis ensiformes (in auctorum setaceae), rufa. Caput lineis 4 sanguineis; quarum 2 per oculos; 2 per faciem anticam in a, quae ultima deest in 2. Elytra tota viridia in 2; sed lateribus linea alba interrupta in a.*

brevicornis. 2. G. A. capite prominulo viridis, antennis compressis longitudine thoracis. *Amœn. acad.* 6. p. 398. n. 37. \*

*Habitat in America septentrionali.*

\* \* BULLA. *Thorax carinatus. Antennae thorace breviores, filiformes.*

unicolor. 3. G. B. unicolor, thorace carinato brevissimo, antennis scutello brevioribus. *Mus. Lud. Ulr.* 119. \*

*Habitat in Indiis.*

*Structura sequentis, sed thorax non cristatus. Color flavus aut ruber.*

4. G. B.

- variolo-  
sus. 4. G. B. colloso, punctatus, thoracis carina subtridentata,  
antennis brevibus, fronte verrucosa. *Mus. Lud. Ulr.*  
120. \*  
*Habitat in Indiis.*  
*Corpus virescens. Scutellum carinatum, duplo longius*  
*capite cum thorace. Elytra membranacea. Pedes*  
*postici abdomine ventricoso non longiores,*
- ferrugus. 5. G. B. thorace cymbiformi carinato denticulato, capite  
acuminato, abdomine caeruleo. *Mus. L. U.* 121. \*  
*Gron. zooph. 642. \**  
*Raf. inf. 2. gryll. t. 16. f. 12.*  
*Sultz. inf. t. 8. f. 58.*  
*Habitat ad Cap. b. Spei.*
- carinatus. 6. G. B. thorace cymbiformi laevi, vertice depresso.  
*Mus. Lud. Ulr.* 122. \*  
*Habitat in Indiis.*
- bipuncta-  
tus. 7. G. B. thoracis scutello abdominis longitudine. *Faun.*  
*svec. 864. \* Scop. carn. 316.*  
*Fn. svec. 1. n. 623. Gryllus elytris nullis, thorace*  
*in elytron longitudinale extenso macula utrinque ni-*  
*gra rhombea.*  
*Geoffr. inf. 1. p. 394. Acridium 5.*  
*Habitat in Europa.*  
*Huic & sequenti Elytra nulla.*
- subulatus. 8. G. B. thoracis scutello abdomine longiore. *Fn. svec.*  
865. \*  
*Fn. svec. 624. Gryllus elytris nullis, thorace produ-*  
*cto abdomine longiore.*  
*Geoffr. inf. 1. p. 395. Acridium 6.*  
*Habitat in Europa ad fossas & aquas stagnantes.*
- Lunus. 9. G. B. thoracis segmento posteriore crista semiorbicula-  
ta, elytris nigris: fasciis albis. *Amæn. acad. 6. p.*  
397. n. 30. \*  
*Habitat Surinami.*  
*Crista thoracis e carina compressa.*
- Gryllo-  
talpa. 10. G. A. thorace rotundato, alis caudatis elytro longio-  
ribus, pedibus anticis palmaris tomentosis. *M. L.*  
*U. 123. \* Fn. svec. 866. \* Scop. carn. 317.*  
Y y *Monff.*

Mouff. inf. 104. Gryllotalpa.

Aldr. inf. 571.

Fonst. inf. t. 12, 13.

Raj. inf. 64, 67.

Vellch. becaft. 1. p. 39.

Gæd. inf. 1. t. 76.

Blanck. herb. t. 81. f. 10.

Ræf. inf. 2. gryll. t. 14, 15.

Frisch. inf. 11. t. 5.

Imperat. nat. 921. f. 2.

Sultz. inf. t. 9. f. 59.

Geoffr. parif. 1. p. 387. t. 8. f. 1.

Catesb. car. 1. t. 8.

Habitat in Europæ & Americæ borealis herbosis & cultis, Hortorum hostis. In Java minor. Fimo equino allicitur, porcino pellitur. Scop.

minutus. 11. G. A. thorace rotundato flavescens, alis caudatis, cauda bifeta, tibiis posticis trispinosis.

Habitat in America. Brunnich.

Corpus  $\frac{1}{2}$  pollicis, statura omnino G. domestici, supra pallide flavum, subtus fuscum. Oculi nigri. Thorax rotundatus. Elytra planiuscula, striata. Alæ caudatæ, elytris  $\frac{1}{4}$  longiores. Ensis recurvus, fuscus; supra hunc setæ 2, hirsutæ, ultra enses porrectæ. Femora postica crassa, extus unisulcata. Tibiæ posticæ versus apicem spinis 3 validis. Brunnich.

domesti- 12. G. A. thorace rotundato, alis caudatis elytro longioribus, pedibus simplicibus, corpore glauco. Fr. succ.

868. Scop. carn. 318.

Mouff. inf. 135. Gryllus domesticus.

Raj. inf. 63.

Ræf. inf. 2. gryll. t. 12.

Fonst. inf. t. 12.

Geoffr. inf. 1. p. 389. n. 2.

Hospitatur hodie in Europæ muris domesticis, tota nocte stridens, præsertim instante pluvia; Blattis non cohabitare. Poda; an semper verum? occiditur pilulis ex Arsenico & rad. Danci recentis, Farina Tritici mixtis; foco e Populo; Nymphaeæ lacti incoctæ radicibus. In Guinea sextuplo major, teste Brunnichio.

13. G. A.

- campe- 13. G. A. thorace rotundato, cauda bifeta stylo lineari,  
stris. alis elytro brevioribus, corpore nigro. *Mus. Lud.*  
*Ultr. 124. \* Scop. carn. 319.*  
*Frisch inf. 1. t. 1.*  
*Schaff. elem. 2. 66.*  
*Raf. inf. 2. gryll. t. 13.*  
*Raj. inf. 63. Gryllus campestris.*  
*Habitat in Europa australiore, usque in Cap. b. spei.*  
*Domesticus factus pellit priorem. Scop.*

- umbracu- 14. G. A. niger, elytris apice albis, umbraculo frontis  
latus. deflexo.  
*Habitat in Mauritania. E. Brander.*  
*Facies G. campestris: totus niger, sed Caput magis*  
*ferrugineum. Thorax laevis. Elytra abdomine bre-*  
*visiora, ad apicem lactea. Antennae longitudine cor-*  
*poris. Setae 2 ad caudam corpore paulo breviores.*  
*Singularis est Umbraculo ex membrana obovata, e*  
*fronte ante caput deflexa, magnitudine ipsius capi-*  
*tis, nigra. Femora postica laevia, interiori latere*  
*excavata tegunt abdomen. Tibiae postice bifariam*  
*aculeatae.*

- convolu- 15. G. A. thorace rotundato, corpore nigro nebuloso,  
tus. elytris convolutis albidis. *Aman. acad. 6. p. 399.*  
*n. 38. \**  
*Habitat Surinami.*

\* \* \* \* TETTIGONIA. Cauda ensifera feminis. An-  
tenna setacea.

- citrifoli- 16. G. T. thorace tetragono angulis scabro. *Mus. Lud.*  
us. *Ultr. 125. \* Gron. zooph. 657. \**  
*Raf. inf. 2. gryll. t. 16. f. 1.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Elytra ovato-oblonga, folia lauri pallida referentia.*  
*Folium ambulans veterum non tantum e Cica is folia-*  
*ceis quibuscumque, sed & e G. citrifolio, laurifolio,*  
*siccifolio apparet.*

- laurifoli- 17. G. T. thorace subtetragono laevi trilobo, alis lanceo-  
us. latis elytro obtusiore longioribus. *M. L. U. 126. \**  
*Sloan. jam. 2. p. 201. t. 236. f. 1. Locusta maxi-*  
*ma viridis, alis latissimis.*  
*Marcgr. bras. 246 Tucurubi.*

Y y 2

Habi-

*Habitat in Indiis: Carolina. Garden.*  
*Elytra ovato-oblonga, viridia. Alæ acutiores. Femora subtus subdentata. Tibiæ quadrifariam serrato-spinosæ.*

myrtifoli- 18. G. T. thorace subtetragono lævi, alis deflexis elytro  
us. longioribus, tibiis muticis.

*Habitat Surinami. Rolander.*  
*Antennæ longitudine corporis. Thorax lævis, subtetragonus, postice rotundatus. Elytra ovata, deflexa, viridia, quasi 2 folia, margine superiore magis convexa. Alæ paulo longiores, albide. Pedes inermes. Magnitudo quadruplo minor G. laurifolio.*

conocephalus. 19. G. T. thorace rotundato lævi, elytris oblongis ala  
brevioribus, tibiis muticis, capite conico. *Brunnich.*

*Habitat in Africa.*  
*Corpus viride, magnitudine Gr. domestici. Antennæ longiores. Caput conicum. Thorax rotundatus linea longitudinali fusca, a vertice capitis ad apicem thoracis ducta. Elytra pallide viridia, angusta, abdomine fere longiora. Alæ elytris longiores. Ensis ferrugineus. Pedes virides tibiis muticis. Br.*

elongatus. 20. G. T. thorace subquadrato lævi, elytris alisque corpore  
longioribus. *Mus. Lud. Ulr. 127. \**

*Raf. gryll. t. 18. f. 7?*

*Habitat in India.*

*Elytra sublinearia maculis lunatis fuscescentibus.*

lamellosus. 21. G. T. thorace subquadrato, foliolis ovatis ante femora  
postica. *M. L. U. 128. \**

*Habitat in Indiis.*

*Ad insertionem femorum posticorum foliola duo ovata concava. Corpus primæ magnitudinis.*

ocellatus. 22. G. T. thorace rotundato, alis posticis ocello notatis.  
*Mus. Lud. Ulr. 129. \* Gron. zooph. 649. \**

*Habitat in Indiis.*

*Gryllus primæ magnitudinis. Ocellus magnus in alis, notatus lunulis duabus albis.*

acuminatus. 23. G. T. thorace rotundato, vertice subulato, alis vire-  
scentibus. *M. L. U. 130. \* Gron. zooph. 650. \**

*Sloan. jam. 2. p. 202. t. 236. f. 3.*

*Habi-*

*Habitat in America.*

*Ensis latior quam in reliquis.*

- triops. 24. G. T. thorace rotundato, vertice acuminato subtus puncto oculari nigro, alis viridibus. *Mus. Lnd. Utr.* 131. \*  
*Raf. gryll. t. 16. f. 3?*  
*Habitat in Indiis.*  
*Abdomen breve. Ensis longitudine abdominis.*

- rugosus. 25. G. T. thorace rotundato rugoso cristato, capite acuminato, femoribus posticis subtus repandis. *M. L. U.* 132. \*  
*Habitat in Indiis.*  
*Thorax versus apicem cristâ compressa crenata.*

- coronatus. 26. G. T. thorace spinis erectis coronato, elytris varioso-concavis.  
*Habitat in Indiis. De Geer.*  
*Antennæ corpore triplo longiores, filiformes, luteo griseoque variae. Thorax supra postice cinctus margine valde dentato, antice juxta caput spinâ, in medio 2. Elytra grisea, dispersa punctis magnis, excavatis, fuscis. Alæ nigritantes. Pedes & Femora valde spinosa. Ensis lanceolatus, longus.*

- aquilinus. 27. G. T. thorace rotundato subverrucoso, alis latissimis: nervis quindecim. *M. L. U.* 133. \*  
*Habitat in Indiis.*  
*Corpus primæ magnitudinis. Elytra lanceolata. Alæ omnium latissimæ. Tibiæ quadrifariam spinis bispidæ.*

- melanopterus. 28. G. T. thorace rotundato lævi, elytris abdomine dimidio brevioribus, alis nigris. *M. L. U.* 134. \*  
*Habitat in Indiis.*  
*Elytra longitudine thoracis ovali-oblonga.*

- fastigiatus. 29. G. T. thorace rotundato lævi, elytris ovatis, alis truncatis, spinis tibiarum filiformibus. *Mus. L. U.* 135. \*  
*Habitat in Indiis.*  
*Spinæ tibiarum longiores, quam in reliquis.*

- coriaceus. 30. G. T. thorace rotundato lævi, elytris coriaceis, alis pallidis, antennis longissimis. *M. L. U.* 136. \*

*Habitas in Indiis.*

*Corpus magnum, colore flavo corii. Femora teretia.*

viridiffi- 31. G. T. thorace rotundato, alis viridibus immaculatis,  
mus. antennis setaceis longissimis. *Fa. suec.* 869 \* *Scop.*

*Fa. n. suec.* 866, 2283. *Gryllus brachypterus.*

*Robt. t. i. p. 27.*

*Frisch. inf. 12. t. 2. f. 1.*

*Kuf. inf. 2. gryll. t. 10. 11.*

*Schaff. elem. t. 79.*

*Gr. inf. 2. p. 165. t. 40. List. t. 121. Agrigoneus.*

*Znan. obs. t. 7. f. 7.*

*Geoffr. parisi. p. 397. Locusta 1.*

*Habitat in Europæ arboribus agrisque hordeaceis sub*

*canicula stridit.*

*Corpus totum viride. Thorax non carinatus, sed linea*  
*rufa notatus. Abdomen subtus lineis 2 albiis. En-*  
*sis rectus.*

cinerari- 32. G. T. antennis longissimis, elytris deflexis verticali-  
us. *Amer. acad. 6. p. 397. n. 31. \**

*Habitas in Brasilia.*

verrucci- 33. G. T. thorace subquadrato lævi, alis viridibus fusco  
vovus. maculatis, antennis setaceis longitudine corporis. *Fa.*  
*suec.* 870 \* *Scop. carn.* 321.

*It. wgoth. 253. Gryllus cauda ensifera recta, corpore*  
*subviridi.*

*Blasf. inf. 117. f. 5.*

*Frisch. inf. 12. t. 1. ic. 2. f. 1.*

*Fenst. inf. t. 11. p. 1, 2, 3.*

*Merian. inf. t. 176.*

*Sultz. inf. t. 9. f. 61.*

*Geoffr. parisi. 398. t. 8. f. 3. Locusta 2.*

*Rob. ic. t. 27.*

*Kuf. inf. 2. t. 8.*

*Habitat in Europa.*

*Corpus murino-fuscescens. Sub oculis macula pallida.*

*Thorax rotundatus, lævis, supra planus, postice sub-*  
*carinatus. Alæ murinae, ordine punctorum pallido-*  
*rum obsoleto longitudinali; margine exteriori ad an-*  
*gulum acutum striato. Easis adscendens, arcuatus,*  
*nitidus, glaberrimus, basi flavus.*

34. G. T.



**Pupus.** 34. G. T. aptera, thorace spinoso, femoribus punctatis.  
*Amœn. acad.* 1. p. 322.

*Pet. gaz.* t. 13. f. 7. Locusta-Talpa capensis, pedibus longis.

*Kundm. prompt.* 118. n. A. 184.

*Rœf. inf.* 2. gryll. t. 6. f. 3.

*Habitat in Æthiopia.*

*Habet supra censem duo puncta prominula, quæ indicant affinitatem cum Gryllo-Talpis.*

\*\*\* LOCUSTA. Cauda simplex. Antennæ filiformes.

**Elephas.** 35. G. L. thorace carinato integro, corpore aptero.

*Rœf. inf.* 2. gryll. t. 6. f. 2.

*Habitat in Africa; an Pupa G. succinchi?*

*Reliquis omnibus major & ponderosior. Antennæ filiformes. Corpus totum viride, punctis excavatis adpersum; thoracis dorsum carina elevata integerrima. Femora mutica. Rudimenta alarum duo, nec quatuor in Pupis Gryllorum.*

**succin-** 36. G. L. thoracis carina margineque postico elytrorum-  
**chus.** que margine dorsali flavis. *Amœn. acad.* 6. p. 398.  
n. 36.

*Habitat in Java, Carolina.*

*Antennæ filiformes, luteæ. Thorax lateribus exaratus lineis 3 transversis. Pectus antice lacuna transversa, postice poris duobus. Inter pedes primores mucro perpendicularis, obtusus. Tibiæ posticæ late-re postico spinis luteis apice atris. Femora postica 6-gona. Javanus duplo major, Thoracis margine postico etiam sulphureo, quod non in carolino.*

**cristatus.** 37. G. L. thorace cristato: carina quadrifida. *Mus. L.*  
*Ulr.* 137. \* *Gron. zooph.* 658.

*Amœn. acad.* 1. p. 21. t. 17. f. 4. Gryllus crista thoracis quadrifida.

*Olear. mus.* t. 17. f. 5. Gryllus ex Ægypto.

*Frisch. inf.* 9. t. 1. f. 1.

*Rœf. inf.* 2. gryll. t. 5.

*Edw. av.* t. 322.

*Hasselt. iter.* 413. Gryllus arabicus.

*Habitat in America, Arabia, Asia.*

*Hic Arabicus esculentus est. Aët. Stockh.* 1752.

*Thoracis carina in 4 s. 5 lobos transversim dissecta.*

morbillo- 38. G. L. thorace quadrato rubro verrucoso, elytris fus-  
sus. scis albo punctatis, alis rufis. *Mus. Lud. U.* 141. \*

*Gran. zooph.* 179. n. 662.

*Raf. inf.* 2. gryll. t. 18. f. 6.

*Habitat ad Cap. b. spei. D. Talbagh.*

miliaris. 39. G. L. thorace subquadrato dentato verrucoso, elytris  
panctis callosis. *Mus. Lud. Ultr.* 142. \*

*Habitat in America.*

hemato- 40. G. L. thorace subcarinato scabro, capite obtuso, fe-  
pus. moribus piloso-ciliatis. *M. L. U.* 143. \*

*Habitat in Indiis.*

*Femora postica angulo utrinque pilis longis ciliata.*

migrato- 41. G. L. thorace subcarinato: segmento unico, capite  
rius. obtuso, maxillis atris. *M. L. U.* 140. \* *Fn. succ.*

871. *Scop. carn.* 323.

*Frisk. inf.* 9. t. 1. f. 8. *Gryllus migratorius.*

*Raf. inf.* 2. gryll. t. 24.

*Edw. an.* 208. t. 208.

*Habitat in Arabia, inde Europam variis annis adit,  
exceat omne vegetans; vide Rappolt, Rambles,  
Kundman.*

42. G. L. thorace subcarinato: segmentis tribus, capite  
rotundato, maxillis concoloribus. *Mus. Lud. Ultr.*

*Habitat in Arabia, Africa.*

*Ala casta rubra a priori manifeste distinctus.*

variegatus 43. G. L. thorace lineato flavo: elytris viridibus, alis  
cæruleis. *M. L. U.* 144. \*

*Habitat in America.*

*Frons rubra characteribus atris.*

cærule- 44. G. L. thorace subcarinato, alis virescenti-cæruleis:  
scens. fascia nigra. *M. L. U.* 145. \*

*Scop. carn.* 325.

*Raf. inf.* 2. gryll. t. 21. f. 4.

*Frisk. inf.* 9. t. 1. f. 3.

*Sultz. inf.* t. 9. f. 60.

*Geoffr.*

*Grylli Larvæ pleræque habitant sub terra, pupæ etiam exterrant & cum parenti-  
bus plantas vorant, dum mater fridenti musca sonant.*

*Geoffr. parif.* 392. *Acridium* 2.

*Habitat in Meridionalibus.*

45. *G. L.* thorace lineis quatuor flavis, alis cæruleis, elytris viridibus. *Mus. Lud. Ulr.* 146. \*

*Habitat Surinami.*

46. *G. L.* thorace subcarinato, alis rubris: apice hyalinis.

*M. L. U.* 147. \* *Scop. carn.* 327.

*Raf. inf.* 2. *gryll.* 2. 21. f. 6.

*Habitat in Europa australi; Cap. b. spei. D. Tulbagh.*

47. *G. L.* thorace subcarinato, alis rubris extimo nigris nebulosis. *Fann. fec.* 872. \* *Scop. carn.* 326.

*It. æl.* 158. *Gryllus* elytris nebulosis, alis rubris extimo nigris.

*Friseh. inf.* 9. 1. f. 2.

*Raf. inf.* 2. *gryll.* 2. 21. f. 1.

*Schæff. clem.* 2. 15.

*Uddm. diff.* 50.

*Geoffr. parif.* 1. p. 393. 2. 8. f. 4. *Acridium* 4.

*Habitat in Europa, tota die; in seram noctem stridens S.*

48. *G. L.* thorace latiusculo, elytris pallidis nigro maculatis, alis latere tenuiore cærulescentibus.

*Habitat in Europæ rapeseibus; in Suecia. Marks. v. Wartenberg.*

Corpus medium, triste. Elytra hyalina, nigro-reticulata, adpersa confuse maculis nigris. Alæ colore cæruleo (absque fascia nigra) ad latus tenuius.

49. *G. L.* thorace subcarinato, alis nigris margine postico flavis.

*Catesb. car.* 2. p. 89. 2. 89. *Locustella carolina*, elytris fuscis, alis inferioribus nigris ad extremitates luteis.

*Habitat in America.*

50. *G. L.* thorace subcarinato, alis disco rubro fascia nigra, apice hyalinis. *M. L. U.*

*Habitat in Africa; Cap. b. spei.*

51. *G. L.* thorace carinato, antennis clavatis, tibiis anticis ovato-clavatis crassiss. †

Y y 5

Ha-

*Roes. inf. (22) gryll. 189. t. 30. v. 1. p. 1. (22) (22) (22)*  
*Suttr. inf. t. 100. p. 62. (22) (22) (22)*  
*Habitat in China.*

phospho- 4. F. fronte rostrata subulata adscendente, corpore griseo  
 rea. glauco. *Habitat in America. Rolander.*

noctivida. 5. F. fronte rostrata acuminata adscendente, corpore vi-  
 ridi, alis hyalinis. *Habitat in America. Rolander.*

lucerna- 6. F. fronte rostrata prominente, corpore supra viride-  
 ria. scente, subtus flavo. *Habitat in America. Rolander.*

flammea. 7. F. fronte rostrata adscendente tereti truncata. *Amen.*  
*acad. 6. p. 399. n. 39.*  
*Habitat in America.*  
*Ala inferiores fusca.*

truncata. 8. F. fronte obtusiuscula, alis truncatis viridibus.  
*Amen. acad. 6. p. 399. n. 40. \* Cicada truncata.*  
*Habitat in Java; in America. Brunniche.*  
*Ala deflexa, compressa, postice latiores, truncata.*

europæa. 9. F. fronte conica, corpore viridi, alis hyalinis reticu-  
 latis, plantis rufis.  
*Habitat in Europa australi. D. Gouan.*  
*Magnitudo Cicada spumantis. Caput & Thorax li-  
 neis 3 elevatis. Subtus vera 55 Tibia postica serrata.*

222. CICADA. Rostrum inflexum.  
*Antenna setacea.*  
*Ala IV, membranacea, deflexa.*  
*Pedes (plerisque) saltatorii.*

\* FOLIACEÆ. Thorace compresso-membranaceo, cor-  
 pore majore.  
 rhombica. 1. C. foliacea, folio rhombico postice latiore. *Balker.*  
*af. angl. 1765. p. 55. t. 6.*

Ha-

Cicade, quotquot novimus, frident uti Grylli.

*Habitat in Jamaica.*

*Major reliquis hujus phalangis. Thoracis folium rhombicum; brunnescens, margine subrepando, disco maculis 2, obsoletis, subdiaphanis.*

- foliata. 2. *C. foliacea rotundata nigra arcu albo. S. N. Gron. zooph. 677.*

*Morian. sur. t. 5. f. ult.*

*Habitat in India. De Geer.*

*Thorax e folio perpendiculari, semicordato, atro, antice rotundato, utrinque, in altero sexu, arcu albo, in altero vero antice linea alba, postice arcu albo. Postice subtus corpus Elytris 2 nigris Alisque 2 albis. Pedes anteriores extimo articulo gibbosi.*

- fronditia. 3. *C. foliacea dorso repando: rostro obtusissimo. S. N. Gron. zooph. 676.\**

*Habitat in America. Rolander.*

*Thorax e folio perpendiculari griseo margine superiore repando, antice producto in rostrum subtruncatum; postice angustatum, longitudine corporis, deorsum acutum. Elytra obovata, concoloria. Alæ hyalinae. Pedes breves.*

- squarnigera. 4. *C. foliacea antice posticeque rostrata acuta.*

*Habitat in America. Rolander.*

*Simillima priori, sed minor, livido-grisea. Thorax antice adscendens in rostrum acutiusculum, postice acute descendens. An prioris Mas?*

\* \* *CRUCIATE Thorace utrinque cornuto.*

- Crux. 5. *C. thorace cruciformi corpus totum tegente. Mus. Lzd. Utr. 154.\**

*Habitat in Indiis.*

*Thorax forma crucis: brachiis expansis compressis; columna postica longitudine abdominis, latior, subcarinata.*

- cornuta. 6. *C. thorace bicorni postice subulato longitudine abdominis, alis nudis. Fn. suec. 879.\* Scop. carn. 435. Pet. gaz. t. 47. f. 2, 3. Ranatra cornuta.*

*Schreb. inf. 7. f. 3, 4.*

*Sultz. inf. t. 10. f. 63.*

*Geoffr. paris. 423. t. 9. f. 2. n. 18.*

*Habitat in Carduis, Salicibus.*

7. *C.*

*Habitat in Sibiria. Er. Laxman.*

Corpus griseo-nebulosum, longitudine 8 f. 9 lin. longum. Alæ hyalinae. Femora postica grisea nigroque maculata, subtus flava. Antennæ cinereo-nebulosae.

flavus. 52. G. L. thorace subcarinato, alis disco flavo fascia nigra apice hyalinis. *Mus. Lud. Utr. 149.*  
*Pet. gaz. 6. t. 3. f. 6.*

*Habitat in Africa: Cap. b. spes.*

apricarius. 53. G. L. thorace cruciato, antennis longitudine corporis. *Faun. suec. 873. \* It. xl. 152.*  
*Habitat in Europæ campis siccissimis.*

viridulus. 54. G. L. thorace cruciato, corpore supra viridi, elytrorum margine albido. *Fa. suec. 874. \**  
*It. wgoth. 276.* Gryllus capite thorace elytrisque superne viridibus.  
*Habitat in Europa.*

biguttulus. 55. G. L. thorace cruciato, elytris nebulosis puncto oblongo albo versus apices. *Fa. suec. 875. \**  
*Habitat in Europa.*

rufus. 56. G. L. thorace cruciato, corpore rufo, elytris griseis, antennis subclavatis acutis. *Fa. suec. 876. \* Scop. carn. 329.*  
*Habitat in Europa.*

danicus. 57. G. L. thorace subcarinato, femoribusque virescentibus, tibiis posticis sanguineis.  
*Habitat in Dania. D. Brunniche.*  
*Magnitudo G. verrucivori. Antennæ compressæ, vix thorace longiores. Caput subvirescens. Thorax viridis, obsolete carinatus. Alis complicatis dorsum testaceum, at latera elytrorum pallida, fusco-nebulosa. Alæ pallide. Femora postica viridia Tibiis sanguineis.*

grossus. 58. G. L. femoribus sanguineis; elytris virescenti-subrufis, antennis cylindricis. *Fa. suec. 877. \**  
*Friseb. inf. 2. p. 5. t. 4.*  
*Habitat in Europa.*

59. G. L.

spinulo- 59. G. L. thorace spinis muricato cinctoque, corpore  
lus. aptero. *Amæn. acad.* 6. p. 398. n. 35. \*

*Edw. av.* 2. p. 161. t. 285. f. 3, 4, 5.

*Habitat in Indiis.*

pedestris. 60. G. L. corpore livido incarnato aptero. *Fann. suec.*  
878. \*

*Habitat in Europa.*

*Copula connexa individua vidi, ideoque declarata est  
perfecta.*

perspicil- 61. G. L. alarum rudimentis oculo atro, oculis aureis  
latus. *Amæn. acad.* 6. p. 398. n. 34. \*

*Habitat in Indiis.*

*An hæc species aptera vel larva, non dum consistit.*

222. FULGORA. Caput fronte producta, mani.

*Antennæ* infra oculos: articulis  
2; exteriore globoso majore.

*Rostrum* inflexum.

*Pedes* gressorii.

Laterna- 1. F. fronte ovali recta, alis lividis: posticis ocellatis.  
ria. *Mus. Lud. Utr.* 152. \* *Gron. zooph.* 668.

*Grew. mus.* 158. t. 13. *Cucujus peruvianus.*

*Merian. sum.* 1. 49. *Laternaria.*

*Reaum. inf.* 5. t. 20. f. 6, 7.

*Raf. inf.* 2. *gryll.* t. 28, 29.

*Habitat in America calidiore.*

*Prominente fronte noctu lucem vivacissimam spargit.*

diadema. 2. F. fronte rostrata muricata, apice trifido, alis nigris  
rubro maculatis. *Brunnich.*

*Seb. mus.* 4. t. 77. f. 7.

*Habitat in India.*

*Corpus L. candelariam superat.*

Candela- 3. F. fronte rostrata subulata adscendente, elytris viridi-  
ria. bus luteo maculatis, alis flavis: apice nigris. *Mus.*

*L. U.* 153. \*

*At. stockb.* 1746. p. 63. t. 1. f. 5, 6.

*Edw. av.* t. 120.

*Raf.*

*Rostrum inflexum gryll. 189. t. 30. f. 62. coloris  
Sed et inf. t. 100 f. 62.  
Habitat in China.*

phospho- 4. F. fronte rostrata subulata adscendente, corpore griseo  
real. glauco.  
*Habitat in America. Rolander.*

noctivida. 5. F. fronte rostrata acuminata adscendente, corpore vi-  
ridi, alis hyalinis.  
*Habitat in America. Rolander.*

lucerna- 6. F. fronte rostrata prominente, corpore supra viride-  
ria. scente, subtus flavo.  
*Habitat in America. Rolander.*

flammea. 7. F. fronte rostrata adscendente tereti truncata. *Amen.  
acad. 6. p. 399. n. 39.*  
*Habitat in America.*  
*Ala inferiores fuscae.*

truncata. 8. F. fronte obtusiuscula, alis truncatis viridibus.  
*Amen. acad. 6. p. 399. n. 40. \* Cicada truncata.*  
*Habitat in Java; in America. Brunniche.*  
*Ala deflexa, compressa, postice latiores, truncata.*

europæa. 9. F. fronte conica, corpore viridi, alis hyalinis reticu-  
latis, plantis rufis.  
*Habitat in Europa australi. D. Gouan.*  
*Magnitudo Cicada spumantis. Caput & Thorax li-  
neis 3 elevatis. Subtus vera s. Tibia postica serrata.*

222. CICADA. *Rostrum inflexum.*  
*Antennae setaceae.*  
*Ala IV, membranaceae, deflexae.*  
*Pedes (plerisque) saltatorii.*

\* FOLIACEAE. *Thorace compresso-membranaceo, cor-  
pore majore.*  
thimbea. 1. C. foliacea, folio rhombico postice latiore. *Backer.  
af. angl. 1765. p. 55. t. 6.*

Ha-

Cicade, quotquot novimus, frident uti Grylli.



*Habitat in Jamaica.*

Major reliquis hujus phalangis. Thoracis folium rhombicum, brunnescent, margine subrepando, disco maculis 2, obsoletis, subdiaphanis.

foliata. 2. *C. foliacea* rotundata nigra arcu albo. S. N. Gron. zooph. 677.

*Morian. sur. t. 5. f. ult.*

*Habitat in India. De Geer.*

Thorax e folio perpendiculari, semicordato, atro, antice rotundato, utrinque, in altero sexu, arcu albo, in altero vero antice linea alba, postice arcu albo. Postice subitum corpus Elytris 2 nigris Alisque 2 albis. Pedes anteriores extimo articulo gibbosi.

fronditia. 3. *C. foliacea* dorso repando: rostro obtusissimo. S. N. Gron. zooph. 676. \*

*Habitat in America. Rolander.*

Thorax e folio perpendiculari griseo margine superiore repando, antice producto in rostrum subtruncatum; postice angustatum, longitudine corporis, deorsum acutum. Elytra obovata, concoloria. Alæ hyalinae. Pedes breves.

squamigera. 4. *C. foliacea* antice posticeque rostrata acuta.

*Habitat in America. Rolander.*

Simillima priori, sed minor, livido-grisea. Thorax antice ascendens in rostrum acutiusculum, postice acute descendens. An prioris Mas?

\* \* CRUCIATÆ Thorace utrinque cornuto.

Crux. 5. *C. thorace* cruciformi corpus totum tegente. Mus. Lzd. Utr. 154. \*

*Habitat in Indiis.*

Thorax forma crucis: brachiis expansis compressis; columna postica longitudine abdominis, latior, subcarinata.

cornuta. 6. *C. thorace* bicorni postice subulato longitudine abdominis, alis nudis. Fn. suec. 879. \* Scop. carn. 435.

Pet. gaz. t. 47. f. 2, 3. Ranatra cornuta.

Schreb. inf. 7. f. 3, 4.

Sultz. inf. t. 10. f. 63.

Geoffr. paris. 423. t. 9. f. 2. n. 18.

*Habitat in Carduis, Salicibus.*

7. *C.*

aurita. 7. *C. thorace biaurito, capitis clypeo antrorsum dilatato rotundato.*

*Schreb. inf. 8. f. 1, 2. Cicada cristata thorace bicornicorniculis subrotundis.*

*Geoffr. parif. 1 p. 422. t. 9. f. 1. n. 17.*

*Habitat in Germania. P. Forskâhl.*

*Magnitudo Tabani, tota cinerea. Thorax a tergo gerit cornua duo, compressa, erectiuscula, rotundata, at clypeus capiti impositus antrorsum dilatatus, rotundatus, supra rugosus, fere membranaceus. Alæ 4, deflexæ.*

\* \* \* MANNIFERÆ, non saltantes.

ciliaris. 8. *C. alis posticis ferrugineo-fuscis: vittis longitudinalibus luteis, abdominis segmentis ciliatis. Mus. Lud. Ulr. 155. \**

*Rumph. amb. 3. p. 210. t. 135? Folium ambulans.*

*Habitat in Indiis.*

4-fasciata. 9. *C. flava, fasciis quatuor fuscis.*

*Habitat in America. Rolander.*

bifasciata. 10. *C. fusca, fasciis alarum binis albis. Fn. succ. 898. \* Faun. succ. 1. n. 633.*

*Habitat in Svecia.*

fornicata. 11. *C. thorace virescente, abdomine fornicato. M. L. U. 156. \**

*Habitat in Indiis.*

*Latere abdominis margine dilatata, ut abdomen duplo latius conspiciatur, quam est.*

stridula. 12. *C. elytris margine dilatato, punctis septem albis. M. L. U. 157. \**

*Habitat in Indiis.*

capensis. 13. *C. alis inferioribus limbo postico fuscescente palmato-picto. Mus. Lud. Ulr. 158*

*Pet. gaz. 7. t. 4. f. 1. Cicada capensis variegata, marginibus transperantibus.*

*Habitat ad Cap. b. Spei. D. Tulbagh.*

14. *C.*

*C. Mannifera Larvæ, Tettigometre veteribus, per annum sedant & latent sub terra. Declarantur masculæ lamellis 2 abdomen subitus obregentibus sonura in arbutis strident, mutasque ad venerem feminas provocant.*

- hemato- 14. *C. nigra immaculata*, abdominis incisuris sanguineis.  
des. *Scop. carn.* 347.  
*Pet. gaz. t.* 15. f. 7.  
*Gran. zooph.* 675. \*  
*Habitat in* Barbaria & *Europa australi.* Brander.  
*Corpus medium, gibbosum. Thorax immaculatus. Al-*  
*lae hyalinae: lunula magna versus posteriora marginis*  
*exterioris. Abdomen supra nigrum, incisuris mar-*  
*gine coccineis; subtus testaceum. Femora testacea,*  
*nigro striata; antica crassa; subtus aculeis tribus.*
- plebeja. 15. *C. scutelli apice bidentato, elytris anastomosibus qua-*  
*tuor, lineisque sex ferrugineis.* *Scop. carn.* 345.  
*Mouff. inf.* 127.  
*Aldr. inf.* 307.  
*Matth. dios.* 264.  
*Habitat in* Italia, Africa.  
*Maxima; Scutelli basis notata maculis 2, ovatis, ni-*  
*gris. Alae superiores in disco notatae anastomosibus*  
*quatuor ferrugineis, oblique transversis, & secun-*  
*dum nervos postice lineis 6, ferrugineis e nervo*  
*dilatato.*  
*Et cantu querulae rumpent arbusa Cicadae.* Virg.
- Orni. 16. *C. elytris intra marginem tenuiorem punctis sex con-*  
*catenatis, anastomosibusque interioribus fuscis.* *Scop.*  
*carn.* 346. \*  
*Reaum. inf. 5. t. 5. f.* 16, 17, 18, 19.  
*Sultz. inf. t.* 10. f. 65.  
*Habitat in* Italia, Apulia &c.  
*Sole sub ardenti resonant arbusa Cicadis.* Virg.
- repanda. 17. *C. elytris linea flexuosa, alis margine hyalino.* *Musf.*  
*Lud. Ulr.* 159. \*  
*Habitat in* Indiis.
- reticulata. 18. *C. grisea, thoracis linea alba, elytris albo reticulatis.*  
*Habitat in* America. Rolander.
- Tibicen. 19. *C. elytris anastomosibus ferrugineis, scutelli apice e-*  
*marginato.* *M. L. U.* 160. \*  
*Musf. Ad. Fr.* 1. p. 84.  
*Merian. surin. t.* 49. Tibicen.  
*Brown. jam.* 436. t. 43. f. 15. Panorpa.

*Macgr.*

*Merogr. bras.* 176. Gverucu Erejmenbi.  
*Habitat in America.*

septende- 20. *C. nigro-virescens*, elytris margine flavescente, capi-  
 cim. te utrinque octo-striato.

*Collins. act. angl.* 1765. p. 6. s. t. 8.

*Kalm. act. stockb.* 1756. p. 101. Cicada maxilla utra-  
 que lineis octo transversis concavis, alarum margine  
 inferiore lutescente.

*Habitat in America boreali.*

violacea. 21. *C. violacea*, alis apice fuscis. *Mus. Lud. Ulr.* 162. \*

*Geoffr. inf.* 1. p. 415. n. 1.

*Habitat in Meridionalibus calidis.*

*Femora antica dentibus tribus armata.*

\* \* \* \* *RANATRÆ, saltatoria.*

sanguino- 22. *C. atra*, elytris maculis duabus fasciæque sanguineis.  
 lenta. *Scop. carn.* 330. Cicada sanguinolenta.

*Geoffr. paris.* 1. p. 418. t. 8. f. 5. Cicada nigra.

*Habitat* Dresdæ, Heissius; Pariliis, Geoffroa; Monspeliis,  
 Gouan; in Italia, Scopoli.

*Corpus atrum. Elytra atra: fascia rubra ad basin &*  
*apicem cum intersecto puncto sanguineis. Abdomen*  
*sanguineum nigro maculatum & punctatum. Pedes*  
*nigro rubroque varii.*

coleop- 23. *C. elytris totis coriaceis alas tegentibus. Faun. suec.*  
 trata. 880. \*

*Habitat in Europa.*

*Elytra livida fascia subrhombica fusca.*

spumaria. 24. *C. fusca*, elytris maculis binis albis lateralibus: fascia  
 duplici interrupta albida. *Faun. suec.* 881. \* *Scop.*  
*carn.* 331.

*De Geer Act. stockb.* 1741. p. 221. t. 7.

*Swamm. quart.* p. 83.

*bibl.* 1. p. 215.

*Raj. inf.* 67.

*Merian. inf.* 77. t. 51.

*Pet. gaz.* t. 61. f. 9.

*Sultz.*

Cicadae Ranatræ Larvæ ramis insidentes ano evacuant numerosas vesiculas, ne lo-  
 tegant intra spumam.

*Sultz. inf. 2. 10. f. 64.*

*Geoffr. paris. 1. p. 415. n. 2.*

*Aët. par. 1705. p. 162.*

*Röf. inf. 2. gryll. 139. t. 23.*

*Frisch. inf. 8. p. 26. t. 12.*

*Schaff. elem. t. 42.*

*Blank. inf. 27. t. 11. f. N. O. P.*

*Habitat in Europæ Plantis variis; frequens in Salice  
viminali, latitans intra spumam.*

nervosa. 25. *C. fusca, alis hyalinis fusco maculatis: nervis punctatis. Fn. suec. 882. \* Scop. carn. 341.*

*Geoffr. paris. 1. p. 415. n. 1.*

*Habitat in Europa.*

leucophthalma. 26. *C. nigra, oculis albis. Fn. suec. 883. \**

*Habitat in Europa.*

albifrons. 27. *C. nigra, fronte alba. Fn. suec. 884. \**

*Habitat in Europa.*

leucoccephala. 28. *C. nigra, capite albo. Fn. suec. 885. \**

*Geoffr. paris. 1. p. 421. n. 13.*

*Habitat in Europa.*

lateralis. 29. *C. nigra, elytris latere albis. Fn. suec. 886. \**

*Raj. inf. 68. n. 2.*

*Geoffr. paris. 1. p. 416. n. 3.*

*Habitat in Europæ pratis.*

striata. 30. *C. elytris albido nigroque ad angulum acutum sutura dorsalis striatis. Fn. suec. 887. \**

*Raj. inf. 68. n. 1.*

*Geoffr. paris. 1. p. 424. n. 20.*

*Habitat in Europa.*

lineata. 31. *C. exalbida: linea utrinque longitudinali nigra. Fn. suec. 888. \**

*Habitat in Europa.*

Populi. 32. *C. subtus flavescens, fronte punctis duobus nigris, alis hyalinis. Fn. suec. 890. \**

*Habitat in Populo tremula.*

flavicolis. 33. *C. fusca, capite thoraceque flavis. Fn. suec. 891. \**

*Habitat in Europa.*

Z z

34. C.

114 INSECTA HEMIPTERA. Cicada. Deflexa.

- flava. 34. *C. flava unicolor.* Gron. *zooth.* 681.  
*Habitat in Europa.*
- interrupta. 35. *C. elytris flavis, linea nigra duplici interrupta longitudinali.* Faun. *svec.* 889. \*  
*Pet. gaz. t. 61. f. 10.*  
*Geoffr. parisi. 1. p. 419. n. 9.*  
*Habitat in Europa.*
- vittata. 36. *C. flava: vitta nigra longitudinali duplici repandentata.* Fn. *svec.* 893. \*  
*Habitat in Europa.*
- Lanio. 37. *C. viridis, capite thoraceque carnis.* Fn. *svec.* 892. \*  
*Habitat in Europa.*
- aptera. 38. *C. aptera atra, elytris abbreviatis, tibiis antennisque pallidis.* Fn. *svec.* 894. \*  
*Habitat in Sudermannia ad Akeröam.*  
*Magnitudo Pulicis.*

\* \* \* \* \* DEFLEXÆ. *Alis deflexis latera obvolvuntibus.*

- marginata. 39. *C. flava, elytris deflexis nigris: linea laterali alba.* Brunnich.  
*Habitat in America. Brunniche.*  
*Corpus magnitudine C. lateralis, flavum. Frons obtusa, levis. Oculi nigri. Elytra satis magna, truncata, fusca, linea laterali longitudinali alba, intra marginem exteriorem, ante apicem finita. Alæ inferiores pallidiores.*
- Phalænoi-des. 40. *C. exalbida, alis deflexis patulis: elytris antice fusco punctatis.*  
*Habitat in America. De Geer.*  
*Similis Hemerobio Perla. Corpus flavescens. Alæ albidæ, deflexæ ut in Phalæna, glabræ: exteriores antice versus marginem utrumque irroratæ punctis nigris sparsis. Inferiores alæ nivæ.*
- bipunctata. 41. *C. exalbida, elytris deflexis griseis, thoracis margine antico punctis duobus impressis.* Brunnich.  
*Habitat in America. Brunniche.*  
*Corpus magnitudine C. cornuta, flavescens. Frons levis. Thoracis margo anticus punctis 2 impressis.*  
*Alæ*

*Alæ cruciatæ, cinereo-albidæ, elytris minores. Elytra deflexa grisea, margine laterali transversim, postico longitudinaliter striato: striis punctatis.*

- lanata. 42. C. alis deflexis nigris: punctis cæruleis, fronte lateribusque rubris, ano lanato. *Mus. Lud. Ulr. 163. \**  
*Habitat in Indiis.*  
*Corpus nigricans. Abdomen postice lana densissima, mollissima.*
- leporina. 43. C. alis deflexis exalbidis: antice anastomosibus pallidis supra lineolam nigricantem, ano lanato. *Faun. suec. 895. \**  
*Habitat in Europa.*
- cunicularia. 44. C. alis deflexis hyalinis striga fascia punctisque fuscis, ano lanato.  
*Habitat - - - -*  
*Frons ovata, tricarinata, ferruginea, desinens in rostrum. Corpus magnitudine Muscæ domesticæ. Alæ hyalinæ venis exasperatis albo fuscisque punctatis & fascia fusca versus apicem; striga fusca in medio; puncta nonnulla sparsa fusca.*
- rubra. 45. C. rubra, alis deflexis fuscis: fasciis duabus flavis.  
*Habitat in America. Rolander.*  
*Alæ inferiores hyalinæ, immaculatæ.*
- viridis. 46. C. elytris viridibus, capite flavo punctis nigris. *Fn. suec. 896. Geoffr. parif. 1. p. 417. n. 5.*  
*Pet. gaz. 73. t. 76. f. 6. Ranatra viridescens.*  
*Raj. ins. 68. n. 3. Locusta-pulex tertia.*  
*Habitat in Europa.*
- flava. 47. C. flava compressa. *Fn. suec. 897. \**  
*Habitat in Europa.*
- aurata. 48. C. flava, elytris fulvo pictis: maculis quatuor nigris posticeque auratis. *Fn. suec. 899. \**  
*Habitat in Europa.*
- Ulmi. 49. C. alis viridi-luteis: apicibus nigricantibus inauratis.  
*Fn. suec. 900. \* Geoffr. parif. 1. p. 427. n. 27.*  
*Habitat in Ulmo.*

- Rosæ. 50. *C. flava*, alis albis apice membranaceis. *Faun. suec.* 902. \* *Geoffr. paris.* 1. p. 428. n. 28.  
*Frisch. inf.* 11. p. 13. t. 20.  
*Reaum. inf.* 5. t. 20. f. 10-14.  
*Habitat in Rosæ foliis.*

- Coryli. 51. *C. alis fuscis convolutis: fascia albida pone maculam cordatam cærulecentem.* *Fn. suec.* 901. \*  
*Habitat in Corylo.*

## 224. NOTONECTA. *Rostrum* inflexum.

*Antennæ* thorace breviores.

*Alæ* IV, cruciato-complicatae, antice coriaceæ.

*Pedes* posteriores pilosi, natorii.

- glaucæ. 1. *N. grisea*, clytris griseis margine fusco punctatis apice bifidis. *Fn. suec.* 903. \* *Scop. carn.* 348.  
*Frisch. inf.* 6. p. 28. t. 13.  
*Pet. gaz.* t. 72. f. 5.  
*Bradt. nat.* t. 26. f. 2. E.  
*Rosf. inf. app.* 1. p. 165. t. 27.  
*Hæff. inf.* t. 12. f. 19.  
*Raj. inf.* 58. *Notonectæ* 1. mouffetti similis.  
*Sultz. inf.* t. 10. f. 67.  
*Poda inf.* t. 1. f. 5.  
*Geoffr. paris.* 476. t. 9. f. 6. n. 1.  
*Schaff. elem.* t. 90.  
*Habitat in Europæ aquis.*  
*Scutellum atrum.*

- striata. 2. *N. clytris pallidis; lineolis transversis undulatis striatis.* *Fn. suec.* 904. \* *Scop. carn.* 349.  
*Pet. gaz.* t. 72. f. 7. *Notonectæ vulgaris compressa fusca.*  
*Rosf. inf. app.* 1. p. 177. t. 29.  
*Joblot. micr.* 1. pp. 1. t. 7. f. 2, 3.  
*Geoffr. paris.* 478. t. 9. f. 7. *Corixa.*  
*Schaff. elem.* t. 50.

*Habi-*

---

*Notonectæ sub aquis degunt.*



*Habitat in Europæ aquis.*

*Digiti antici utrinque ciliati. Scutellum nullum.*

minutissi- 3. *N. elytris cinereis: maculis fuscis longitudinalibus.*  
ma.

*Faun. suec. 905. \**

*Fa. suec. 1. n. 690. Not. arenulæ magnitudinis.*

*Geoffr. parif. 478. n. 2.*

*Habitat in Europæ aquis.*

*Habet alas, Elytra, scutellum.*

225. NEPA. *Rostrum inflexum.*

*Antennæ - - - -*

*Alæ IV, cruciato-complicatæ: antice coriaceæ.*

*Pedes anteriores cheliformes: reliqui 4 ambulatorii.*

grandis. 1. *N. testacea, scutello lævi, alis albis maculis venisque flavis. Mus. Lud. Utr. 164. \**

*Marcgr. bras. 258: f. 259. Insectum magnitudinæ brulci.*

*Merian. surin. t. 56.*

*Raf. inf. 3. t. 26.*

*Gron. zooph. 685.*

*Habitat in America.*

*Antennæ palmatæ, 4-fidæ. Pedes anteriores digiti lineis 2 s. 3 obliquis insculptis.*

rubra. 2. *N. fusca, abdomine supra alarumque nervis rubris.*  
*M. L. U. 165. \**

*Habitat in Calidis regionibus.*

fusca. 3. *N. fusca, scutello rugoso, alis niveis. Mus. L. U. 166. \**

*Habitat in Calidis regionibus.*

atra. 4. *N. atra, thorace inæquali, corpore oblongo.*

*Habitat in Africa. Brander.*

*Simillimus insequenti, sed duplo major; duplo longior & tota atra.*

Z z 3

5. N.

*Nepæ pleraque sub aquis vitam agunt.*

*cinerea*. 5. *N. cinerea*, thorace inæquali, corpore oblongo-ovato. *Fn. suec.* 906. *Scop. carn.* 350.

*Faun. suec.* 1. n. 691. *Nepa* abdominis margine integro.

*Mouff. inf.* 321. *Scorpio palustris*.

*Fonst. inf.* 27. f. 1, 2. & t. 28. f. ad verb. *stell.*

*Pet. gaz.* t. 74. f. 4.

*Bradl. nat.* t. 26. f. 2. C.

*Swamm. bibl.* 1. t. 3. f. 4.

*Ræf. inf. app.* 1. p. 136. t. 22. f. 6, 7, 8.

*Bruh. ballon.* 212. f. 2. *Araneus aquaticus*.

*Hoffm. pict.* t. 11. f. 2.

*Frisch. inf.* 6. t. 15.

*Sultz. inf.* t. 10. f. 68.

*Geoffr. paris.* 1. p. 481. n. 2.

*Schæff. elem.* t. 69.

*Habitat in Europæ aquis.*

*Abdomen supra rubrum.*

*Cimicoides*. 6. *N. abdominis margine serrato.* *Fn. suec.* 907.

*Frisch. inf.* 6. p. 31. t. 14. *Cimex aquaticus latior.*

*Ræf. inf. app.* 176. t. 28.

*Geoffr. paris.* 474. t. 9. f. 5. *Naucoris*.

*Gron. zooph.* 686. \*

*Schæff. elem.* t. 87.

*Habitat in Europæ aquis.*

*Pedes præni cheliformes.*

*linearis*. 7. *N. linearis*, manibus spina laterali pollicatis. *Faun. suec.* 908. \*

*Swamm. bibl.* 1. p. 233. t. 3. f. 9.

*Frisch. inf.* 7. p. 24. t. 16.

*Ræf. inf. app.* 141. t. 23.

*Geoffr. paris.* 1. p. 480. t. 10. f. 1.

*Gron. zooph.* 683. \*

*Habitat in Europa.*

226. CIMEX. *Rostrum* inflexum.*Antennæ* thorace longiores.*Alæ* IV, cruciatio-complicatæ: superioribus antice coriaceis.*Dorsum* planum, thorace marginato.*Pedes* cursorii.

## \* a \* APTERI.

Scutulari- I. C. apterus. *Faun. suec.* 909. *Scop. carn.* 354.  
us. *Monff. inf.* 269. f. superiores. Cimex domesticus.

*Bonani. microsc.* t. 65.*Aldr. inf.* 534.*Fonst. inf.* 89.*Raj. inf.* 7.*Lederm. micr.* t. 52, 63.*Sultz. inf.* t. 10. f. 69.*Geoffr. parif.* 1. p. 434. n. 1.

*Habitat in* Domibus exoticus, sed ante epocham salutarem in Europa, at in Anglia vix ante 1670 visus teste Southall, nocturnum foetidum animal.

*Pellitur* nidore Carbonum, & Terebinthinae accenso, *Mentha arvensi*, *Lepidio ruderali*, *Myrica*, *Geranio robertiano*, *Agarico muscario*, *Cimicifuga Aëæ*, *Cannabis seminibus herbaque*, *Opuli baccis*, *Ledo palustri*, *Plumbaginis europea infuso*, *Acoro palustri*, *Tabaci oleo*, *Cappici fumo*; oleo *Melolonthæ infuso*, *Medusa*, *Cimice personato*, *Formicis rubris*. Facile occiduntur vivi, sed frustra, nisi in ovo latentes iterato expellantur.

*Monographia Southall Treatise of Bugs. Lond.* 1730. 88.

*Declaratur hæc species nunquam elytris s. alis, sed semper apterum, Larvæ aut Pupæ forma persistit, quod singulare; at in Carniola volatilis etiam occurrat? confer. Scopoli.*

\* b \* SCUTELLATI: *Scutello* longitudine abdominis.

Stocker- 2. C. scutellaris, corpore viridi maculis nigris. *Mon-*  
rus. *Lud. Ulr.* 167. \*

Z z 4

Per

*Cimicis Larvæ obambulant, & more volatilium rostro exauriant, imprimis qua insecta molliora; plerique cimices fatent.*

*Scutellares mihi species, in quibus Scutellum adeo magnum, ut totum abdomen, sicut coleopterorum obteget & alas occultet.*

*Pet. gaz.* 34. t. 21. f. 12. *Stockerus benghalensis viridis nigromaculatus.*  
*Habitat in Asia.*

nobilis. 3. *C. scutellatus*, viridi-auratus nigro-maculatus. *Amem. acad.* 6. p. 400. n. 46. \*  
*Habitat in Java.*

Scarabæ- 4. *C. scutellaris*, corpore supra atro-æneo. *Faun. suec.*  
 oides. 912. \*  
*Habitat in Europa, frequentius in Ranunculis.*

maurus. 5. *C. scutellaris*, corpore griseo. *Fn. suec.* 913. \* *Scop. carn.* 352.  
*Habitat in Mauritania, in Svecia paulo minor.*  
*Scutellum basi gerit puncta 2 alba.*

lineatus. 6. *C. scutellaris niger*, thorace lineis quinque, scutello tribus luteis, abdomine flavo punctis nigris. *Scop. carn.* 351.  
*Monff. inf.* 174. f. 5.  
*Geoffr. parif.* 1. p. 468.  
*Poda inf.* 55. n. 2.  
*Gron. zooph.* 639.  
*Schæff. ic. t. 2. f. 3.*  
*elem. t. 44. f. 1.*  
*Habitat in Mauritania, Europa australiore.*  
*Supra niger: lineis luteis capitis 3, thoracis 5, scutelli 3. Alæ basi luteæ, apice fusæ. Subtus totus flavus punctis nigris. Femora fulva puncto nigro. Lineæ corporis luteæ in aliis flavæ, in aliis fulvæ.*

grammi- 7. *C. scutellaris*, corpore flavescente supra lituris longitudinalibus nigricantibus.  
 cus. *Habitat in Mauritania. Brander.*  
*Corpus mediocre, flavum: supra totum lituris longitudinalibus, difformibus, fuscis. Caput acuminatum. Thoracis latera angulo recto. Alæ nigricantes.*

fuligino- 8. *C. scutellaris*, scutello fuliginoso lituris quinque nigris: postica alba bifida. *Fn. suec.* 914. \*  
*Habitat in Europa.*

arabs. 9. *C. scutellaris*, thorace spinoso, corpore ovato livido, ano bidentato. *Mus. Lud. Ulr.* 168. \*

*Sloan.*

*Sloan. jam. 2. t. 237. f. 15, 16. Cimex sylvaticus  
foetens viridis triangularis?*

*Habitat in Arabia.*

ferratus. 10. *C. scutellaris*, thorace spinoso, corpore livido, abdominis marginibus ferratis. *M. L. U. 169. \**  
*Habitat in Arabia.*

stolidus. 11. *C. scutellaris*, thorace subangulato, corpore supra viridi, subtus flavo, ano bidentato. *Mus. Lud. Utr. 170. \**  
*Habitat in Indiis.*

Histrio. 12. *C. scutellaris*, thorace scabro depresso griseo pallidoque vario.  
*Habitat in Indiis.*

\* c \* COLEOPTRATI: *Elytris fere totis coriaceis.*

grylloides. 13. *C. apterus niger*, elytris ovatis margine luteis abdomine brevioribus. *Fn. suec. 910. \**  
*Habitat in Europa.*

*Differt a sequentibus: elytris abdomine brevioribus, apice distantibus, albo-marginatis. Thorax refertur Gryllum; singularis species.*

*Idem niger, oculis nigris, capite sanguineo, pedibus antennisque biarticulatis luteis; sub foliis Rumicis lectus a Brunnichio.*

littoralis. 14. *C. coleoptratus*, elytris fordidis albo punctatis, alis abbreviatis, corpore nigro. *Fn. suec. 914, 915. \**  
*Habitat in Europæ littoribus.*

rugosus. 15. *C. coleoptratus*, elytris pallidis, corpore oblongo.  
*Fn. suec. 916.*  
*Habitat in Europa.*

clavicornis. 16. *C. coleoptratus*, elytris nervoso-carinatis reticulato punctatis, antennis clavatis. *Fn. suec. 911. \**  
*Reaum. inf. 3. t. 34. f. 1 - 4.*  
*Geoffr. parif. 1. p. 461. n. 56.*  
*Habitat in Europa.*

Zz 5

\* d \*

*Coleoptrati ubi dicuntur, in quibus Elytra nulla membrana argentea, sed tota coriacea, ut in Coleoptratus, abdomen obtegant.*

\* d \* MEMBRANACEI & valde depressi ut folium.

corticalis. 17. *C. membranaceus*, abdominis margine imbricatum sceto, corpore nigricante. *Faun. suec.* 917.

*Habitat in Europæ Arboribus sylvaticis.*

Betulæ. 18. *C. membranaceus*, thorace denticulato: capite muricato, elytris antice dilatatis. *Fn. suec.* 918. \*

*Habitat in Betula alba.*

erosus. 19. *C. membranaceus*, abdomine flavo: fascia nigra, thorace rugoso, tibiis anticis incrassatis.

*Sultz. inf. t. 11. f. 71.*

*Habitat in America. Rolander.*

*Antennæ clavatæ. Thorax niger, antice flavescens, rugosus, margine undique erosus. Abdomen rhombeum, membranaceum, alis latius, flavum fascia nigra. Alæ griseæ. Tibiæ antice breves, sed crassissimæ, ut in Mante.*

Filicis. 20. *C. membranaceus*, elytrorum apicibus capite pedibusque lividis, corpore nigro. *Fn. suec.* 919. \*

*Habitat in Filicibus.*

Cardui. 21. *C. membranaceus*, scutello lineis tribus elevatis, antennæ apice nigris. *Fn. suec.* 920. \*

*Habitat in Cardui capitulis.*

rhombeus 22. *C. thorace acutangulo, abdomine dilatato rhombeo postice fexdentato.*

*Habitat in Africa. E. Brander.*

*Corpus medium, supra griseum, tenuissime punctatum; subtus flavescens. Thorax angulo acuto, vix spinoso. Scutellum mediocre. Abdominis latera membranaceo-dilatata in angulum lateralem rectum, ad anum sex serraturis. Antennæ purpurascens, ultimo articulo paulo crassiore.*

\* e \* SPINOSI: Thorace spina utrinque armato.

bidens. 23. *C. ovatus griseus*, thorace acuto spinoso, antennæ rufis. *Fn. suec.* 921. \*

*Sultz. inf. t. 11. f. 72.*

*Habitat in Europa.*

24. *C.*

- rufipes.** 24. *C. ovatus* griseus, thorace obtuse spinoso, pedibus rubris. *Faun. suec.* 922. \*  
*Habitat in Europa.*
- ictericus.** 25. *C. ovatus* incarnatus subtus flavus, thorace acute spinoso. *Amæn. acad.* 6. p. 399. n. 41. \*  
*Habitat in Carolina. D. Garden.*
- floridanus.** 26. *C. ovatus* niger rubro varius, thorace spinoso, scutello maculis tribus rubris.  
*Habitat in Carolina. D. Garden.*  
*Corpus mediocre, ovato-oblongum. Thorax linea media, & laterali utrinque brevior rubris. Scutellum abdomine brevius, basi maculis 2 paribus coadunatis & unica terminali sanguineis. Abdomen rubrum lateribus nigrum. Femora basi rubra.*
- hæmorrhous.** 27. *C. oblongus* niger, thorace spinoso, abdomine rufo, elytris punctis linearibus quinque nigris. *Amæn. acad.* 6. p. 400. n. 45. \*  
*Habitat in America septentrionali.*
- marginatus.** 28. *C. oblongo-ovatus* griseus, thorace obtuse spinoso, antennis medio rubris. *Fn. suec.* 923. \* *Scop. carn.* 363.  
*Faun. suec.* 1. n. 662. *Cimex oblongus* rufus immaculatus, thorace utrinque angulato.  
*Geoffr. parif.* 1. p. 446. n. 20. *Cimex* capite prope antennis externe denticulato.  
*Habitat in Europa.*
- 2-pustulatus.** 29. *C. oblongiusculus* niger, thorace spinoso, punctis verticis duobus coccineis.  
*Habitat in America. Rolander.*  
*Corpus oblongiusculum, magnum, totum nigrum capite, thorace, pectore, alis. Abdomen rubrum. Elytra livida. Inter oculos puncta 2 globoso purpurea nitida.*
- scaber.** 30. *C. oblongiusculus* testaceus, thorace angulato-spinoso, alis nigris, femoribus denticulatis. *Amæn. acad.* 6. p. 400. n. 43. \*  
*Habitat in Java.*
- punicus.** 31. *C. ovatus* niger, thorace spinoso, scutello lunula apiceque rubris.

*Habi-*

*Habitat in Barbaria. D. Brander.*

Magnitudo *C. baccarum*. Caput depressum, porrectum. Thorax linea rubra, & Spinae basi rubra. Scutellum basi lunula rubra & apice rubrum. Elytra Alæque nigrae. Subtus lutea & nigra omnia.

ypsilon. 32. *C. ovatus lividus, thorace spinoso, scutello ypsilon flavo inscripto.*

*Habitat in America. Rolander.*

Corpus ovatum, lividum. Thorax utrinque acute spinosus. Antennae nigrae annulis duobus albis. In Elytris singulis punctum album. Scutellum totum ygreco inscriptum. Abdomen flavescens.

clypeatus. 33. *C. ovatus viridis fascia flavicante, thorace spinoso, capite clypeato.*

Gron. zooph. 691. *C. ovatus, thorace utrinque aculeato fascia transversali flavicante, scutello gibboso, capite clypeato, ano serrato.*

*Habitat in China.*

punctatus. 34. *C. ovatus fusco punctatus, thorace subspinoso, tibiis annulo albo. Faun. suec. 924.\**

*Habitat in Europa.*

hamor- 35. *C. ovato-oblongus griseus, thorace acute spinoso, rhoidalis. antennis nigris, sterno porrecto. Fn. suec. 925.\**

*Habitat in Europa.*

valgus. 36. *C. oblongus niger, thorace spinoso, femoribus posticis incurvis, tibiisque posticis unidentatis. Mus. L. Ulr. 171.\**

*Habitat in Indiis.*

*Abdominis basis subtus notata prominentiis tribus.*

4-spino- 37. *C. oblongus ruber, thorace quadrispinoso. sus.*

*Habitat in America. Rolander.*

Corpus oblongum ut *C. lacustris*, rubrum. Antennae longissimae, capillares. Thorax spinis 4 teretibus: una utrinque & 2 a tergo. Alæ rubrae. Pedes longi, nigri.

Acanthi- 38. *C. oblongus, thorace spinoso, abdomine spinis ciliato. ris.*

Brown. jam. 434. t. 44. f. 11. *Acanthais.*

*Habitat in Jamaica.*



\* f \* ROTUNDATI f. ovati, thorace mutico.

viridulus. 39. C. rotundatus supra flavus punctis viridibus, subtus viridis. *Mus. Lud. Ulr.* 172. \*

*Habitat in Indiis.*

peregrinator. 40. C. suborbiculatus depressus griseo pallideque varius, thorace scabro. *M. L. U.* 173. \*

*Habitat in Indiis.*

1-punctatus. 41. C. ovatus pallide griseus: puncto albo utrinque ad basin scutelli. *Mus. Lov. Ulr.* 174.

*Habitat in Syria.*

*Hic color griseus est scaber, flavus autem lavis.*

6-punctatus. 42. C. rotundatus luteo nigroque varius, thorace luteo, punctis sex nigris. *M. L. U.* 175. \*

*Habitat in Indiis.*

griseus. 43. C. ovatus griseus, abdominis lateribus albo nigroque variis, alis nebulosis, sterno porrecto. *Fn. succ.* 926. \*

*Habitat in Europa.*

interstin- 44. C. ovatus griseus, abdominis lateribus rubro nigroque  
tus. variis, alis albis, sterno porrecto. *Fn. succ.* 927. \*

*Habitat in Europa.*

bacca- 45. C. ovatus griseus abdominis margine nigro maculato.  
rum. *Faun. succ.* 928. *Scop. carn.* 360.

*List. loqv.* 396. *mut.* t. 31. f. 19. Cimex ex luteo virescenti infuscatus, ad alvi margines nigris maculis.

*Raj. inf.* 54. n. 2. Cimex sylvestris, corpore breviori, subfuscus, scapulis magis exstantibus.

*Fonst. inf.* t. 17. f. 9.

*Geoffr. paris.* 1. p. 466. n. 64.

*Habitat in Europæ sylvis.*

dumosus. 46. C. subrotundus griseus, margine undique sanguineo. *Fn. succ.* 929. \*

*Habitat in Europa.*

variolo- 47. C. ovatus flavus, thorace subspinoso punctis fuscis  
sus. excavatis varioloso, scutello basi gibbo.

*Habitat in America. Rolander.*

*Corpus majusculum. Margo abdominis serratus. Tho-  
rax angulis vix spinosus, flavus, punctis confertis*

*varie sparsis excavatis subfuscis varicosus. Elytra flava.*

Juniperi- 48. C. subrotundatus viridis, margine undique scutello-  
nus. que apice flavo. *Fn. suec. 930. \* Scop. carn. 359.*

*Raj. inf. 53. n. 1.*

*Geoffr. paris. 1. p. 464. n. 61.*

*Habitat in Juniperis.*

præsinus. 49. C. subrotundus totus viridis, scutello concolore. *Fn. suec. 931. \**

*Habitat in Europa.*

cæruleus. 50. C. ovatus cæruleus immaculatus. *Fn. suec. 933. \**

*Geoffr. paris. 1. p. 482. n. 75.*

*Habitat in Thesio frequens.*

Morio. 51. C. ovatus ater, plantis rufis. *Fn. suec. 932. \**

*Habitat in Europa.*

lineola. 52. C. ovatus, thorace leviter antice atro, postice livido distincto punctis excavatis.

*Habitat in America. Rolander.*

*Magnitudo fere Tabani. Caput & Pectus atra. Thorax adpersus punctis excavatis, antice ater, postice albidus, qui colores distincti linea transversa ex punctis excavatis. Abdomen ovatum, triquetrum, flavum, latere maculatum. Elytra incarnata pallidaque.*

oleraceus. 53. C. ovatus cæruleo-æneus, thorace lineola scutelli apice elytrisque puncto albo rubro. *Fn. suec. 934. \**

*Raj. inf. 54. n. 6. Cimex sylvestris cærulescens.*

*Geoffr. paris. 1. p. 471. n. 74.*

*Habitat in Europa, destruxit Tetradynamas nostras 1760.*

biguttatus. 54. C. ovatus niger margine undique albo, elytris puncto albo. *Fn. suec. 935. \* Scop. carn. 356.*

*Habitat in Europa.*

bicolor. 55. C. ovatus niger, elytris nigro alboque variis, alis albis. *Fn. suec. 936. \* Scop. carn. 357.*

*Pet. gaz. t. 14. f. 7. Cimex niger albo maculatus.*

*List. loqu. 396. Cimex niger maculis candidis.*

*Raj. inf. 54. n. 5. Cimex sylv. parvus, corpore rotundiore.*

*Geoffr.*

*Geoffr. parif. 1. p. 471.*

*Habitat in Europa.*

ornatus. 56. C. rotundato-ovatus nigro rubroque varius, capite alisque nigris. *Fn. suec. 937. \* Scop. carn. 361.*

*Sultz. inf. 2. 11. f. 73.*

*Geoffr. parif. 1. p. 469. n. 69.*

*Habitat in Europa.*

festivus. 57. C. ovatus rubro nigroque varius, thorace punctis sex nigris, alis fuscis albo marginatis.

*Scop. carn. 362. Cimex Dominulus.*

*Habitat in Germania. D. D. Schreber.*

*Statura C. bicoloris, sed magis oblongus. Caput rubrum, nigro maculatum. Thorax ruber punctis nigris: 2 anticis; 4 posticis. Scutellum rubrum macula basalis nigra. Elytra margine interiore macula transversa nigra & ad apicem puncto nigro. Abdomen rubrum subius ad latera punctis nigris. Variat colore luteo loco rubri.*

ruber. 58. C. ruber, alis fuscis, elytris lineola transversa alba.

*Faun. suec. 938. \**

*Habitat in Europæ Urticis aliisque.*

acuminatus. 59. C. ovalis antice attenuatus cinereo exalbidus, antennis incarnatis. *Fn. suec. 939. \**

*Rai. inf. 56. n. 6. Musca cimiciformis.*

*List. nat. 1. 31. f. 20.*

*Geoffr. parif. 1. p. 472. n. 77.*

*Habitat in Europa.*

leucoccephalus. 60. C. ovatus niger, capite pedibusque flavis. *Fn. suec. 940. \**

*Habitat in Europa.*

minutus. 61. C. ovatus, elytris lividis apice fuscis. *Fn. suec. 941. \**

*Habitat in Europa.*

cristatus. 62. C. rostro arcuato, antennis setaceis, corpore fusco-ferrugineo, scutello cristato. *Aman. acad. 6. p. 399. n. 42. \**

*Habitat in Carolina. D. Garden.*

*Thorax utrinque spina. Scutellum maximum crista obtusata, apice bidentata. Species facile maxima*

63. C.

collaris. 63. *C.* rostro arcuato, corpore nigro, thorace postice elytrisque antice ferrugineis, elytris postice alisque nigris. *Brunnich.*

*Habitat in Guinea.*

Corpus oblongum, magnitudine & statura *C. personati*. Caput angustum. Thoracis segmentum anterius nigrum; posterius v. ferrugineum; margo lateralis elevatus. Elytra ferruginea, postice nigra ut *Ala*. Abdomen ferrugineum fasciis nigris, transversis. Antennæ & Pedes nigri.

\* g \* SETICORNES. Antennis apice setaceis.

persona- 64. *C.* rostro arcuato, antennis apice capillaceis, corpore  
tus. oblongo subvillosa fusco. *Fm. succ. 942. Scop. carn*

379.

*Frisch. inf. 10. t. 20. Cimex stercorarius major oblongus.*

*Raj. inf. 56. n. 3. Musca cimiciformis.*

*Lest. loqu. 379. n. 38.*

*Sultz. inf. t. 11. f. 74?*

*Geoffr. paris. 397. n. 38.*

*Habitat in Europa.*

*Consumit C. lectularias hujus Larva horrida, personata.*

longipes. 65. *C.* rostro arcuato, corpore rubro, elytris nigris basi fasciisque rubris. *Brunnich.*

*Gron. zooph. 709.*

*Habitat in Insula S. Thomæ. L. Spengler.*

Corpus magnitudinis *C. personati*, oblongum, angustum. Caput minimum, angustum, rubrum. Antennæ nigrae. Thorax ruber macula dorsali lata nigra. Abdomen rubrum. Elytra nigra, basi & fascia media rubra. Pedes corpore duplo longiores, nigri. Femora 4 posteriora annulo rubro.

Branderi. 66. *C.* rostro arcuato, thorace subsexspinoso, elytris punctis tribus albis.

*Habitat in Barbaria. E. Brander.*

Corpus griseum, mediocre, subtus testaceum. Antennæ subclavatae, rufae, ultimo articulo obscuriore subovato. Thorax margine postico scaber, valdeque emarginatus: utroque lobo laterali denticulis tribus. Scutellum basi nigricans. Elytra in medio punctis 3, albis, transversis. Abdominis margines laterales fasci-

*fasciati, elevati statura proximorum, sed absque antennarum seta.*

- trifascia- 67. C. antennis apice capillaribus, corpore oblongiusculo  
tus. nigro rubroque varius.

*Habitat in Germania.*

Corpus nigrum. Thorax lateribus & subtus ruber. Elytra rubra: macula communis nigra ad basin; Fascia nigra in medio; apices nigri. Alæ fusca. Abdomen rufum.

- semifla- 68. C. antennis apice capillaribus, corpore oblongiuscu-  
vus. lo nigro, thorace pedibusque testaceis.

*Habitat in Svecia.*

Statura C. atri. Caput inter oculos, Thorax supra & subtus, Pedesque testacea s. ferruginea. Antennarum basis etiam testacea. Pili antennarum basi albi.

- erythro- 69. C. rostro arcuato, antennis capillaribus, thorace pos-  
pus. sice emarginato, pedibus rubris.

*Habitat in Barbaria.*

Caput nigrum rubrumque, angustissimum. Thorax niger rubro varius, posice late emarginatus apicibus flavis. Elytra rufa. Abdomen nigrum marginibus albo nigroque variis. Pedes nigricantes, maximam partem rubri. Antennæ fusca, setacea.

- bigutta- 70. C. rostro arcuato niger, thorace scutelloque acute  
tus. spinosis, elytris puncto albo. Brunnich.

*Habitat in Guinea; e museo D. Schlofferi.*

Corpus oblongum, magnitudine C. vaigi. Rostrum breve. Antennæ ferrugineæ, basi nigrae. Thorax anterieus angustatum, elevatum, rugosum, posterius lateribus dente valido. Scutellum tridentatum dentibus erectis. Elytra juxta scutellum macula rotunda alba. Femora medio exalbida. Tibiæ rufescentes.

- annula- 71. C. rostro arcuato, antennis apice capillaribus, corpo-  
tus. re oblongo: subtus sanguineo maculato. Fn. suec. 943. \*

*Geoffr. parisi. 1. p. 437. n. 5.*

*Habitat in Europa.*

- ater. 72. C. antennis apice capillaribus, corpore oblongiusculo  
atro. Fn. suec. 944.

A a a

Geoffr.

*Geoffr. parif. 1. p. 460. n. 54.*

*Habitat in Europa.*

- gothicus. 73. C. antennis apice capillaribus, corpore oblongo nigro, scutello elytrorumque apicibus coccineis. *Faun. suec. 966. \* Scop. carn. 381.*  
*Geoffr. parif. 1. p. 445. n. 18.*  
*Habitat in Europa.*

\* h \* OBLONGI.

- indus. 74. C. oblongus, abdomine rubro bidentato, elytris fuscis pallido-striatis. *Mus. Lud. Utr. 176. \**  
*Habitat in Indiis.*

- Janarius. 75. C. oblongus rufus, elytris apice sanguineis, thorace nigricante, abdomine flavo.  
*Habitat in Svecia.*

*Corpus mediocre, subtus sulphureum. Caput rufum. Antennæ sanguineæ articulis apice nigricantibus. Thorax fuscus, postice in medio niger. Elytra rufa apicibus sanguineis. Anus supra sanguineus.*

- Hyoscyam. 76. C. oblongus rubro nigroque varius, alis fuscis im-maculatis. *Fa. suec. 945. \* It. æl. 155. \**

*Pet. gaz. t. 62. f. 2. Cimex hyoscyamoides ruber, maculis nigris.*

*List. loqu. 397. mut. t. 31. f. 21. Cimex miniatus, nigris maculis, hyoscyami.*

*Raj. inf. 55. Cimex sylvestris minor, corpore oblongo angusto.*

*Geoffr. parif. 441. n. 12. Cimex scutelli nigri apice rubro.*

*Sultz. inf. t. 11. f. 75.*

*Habitat in Hyoscyamo.*

- equestris. 77. C. oblongus rubro nigroque varius, alis fuscis albo maculatis. *Faun. suec. 946. \* It. æl. 155. Mus. Lud. Utr. 177.*

*Geoffr. parif. 1. 442. n. 14.*

*Scop. carn. 369. Cimex speciosus.*

*Schaff. elem. t. 44. f. 2.*

*Habitat in Europa.*

*Præcedenti duplo major, nec in Hyoscyamo obuius.*

apterus. 78. *C. oblongus* rubro nigroque varius, elytris rubris punctis duobus nigris. *Scop. carn.* 370.

*Raj. inf.* 55. n. 3.

*Geoffr. parif.* 440. n. 11. t. 9. f. 4.

*Habitat in* Malva sylvestri; Europæ: Calmaria.

*Simillimus C. Hyoscyami.* Corpus nigrum, sed Thorax undique cinctus margine rubro. Pectus fasciis rubris. Anas fascia rubra. Elytra sanguinea apice nigricantia; in singuli elytri medio punctum majusculum, atrum, & punctum minimum ad elytri basin. Alæ plane nullæ.

ægyptius. 79. *C. oblongus* rubro nigroque varius, elytris rubris puncto nigro. *Mus. Lud. Utr.* 178. \*

*Habitat in* Ægypto.

Andræ. 80. *C. oblongus* sanguineus, antennis tibiis rostro alisque nigris. *Mus. L. U.* 179. \*

*Sloan. iam.* 2. t. 237 f. 29, 30. *Cimex sylvestris oblongus* e cinereo & nigro variegatus, supina parte cruce s. Andræ notatus.

*Habitat in* America.

*Conf.* *Cimex ruficollis.* *M. L. U.* 180.

saxatilis. 81. *C. oblongiusculus* niger, thoracis margine laterali lineaque rubris, elytris maculis tribus rubris. *Scop. carn.* 371.

*Habitat in* Germania.

Caput macula rubra, antice bifida. Thorax lineis marginalibus & media rubra. Scutellum nigrum. Elytra maculis tribus rubris: unica juxta scutellum; secunda in medio; tertia ad apicem. Pectus utrinque maculis 3 rubris. Abdomen subtus fasciis maculisque nigris.

succineus. 82. *C. oblongus*, thoracis elytrorumque margine exteriori femorumque basi sanguineis. *Amæn. acad.* 6. p. 400. n. 44.

*Habitat in* Pennsylvania. *De Geer.*

pabulinus. 83. *C. oblongiusculus* flavescenti-viridis totus. *Fn. succ.* 947. \* *Scop. carn.* 132.

*Habitat in* Europa.

- Kalmii. 84. *C. oblongus viridis*, scutello macula cordata flava, elytris maculis duabus nigris. *Fann. suec.* 948. \*  
*Habitat in Europa.*

- superciliofus. 85. *C. ovato-oblongus niger*, palpebra elytrorumque margine albis.  
*Habitat in Svecia. Modeer.*

*Corpus nigrum, mediocre. Abdominis latera subtus utrinque litura rufa. Antennæ longitudine corporis, apicem versus angustiores. Palpebra superior & elytrorum margo exterior alba.*

- pratensis. 86. *C. oblongus griseus*, scutello macula cordata flava, elytris apice puncto fusco. *Fn. suec.* 949. \* *Scop. carn.* 386.

*Geoffr. parif.* 1. p. 451. n. 33.

*Habitat in Europa.*

- campestris. 87. *C. oblongus viridis*, scutello macula cordata viridi, elytris macula ferruginea. *Fn. suec.* 950. \*

*Geoffr. parif.* 452. n. 34.

*Habitat in Europa.*

- melanocephalus. 88. *C. oblongus niger*, thorace elytris antennis pedibusque pallidis.

*Habitat in Svecia. D. C. Solander.*

*Parvus. Caput, Pectus, Abdomen totum nigricantia. Alæ omnes membranaceæ, nigre; reliqua testaceo-pallida.*

- histrionius. 89. *C. oblongus niger*, scutello flavo, elytris pedibusque testaceis.

*Habitat in Europa.*

*Corpus magnitudine Culicis. Caput nigrum. Antennæ basi rubræ. Thorax margine antico posticoque flavo, ut nigredo postice biloba. Scutellum nigrum macula triquetra, flava. Elytra testacea, basi albida, apice membranaceo fusco basi albido. Pedes subtestacei.*

- umbratilis. 90. *C. oblongus niger*, elytris albo maculatis. *Fn. suec.* 951. \*

*Habitat in Europa.*

91. *C.*



- nemor- 91. *C. niger*, elytris alisque fusco alboque variis, pedi-  
rum. bus testaceis. *Fann. suec. 953. \**  
*Habitat in Europa.*
- crassicor- 92. *C. oblongus subgriseus rubro-punctatus*, antennis cla-  
nis. vatis. *Fn. suec. 952. \**  
*Habitat in Europa.*
- salstori- 93. *C. oblongus niger*, elytris striatis, alis postice flavo  
us. maculatis. *Fn. suec. 954. \* It. xl. 121.*  
*Raj. inf. 57. n. 2. Cimex brevis & fere rotundus ni-*  
*gricans.*  
*Habitat in Europa ad littora.*
- 3-gutta- 94. *C. oblongus niger*, elytris testaceis: punctis tribus ni-  
tus. veis: interiore minore.  
*Habitat in Europa.*  
*Corpus magnitudine Pediculi, nigrum. Antennæ ni-*  
*gra, longitudine corporis. Elytra crassiora, reliquis*  
*longiora (apice solo membranacea,) quasi emargina-*  
*ta, fusco-testacea: singulis macula 3 nivea; ha-*  
*rum una versus apicem; duæ versus basin: interio-*  
*re minuta. Alæ hyalinae. Pedes testacei.*
- arenarius. 95. *C. oblongus niger*, elytris cinereis antice nigris, alis  
postice albis. *Fn. suec. 955. \* It. xl. 121.*  
*Habitat in Europa.*
- Pinl. 96. *C. oblongus ater*, elytris fuscis macula rhombea ni-  
gra. *Fn. suec. 956. \**  
*Habitat in Pinetis.*
- clavatus. 97. *C. oblongus niger*, elytris fuscis: fasciis duabus  
niveis.  
*Habitat in Europa. Filius.*  
*Corpus nigrum, magnitudine C. lectularii, sed angu-*  
*stius. Abdomen clavatum. Elytra fusca, apice*  
*membranacea: fasciæ 2 niveæ, quarum anterior fra-*  
*cta; posterior vix tangit marginem interiorem. An-*  
*tennæ longitudine corporis.*
- Rolandri. 98. *C. oblongus ater*, hemelytris macula flava. *Fann.*  
*suec. 957. \**  
*Saltz: inf. t. 11. f. 76.*

β. Cimex bimaculatus. *Syst. nat.* 10. p. 449. n. 76.  
*Habitat in Europa.*

ferrugineus. 99. ferrugineus, capite thorace scutelloque nigris.  
*us. Habitat in Svecia.*

*Similis C. rolandri, sed totus ferrugineus excepto capite, scutello, thorace, qui margine postico etiam ferrugineus.*

nigripes. 100. C. oblongus, elytrorum basi antennis pedibusque rubris, tibiis anticis nigris hirsutissimis.

*Habitat in America. Rolander.*

*Corpus magnum, nigrum. Abdomen rubrum. Antennæ basi nigrae. Tibiæ anticae longiores, crassiores, atrae, valde hirsutae.*

\* 1 \* *Antennis setaceis longitudine corporis.*

laevigatus. 101. C. oblongus exalbidus, lateribus albis. *Fn. suec.* 958. \*

*Habitat in Europa.*

virens. 102. C. oblongus viridis, plantis antennarumque apicibus rufescentibus.

*Habitat in Europa.*

*Simillimus C. laevigato.*

dolabratus. 103. C. oblongus, elytris ferrugineis latere albidis, antennis nigris, linea thoracis alba. *Fn. suec.* 959. \*

*Habitat in Festuca natante.*

calens. 104. C. oblongus, capite thorace elytrisque nigris, scutello fulvo, antennis setaceis. *Gron. zooph.* 712. \*

*Habitat in India.*

striatus. 105. C. oblongus niger, elytris flavo fuscoque striatis apice pedibusque rufis. *Fn. suec.* 960. \* *Geoffr. par.* 1. p. 454. n. 38.

*Pet. gaz.* 1. 62. f. 1.

*Habitat in Ulmi campestris foliis.*

*Thorax supra puncto flavo. Scutellum linealis 2 flavis.*

Gronovii. 106. C. oblongus, thorace elytrisque atris linea flava fasciam elytrorum formante, antennis setaceis. *Gron. zooph.* 711. \*

*Habi-*

*Habitat in India.*

Corpus flavicans. Thoracis *margines lineaque media flava: hæc, excurrens ad media elytra utrinque brachio, fasciam efformat.* Pedes rufi.

erraticus. 107. *C. oblongus nigricans, elytris albis, antennis lividis: infimo articulo nigro. Faun. suec. 961.\**

*Habitat in Europa.*

terus. 108. *C. oblongus griseus immaculatus, antennis setaceis. Fn. suec. 962.\**

*Habitat in Europa.*

Populi. 109. *C. oblongus albo fuscoque nebulosus, antennis setaceis. Fn. suec. 963.\**

*Habitat in Populo tremula.*

Ulmi. 110. *C. oblongus supra rubiginosus, elytris striis sanguineis, alis postice albo fuscoque variis. Faun. suec. 964.\**

*Habitat in Ulmo campestri.*

sylvestris. 111. *C. oblongus niger, alis elytrisque albo fuscoque variis, pedibus rufis. Fn. suec. 965.*

*Habitat in Europa.*

mutabilis. 112. *C. oblongiusculus niger, alis inferioribus cæruleis, antennis pedibusque flavis. Fn. suec. 967.\**

*Habitat in Svecia.*

*Totus niger. Alæ membranaceæ, glaucescentes, abdomini impositæ atro valde cæruleæ elucent.*

\* k \* SPINIPEDES. *Tibiis spina notatis.*

phyllopus. 113. *C. oblongus nigricans, thorace subspinoso, elytris fascia albicante.*

*Habitat in Carolina, D. Garden; in insula S. Thomæ, L. Spengel.*

Corpus mediocre, oblongum, luride nigricans. Caput parvum, rufum lipsis 2 nigris. Thorax subspinosus angulis elevatis. Scutellum  $\frac{1}{2}$  abdominis. Elytra postice membranacea Alæque nigra: Fascia linearis pallida pone scutellum per elytra ducta. Femora antica inermia; media sub apice scabra; postica subtus aculeata. Tibiæ posticæ subsiliaceæ s. membranaceæ,

*nacca, dilatata ad basin & sinuata dentibus 3, alboque maculata. Antennæ articulis basi fuscis.*

calcaratus. 114. *C. oblongus niger, capite linea rubra, femoribus posticis subtus sexdentatis. Faun. suec. 968. \**

*Habitat in Europa.*

Varietas? *Pedibus inermibus. Femoribus basi Tibiisque apice nigris.*

Abietis. 115. *C. oblongiusculus maculato-fulvus, pedibus rufis: femoribus anticis crassioribus dentatis. Faun. suec. 969. \* Scop. carn. 364.*

*Habitat in Pinu Abiete.*

kermesinus. 116. *C. oblongus rufus: fascia albida nigro punctata, femoribus posticis multidentatis.*

*Habitat in America.*

*Corpus triste rubrum, magnitudine majoris nostratis. Antennæ fusca. Fascia elytrorum linearis, albida, ad apicem scutelli. Puncta atra in singulo elytro antice 4, postice 3.*

\* 1 \* LINEARES. *Corpore angustis.*

lacustris. 117. *C. linearis supra niger depressus, pedibus anticis brevissimis. Fn. suec. 970. \* Geoffr. paris. 1. p. 463. n. 59. Scop. carn. 394.*

*It. wgoth. 182.*

*Raj. inf. 57. n. 1. Cimex aquaticus figuræ longioris.*

*Bauh. ballow. 213. f. 1. Insectum Tipula dictum.*

*List. nat. t. 5. f. 4.*

*Bradl. nat. t. 26. f. 2. D.*

*Friseh. inf. 7. t. 20.*

*Sultz. inf. 11. t. 78.*

*Habitat in Europæ aquis pacatis.*

stagnorum. 118. *C. linearis nigricans teretiusculus, thorace medio punctis duobus globosis. Fn. suec. 971. \* Geoffr. paris. 463. n. 60. Scop. carn. 395.*

*Pet. gaz. t. 9. f. 12. Tipula londonensis angustissima.*

*Habitat in Europæ aquis pacatis.*

vagabundus. 119. *C. linearis variegatus, pedibus anticis brevissimis crassis inflexis. Fn. suec. 972. \**

*Faun.*

*Fann. suec.* 1. n. 683. *Cimex linearis*, pedibus quatuor longioribus, antennis longissimis albo fuscoque variis.

*Frisch. inf.* 7. p. 11. t. 6. *Cimex arborum* oblongus alarum signatura alba.

*Geoffr. parif.* 462. n. 58.

*Habitat in Europæ Arboribus.*

Tipulari- 120. *C. linearis* exalbidus, pedibus omnibus longissimis, us. femoribus clavatis, antennis biclavatis. *Fann. suec.*

973. \*

*Frisch. inf.* 7. p. 28. t. 20. *Cimex arboreus* culiciformis.

*Habitat in Europæ arboribus.*

*Elytra crenulato-striata.*

Varietas? *mibi visa simillima, sed quæ tota rufa testacea. Pedes vero & Antennæ albo nigroque variae.*

Coryli. 121. *C. oblongus* niger, pedibus antennisque setaceis flavis. *Fn. suec.* 974. \*

*Habitat in Corylo Avellana.*

227. APHIS. *Rostrum* inflexum.  
*Antennæ* thorace longiores.  
*Alæ* IV erectæ aut nullæ.  
*Pedes* ambulatorii.  
*Abdomen* postice sæpius bicornæ.

Ribis. 1. *A. Ribis rubri.* *Fn. suec.* 975. \*  
*Lenw. arc. epist.* 90. p. 545. t. 548.  
*Blank. inf.* 164. t. 14. f. D. E.  
*Frisch. inf.* 11. p. 9. t. 14.  
*Reaum. inf.* 3. t. 22. f. 7 - 10.  
*Habitat in Ribe rubro.*

Ulmi. 2. *A. Ulmi campestris.* *Fn. suec.* 976. \* *It. scan.* 203.  
*Reaum. inf.* 3. t. 25. f. 4 - 7.

Aaa 5

Geoffr.

Aphides pariunt æstate vivos sætus, autumno ponunt ova. A copula parentum secundar nasci filias, neptes, proneptes, abneptes asseverant entomologi. Aliæ apteræ, aliæ alatæ, absque sexus discrimine in eadem Specie; Pleræque duo cornua postica abdominis gerunt, quibus excernunt rorem mellentis hæ Formicarum vacca! Species difficile distinguuntur, difficilius definiuntur, nec semper in diversis plantis diversæ species, adeoque pauciores mihi Aphides quam plantæ aphidifera.

*Geoffr. parif.* 494. n. 1. t. 10. f. 3.  
*Habitat in Ulino campestri.*

Pastina- 3. *A. Pastinacæ sativæ. Fn. suec.* 977. \*  
 cæ. *Habitat in Pastinaca sativa.*

Sambuci. 4. *A. Sambuci nigræ. Faun. suec.* 978.  
*List. loqu.* 391. *Cimex exiguus cælius.*  
*Frisch. inf.* 11. p. 14. t. 18.  
*Reaum. inf.* 3. t. 21. 5 - 15.  
*Geoffr. parif.* 495. n. 3.  
*Habitat in Sambuco nigra.*

Rumicis. 5. *A. Rumicis Lapathi. Fn. suec.* 979. \*  
*Habitat in Rumicibus Lapathis dictis.*

Acetosæ. 6. *A. Rumicis Acetosæ. Geoffr. parif.* 1. p. 496. n. 9.  
*Reaum. inf.* 3. p. 286.  
*Habitat in Rumice Acetosa, Acetosella.*

Lychni- 7. *A. Lychnidis dioicæ. Fn. suec.* 980. \*  
 dis. *Fn. suec.* 719. *Aphis Cucubali.*  
*Habitat in Lychnide dioica.*

Padi. 8. *A. Pruni Padi. Fn. suec.* 981.  
*Reaum. inf.* 3. t. 23. f. 9, 10.  
*Habitat in Pruno Pado.*

Rosæ. 9. *A. Rosæ. Fn. suec.* 982. \*  
*Reaum. inf.* 3. t. 21. f. 1 - 4.  
*Sultz. inf.* t. 12. f. 79.  
*Lederm. micog.* 53. t. 25.  
*Habitat in Rosis.*

Nym- 10. *A. plantarum aquaticarum. Fn. suec.* 983.  
 phææ. *Habitat in Nymphæis, Potamogetone natante.*

Tiliæ. 11. *A. Tiliæ europææ. Fn. suec.* 984. \*  
*Frisch. inf.* 11. p. 13. t. 17. *Pediculus arboreus Tiliæ.*  
*Reaum. inf.* 3. t. 23. f. 1 - 8.  
*Geoffr. parif.* 495. n. 6.  
*Habitat in Tilia europæa.*

Brassicæ. 12. *A. Brassicæ oleracæ. Fn. suec.* 985. \*  
*Frisch. inf.* 11. p. 10. t. 3. f. 15. *Pediculus Brassicæ.*  
*Habitat in Brassica.*

13. *A.*

- Craccæ. 13. *A. Viciæ* Craccæ. *Fn. suec.* 986. \*  
*Habitat in Vicia Cracca.*
- Laſtucæ. 14. *A. Laſtucæ.*  
*Reaum. inf.* 3. t. 22. f. 3, 4, 5.  
*Habitat in Laſtuca oleracea.*
- Sonchi. 15. *A. Sonchi caudata.* *Geoffr. parif.* 1. p. 497. n. 13.  
*Reaum. inf.* 3. t. 22. f. 3 - 5.  
*Habitat in Soncho oleraceo.*
- Cirſii. 16. *A. Serratulæ arvenſis.* *Fn. suec.* 987. \* *It. wgoth.*  
307.  
*Habitat in Serratula arvenſi.*
- Cardui. 17. *A. Cardui.* *Fn. suec.* 988. \*  
*Habitat in Carduis.*
- Tanacetī. 18. *A. Tanacetī vulgaris.* *Fn. suec.* 989. \*  
*Habitat in Tanaceto vulgari.*
- Abſinthii. 19. *A. Artemiſiæ Abſinthii.* *Fn. suec.* 990. \*  
*Habitat in Artemiſia Abſinthio.*
- Jaceæ. 20. *A. Centaureæ Jaceæ.* *Fn. suec.* 991. \*  
*Habitat in Centaurea Jacca.*
- Betulæ. 21. *A. Betulæ albæ.* *Fn. suec.* 992. \*  
*Reaum. inf.* 3. t. 22. f. 2.  
*Geoffr. parif.* 496. n. 7.  
*Habitat in Betula alba.*
- Roboris. 22. *A. Quercus Roboris nigra, corniculis obſoletis atris*  
*medii abdominis.* *Fn. suec.* 993. \*  
*Habitat in Quercu Robore.*
- Fagi. 23. *A. Fagi ſylvaticæ lanata.* *Geoffr. parif.* 1. p. 497. n. 2.  
*Reaum. inf.* 3. t. 26. f. 1.  
*Habitat in Fago ſylvatica.*
- Quereus. 24. *A. Quereus proboscelde longiſſima.*  
*Reaum. inf.* 3. t. 28. f. 5 - 14.  
*Geoffr. parif.* 498. n. 14.  
*Habitat in corticibus Quercus, in Gallia.*  
*Maxima noſtratum, atra. Alæ hyaline margine ex-*  
*terius atro, Antennarum Pedumque articuli baſi*  
*fer-*

*ferruginei*. Rostrum longitudine abdominis. Abdomen muticam.

- Pini. 25. *A. Pini sylvestris*. *Faun. suec.* 994.  
*Habitat in Pino sylvestri.*
- Salicis. 26. *A. Salicis*. *Fn. suec.* 995. \*  
*Reaum. inf.* 3. t. 22. f. 2.  
*Habitat in Salicibus: caprea, viminali, pentandra.*
- Populi. 27. *A. Populi tremulæ foliorum*. *Fn. suec.* 996. \*  
*Habitat in Populo tremulæ, sub foliis fornicatis.*
- tremulæ. 28. *A. Populi tremulæ ramulorum*. *Faun. suec.* 997. \*  
*Habitat in ramulis Populi tremulæ, ubi folia approximantur ut tegant.*
- bursaria. 29. *A. Populi nigræ*. *Fn. suec.* 998.  
*It. scan.* 311.  
*Hoffm. alt. hort.* 51.  
*Seb. mus.* 1. t. 38. f. 8.  
*Jung. verm.* 161, 162.  
*Rupp. jen.* 3. p. 333.  
*Swamm. bibl.* 45. f. 22 - 25.  
*Reaum. inf.* 3. t. 26. f. 7 - 11.  
*Amb. hort.* t. 96.  
*Merian europ.* 1 p. 15. t. 42.  
*Habitat in Populi nigræ foliis saccatis, petiolorumque utricularis coloratis.*
- Urticæ. 30. *A. Urticæ, alba lanata, postice truncata*.  
*Frisch. inf.* 8. p. 34. t. 17.  
*Habitat in Urtica Germanicæ. P. Forskål.*  
*Inter maximas huius generis, tota alba, obtecta quasi setis; subtus vero laxe alba, postice valde obtusa; de genere hæreo, utrum ad Aphides aut Cermes accedat.*
- Aceris. 31. *A. Aceris platanoides*. *Fn. suec.* 999. \*  
*Reaum. inf.* 3. t. 22. f. 6 - 10.  
*Geoffr. paris.* 495. n. 5.  
*Habitat in Acere Platanoides.*
- Atriplicis. 32. *Atriplicis*. *Fn. suec.* 1000.  
*Habitat sub Atriplicis, imprimis littoralis, foliis, obambulans intra cylindrum a foliis revolutis confectum.*



Pistacia. 33. *A. nigra*, alis albidis, tibiis longissimis, thorace verrucoso. *Gouan.*

*Siml. vit. gesu.* 49.

*Camer. epit.* 51.

*Lob. ic.* 100.

*Dod. pempt.* 780.

*Bauh. hist.* 1. p. 279.

*Tabern. hist.* 1439.

*Habitat in Pistacia vera, Terebintho, Lentisco, quibus e foliorum basi enascitur Folliculus incarnatus, ventricosus, utrinque attenuatus, spithameus, pollice crassior.*

*Lentisci folliculus reniformis, compressus, ex parte laterali folii aucta; cum hic folliculus viridis est vivunt in eo Aphides, cum vero demum ruber evasit, ex eo exiere per linearem aperturam: Aphides flavæ annulis 10. Rostrum inflexum. Oculi nigricantes. Antennæ moniliformes. Abdomen postice muticum. Alæ 4 erectæ in nonnullis. Lanugo alba globulis albis pellucidis mixta, sæpe adheret abdomini postice. Vandellius.*

228. CHERMES. *Rostrum pectorale.*  
*Antennæ thorace longiores.*  
*Alæ IV deflexæ.*  
*Thorax gibbus.*  
*Pedes saltatorii.*

- Graminis. 1. *C. Airæ flexuosæ. Fn. suec. 1001. \**  
*Faun. suec. 693. Chermes graminis.*  
*Habitat in Graminibus, imprimis in Aira flexuosa.*
- Ulm. 2. *C. Ulmi campestris. Fn. suec. 1002. \**  
*Habitat intra folia revoluta Ulmi campestris.*
- Cerastii. 3. *C. Cerastii viscosi. Fn. suec. 1003.*  
*Habitat in foliis Cerastii viscosi, conniventibus in capitulo.*
- Pyri. 4. *C. Pyri communis. Faun. suec. 1004. \**  
*Habitat in Pyri communis foliis.*

5. C.

*Chermis Larvæ pedata, sæpe villosæ; Volatilia solum, plantis insident.*

- Sorbi. 5. *C. Sorbi aucupariæ*.  
*Habitat in Sorbo aucuparia.*  
*Corpus supra lituris lineisque variis nigris; subtus vi-*  
*rens. Thorax flavescens antice punctis 2, postice li-*  
*neis 4 nigris.*
- Calthæ. 6. *C. Calthæ palustris.* *Fann. suec. 1005. \**  
*Habitat in Calthæ palustris floribus.*
- Buxi. 7. *C. Buxi.*  
*Reaum. inf. 3. t. 29. f. 1 - 14.*  
*Habitat intra Buxi folia summa conniventia; in Gallia.*
- Urticæ. 8. *C. Urticæ dioicæ.* *Fn. suec. 1006. \**  
*Habitat in Foliis Urticæ dioicæ.*
- Betulæ. 9. *C. Betulæ albæ.* *Fn. suec. 1007. \**  
*Habitat in Betula alba.*
- Alni. 10. *C. Betulæ Alni.* *Fann. suec. 1008. \* Kalm. it. 2.*  
*p. 275.*  
*Frisch. inf. 8. t. 13. Vermis suætorius Alni.*  
*Schæff. elem. t. 39.*  
*Sultz. inf. t. 12. f. 80.*  
*Habitant in Betula Alni ramulis Larvæ, caudis plu-*  
*mosis testæ; in America septentrionali. Kalm.*
- Quercus. 11. *C. Quercus Roboris.* *Fn. suec. 1009. \**  
*Habitat in Quercus foliis.*  
*Corpus flavo albicans; Elytra ad marginem anteriorem*  
*lituris 4 fuscis; unica vero ad posteriorem.*
- Fagi. 12. *C. Fagi sylvaticæ.* *Fn. suec. 1010.*  
*It. scan. 65.*  
*Reaum. inf. 3. t. 26. f. 1 - 6.*  
*Habitat in Fagi sylvaticæ foliis.*
- Abietis. 13. *C. Pini Abietis.* *Fann. suec. 1011. \* Fl. lapp. 218.*  
*p. 347. E.*  
*It. gotl. 180.*  
*Clusj. pan. 20, 21. Picea pumila.*  
*Geoffr. paris. 487. Pfylla 5.*  
*Frisch. inf. 12. p. 10. t. 2. f. 3. Insectum tuberculi*  
*muricati.*

*Habitat in Pini Abietis apicibus turionum, quæ inde, basi dilatatis foliolis abbreviatisque, baccam mentiuntur.*

- Salicis. 14. C. Salicis. *Fn. suec. 1012. \**  
*Habitat in Salicibus variis.*
- Fraxini. 15. C. Fraxini excelsioris. *Faun. suec. 1013. \**  
*Geoffr. parif. 486. n. 4.*  
*Habitat in Fraxino excelsiore.*
- Aceris. 16. C. Aceris platanoides. *Fn. suec. 1014.*  
*Habitat in Aceris platanoidis ramulis, pedunculis.*
- Ficus. 17. C. Ficus Caricæ.  
*Reaum. inf. 3. t. 29. f. 22 - 24.*  
*Habitat in Fico Carica.*

229. COCCUS. *Rostrum* pectorale.  
*Abdomen* postice setosum.  
*Alæ* II erectæ masculis. *Feminae*  
*apteræ.*

- Hesperidum. 1. C. Hybernaculorum. *Faun. suec. 1015. \**  
*Fn. suec. 722. Coccus hesperidum.*  
*Schæff. elem. t. 48.*  
*Act. parif. 1692. p. 14. t. 14.*  
*Frisch. inf. 12. p. 12.*  
*Reaum. inf. 4. t. 1.*  
*Sultz. inf. t. 12. f. 81.*  
*Geoffr. inf. 505. Chermes hesperidum.*  
*Habitat in arboribus sempervirentibus Hybernaculi: uti Citri, Lauri, Quassia, &c.*
- Aonidium. 2. C. indarum arborum.  
*Habitat in Asiæ arboribus sempervirentibus, ut in Camellia, aliisque.*  
*Præcedenti minor, sed similis: Testa orbiculata, planiuscula, atro-purpurascens, centro s. vertice tuberculo rotundo rubro, quod in senescentibus aperitur.*  
Mas

Cocci tardi, imprimis matres gravidæ, plantis adherent, sæpe ramis, aliæ radicibus, fere immobiles; Mares volatu saliant.

- Mas apterus, flavescens, oblongus, apice caudæ aliquot pilis rectis. Antennæ longitudine fere thoracis, filiformes.*
- capensis. 3. *C. ovalis* subtomentosus conico-gibbus apice operculato. *Ann. acad. 6. p. 401. n. 47. \**  
*Habitat in Gnaphalio muricato ad Caput b. spei.*
- adonidum. 4. *C. rufa* farinacea pilosa.  
*Geoffr. parif. 1. p. 511. n. 1. Coccus adonidum, corpore roseo farinaceo, alis setisque niveis.*  
*Faun. suéc. 1. n. 1169. Pediculus adonidum.*  
*Habitat in America, Africa, nunc in Europa calidiore.*  
*Conf. Lederm. 1762. t. 9. Pediculus Coffæ.*  
*Corpus ovatum, oblongiusculum, album. Linea dorsalis longitudinalis, elevata, cum puncto obsoleto in singulo segmento. Laterum margines acuti cum incisuris 14, totidemque punctis prominentibus. Area inter lineam dorsalem marginemque totidem punctis in seriem longitudinalem dispositis. Cauda bifida. Antennæ capillares fusæ. Pedes 6, tennes, fusci. Senior factus folliculum struit, se ipso sexies majorem, intra quem insimul ova flava includit.*
- Quercus. 5. *C. Quercus* Roboris. *Fn. suéc. 1016.*  
*Reaum. inf. 4. t. 6. f. 1 - 4 & alia f. 8, 9, 10.*  
*Habitat in Quercu Robore.*
- Ilicis. 6. *C. Quercus* coccifera.  
*Garid. aixens. 250. t. 53. & 2.*  
*Geoffr. mat. 2. p. 782.*  
*Reaum. inf. 4. t. 5.*  
*Lederm. micr. 72. t. 36.*  
*Habitat in Galloprovinciæ Quercu coccifera.*  
*Aceto immerguntur, exsiccantur supra lintea.*
- Betulæ. 7. *C. Betulæ* albæ. *Fn. suéc. 1017.*  
*Habitat in Betula alba.*
- Carpini. 8. *C. Carpinus* Betuli. *Fn. suéc. 1018. It. scan. 47.*  
*Habitat in Carpino Betulq.*
- Ulmi. 9. *C. Ulmi* campestris. *Fn. suéc. 1019.*  
*Geoffr. parif. 512. n. 7.*  
*Habitat in Ulmo campestri.*

- Coryli. 10. *C. Coryli* Avellanæ. *Fn. suec.* 1020.  
*Reaum. inf.* 4. t. 3. f. 4 - 10.  
*Habitat in Corylo Avellana.*
- Tiliæ. 11. *C. Tiliæ* europææ. *Fann. suec.* 1021.  
*Reaum. inf.* 4. t. 3. f. 1 - 3.  
*Habitat in Tilia europæa.*
- Rusci. 12. *C. Rusci*, testa octo clypeolis cincta.  
*Column. purp.* 16. t. 17. *Lepas nova f. myrti morbus.*  
*Bocc. mus. t.* 107. f. XXIII: b, b.  
*Ginan. adr.* 1. p. 60. t. 3. f. 27. *Balanus terrestris*  
 compositus e multis testis.  
*Klein. ostr.* 116. *Lepas tessellata.*  
*Habitat in Apuliæ Myrto, Rusco. D. Kähler.*  
*Testa truncata, octagona, perforata, cincta octo clypeo-*  
*lis instar testudinis: horum omnes in medio granulo*  
*notati, exceptis duobus lateralibus oppositis.*
- Myricæ. 13. *C. Myricæ* quercifoliæ.  
*Habitat ad Cap. b. spei in Myrica quercifolia.*  
*Magnitudo Pisi minoris, semiovatus secundum perpen-*  
*diculum, pallide incarnatus, verticè obtuse acumi-*  
*natus cum poro tenuissimo; postice supra marginem*  
*etiam porus est. Margo cartilagineus, crassior, al-*  
*bus, utrinque circiter 7 torulis protuberans.*
- Capræ. 14. *C. Salicis* cinereæ.  
*Habitat in Salicibus foliis hirsutis.*  
*Magnitudo Pisi majoris, semiamplexicaulis, antice ob-*  
*tusus & bifidus, ovatus, colore Seminis Staphylæ.*
- Salicis. 15. *C. Salicis* hermaphroditicæ. *Fn. suec.* 1022. \*  
*Habitat in Salicis hermaphroditicæ cortice.*  
*Adeo parvus, ut nisi attente observetur, non conspicuus.*
- Vitis. 16. *C. Vitis* viniferæ.  
*Reaum. inf.* 4. t. 6. f. 5 - 7.  
*Act. bonon.* 2. pp. 2. p. 279. t. 284.  
*Habitat in Vite vinifera.*
- poloni-  
cus. 17. *C. radicis* Scleranthi perennis. *Fn. suec.* 1023.  
*Fn. suec.* 720. *Coccus radicum purpureus.*  
*Camer. epis.* 691. *Polygonum cocciferum.*  
*Bauh. pin.* 281.

B b b

Breyn.

*Breyn. E. N. C.* 1731.

*Rupp. jen.* 86.

*Raj. bist.* 186.

*Bauh. bist.* 3. p. 378.

*Reaum. inf.* 4 p. 1.

*Frisch. inf.* 5. p. 6. t. 2.

*Geoffr.* 504. *Chermes radicum purpureus.*

*Aët. angl.* 1765. p. 91. t. 10. *Potentillæ albæ & reptantis, Scleranthi annui.*

*Aët. nps.* 1742. p. 54. t. 1.

*Habitat in Scleranthi perennis radicibus.*

**Pilosellæ.** 18. *C. radicis Hieracii Pilosellæ. Fn. suec.* 1024.

*Sim. Paul. quadr.* 113.

*Aët. nps.* 1742. p. 54. t. 2.

*Habitat in Hieracii Pilosellæ radicibus.*

*Affinis nimium C. polonici.*

**Uvæurfi.** 19. *C. radicis Arbuti Uvæ urfi. L. aët. holmens.*

*Habitat ad radices Arbuti Uvæ urfi sub muscis.*

**Phalaridis.** 20. *C. radicum Phalaridis. Fn. suec.* 1026. \*

*Geoffr. paris.* 1. p. 512. n. 2. t. 10. f. 5. *Coccus Graminis, corpore roseo.*

*Habitat in Phalaridis canariensis, variisque aliis, Graminum radicibus.*

**Oxyacan-** 21. *C. Cratægi Oxyacanthæ.*

*thæ.*

*Reaum. inf.* 4. t. 6. f. 11, 12.

*Habitat in Cratægo Oxyacantha.*

**Cacti.** 22. *C. Cacti coccinelliferi.*

*Brown. jam.* 435. *Coccinella alis destituta, corpore rugoso.*

*Hern. mex.* 78.

*Sloan. jam.* 2. p. 153. *præf.* t. 9.

*Pet. gaz.* 3. t. 1. f. 5.

*Reaum. inf.* 4. t. 7. f. 11, 19.

*Aët. angl.* 1762.

*Habitat in Cactis Opuntiis variis Americæ. Vivus transmissus a D. Rolandro in Hort. Upsaliensem 1756. Pluviam non fert.*

*Corpus depressum, tomentosum, rugis transversis, & margines laterales dorsi utrinque duplices: superiore brevior. Abdomen purpurascens. Os: punctum sub-*

*Subulatum e medio pectoris. Antennæ subulata, corpore  $\frac{1}{4}$  breviores. Pedes breves, nigri.*

no. THRIPS. *Rostrum* obscurum.

*Antennæ* longitudine thoracis.

*Corpus* lineare. Abdomen sursum reflexile.

*Alæ* IV, rectæ, dorso incumbentes, longitudinales, angustæ, subcruciatae.

paradoxa. 1. *T. fusca*, alis abbreviatis, antennis pectinatis fissilibus aliformibus. *Amæn. acad.* 6. p. 401. n. 48. \*

*Habitat in China.*

*Insectum valde singulare.*

Physapus. 2. *T. elytris* glaucis, corpore atro. *Faun. suec.* 1027. \*

*Geoffr. paris.* 385. n. 2. *Scop. carn.* 418.

*De Geer. act. stockh.* 1744. p. 3. t. 4. f. 4. *Physapus* ater, alis albis.

*Schæff. elem.* t. 127.

*Habitat in floribus semistylulorum. Lotti corniculata flores clausos tumidosque reddit, spicas Secales inanis.*

minutissima. 3. *T. elytris* corporeque glauco, oculis fuscis. *Fn. suec.* 1028. \*

*Habitat in Europa.*

Juniperina. 4. *T. elytris* niveis, corpore fusco. *Fn. suec.* 1029. \*

*De Geer. act. stockh.* 1744. p. 6. t. 1. f. 2. *Physapus* fuscus, alis albicantibus.

*Geoffr. paris.* 1. p. 384. n. 1. t. 7. f. 6.

*Habitat in Juniperis.*

fasciata. 5. *T. elytris* albis nigrisque fasciatis, corpore fusco. *Fn. suec.* 1030. \* *Geoffr. paris.* 385. n. 3.

*Sulz. inf.* t. 7. f. 48. b.

*Habitat in floribus.*

*Thripis rostrum ob parvitatem vix conspicuum; Li in floribus frequentes agilissimi fere subsistunt, abdomen saepius sursum flexunt. Tarsi vesiculosi. Bonpau. De Geer. Geoffr. Larvæ æque agiles currunt, saepius rubræ.*

## III. LEPIDOPTERA.

Alæ IV, imbricatæ squamis.

Os *Lingua involuta spirali.*

Corpus pilosum.

231. PAPILIO. *Antenna* apicem versus crassiores, sæpius clavato-capitata.*Alæ* (sedentis) erectæ sursumque conniventes (volatu diurno.)\* EQUITES *Troës.*Priamus. 1. P. E. alis denticulatis tomentosis supra viridibus: institis atris; posticis maculis sex nigris. *Amæn. acad.* 5. t. 3. f. 203. *Mus. Lud. Ulr.* 182. \* *Clerck. ic. t.* 17.*Vincent. mus.* 10. Papilio amboinensis viridi & nigro-holosericeus insignis.*Mus. petrop.* 664. Papilio f. Atlas amboinensis, alis superioribus holoserice nigris: institis viridibus.*Habitat in Amboina.*

Papi-

Papiliones dividuntur in VI. phalanges:

a. Equites *Alis* primoribus ab angulo postico ad apicem longioribus, quam ad basin; his sæpe *Antennæ* filiformes.-- -- *Troës* ad Pectus maculis sanguineis, (*sæpius nigri*).-- -- *Achivi* Pectore incruento, ocellis ad angulum ani:-- -- *Alis* absque fasciis.-- -- *Alis* fasciatis.b. *Heliconii* *Alis* angustis integerrimis, sæpe denudatis: primoribus oblongis; posticis brevissimis.c. *Danai* *Alis* integerrimis.Candidi *Alis* albidis.Festivi *Alis* variegatis.d. *Nymphales* *Alis* denticulatis:Gemmae *Alis* ocellatis:Ocellis in *Alis* omnibus.in *Alis* primoribus.in *Alis* posticis.Phalerati *Alis* cæcis absque ocellis.e. *Plebeji* parvi: Larva sæpius contracta.Rurales *Alis* maculis obscurioribus.Urbicolæ *Alis* sæpius maculis pellucidis.



*Papilionum omnium Princeps longe angustissimus, totus holosericeus, ut dubitem pulchrius quidquam a natura in insectis productum.*

Corpus 1:me magnitudinis. Caput & Pedes nigra. Thoracis latera lineis transversis coccineis. Abdomen flavissimum. Antennas non vidi.

Alæ Primores supra virides margine nigro: macula nigra ovato-oblonga magna disci; subtus nigricantes: Macula viridis linearis versus marginem anteriorem & apicem; Macula viridis parva duplicata in disco; Macula viridis magna disci versus marginem posticum, in qua Puncta 6 nigra oblonga.

- Secundariæ supra virides margine nigro: Macula 4 nigra versus marginem posticum; Macula fulva major, tecta ab alis primoribus, subtus virides margine nigro-dentato; Macula 6 nigra; rotundata, intra marginem; Macula fulva, magis oblonga, ante primores; Margo interior niger lana ferruginea longissima.

Hedior. 2. P. E. alis caudatis concoloribus nigris: primoribus fascia alba; posticis maculis rubris. *Mus. Lud. Utr.* 181. \* *Clerck. ic. t. 33. f. 1.*

*Raj. inf. 134. & 137. Papilio indica maxima nigra. Habitat in Indiis.*

Alæ Primores fascia alba ex maculis 8 ovalibus bifidis, præter reliquas; Posticæ arcu duplici e maculis coccineis retrorsum lunatis.

Paris. 3. P. E. alis caudatis nigris: posticis macula cyanea ocelloque purpureo; subtus ocellis septem. *Mus. L. U. 184. \* Clerck. ic. t. 13. f. 1.*

*Knorr. delic. t. C. 3. f. 1.*

*Habitat in Asia.*

Alæ supra atomis caruleis; Posticæ subtus atomis albis & ocellis 7 intra marginem posticum. Datur etiam ecaudatus.

Heltenus. 4. P. E. alis caudatis nigris: posticis macula alba: subtus tribus albidis lunulisque septem ferrugineis. *M. L. U. 185. \* Clerck. ic. t. 13. f. 2.*

*Ekret. pict. t. 10.*

*Edw. av. t. 342.*

*Habitat in Asia.*

Polytes. 5. P. E. alis caudatis nigris concoloribus: posticis fascia maculis quinque albis lunulisque rubris. *Mus. Lud. Ulr.* 186. \* *Clerck. ic. t. 14. f. 1.*  
*Habitat in Asia.*

Troilus. 6. P. E. alis caudatis nigris: primoribus punctis marginalibus pallidis; posticis subtus maculis fulvis. *M. L. U.* 187. \*  
*Habitat in Indiis.*

Deiphobus. 7. P. E. alis caudatis nigris: subtus basi rubro maculatis; posticis maculis septem rubris subannularibus. *Mus. Lud. Ulr.* 188. \* *Clerck. ic. t. 25.*  
*Edw. av. t. 346.*  
*Pet. gaz. t. 11. f. 8.* Papilio luz. maximus nigrescens: maculis coccineis.  
*Habitat in Asia.*

Pammon. 8. P. E. alis caudatis nigris concoloribus: omnibus margine maculatis; posticis fascia maculis septem albis. *M. L. U.* 189. \* *Clerck. ic. t. 14. f. 2.*  
*Raf. add. t. 2. f. 2, 3.*  
*Habitat in Asia.*

Glaucus. 9. P. E. alis subcaudatis nebulosis concoloribus: primoribus macula flava; posticis macula ani fulva. *Mus. Lud. Ulr.* 190. \* *Clerck. ic. t. 24. f. 1.*  
*Habitat in America.*  
*Alæ Posticæ Linea transversa fusca bifida; ceterum Troilo similis.*

Polydorus. 10. P. E. alis subcaudatis nigris concoloribus: posticis macula alba suturis sexfida lunulisque septem rubris. *Amœn. acad. 6. p. 401. n. 50.* \* *Clerck. ic. t. 33. f. 2.*  
*Habitat in India.*  
*Affinis Polythes, sed alæ vix caudatæ.*

Anchises. 11. P. E. alis dentatis nigris concoloribus: posticis maculis septem coccineis ovatis. *Mus. L. U.* 191. \* *Clerck. ic. t. 29. f. 1.*  
*Merian. sur. 17. t. 17.*  
*Sloan. jam. 2. p. 216. t. 239. f. 19, 20.*  
*Edw. av. t. 207.*  
*Eluct. pict. t. 9.*  
*Habitat in Citro Americæ. Larva tentaculata.*

12. P. E.

Polydama. 12. P. E. alis dentatis nigris fascia interrupta flava, posticis subtus maculis linearibus flexuosis rubris. *Mus. Lud. Ulr.* 192. \*

*Merian. sur.* 31. t. 31.

*Habitat in Hibisco mutabili Americes.*

Alæ supra fascia lutea e maculis parallelis sagittatis; Posticarum margo subtus maculis 7, linearibus, flexuosis (3), coccineis.

Memnon. 13. P. E. alis dentatis nigris: omnibus basi subtus rubro notatis. *Mus. Lud. Ulr.* 193. \*

*Pet. gaz.* t. 11. f. 8.

*Raj. inf.* 135.

*Habitat in China.*

Alæ Primores subtus basi macula ovata, rubra: Posticæ basi paribus 4, subrotundis, rubris, confertis.

Agenor. 14. P. E. alis dentatis nigris basi sanguineis: primoribus striatis; posticis disco albo maculis nigris. *M. L. U.* 194. \* *Clerck. ic.* t. 15.

*Habitat in China.*

Alæ Primores concolores, albo late striatæ. Posticæ atræ disco albo; postice cinctæ maculis 7 nigris, versus anum rubro infectis. Similis *Deiphobo*.

Sarpedon. 15. P. E. alis dentatis nigricantibus fascia viridi: posticis subtus linea bascos maculisque quinque rubris. *Mus. Lud. Ulr.* 196. \*

*Habitat in Asia.*

*Differt a P. Eurypylo, quod, in alis primoribus, supra, nulla puncta virescentia, præter illa quæ fasciam constituent; in Eurypylo vero macule s. puncta, præter fasciam, tam ad marginem anteriorem, quam posteriorem.*

Æneas. 16. P. E. alis dentatis atris: primoribus supra macula viridi; posticis macula palinata sanguinea. *M. L. U.* 197. \*

*Ruf. inf.* 4. p. 24. t. 2. f. 2.

*Habitat in Asia.*

Alæ posticæ subtus maculis 5, sanguineis; basi approximatis.

Bbb 4

17. P. E.

Panthous. 17. P. E. alis dentatis nigris concoloribus: primoribus albo maculatis; posticis maculis albis nigra foetis.  
*Mus. Lud. Ulr.* 195. \* *Clerck. ic. t. 18, 19.*  
*Habitat in Indiis.*

Pandarus. 18. P. E. alis subdentatis nigricantibus albo-maculatis concoloribus; posticis flavis, ocellis septem nigris.  
*Mus. Lov. Ulr.* 198. \*  
*Habitat in India.*

Helena. 19. P. E. alis dentatis atris concoloribus: posticis disco communi aurato. *Mus. Lud. Ulr.* 199. \* *Clerck. ic. t. 22. f. 1.*  
*Merian. surin. in tabula titulo praefixa: figura maxima.*  
*Habitat in floribus Arecae Americes.*  
*Speciosissimus colore fulgentissimi auri, utrinque in disco alarum posticarum.*

\* EQUITES Achivi.

Menelaus. 20. P. E. alis dentatis: supra caeruleis nitidissimis; subtus nebulosis punctis fuscis. *Mus. Lud. Ulr.* 200. \*  
*Clerck. ic. t. 21. f. 1. Gron. zooph. 722. \**  
*Merian. surin. 53. t. 53.*  
*Knorr. delic. t. C. 4. f. 2.*  
*Habitat in America meridionali.*  
*Color alarum caeruleus paginae superioris adeo politus nitidusque, ut vix simile in rerum natura conspiciatur. Sexus alter in pagina inferiore alarum primorum Ocellos 2, in posticarum 3 gerit.*

Ulysses. 21. P. E. alis caudatis nigris disco caeruleo radiante; posticis subtus ocellis septem. *Mus. L. U.* 201. \*  
*Clerck. ic. t. 23. f. 1.*  
*Habitat in Asia.*  
*Alae Primores atrae: a basi ad medium macula caerulea septem-dentata: maculis 7 fuscis lanceolatis parallelis, in parte alarum nigra simul arcum caeruleam intrantibus.*

Agamemnon. 22. P. E. alis caudatis nigris viridi-maculatis; posticis subtus oculo lunato maculisque rubris. *Mus. L. U.* 202.  
*Habitat in Asia. Osbeck.*

Alc

*Alæ posticæ subtus maculis nigris apice rubris. Similis Temero, sed magis niger maculisque minoribus flavia.*

- Diomedes. 23. P. E. alis caudatis nigris, supra introrsum viridibus; posticis lunulis cyaneis. *Mus. Lud. Ulr.* 203. \*

*Habitat in Indiis.*

*Alæ posticæ supra versus basin cyaneæ, lunulisque inter dentes cyaneis; subtus maculis marginalibus 6 semiocellatis.*

- Patroclus. 24. P. E. alis caudatis concoloribus fuscis: fascia lineari alba apicibusque albis. *M. L. U.* 204. \* *Clerck. ic.* t. 37. f. 1.

*Habitat in Indiis.*

*Antennæ filiformes ut in Idomeneo, Telepho, Achille.*

- Pyrrhus. 25. P. E. alis bicaudatis fuscis fascia communi alba: primorum dimidiata. *Mus. L. U.* 205. \* *Clerck. ic.* t. 25. f. 2.

*Habitat in Indiis.*

*Alæ posticæ dentibus 2 longioribus; his margo flavus lunulis 3 rufis: quarta remotiore.*

- Jason. 26. P. E. alis bicaudatis fuscis postice lutescentibus, subtus fascia characteribusque albis.

*Habitat in Barbaria. Brander.*

*Corpus fuscum, magnitudine P. Populi. Antennæ nigrae, filiformi-clavatae. Palpi extus albi. Pedes 6, perfecti. Alæ Primores supra fuscae, ad marginem posticum lutescentes nervis nigris; ante hunc ordinem Puncta 5 s. 6 ferruginea, ordine transversa. Postice supra fuscae: his postice ordo macularum albarum sublunarium; anterieus ordo e maculis ceruleis parvis 5 s. 7. Margo posticus niger dentatus: dentibus duobus alternis excurrentibus in caudas lineares. Subtus omnes secut fascia media nivea. Area anterior ferruginea scripta characteribus albis difformibus, includentibus maculas griseas; postica area colore fere paginae superioris.*

B b b 5

27. P. E.

Hexapodi sunt plurimi Equites; sed de Menelae, Achilla, Idomeneo nobis non constat.

Orontes. 27. P. E. alis caudatis nigris albido-virescente fasciatis : caudis albis distantibus. *Aman. acad.* 6. p. 402. n. 51. \* *Clerck. ic. t. 26. f. 1.*  
*Habitat in Indiis.*

Nireus. 28. P. E. alis subcaudatis nigris : fascia inaurato-viridi ; subtus nigricantibus. *Mus. Lud. Uir.* 217. \* *Clerck ic. t. 30. f. 1.*  
*Habitat in Indiis.*

Philoctetes. 29. P. E. alis subcaudatis fuscis ; posticis ocellis duobus cæruleis pupilla nigra punctisque tribus albis. *Mus. L. U.* 219. \* *Clerck. ic. t. 30. f. 3.*  
*Habitat in Indiis.*

*Alæ Primores, subtus fascia lineari alba & linea transversa atra baseos. Posticæ punctis 3 albis & maculis 2 violaceis.*

Stelenes. 30. P. E. alis subcaudatis supra fuscis : fascia virescente obtusa interrupta. *M. L. U.* 219. \* *Clerck. ic. t. 35. f. 2.*

*Merian. sur. 2. t. 2.*

*Sinn. jam. 2. p. 219. t. 239. f. 9, 10.*

*Pet. gaz. t. 13. f. 1.*

*Habitat in America calidiore.*

Leilus. 31. P. E. alis caudatis concoloribus nigris : fascia lineisque viridibus nitentibus numerosis. *Mus. Lud. Uir.* 206. \* *Clerck. ic. t. 27. f. 1. Gron. zooph. 724.*

*Merian. sur. 29. t. 29.*

*Sinn. jam. 2. p. 215. t. 239. f. 11, 12.*

*Knorr. delic. t. C. f. 1.*

*Rœf. add. t. 2. f. 1.*

*Habitat in Citro Americæ.*

Ajax. 32. P. E. alis obtuse caudatis concoloribus fuscis : fasciis flavescens, angulo ani fulvo.

*Raj. inf. 111. n. 2.*

*Edw. av. 34.*

*Habitat in America boreali.*

Machæon. 33. P. E. alis caudatis concoloribus flavis limbo fusco lunulis flavis, angulo ani fulvo. *Fn. fec. 1031. \**

*Scop. carn. 444. Gron. zooph. 725.*

*Mouff. inf. 99. t. 968.*

*Aldr.*

*Aldr. inf.* 96. n. 5, 6. f. 1.

*Fonst. inf.* t. 5, 7.

*Column. ecph.* 2. t. 86.

*Raj. inf.* 110. n. 1.

*Rob. ic.* 18.

*Merian. eur.* t. 94 & 163.

*Frisch. inf.* 2. t. 10.

*Reaum. inf.* 1. t. 29. f. 1. & t. 30.

*Edw. av.* t. 343.

*Rœf. inf.* 1. pap. 2. t. 1.

*Wilk. pap.* 47. t. 1. a. 1.

*Geoffr. parif.* 2. p. 54. n. 23.

*Habitat in Europa Umbellatis & Ruta.*

*Larva laevis, viridis cingulis nigris: alternis ferrugineo punctatis. Caput tentaculis 2.*

Xuthus. 34. P. E. alis caudatis nigris albido striato-maculatis; posticis subtus caeruleo fulvoque subocellatis.

*Habitat in India orientali.*

*Simillimus P. Ajaci. Alæ supra nigrae maculis obconatis (extimis duabus puncto nigro) lunalisque marginalibus albidis. Subtus albida nigro radiata. Inferiores subtus ordine e maculis caeruleis fulvisque connexis; supra aliquot maculae caerulescentes obsoletæ.*

Anthilochus. 35. P. E. alis caudatis concoloribus flavis: fasciis margineque nigris, caudis albis longitudine alæ. *Mus. Lud. Ulr.* 207. \*

*Pet. mus.* 50. n. 505. Papilio caudatus maximus, stris umbrisque nigris.

*Catesb. car.* 2. t. 83.

*Habitat in America septentrionali.*

Podalirius. 36. P. E. alis caudatis subconcoloribus flavescentibus: fasciis nigricantibus geminatis; posticis subtus linea sanguinea. *M. L. D.* 208. \* *Scop. carn.* 445.

*Gron. zooph.* 731.

*Raj. inf.* 111. n. 3.

*Merian. eur.* 163. f. 44.

*Reaum. inf.* 1. t. 11. f. 3, 4.

*Rœf. inf.* 1. pap. 2. t. 2.

*Pod. inf.* 62. t. 2. f. 1. Papilio Simm.

*Geoffr. parif.* 2. p. 56. n. 24.

*Schæff. elem.* t. 94. f. 4.

*Habitat in Brasilia Europa australis Africaque borealis.*

*Aff.*

*Affinis nimium Protefilao, ut larva utriusque distinguat species.*

- Phidippus. 37. P. E. alis subcaudatis fuscis, subtus fasciis albidis biocellatis caudæque ocellis geminis. *Amæn. acad. 6. p. 402. n. 52. \**  
*Habitat in Java. Nordgreen.*
- Jafon. 38. P. E. alis subcaudatis supra fuscis fascia posticisque maculis sex viridibus. *Mus. Lud. Utr. 210. \**  
*Habitat in Indiis.*
- Protefilaus. 39. P. E. alis caudatis subconcoloribus albidis: fasciis fuscis: unica subtus sanguinea, angulo ani rubro. *M. L. Utr. 209. \* Clerck. ic. t. 27. f. 2.*  
*Pet. mus. 50. n. 502.*  
*Sloan. jam. 2. p. 218. t. 239. f. 17, 18.*  
*Merian. sur. 43. t. 43.*  
*Seh. mus. 1. t. 11. f. 2.*  
*Catesb. car. 2. t. 100.*  
*Habitat in America septentrionali.*
- Nestor. 40. P. E. alis dentatis: supra fuscis maculis discoque cæruleis, subtus ocellis tribus binisque. *\**  
*Gron. zooph. 718. \**  
*Merian. sur. 9. t. 9.*  
*Habitat in Punica Americæ.*
- Telemachus. 41. P. E. alis dentatis: supra fuscis immaculatis area communi cærulea radiata; singulis subtus ocellis sex. *†*  
*Merian. sur. 68. t. 68.*  
*Habitat in America.*  
*Simillimus parenti, sed minor, nec caudatus.*
- Achilles. 42. P. E. alis dentatis: supra nigris fascia cærulea; subtus fuscis: ocellis tribus quinisque. *M. L. U. 211. \**  
*Clerck. ic. t. 24. f. 2.*  
*Gron. zooph. 719.*  
*Merian. sur. 7. t. 7.*  
*Knorr. delic. t. C. 2. f. 1, 2.*  
*Habitat in Psidio Americæ.*

43. P. E.

---

Larva Machanitis, Anclises & plurimum Equitum Tentacula duo supra caput exserit, uti Larva Apollinis, utrum vero idem in reliquis Equitibus obtineat, dici docet.



Medon. 43. P. E. alis supra nigris: primoribus fascia lutea apice-  
que albo; posticis disco cærulescentibus. *Aman. a-*  
*cad. 6. p. 402. n. 53. \* Clerck. ic. t. 28. f. 1.*  
*Habitat in Indiis.*

Teucer. 44. P. E. alis subrepandis lividiusculis, subtus nebulosis;  
posticis ocellis tribus: postremo maximo. *Mus. L.*  
*Ulr. 212. \**  
*Gron. zooph. 721. \**  
*Merian. sur. 23. t. 23.*  
*Sloan. jam. 2. p. 219. n. 24.*  
*Knorr. delic. t. C. 1. f. 1, 2?*  
*Pet. gaz. t. 28. f. 1?*  
*Habitat in Musa Americæ.*

Idome- 45. P. E. alis subcrenatis cærulescenti - fuscescentibus,  
neus. subtus nebulosis: ocellis duobus: postico magno fla-  
vescente. *Mus. Lud. Ulr. 213. \* Clerck. ic. t.*  
*20. f. 1.*  
*Pet. gaz. t. 28. f. 1.*  
*Gron. zooph. 721. \**  
*Merian. sur. 60. t. 60.*  
*Habitat in America meridionali.*  
*Sexu tantum a precedenti distinguit D. Gronovius.*

Demo- 46. P. E. alis dentatis fuscis: maculis fasciæque maculo-  
leus. sa flavis; posticis ocellis binis. *M. L. U. 214. \**  
*Ehret. pict. t. 5.*  
*Raf. add. t. 1. f. 2; 3.*  
*Habitat ad Cap. b. spei. Tulbagh.*  
*Ocellus cæruleus ad marginem anteriorem, ruber ad*  
*angulum ani.*

Demo- 47. P. E. alis dentatis: supra nigris fascia viridi, subtus  
phon. griseo inarmoratis. *M. L. U. 215. Clerck. ic. t.*  
*29. f. 2.*  
*Raf. inf. 4. t. 4. f. 1?*  
*Habitat in Indiis.*  
*Mas intra marginem alarum posticarum punctis 5 al-*  
*bis; Femina vero ocellis 2.*

48. P. E.

Concolores Alæ in Papilionibus dicuntur, quæ in utraque pagina, superiore scili-  
cet & inferiore, eundem colorem gerunt.

*Ægistus*. 48. P. E. alis dentatis fuscis virescente maculatis; subtus subincarnatis maculis virescentibus rarioribus. *Amæn. acad.* 6. p. 401. n. 49. \*

*Habitat in China.*

*Similis P. Agamemnoni.*

*Eurypy- lus*. 49. P. alis dentatis nigris concoloribus: fascia interrupta viridi; posticis subtus rubro maculatis. *M. L. Utr.* 216. \* *Clerck. ic. t.* 28. f. 2.

*Habitat in Indiis.*

Alæ primæ subtus maculis 6 atro-sanguineis in disco. Variat maculis alarum albis loco viridum, an sexu? caute distinguendus a *P. Sarpedone*.

#### \* HELICONII.

*Apollo*. 50. P. H. alis oblongis integerrimis albis: posticis ocellis supra quatuor, subtus sex basique rubris. *Fn. suec.* 1032. \* *H. gotl.* 230. \* *Scop. carn.* 447.

*Monff. inf.* 94. f. 2, 3.

*Pet. mus.* 49. n. 502.

*gaz.* t. 23. f. 8.

*Raj. inf.* 193. n. 2.

*De Geer inf.* 1. t. 18. f. 12, 13.

*Ræf. inf.* 4. pap. 29. t. 4. f. 1, 2.

*Schæff. monogr.* 1754. t. 2. f. 2, 3

*Sultz. inf.* t. 13. f. 41.

*Pod. inf.* 66. n. 11. Papilio Rhea.

*Schæff. elem.* t. 94. f. 6.

*Habitat in Seda Telephio, Saxifr. Cotyledone, frequens in Suecia, prodit mense grossificationis, tarde volitans.*

*Larva Tentaculis 2 ad occiput, quemadmodum E. Machaonis.*

*Mnemo- syne*. 51. P. H. alis oblongis integerrimis albis nigro-nervosis: primoribus maculis duabus nigris marginalibus. *Fn. suec.* 1033. \* *Scop. carn.* 449.

*Uddm. diff.* 55.

*Pod. inf.* 63. n. 3. ♀ *P. Cratægi* varietas.

*Habitat in Finlandia, Hungaria.*

*Præcedenti similis, licet specie distinctissimus.*

*Piera*. 52. P. H. alis oblongis integerrimis hyalinis diaphanis, posticis ocellis binis. *M. L. U.* 220. \* *Clerck. ic.* t. 36. f. 4. *Gron. zooph.* 734, 735.

*Merian.*

*Merian. furin. 16. f. 1.*

*Raf. add. t. 6.*

*Habitat in Indiis.*

- Patithoe. 53. P. H. alis nigris albo subradiatis puncto centrali albo; posticis subtus luteis basi cruentatis.

*Habitat in Asia.*

*Statura P. Apollinis, sed dimidio minor. Alæ omnes supra nigrae, versus basin caerulecentes, in ambitu radiatae striis albis rhombeis. Punctum album in centro cujusvis alæ, subtus alæ primores concolores; Posticæ alæ subtus sulphurea venis nigris, sed margine nigrae, & basi sanguineae. Hæ alæ etiam ad marginem ani supra flavescunt.*

- Horta. 54. P. H. alis oblongis integerrimis rubris: primoribus apice hyalinis; posticis subtus albidis nigro punctatis. *M. L. U. 234. \**

- Cepheus. 5. *Mus. Lud. Ulr. 252. Clerck. ic. t. 43. f. 4.*

*Habitat in Africa.*

*Varietas 5 forte e loco orta.*

- Terpsicore. 55. P. H. alis oblongis integerrimis flavis; posticis saturatioribus: maculis nigris sparsis. *M. L. U. 222.*

*Pet. gaz. t. 40. f. 4.*

*Habitat in Asia.*

- Calliope. 56. P. H. alis oblongis integerrimis luteis: primoribus striis tribus; posticis fasciis tribus nigris. *M. L. U. 223. \**

*Clerck. ic. t. 41. f. 4.*

*Habitat in Indiis.*

- Melite. 57. P. H. alis oblongis integerrimis flavis: primoribus supra nigris: lineis duabus fasciisque flavis. *Amoen. acad. 6. p. 403. n. 56. \** *Clerck. ic. t. 44. f. 5.*

*Habitat in Indiis.*

- Poly-mnia. 58. P. H. alis oblongis integerrimis luteis; primoribus fascia flava; posticis fasciis tribus nigris. *M. L. U. 224. \**

*Pet. gaz. t. 12. f. 8.*

*Raf. inf. 4. p. 43. t. 5. f. 2.*

*Edw. av. t. 175.*

*Habi.*

*Habitat* Surinami.

*Alæ* basi fulvæ.

- Mueme. 59. P. H. alis oblongis integerrimis nigris basi fulvis: primoribus fascia maculisque tribus flavis. *Amoen. acad.* 46. p. 403. n. 5. \*
- Mopsa. 60. P. alis oblongis integerrimis concoloribus luteis nigrisque; subius punctis marginalibus octo albis. *Mus. Lud. Ulr.* 235. \*
- Habitat in India orientali.*  
*Valde affinis* P. *Polymnia*.  $\beta$  forte solo sexu differens.
- Urania. 60. P. H. alis oblongis integerrimis fusciscentibus disco albis; posticis ocellis utrinque binis. *Mus. L. Ulr.* 225. \*
- Habitat in Indiis.*
- Euterpe. 61. P. H. alis oblongis integerrimis nigris albo-punctatis fascia fulva. *M. L. U.* 226. \*
- Habitat in America.*
- Thallo. 62. P. H. alis oblongis integerrimis nigris: primoribus fasciis duabus; posticisque unica flavis. †
- Edw. av.* 36. t. 226.  
*Habitat in China.*  
*Corpus caeruleum, ut & basis alarum anticarum. Caput & anteriora pectoris rubra.*
- Ricini. 63. P. H. alis oblongis integerrimis fuscis; primoribus utrinque fasciis duabus flavis. *Mus. L. Ulr.* 227. \*
- Gron. zooph.* 740, 741.  
*Ehret. pict.* t. 1.  
*Merian. sur.* 30. t. 30.  
*Raf. inf.* 4. p. 42. t. 5. f. 1. mas.  
*Habitat in Ricino Americæ.*  
*Mas alas posticas basi purpureas gerit.*
- Psidii. 64. P. H. alis oblongis integerrimis fuscis; primoribus fasciis tribus; posticisque duabus hyalinis. *Mus. L. Ulr.* 218. \*
- Pet. gaz.* t. 40. f. 3.  
*Merian. sur.* 19. t. 19.  
*Raf. inf.* 4. p. 25. t. 2. f. 3.  
*Habitat in America, Asia Psidio.*

65. P. H.

**Charitho-65.** P. H. alis oblongis integerrimis atris concoloribus: primoribus fasciis flavis tribus; posticis duabus.

*Sloan. jam. 2. p. 217. t. 239. f. 15, 16.*

*Edw. av. 80. t. 80.*

*Habitat in America. Brunniche.*

*Corpus medium, atrum. Caput luteo punctatum. Thorax luteo punctatus: puncto coccineo pectoris utrinque. Abdomen incisuris flavis & puncto utrinque. Antennæ clavatae, nigrae. Pedes nigri: sed primi flavi mutici. Alæ Primores fasciis flavis, tribus, quarum intima a basi ascendit. Margo basos anticus subtus coccineus. A. Posticæ basi punctis 2 coccineis; dein fascia flava lanceolata; tum fascia e punctis 16 flavis; demum puncta marginalia postica 8 flava; ad angulum ani subtus puncta duo coccinea Valde affinis P. Psidii.*

**Chio.** 66. P. H. alis oblongis integerrimis fuscis: primoribus albo maculatis; posticis fascia alba. *Mus. Lud. Ulr. 229. \**

*Merian. sur. 35. t. 35.*

*Habitat in Sophora Americæ.*

**Thalia.** 67. P. H. alis oblongis integerrimis fuscis: primoribus flavo-maculatis; posticis striatis. *M. L. U. 230. \**  
*Clerck. ic. t. 43. f. 2.*

**β.** Papilio *Ixilion.* *Syst. nat. 10. p. 488. n. 191.*

*Habitat in Indiis.*

**Æpea.** 68. P. H. alis oblongis integerrimis albo maculatis: superioribus virescentibus; posticis fascia flava. *Amen. acad. 6. p. 403. n. 55. \** *Clerck. ic. t. 4. f. 2.*  
*Habitat in Indiis.*

**Euryta.** 69. P. H. alis oblongis integerrimis concoloribus fuscis nigro striatis: fascia alba; posticis punctis decem atris. *Mus. Lud. Ulr. 221. Clerck. ic. t. 31. f. 4.*  
*Habitat in Indiis.*

**Erato.** 70. P. H. alis oblongis integerrimis atris: primoribus flavo-maculatis basi rubris; posticis rubro-striatis. *M. L. U. 231. \** *Clerck. ic. t. 40. f. 1.*  
*Habitat in Indiis.*

C c c

71. P. H.

- Melpomene. 71. P. H. alis oblongis integerrimis nigris: primoribus fascia rubra; posticis basi subtus punctis sanguineis.  
*Mus. Lud. Ulr.* 232. \*  
*Edw. av.* t. 38.  
*Sloan. jam.* 2. p. 219. t. 239. f. 25, 26.  
*Pet. gaz.* t. 4. f. 2.  
*Raf. inf.* 4. p. 27. t. 3. f. 6.  
*Habitat in America.*

- Cratægi 72. P. H. alis integerrimis rotundatis albis: venis nigris.  
*Faun. suec.* 1034. \* *It. goth.* 182.  
*Geoffr. parif.* 2. p. 71. n. 43.  
*Scop. carn.* 448.  
*Aldr. inf.* 246. f. 6.  
*Mouff. inf.* 103.  
*Pet. mus.* 33. n. 301.  
*Raj. inf.* 115. n. 5.  
*Albin. inf.* 2. t. 2.  
*Merian. europ.* 2. t. 35.  
*Friseh. inf.* 5. t. 5.  
*Reaum. inf.* 2. t. 2. f. 9, 10.  
*De Geer inf.* 1. t. 14. f. 19, 20.  
*Raf. inf.* 11 p. 2. t. 3.  
*Wilk. pap.* 49. t. 2. a. 1.  
*Habitat in Pruno, Cratægo, Sorbo, Pyro.*  
*Heliconium esse indicant alæ apice denudatæ.*

\* DANAI Candidi.

- Idea. 73. P. D. alis integerrimis rotundatis albis: venis maculisque nigris; primoribus nigro margine albo punctato. *Amen. acad.* 6. p. 405. n. 63. \* *Clerck. ic.* t. 38. f. 1.  
*Edw. av.* t. 340.  
*Habitat in Indiis.*  
*Major reliquis Danais.*

- Anacardi. 74. P. D. alis integerrimis angulatis virescenti-albidis apice fuscis; posticis ocellis duobus. *Mus. Lud. Ulr.* 236. \* *Clerck. ic.* t. 28. f. 3.  
*Merian. sur.* 16. t. 16.  
 β. Papilio Cyrene. *Syst. nat.* 10. p. 474. n. 100.

Habi-

Danaorum Candidorum nomina a filiabus Danai Egypti, Festivorum a filiis mutantis sum.

*Habitat in Anacardio Americes.*

*Larva lanata alba, lana longa ad latera reflexa.*

*Alæ primores supra ocellis 2 cæcis ad marginem posticum. Posticæ ocellis 2 cæcis ad marginem posteriorem & incarnato ad angulum ani.*

**Brassicæ.** 75. P. D. alis integerrimis rotundatis albis: primoribus maculis duabus apicibusque nigris, major. *fn. fvec.* 1035. \*

*Geoffr. parif. 2. p. 68. n. 40.*

*Scop. carn. 450.*

*Mouff. inf. 189. f. 1.*

*Gæd. inf. 1. t. 11.*

*List. gæd. 16. f. 7.*

*Blank. inf. t. 4. f. A. D.*

*Raj. inf. 113. n. 1. & 348.*

*cantabr. 134.*

*Pet. gæz. t. 62. f. 3.*

*Merian. europ. 1. t. 45.*

*Alb. inf. 1. t. 1.*

*Vallisn. nat. 1. t. 1.*

*Swamm. bibl. t. 37. f. 6.*

*quart. t. 13. f. 6.*

*Reaum. inf. 1. t. 29. f. 1.*

*t. 10. f. 7.*

*Rœs. inf. 1. pap. 2. t. 4.*

*Wilk. pap. 49. t. 2. a. 2.*

*Habitat in Brassica Europæ, Chinæ; etiam in Tropæolo.*

*Alæ posticæ, margine antico, subtus flavæ.*

**Rapæ.** 76. P. D. alis integerrimis rotundatis: primoribus maculis duabus apicibusque nigris, minor. *faun. fvec.* 1036. \*

*Geoffr. parif. 2. p. 69. n. 41.*

*Scop. carn. 451.*

*Mouff. inf. 971. f. 9, 10.*

*Gæd. inf. 1. t. 27.*

*List. gæd. 22. f. 8.*

*Blank. inf. t. 5. f. A - D.*

*Merian. europ. 2. t. 39.*

C c c 2

Raj.

*Papiliones Brassicæ, Rapæ, Napi &c. notantur in alis primoribus macula nigra: mares tantum suatus; femina vero utrinque.*

*Raj. inf.* 114. n. 1, 2, 3.

347. n. 20.

*Robert. ic.* t. 6.

*Pet. gaz.* t. 64. f. 4. & 49. f. 11.

*Alb. inf.* t. 51. f. C - F.

*Reaum. inf.* 1. t. 29. f. 7, 8.

2. t. 2. f. 3.

*Rœs. inf.* 1. pap. 2. t. 5.

*Wilk. pap.* 50. t. 2. a. 3.

*Ammiral.* t. 16.

*Habitat in* Brassicis, Tropæolo.

Napi. 77. P. D. alis integerrimis rotundatis albis: subtus venis dilatato-virescentibus. *Faun. suec.* 1037. \*

*Scop. carn.* 453.

*Raj. inf.* 114. n. 4.

*Pet. gaz.* t. 62. f. 4.

*Merian. europ.* 2. t. 39.

*Alb. inf.* t. 52. f. F. G.

*Wilk. pap.* 50. t. 2. a. 4.

*Geoffr. paris.* 2. p. 70. n. 42.

*Habitat in* Brassica & affinis; Europæ, Chinæ.

*Chinensis nostrate* duplo major & margo exterior magis niger.

Hellica. 78. P. D. alis albis: primoribus macula apiceque albo-punctato nigris; posticis subtus cinereo-venosis. *Musf. Lud. Ulr.* 243. \*

*Habitat ad* Cap. b. spei. *Tulbagh.*

Sinapis. 79. P. D. alis integerrimis rotundatis albis immaculatis: apicibus fuscescentibus. *Faun. suec.* 1038. \* *Scop. carn.* 452.

*Habitat in* Brassica & affinis.

Monuste. 80. P. D. alis rotundatis albis immaculatis margine fusco. *Musf. L. U.* 237. \*

*Habitat in* Barbaria.

Daplidice. 81. P. D. alis integris rotundatis albis margine fuscis: subtus luteo-griseis albo maculatis.

*Pet. gaz.* t. 1. f. 7.

*Raj. inf.* 116. n. 10.

*Habitat in* Europa australi & Africa.

*Stain-*



*Statura P. Cardamines Alæ Primores concolores albæ: Maculae duæ fuscae in disco utrinque feminae, at mari una supra; apices fusci maculis albis nonnullis sparsis; subtus concolores, sed loco nigredinis virescentes. Posticæ supra mari albæ immaculatæ; femina limbo fuscescente & albo maculato. Subtus albæ, virescente maculatæ.*

Demo- 82. P. D. alis rotundatis albidis: fasciis duabus margine-  
phile. que fuscis; posticis subtus subincarnatis. *Amæn. acad. 6 p. 406. n. 66. \* Glerck. ic. t. 28. f. 4.*  
*Habitat in India orientali.*

Acasta. 83. P. D. alis rotundatis albis maculis quinque transver-  
fis apicibusque fuscis; subtus flavescentibus. *Mus. Lud. Ulr. 250. \**  
*Habitat in India.*

Belia. 84. P. D. alis rotundatis albis; subtus flavis griseiscente  
subfasciatis.  
*Habitat in Barbaria. Brander.*  
*Simillimus P. Cardamines feminae, sed minor. Corpore subtus flavo. Alæ Primores concolores albæ lunula fusca; apiceque lutescentes. Posticæ supra albæ immaculatæ; subtus flavissimæ lituris aliquot transversis griseis.*

Cardami- 85. P. D. alis integerrimis rotundatis albis: primoribus  
nes. medio fulvis; posticis subtus viridi nebulosis. *Faun. suec. 1039. \* Scop. carn. 454.*  
*Fn. suec. 1. n. 801. P. Aurora.*  
*Mouff. inf. 106. f. 2, 3, 4.*  
*Jonst. inf. t. 5.*  
*Raj. inf. 115. n. 6, 7, 10.*  
*Pet. mus. 33. n. 305, 306.*  
*Mertan. europ. t. 181.*  
*Edw. av. t. 125.*  
*Raf. inf. 1. pap. 2. t. 8.*  
*Robert. ic. t. 21.*  
*Valent. herb. t. 183.*  
*Schæff. elem. t. 94. f. 8.*  
*Wilk. pap. 2. p. 50. t. 2. a. 5.*  
*Geoffr. paris. 2. p. 71. n. 44.*  
*Habitat in Cardamine, Brassica campestris, Thlaspi.*  
*Sexus alter caret macula fulva in alis primoribus.*

Ccc 3

86. P. D.

- Pyrene. 86. P. D. alis integerrimis rotundatis flavis: primoribus apice (medio fulvo) nigris; subtus nebuloso maculatis. *M. L. U.* 241. \*

*Habitat in China.*

- Euppe. 87. P. D. alis integerrimis rotundatis flavescens: primoribus apice (medio fulvo) nigris; posticis subtus albis. *Mus. Lud. Ulr.* 239. \* *Clerck. ic. t. 50. f. 5.*

*Gron. zooph.* 758.

*Pet. gaz. t. 9. f. 10.*

*Habitat in Asia.*

*Macula fulva intra nigredinem apicum, nec infra ut in precedente; Ale postica subtus alba, nec nebulosa.*

- Eupheno. 88. P. D. alis integerrimis rotundatis flavis: primoribus apice (medio fulvo) nigris, posticis subtus lituris fuscis.

*Habitat in Barbaria.*

*Simillimus P. Cardamines, paulo minor. Alæ flavissimæ: Primores supra apice fulvo, cincto nigredine; subtus apice fulvo non cincto nigredine, sed flavo communi, cum macula nigra ad basin fulvi. Secundariæ utrinque flavæ; subtus lituris tribus, fuscescentibus, obsolete, curvis, margine exteriori crassioribus.*

- Glaucippe. 89. P. D. alis integerrimis rotundatis albis: primoribus apice (medio fulvo) nigris; posticis subtus cinereis. *Mus. L. U.* 240. \* *Clerck. ic. t. 35. f. 1.*

*Edw. av. 128. t. 128.*

*Habitat in Asia: China.*

*Ale postica subtus linea nigra longitudinali.*

- Encedonia. 90. P. D. alis integerrimis rotundatis flavis: primoribus apice (medio albo) nigris, posticis punctis XIX nigris. *M. L. U.* 244. \*

*Habitat in Indiis.*

- Arfalte. 91. P. D. alis integerrimis rotundatis albis: striis marginalibus nigris; primoribus antice basi flavescens. *Mus. L. U.* 246. \* *Clerck. ic. t. 23. f. 2.*

*Habitat in Indiis.*

92. P. D.

Hyparete. 92. P. D. alis integerrimis rotundatis albis; posticis sub-  
tus venis maculisque sanguineis. *Musf. Lud. Utr.*  
247. \* *Clerck. ic. t. 38. f. 2, 3.*

*Habitat in Indiis.*

Damone. 93. P. D. alis integerrimis rotundatis albis; primoribus  
maculis nigris.

*Habitat in Indiis.*

Helcita. 94. P. D. alis integerrimis rotundatis luteis concoloribus:  
limbo nigro punctis septem albis. *Amoen. acad. 6.*  
p. 405. n. 62. \* *Clerck. ic. t. 39. f. 4.*

*Edw. av. 340.*

*Habitat in Indiis.*

Scylla. 95. P. D. alis subintegerrimis rotundatis fulvis: primori-  
bus supra albis limbo nigro; subtus omnibus nebulo-  
fis. *M. L. U. 242.*

*Habitat in Java.*

Hecabe. 96. P. D. alis integerrimis rotundatis flavis extimo ni-  
gris: singulis subtus punctis pallidis numerosissimis.  
*M. L. U. 249. \**

*Gron. zooph. 757.*

*Pet. gaz. t. 28. f. 9.*

*Edw. av. t. 253. f. 2.*

*Habitat in Asia.*

Trite. 97. P. D. alis integerrimis flavis: primoribus supra mar-  
gine nigris; singulis subtus linea transversa ferruginea.  
*Musf. Lud. Utr. 248. \**

*Habitat in Calidioribus regionibus.*

*Sequenti similis.*

Pyräthe. 98. P. D. alis integerrimis rotundatis albis puncto apice-  
que nigris; subtus cinereo undulatis puncto fulvo.  
*Musf. L. U. 245.*

*Habitat in Asia: China.*

*Magnitudo P. Brassicae. Alae supra albae margine sub-  
sanguineo: primores puncto centrali & limbo ni-  
gris; Subtus glaucae cinereo-undulato nebulosae; pun-  
cto centrali rubro, quorum qui in alis posticis cen-  
tro saepe argenteo. Antennae rubrae.*

C c c 4

99. P. D.

**Palæno.** 99. P. D. alis integerrimis rotundatis flavis apice nigris margineque fulvis; posticis subtus puncto argenteo.  
*Faun. suec.* 1041. \*

*Uddm. diss.* 56. P. hexapus, alis rotundatis albis ocello parvo fusco oblongo; apicibus fuscis.

*Habitat in Europæ Pteride aquilina.*

*Affinis nimium Hyales.*

**Hyale.** 100. P. D. alis integerrimis rotundatis flavis; posticis macula fulva, subtus puncto sesquialtero argenteo.

*Faun. suec.* 1040. \*

*Scop. carn.* 455.

*Pet. gaz. t.* 14. f. 11.

*Raf. inf.* 112. n. 6.

*Scheff. elem. t.* 94. f. 7.

*Geoffr. parif. 2. p.* 75. n. 48.

*Edw. av.* 304. f. 1, 2.

*Raf. inf.* 3. t. 46. f. 4, 5.

*Habitat in Europa, Africa, America septentrionali.*

**Electra.** 101. P. D. alis integerrimis rotundatis fulvis margine nigris; posticis subtus ocello sesquialtero albo. *Aman. acad.* 6. p. 405. n. 61.

*Pet. gaz. t.* 9. f. 11.

*Habitat ad Cap. b. spei.*

*Simillimus Palæno precedenti.*

**Eubule.** 102. P. D. alis integerrimis rotundatis luteis margine punctis nigris; subtus puncto gemino ferrugineo argenteo.

*Edw. av. t.* 304.

*Habitat in Carolina.*

*Alæ luteæ integræ; omnes margine nigro punctatæ: singule subtus puncto ferrugineo. Primores supra ocello rubro.*

**Senne.** 103. P. D. alis integerrimis rotundatis flavis apice nigris; singulis subtus puncto gemino ferrugineo argenteo.

*Sloan. jam. 2. t.* 236. f. 11, 12.

*Raf. inf.* 112. n. 5.

*Merian. fur.* 58. t. 58.

*Habitat in Cassica Americæ.*

**Palica.** 104. P. D. alis integerrimis angulatis flavis: primoribus macula; posticis limbo luteis. *Aman. acad.* 6. p. 404. n. 59. \*

*Raf.*

*Ræf. inf.* 4. t. 3. f. 5.

*Habitat in Indiis.*

Cleopatra. 105. P. D. alis integerrimis angulatis flavis: primoribus supra disco fulvo; reliquis puncto ferrugineo.

*Habitat in Barbaria. Brander.*

*Simillimus P. Rhamni. Antennæ supra rubra. Palpi rubri. Alæ flavae. Primores supra disco fulvo absque puncto centrali. Subtus puncto centrali & marginis crassioris punctis 4 ferrugineis. Posticæ angulatæ: puncto centrali supra fulvo, subtus ferrugineo.*

Rhamni. 106. P. D. alis integerrimis angulatis flavis: singulis puncto flavo: subtus ferrugineo. *Faun. succ.* 1042.

*Geoffr. parif.* 2. p. 74. n. 47.

*Scop. carn.* 456.

*Mouff. inf.* 198. t. 193. f. 1.

*Fonst. inf.* t. 5, 6.

*Raj. inf.* 112. n. 4.

*De Geer inj.* 1. t. 15. f. 8, 9.

*Robert. ic.* t. 13.

*Ræf. inf.* 3. t. 46. f. 1, 2, 3.

*Alb. inf.* t. 2. f. 3.

*Sultz. inf.* t. 13. f. 84.

*Poda inf.* 65. t. 2. f. 2.

*Wilk. pap.* 48. t. 1. a. 2.

*Habitat in Rhamno Europæ, Africa.*

Ecclipsis. 107. P. D. alis integerrimis angulatis flavis: primoribus punctis duobus maculaque nigris; posticis ocello cæruleo. *Amæn. acad.* 6. p. 406. n. 67. \*

*Pet. gaz.* 6. t. 10. f. 6.

*Habitat in America septentrionali.*

*Simillimus P. Rhamni, sed macula alarum nigra conspicuus.*

\* DANAI Festivi.

Midamus. 108. P. D. alis integerrimis nigris albido punctatis: primoribus supra cærulescentibus; posticis punctorum alborum linea. *Mus. Lud. Ulr.* 251. \*

*Act. stockh.* 1748. t. 6. f. 1, 2.

*Ehret. pist.* t. 3. & 11.

*Ræf. add.* t. 9.

C c c 5

Ha-

*Habitat in Asia.*

*Corpus atrum punctis albis. Alæ atro-cærulescentes. Posticæ serie intra marginem e punctis albis & alia serie interiore punctis majoribus albis.*

Niavius. 109. P. D. alis integerrimis nigris: primoribus fascia alba; posticis macula baseos communi alba. *Mus. Lud. Ulr. 470. \* Clerck. ic. t. 32. f. 2.*

*Habitat in Indiis.*

*Alæ posticæ subtus cærulescentes, venis striata, basi albæ.*

Zetes. 110. P. D. alis integerrimis: primoribus supra nebulosis punctatis; posticis fulvis nigro punctatis. *Mus. L. U. 270. \* Clerck. ic. t. 43. f. 1.*

*Habitat in Indiis.*

Cæneus. 111. P. D. alis integerrimis subfuscis; posticis subtus orbe macularum novem rubro. *Mus. Lud. U. 271.*

*Habitat in Indiis.*

Enceladus. 112. P. D. alis integerrimis fuscis: punctis marginalibus disci octo albis. *M. L. U. 254. \**

*Habitat in Indiis.*

Obrinus. 113. P. D. alis integerrimis supra nigris fascia cyanea; subtus viridibus fascia albida. *Mus. L. U. 255. \* Clerck. ic. t. 31. f. 2, 3.*

*Habitat in India.*

Pinthæus. 114. P. D. alis integerrimis fuscis concoloribus: primoribus maculis tribus flavis; posticis dimidiato albis. *Mus. Lud. Ulr. 258. \**

*Habitat in Indiis.*

Eribote. 115. P. D. alis integerrimis flavis: primoribus supra maculis tribus nigris; posticis subtus linea cinerascens. *M. L. U. 233. \**

*Habitat in Indiis.*

*In nonnullis hic Heliconiis accedit. Alæ primores supra fusce, reliquæ luteæ.*

Perlus. 116. P. D. alis subintegerrimis: supra fuscis, subtus flavescens: fasciis albis; posticis punctis septem albis. *M. L. U. 261.*

*Habitat in Indiis.*

117. P. D.

- Plexipus. 117. P. D. alis integerrimis fulvis: venis nigris dilatatis, margine nigro punctis albis. *Mus. Lud. Ulr.* 262.  
*Raj. inf.* 138. n. 3.  
*Pet. mus.* 52. n. 527.  
*Sloan. jam.* 2. p. 214. t. 239. f. 5, 6.  
*Catesb. car.* 2. t. 88.  
*Habitat in America septentrionali.*  
*Ala primores fascia alba, ut in sequente, cui similis.*
- Missippus. 118. P. D. alis subintegerrimis fulvis margine nigro alboque lineatis, posticis macula nigra. *Mus. Lud. Ulr.* 264. \*  
*Habitat in America.*
- Chrysipus. 119. P. D. alis integerrimis fulvis margine nigro punctis albis, posticis disco punctis nigris. *M. L. U.* 263.  
*Raj. inf.* 139. n. 1.  
*Edw. av.* 189. t. 189.  
*Schreb. inf.* 9. f. 11, 12. *Papilio ægyptius.*  
*Habitat in Ægypto, America.*
- Cassia. 120. P. D. alis integerrimis fuscis: primoribus posticarumque margine fascia ferruginea, omnibus subtrus ocellatis. *Mus. L. U.* 265. \* *Clerck. ic.* t. 29. f. 3.  
*Merian. sur.* 32. t. 32.  
*Habitat in Cassiis Americæ.*  
*Simillima P. Sophoræ, sed Larva diversissima.*
- Sophoræ. 121. P. D. alis integerrimis fuscis fascia ferruginea; subtrus primoribus oculo unico, posticis tribus. *M. L. U.* 266. \* *Clerck. ic.* t. 35. f. 3.  
*Merian. sur.* 35. t. 35. f. 1, 2.  
*Ræf. add.* t. 4. f. 1, 2.  
*Habitat in Sophora Americæ.*
- Xanthus. 122. P. D. alis integerrimis: supra fuscis fascia ferruginea; posticis subtrus ocellis duobus: altero lunari. *Mus. Lud. Ulr.* 267. \* *Clerck. ic.* t. 34. f. 1, 2.  
*Habitat in Calidis regionibus.*

123. P. D.

---

Nomina Trivialia a plantis, e quibus vitam hauriunt, quasque consumunt minimeque defuncta, ubi obtinenda, primaria sunt in omnibus insectis, reliquis omnibus anteponenda, ideoque etiam solícite indaganda, ut in Politia naturæ actio sadere jungantur Flora & Fauna. Cum vero de his in paucis constet, partem refert unde succedanea desumantur, ubi non desiniunt.

Philome- 123. P. D. alis integerrimis fuscis: primoribus ocello unico utrinque, posticis senis. *Amæn. acad.* 6. p. 404. n. 60. \*

*Habitat in Javâ. Nordgreen.*

*Parvus minor Argo, facie Larvæ.*

Clytus. 124. P. D. alis integerrimis fuscis: primoribus fascia flava ocelloque subtripupillato; posticis ocellis quinque. *Mus. Lud. Ulr.* 268. \*

*Habitat ad Cap. b. spei. D. Tulbagh.*

Cassus. 125. P. D. alis integerrimis fuscis umbra rufescente: primoribus ocello didymo; posticis supra ocellis tribus. *M. L. U.* 269. \*

*Habitat ad Cap. b. spei. D. Tulbagh.*

Mineus. 126. P. D. alis integerrimis subfuscis: subtus posticis ocellis septem; anticis duobus: supra unico.

*Habitat in China.*

*Magnitudo Pap. Urticæ. Alæ supra cineres-fusce.*

*Primores supra ocello 1 nigro; subtus duobus. Posticæ subtus ocellis 7, quorum 1, 4, 5 majores.*

Hyperan- 127. P. D. alis integerrimis fuscis; subtus primoribus ocellis tribus; posticis duobus tribusque. *Faun. suec.* 1043. \*

*Geoffr. parif. 2. p. 47. n. 14.*

*Scop. carn. 434. Papilio Polymeda.*

*Pet. mus. 34. n. 313.*

*Raj. inf. 129. n. 7.*

*Ammiral. t. 30.*

*Habitat in Gramine Europæ.*

Eropus. 128. P. D. alis integerrimis fuscis fascia lutea: primoribus subtus basi ocello unico. *Mus. L. U.* 256. \*

*Clerck. ic. t. 39. f. 1.*

*Habitat in Indiis.*

Canthus. 129. P. D. alis integerrimis fuscis: subtus primoribus ocellis quatuor, posticis senis.

*Amæn. acad. 6. p. 406. n. 65. \* Papilio Eurydice.*

*Habitat in America septentrionali.*

130. P. D.



- Hyperbi- 130. P. D. alis integerrimis fuscis area rufa: primoribus  
 us. ocello bipupillato; posticis subtus septempunctatis.  
*M. L. U.* 257. \*  
*Habitat ad Cap. b. spei. D. Tulbagh.*

\* NYPHHALES *Gemmati.*

10. 131. P. N. alis angulato-dentatis fulvis nigro-maculatis:  
 singulis subtus ocello cæruleo. *Faun. swec.* 1048. \*  
*Geoffr. parif.* 2. p. 36. n. 2.  
*Scop. carn.* 423.  
*Fn. swec.* 1. n. 776. Oculi pavonis.  
*Mouff. inf.* 968. t. 99. f. inf.  
*Jonst. inf.* 40. t. 5.  
*Hoffm. pict.* t. 12. f. 9.  
*Pet. mus.* 34. n. 314.  
*Valent. herb.* t. 57.  
*Raj. inf.* 122. n. 14.  
*Gæd. inf.* 1. t. 1.  
*List. gæd. f.* 1.  
*Merin. europ.* 1. t. 26.  
*Alb. inf.* t. 3. f. 4.  
*Reaum. inf.* 1. t. 25. f. 1, 2.  
*Rœf. inf.* 1. pap. 1. t. 3.  
*Wilk. pap.* 55. t. 3. a. 2.  
*Habitat in Urtica dioica, Humulo; frequentissimus*  
*Upsaliae* 1757.

- Almana. 132. P. N. alis angulatis luteis: singulis supra ocellis  
 sesquialteris: anteriore pupilla gemina. *Mus. Lud.*  
*Ulr.* 272. \*  
*Edw. av.* t. 84.  
*Rœf. add.* t. 5. f. 3, 4.  
*Habitat in Asia.*  
*Similis Asterie, sed Alæ magis angulatæ.*

- Asterie. 133. P. N. alis dentatis luteo-variis: singulis utrinque o-  
 cellis sesquialteris: anteriore pupilla geminata. *Mus.*  
*Lud. Ulr.*  
*Habitat in India.*

- Aonis. 134. P. N. alis angulatis griseis: primoribus flavescenti-  
 nebulosis: supra ocellis sesquialteris. *M. L. U.*  
*Habitat in Asia.*  
*Varietas alis subtus lividis & purpurascens. Ocel-  
 li subtus obsoleti sunt.*

135. P. D

Oenone. 135. P. N. alis denticulatis: primoribus albido maculatis subbiocellatis; posticis basi cyaneis ocellis duobus. *Mus. Lud. Ulr.* 274, 275. \*

*Pet. gaz.* t. 4. f. 3.

*Edw. av.* t. 37. mas & femina.

*Raf. add.* t. 3. f. 1, 2.

*Habitat in Asia.*

*Aliis Ocelli in pagina superiore, aliis in inferiore, aliis nulli in pagina superiore.*

Lemoni- 136. P. N. alis dentatis griseis punctis flavescentibus: as. omnibus ocello unico. *Mus. L. U.* 277. \*

*Habitat in Indiis.*

*Ocellus in alis Anticis ad angulum posticum; in Posticis contra ad angulum anticum.*

Orithya. 137. P. N. alis dentatis fuscis: omnibus supra ocellis utrinque duobus; primoribus subtus unico. *Mus. L. Ulr.* 278. \*

*Edw. av.* t. 26.

*Habitat in Indiis.*

*Ocelli ad marginem exteriorem: posteriore majore in alis primoribus.*

Fidia. 138. P. N. alis dentatis: supra fuscis cæruleo micantibus; primoribus ocellis duobus, duobusque punctis albis.

*Habitat in Barbaria.*

*Corpus magnitudine P. Papuli. Alæ supra omnes nigre cæruleo micantes; Ocelli ad marginem exteriorem inter quos puncta 2 alba. Subtus cinereæ undis duabus albis nigro inductis: primores ocellis 2 & punctis albis, ut supra; posticæ posterius punctis 2 albis & 1 nigro, quæ interdum supra etiam observantur.*

Briseis. 139. P. N. alis subdentatis supra fuscis viridi-micantibus: primoribus ocellis duobus; subtus nigro bimaculatis. *M. L. U.* 276. \*

*Habitat in Germania. D. Schreber.*

Feronia. 140. P. N. alis dentatis supra cæruleo fuscoque undulatis: omnibus ocellis sex. *M. L. U.* 283. \* *Clerck.* ic. t. 31. f. 1.

*Habitat in India.*

*Alæ posticæ subtus quatuor literis O similibus; hexapus.*

141. P. N.

**Mæra.** 141. P. N. alis subdentatis fuscis: utrinque primoribus sesquiocello; posticis ocellis supra tribus. *Fn. suec.* 1049. \*

*Faun. suec.* 1. n. 785. Satyrus.

*Geoffr. parif.* 2. p. 50.

*Scop. carn.* 431.

*Monff. inf.* 972. t. 104. f. 10

*Aldr. inf.* t. 244. f. 12.

*Fonst. inf.* t. 58. f. 6.

*Pet. mus.* 34. n. 312.

*Rai. inf.* 123. n. 15.

*Robert. ic.* t. 15. f. 2.

*Merian. eur.* 1. t. 27. f. 16, 17.

*Wilk. pap.* 53. t. 2. b. 3.

*Ammiral.* t. 5.

*Habitat in Gramine sylvarum.*

*Alæ posticæ subtus Ocellis sex, quorum ultimus papilla gemina, at 1, 3, 4 majores.*

**Megera.** 142. P. N. alis subdentatis luteis fusco fasciatis: utrinque primoribus sesquiocello; posticis supra quinis.

*Habitat in Austria, Jacquin; in Dania, Fabricius.*

*Similis P. Mæræ, sed Alæ supra luteæ fusco fasciatæ, nec totæ fusæ. Primores ad apicem utrinque similiter ocello, cum adjacente minuto, supra obsoleto. Postice supra lutescentes, ocellis quinque: primo cæco; ultimo didymo. Subtus cinereæ, griseo undulatæ ocellis 6: postremo didymo; margo posticarum vix manifeste dentatus.*

**Ægeria.** 143. P. N. alis dentatis fuscis luteo maculatis, utrinque primoribus ocello; posticis supra tribus.

*Raj. inf.* 128. n. 5.

*Reaum. inf.* 1. t. 27. f. 16, 17.

*Raf. inf.* 4. t. 33. f. 3, 4.

*Wilk. pap.* 53. t. 2. b. 4.

*Edw. av.* t. 178.

*Geoffr. parif.* 2. p. 48. n. 16.

*Scop. carn.* 432. Papilio Ægeria.

*Habitat in Europæ & Algiriæ Gramine.*

*Similis P. Megeræ, sed Alæ supra fusæ, luteo maculatæ, nec fasciatæ; posticæ evidenter dentatæ. Primoribus ocellus unicus utrinque. Posticis supra ocelli tres: primo cæco; subtus loco ocellorum Puncta 4 alba: primo remotissimo.*

144. P. N.

Ligea. 144. P. N. alis subdentatis fuscis fascia rufa: utrinque primoribus ocellis quatuor, posticis tribus. *Fa. suec.* 1050. \*

*Faun. suec.* 1. n. 787. Alexis.

*Alb. inf.* 1. 5. f. 1.

*Habitat in Europæ sylvis.*

*Alæ posticæ subtus contaminatæ maculis 2 lacteis.*

Laomedea. 145. P. N. alis dentatis cinerascensibus: supra primoribus ocellis sex; posticis quinque: quibusdam cæcis.

*Aman. acad.* 6. p. 407. n. 72. \* Papilio Adites.

*Habitat in India orientali.*

Libye. 146. P. N. alis dentatis fuscis: subtus lineatis; posticis ocellis sex pupilla argentea.

*Habitat in India.*

*Magnitudo vix P. urticae. Alæ omnes supra fusco-nigræ. Subtus omnes fusco-purpurascens strigis 2 ferrugineis. Primores subtus oculo 1 versus apicem. Inferiores postice subtus ocellis 6 fuscis: pupilla argentea iride flavo; horum ocellus 2 ♂ 5 major; 6 obsoletus.*

Galathea. 147. P. N. alis dentatis albo nigroque variis, subtus primoribus oculo unico, posticis quinque obsoletis.

*Scop. carn.* 427.

*Pet. mus.* 3. n. 3. t. 1. f. 3.

*Wilk. pap.* 52. t. 2. b. 1.

*Raj. inf.* 116. n. 9.

*Raf. inf.* 3. \*app. 1. t. 37. f. 1, 2.

*Geoffr. parif.* 2. p. 74. n. 46.

*Habitat in Gramine Germaniæ & australioris Europæ.*

*Statura P. Rapæ. Alæ dentatæ, supra albo nigroque varie maculatæ; subtus concolores, sed pallidiores.*

*Ocelli, in pagina inferiore tantum, obsoleti: primoribus versus angulum exteriorem 1; posticis 2 ♂ 3: horum ano proximus duplicatus. Antennæ apice subtus rufæ.*

Semele. 148. P. N. alis dentatis fulvo nigroque nebulosis: primoribus utrinque ocellis duobus; posticis supra unico. *Fa. suec.* 1051.

*Faun. suec.* 1. n. 784. Faunus.

*Hoffm. inf.* 2. t. 8.

*Pet. gaz.* t. 14. f. 9.

*Raj. inf.* 128. n. 6.

*Geoffr. parif.* 2. p. 16. n. 13.

*Habitat in Europæ sylvis.*

*Conf. major. Ræf. inf.* 4. t. 27. f. 3, 4.

Hermione. 149. P. N. alis dentatis fuscis fascia pallida: primoribus ocello; posticis supra puncto. *Mus. Lud. Utr.* 281. \*

*Scop. carn.* 428. Papilio Fagi.

*Pet. gaz.* 12. t. 7. f. 5.

*Ræf. inf.* 3. p. 27. t. 34. f. 5, 6.

*Habitat in Germania, Lusitania.*

Phædra. 150. P. N. alis dentatis fuscis concoloribus: primoribus ocellis duobus. *Mus. L. U.* 280. \*

*Scop. carn.* 429. Papilio Dryas.

*Sepp. belg.* 1. p. 1. f. 3. t. 3.

*Gron. zooph.* 775.

*Habitat in Germania. D. Schreber.*

Leda. 151. P. N. alis angulatis luridis: primoribus supra ocello geminato; posticis subtus ocellatis.

*Edw. av.* 297.

*Habitat in Asia.*

*Magnitudo P. Io. Alæ posticæ transverse angulatæ, sexu diversicolores.*

ALTER Alis - - omnibus supra luridis; Primoribus versus exteriora ocello didymo nigro pupilla alba. Posticæ ad marginem posticum ocellis 3 atris pupilla alba. Subtus omnes griseo reticulatæ s. nebulosæ: Primores subtus punctis 3 ocellaribus versus marginem exteriorem. Posticæ ocellis 6 versus marginem exteriorem, quorum 2 minimus, 6 duplici pupilla.

ALTERA supra cum priori eadem, sed posticæ supra regionem pupillarum punctis 3 s. 4 minimis albis. Subtus omnes lurido griseæ punctis 3 s. 4 albis obsoletis sub regione pupillæ.

Helice. 152. P. N. alis subdentatis luridis livido subfasciatis, subtus magis nebulosis, omnibus utrinque ocellis oblitteratis. *Clerck. ic.* t. 34. f. 3.

*Habitat in Asia.*

*Facies P. Leda. Alæ supra luridæ, versus marginem exteriorem obsolete pallidius bifasciatæ. Subtus luride, nebulosæ, vix manifeste fasciatæ, sed postice*  
D d d linea

774 INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Nymphalis. G.

*linea nigricante-ferruginea oblique ducta. Ocelli in omnibus utrinque 5, parvi, cæci, obsoleti. Angulus ani ceruleus.*

Hedonia. 153. P. N. alis dentatis: subtus concoloribus griseis; singulis ocellis sex ferrugineis. *Mus. Lud. Utr. 279.\**  
*Pet. gaz. t. 39. f. 4.*  
*Habitat in Alia.*

Dejanira. 154. P. N. alis dentatis fuscis: primoribus utrinque ocellis quinque; posticis sex fasciaque alba repanda. *M. L. U. 282.\**  
*Geoffr. parif. 2. p. 47. n. 15.*  
*Scop. carn. 433. Papilio Achine.*  
*Habitat in Rhamno alpino Germania. D. Schreber.*

Jurtina. 155. P. N. alis subdentatis fuscis: primoribus supra litura flava ocello utrinque unico. *Fn. svec. 1052.*  
*Faun. svec. 1. n. 786. Coridon.*  
*Scop. inf. 435.*  
*Aldr. inf. t. 246. f. 13.*  
*Pet. mus. 34. n. 309.*  
*Raj. inf. 124. n. 16.*  
*Hæff. inf. 1. t. 1. f. 1.*  
*Alb. inf. t. 53.*  
*Reaum. inf. 1. t. 11. f. 1.*  
*Wilk. pap. 53. t. 2. b. 2.*  
*Ræf. inf. app. 1. t. 34. f. 7, 8.*  
*Geoffr. parif. 2. p. 49. n. 17.*  
*Habitat in Gramine Europæ, Africa.*  
*Janiram & Jurtinam copula connexas vid. O. F. Müller.*

Janira. 156. P. N. alis dentatis fuscis: primoribus subtus luteis ocello utrinque unico; posticis subtus punctis tribus. *Fn. svec. 1053.*  
*Scop. inf. 436.*  
*Habitat in Europæ sylvis. Sexus precedentis ex copula. Scop.*  
*Facies P. Jurtinae absque litura flava supra primores alas, sed puncta 3 fusca sub posticis.*

Cardui. 157. P. N. alis dentatis fulvis albo nigroque variegatis; posticis utrinque ocellis quatuor sæpius cæcis. *Fn. svec. 1054.\**

*Faun.*

*Fann. suec.* 778. 1. n. Belladonna.

*Scop. carn.* 426.

*Mouff. inf.* 169. t. 101. f. 1, 2.

*Hæffn. inf.* t. 7. f. 3.

*Alb. inf.* t. 56.

*Pet. mus.* 35. n. 326.

*Raj. inj.* 122. n. 13.

*Merian. eur.* t. 116. t. 15.

*Reanm. inf.* 1. t. 26. f. 11, 12.

*Gæd. inf.* 3. t. A.

*List. gæd.* f. 5, 6.

*Blank. inf.* t. 3. f. A - C.

*Wilk. pap.* 56. t. 3. a. 3.

*Ræf. inf.* 1. pap. 1. t. 10.

*Geoffr. paris.* 2. p. 41. n. 7.

*Habitat in Carduo Europæ, Africa: in Cap. b. spei; frequentissimus Upsaliæ 1752.*

Tulbag- 158. P. N. alis dentatis subconcoloribus fuscescentibus  
hia. fascia lutea; posticis ocellis quinque. *Mus. Lud.*

*Ulr.* 284. \*

*Habitat ad Cap. b. spei; missus ab illustri Tulbaghio, Cap. b. spei Gubernatore, cum reliquis capensisibus, facile primis, qui orbi innotuere, hujus classis incolis, ex hemisphærio antarctico.*

Pipleis. 159. P. N. alis crenatis nigris concoloribus; posticis dis-  
co fulvo: ocellis septem. *Mus. Lud. Ulr.* 285.  
*Clerk. ic.* t. 26. f. 2.

*Habitat in Indiis.*

*Alæ Primores fascia alba ex maculis 7; Posticæ maculis 7, ovalibus, nigris pupilla alba, intra marginem posticum. In hac sectione facile maximus.*

Lampe- 160. P. N. alis crenatis: primoribus fuscescentibus fascia  
tia. flava; posticis supra ocellis sex. *M. L. U.* 104. \*

*Clerck. ic.* t. 39. f. 2.

*Habitat in Indiis.*

*Ocelli intra marginem posticum concatenati sunt.*

Iris. 161. P. N. alis subdentatis subtus griseis; fascia utrinque  
alba interrupta; posticis supra uniocellatis.

D d d 2

Gron.

*Divisio Papilionum secundum pedes 4 & 6, non facile obtinetur ex asseruatis & in Museis visis, cum hi sæpius mutilati occurrunt.*

*Gron. zooph.* 773.

*Richter. mus.* 336. Papilio Iris.

*Raf. inf.* 3. t. 42. & 4. t. 31. f. 6.

*Wilk. pap.* 63. t. 1. a. 2.

*Scop. carn.* 430.

*Lederm. micr.* 89. t. 49.

*Poda inf.* 70. n. 22, 23.

*Raj. inf.* 126. n. 2.

*Harris. inf.* 7. t. 3. f. a - d.

*Sultz. inf.* t. 14. f. 86.

*Habitat in Quercu Germaniæ, Angliæ &c. P. Forst.*

*Statura P. Populi.* Pedes duo antici angustissimi, mutici. Alæ omnes supra cærulescenti-nigræ, micantes; subtus cinereo-griseæ, cum oculo ferrugineo. Primores supra maculis albis sparsis in medio & exterius. Subtus griseo cinereo variæ maculis albis, cum oculo occultato intra marginem exteriorem. Posticæ supra fascia alba & oculo ferrugineo versus postica: subtus cinereæ fascia alba dentata lateribus ferruginea cum oculo cæruleo inde ferrugineo.

\* \* NYMPHALES *Phalerati*.

**Populi.** 162. P. N. alis dentatis fuscis albo fasciatis maculatisque; subtus luteis albo fasciatis: maculis cærulescentibus. *Fn. suec.* 1055. \*

*Raj. inf.* 127. n. 3.

*Uddm. diss.* 54. f. 15.

*Clerck. act. Stockh.* 1753. p. 278. t. 7.

*Raf. inf. app.* 1. t. 33. f. 1, 2.

*Habitat in Populo tremula.*

**Cydyippe.** 163. P. N. alis dentatis nigro-cærulescentibus albo maculatis area communi rubra; subtus marmoratis.

*Amœn. acad.* 6. p. 409. n. 76. \* Papilio Cydyippe.

*Clerck. ic.* t. 36. f. 1. Papilio Cydyippe.

*Habitat in India.*

**Tipha.** 164. P. N. alis subcaudatis nigris: primoribus maculis duabus; posticis disco rubro-emarginato albis. *Mus.*

*Lud. Ulr.* 308. \* *Clerck. ic.* t. 32. f. 3.

*Edw. av.* t. 32.

*Habitat in India orientali.*

**Antiopa.** 165. P. N. alis angulatis nigris limbo albido. *Fn. suec.* 1056.

*Fann.*



*Faun. suec.* 1. n. 772. Morio.

*Geoffr. parif.* 2. p. 35. n. 1.

*Scop. carn.* 419.

*Schaff. elem.* t. 94. f. 1.

*Jonst. inf.* t. 9. f. 11.

*Raj. inf.* 135, 136.

*De Geer inf.* 1. t. 21. f. 8, 9.

*Wilk. pap.* 58. t. 2. a. 10.

*Raf. inf.* 1. p. 1. t. 1.

*Sultz. inf.* 1. t. 14. f. 85.

*Habitat in Betula, Salice, etiam in America. Kalm.*

polychlo-166. P. N. alis angulatis fulvis nigro maculatis: primo-  
ros, ribus supra punctis quatuor nigris. *Fn. suec.* 1057. \*

*Geoffr. parif.* 2. p. 37. n. 3.

*Scop. carn.* 420.

*Aldr. inf.* 246. f. 7.

*Gæd. inf.* 1. t. 77.

*List. gæd.* 5. f. 3.

*Pet. mus.* 34. n. 315.

*Raj. inf.* 118. n. 2.

*Merian. eur.* 2. t. 2.

*Alb. inf.* t. 55.

*Frisch. inf.* 6. t. 3.

*Reaum. inf.* 1. t. 23. f. 2.

*Raf. inf.* 1. app. 1. t. 2.

*Ammiral.* t. 15.

*Wilk. pap.* 56. t. 3. a. 5.

*Habitat in Pyro, Ceraso, Salice; frequentissimus Up-  
salie 1758.*

Unicæ. 167. P. N. alis angulatis fulvis nigro-maculatis: primo-  
ribus supra punctis tribus nigris. *Fn. suec.* 1058. \*

*Geoffr. parif.* 2. p. 37. n. 4.

*Scop. carn.* 421.

*Mouff. inf.* 101. f. 5, 6.

*Gæd. inf.* 1. t. 21.

*List. gæd.* 3. f. 2.

*Blank. inf.* 13. t. 1. f. L. Q.

*Raj. inf.* 117. n. 1.

348. n. 18.

*Robert. icon.* t. 5.

*Hoffn. pict.* 2. f. 16.

*Bradl. nat.* t. 27. f. 2.

*Merian. eur.* 1. t. 44.

D d d 3

Alb.

*Alb. inf. t. 4. 51.*

*Swamm. bibl. t. 35. f. 12.*

*Reaum. inf. 1. t. 26. f. 6, 7.*

*Ræf. inf. 1. pap. 1. t. 4.*

*Wilk. pap. 56. t. 3. a. 3. fig. inf.*

*Harris. inf. 4. t. 2. f. i - n.*

*Habitat in Urtica vulgarissimus, prodit inter primos, sed fallax veris indicium. Plin. XVIII: 25.*

**C. album.** 168. P. N. alis angulatis fulvis nigro-maculatis; posticis subtus C albo notatis. *Fn. suec. 1059. \**

*Geoffr. paris. 2. p. 38. n. 5.*

*Scep. carn. 422.*

*Monff. inf. 103. f. 2.*

*Aldr. inf. t. 244. f. 3, 4.*

*Raj. inf. t. 118. n. 3.*

349. n. 21.

*Rob. icon. t. 23.*

*Merian. eur. 1. t. 14. f. 159.*

*Frisch. inf. 4. t. 4.*

*Reaum. inf. 1. t. 27. f. 9, 10.*

*De Geer inf. 1. t. 20. f. 9, 10.*

*Ræf. inf. 1. pap. 1. t. 5.*

*Wilk. pap. 57. t. 3. a. 6.*

*Harris. inf. 2. t. 1. f. o - d.*

*Geoffr. paris. 2. p. 38. n. 5.*

*Habitat in Grossularia, Humulo, Urtica.*

**C. aureum.** 169. P. N. alis angulatis fulvis nigro-maculatis: posticis subtus C aureo notatis.

*Habitat in Asia.*

*Simillimus Pap. C albo, sed duplo major, subtus magis luteo-nebulosus & C aureo minori notatus.*

**Ariadne.** 170. P. N. alis angulatis, supra subferrugineis strigis: nigro undulatis, primoribus antice puncto niveo. *Amæn. acad. 6. p. 407. n. 71. \**

*Habitat in Java. Nordgreen.*

**Dirce.** 171. P. N. alis angulatis fuscis, primoribus fascia flava: subtus nigro undulatis. *Mus. Lud. Ulr. 287.*

**β.** Papilio *Butes* alis subcaudatis fuscis: primoribus fascia flavescenti-albida; omnibus subtus albis nigro striatis. *Syst. nat. 10. p. 485. Clerck. ic. t. 36. f. 3.*

*Habitat in Indiis.*

172. P. N.

- Jatrophæ*. 172. P. N. alis angulatis pallidis: lineis undulatis: primoribus puncto unico; pollicis duobus nigris. *Amæn. acad.* 6. p. 408. n. 73. *Mus. L. U.* 289. \*  
*Merian. surin.* 4. t. 4. in *Jatrophæ*.  
*Gron. gaz.* 2. p. 197. n. 790.  
*Habitat in America australi.*
- Canace*. 173. P. N. alis angulatis cæruleis fascia dilutione; subtus luto viridique marmoratis. *Amæn. ac.* 4. p. 406. n. 68.  
*Habitat in India.*
- Amatheæ*. 174. P. N. alis angulatis: supra fuscis albo punctatis: fascia rubra: linea nigra undata. *Mus. L. U.* 288. \*  
*Clerck. ic.* t. 40. f. 3.  
*Habitat in Indiis.*  
*Habitus Pap. Atalanta.*
- Atalanta*. 175. P. N. alis dentatis nigris albo maculatis: fascia communi purpurea, primoribus utrinque, posticis marginali. *Faun. suec.* 1060. *Scop. carn.* 424.  
*Fn. suec.* 1. n. 777. *Amiralis.*  
*Geoffr. parif.* 2. p. 40. n. 6.  
*Mouff. inf.* 100. f. 3, 4.  
*Aldr. inf.* 240. f. 45.  
*Fonst. inf. t.* 7. f. 6, 7.  
*Raj. inf.* 126. n. 1.  
*Pet. mus.* 35. n. 327.  
*Gæd. inf.* 1. t. 26.  
*List. gæd.* 10. f. 4.  
*Harris. inf.* 12. t. 6. f. a - b.  
*Blank. inf. t.* 18. f. 2. A - D.  
*Merian. europ.* 91.  
*Alb. inf. t.* 3. f. 4.  
*Reaum. inf.* 1. t. 10. f. 8, 9.  
*De Geer inf.* 1. t. 22. f. 5.  
*Ræf. inf. 1. pap.* 1. t. 6.  
*Wilk. pap.* 55. t. 3. a. 1.  
*Amiral. t.* 24.  
*Pod. inf.* 72. t. 2. f. 3.  
*Habitat in Urtica urente.*  
*Ocelli in pagina inferiore adeo obsoleti; ut vix ocellorum nomine veniant.*
- Amphino*. 176. P. N. alis dentatis nigris cæruleo-nebulosis: primoribus fascia utrinque alba; posticis rubro radiatis.  
D d d 4 Ræf.

*Ruf. addend. t. 10. f. 1, 2.*

*Merian. sur. t. 7.*

*Habitat in America meridionali.*

*Magnitudo media.* Alæ Primores supra atræ characteribus hieroglyphicis cæruleis adperse fasciæque alba; punctum album ante fasciam. Subtus concolores, sed fusca. Posticæ supra atræ characteribus hieroglyphicis, cæruleis, sparsis. Subtus radiatæ a basi versus posteriora radiis rubris, apice sæpius interruptis.

*Yenilia.* 177. P. N. alis dentatis fuscis: fascia communi arcuata alba marginibus cærulescente. *Mus. Lnd. Utr.* 290. \*  
*Clerck. ic. t. 32. f. 4.*

*Habitat in Calidis regionibus.*

*Alimena.* 178. P. N. alis dentatis atris: fascia cærulea Interrupta: singulis punctis septem albidis marginalibus. *Mus. L. U.* 291. \* *Clerck. ic. t. 32. f. 1.*

*Habitat in Indiis.*

*Leucothoe.* 179. P. N. alis dentatis, supra fuscis subtus luteis: fasciis tribus macularibus albis nigro notatis. *Mus. L. U.* 292. \*

β. Papilio *Hylas* alis dentatis, supra fuscis; subtus lutescentibus; fasciis utrinque tribus albis interruptis. *Syst. nat.* 10. p. 486. n. 173. *Clerck. ic. t. 40. f. 4.*

*Habitat in Asia.*

*Magnitudo Pap. Urticæ.* Alæ utrinque fasciis 3 transversis, cænantibus versus angulum exteriorum primorum: Fascia prima in primoribus nigro interrupta; secunda per posticas & primores utrinque linea nigra notata; tertia in posticis ex maculis 7 albis puncto nigro factis. Thorax supra æneus.

*Phærusa.* 180. P. N. alis dentatis fulvis: fasciis tribus fuscis: primorum longitudinalibus, posticarum transversis. *M. L. U.* 293. \*

*Ruf. inf. 4. p. 24. t. 2. f. 1.*

*Habitat in Indiis.*

*Iphicla.* 181. P. N. alis dentatis: supra fuscis fascia communi alba, maculaque ferruginea anguli ani, *Mus. L. Utr.* 311. \* *Clerck. ic. t. 41. f. 3.*

*Habitat in Indiis.*

182. P. N.

- Idmone. 182. P. N. alis dentatis fuscis: primoribus utrinque fascia alba. *Mus. Lud. Utr.* 310. \*  
*Habitat in Indiis.*
- Elea. 183. P. N. alis dentatis fusco-nebulosis concoloribus: fascia primoribus flava, posticis alba. *Mus. Lud. Utr.* 312. \*  
*Habitat in Indiis.*
- Ancra. 184. P. N. alis dentatis atris: primoribus fascia cærulea, posticis lutea. *M. L. U.* 307. \*  
*Habitat in Indiis.*
- Janassa. 185. P. N. alis dentatis supra nigris: fascia flava discoque cærulescente; subtus punctis tribus atris. *Mus. L. U.* 294. \*  
*Habitat in Indiis.*
- Sibilla. 186. P. N. alis dentatis fuscis concoloribus fascia alba; subtus lutescentibus. *M. L. U.* 303. \* sub *Prorsa*.  
*Scop. carn.* 443. *Papilio rivularis*.  
*Ros. inf.* 3. t. 70. f. 1, 2, 3.  
*Habitat in Germania.*  
*Similis Camilla.*
- Camilla. 187. P. N. alis dentatis fuscis subconcoloribus albo fasciatis maculatisque, angulo ani rubro. *Mus. L. U.* 304. \*  
β. *Papilio Amphion* alis dentatis fuscis: primoribus maculis albis tergeminis; posticis sex transversis. *Syst. nat.* 10. p. 486. n. 177.  
*Pet. gaz.* 12. t. 12. f. 10.  
*Ros. inf.* 3. t. 33. f. 3, 4.  
*Habitat in Lonicera cærulea Europæ.*
- Bollna. 188. P. N. alis dentatis nigris: primoribus maculis duabus; posticis solitaria albo-cærulea. *Mus. Lud. U.* 295. \* *Clerck. ic.* t. 21. f. 2.  
*Græn. zooph.* 789. \*  
*Habitat in India.*
- Clytia. 189. P. N. alis dentatis nigris: margine exteriori primoribus albo maculato, posticis albo luteoque triplici ordine. *M. L. U.* t. 296.  
*Habitat in Indiis.*

*Nezarea.* 190. P. N. alis dentatis supra fuscis albo-maculatis, subtus maculis albis linea rubra cinctis. *Musf. Lud. Ulr.* 297.

*Edw. av.* 33. t. 33.

*Habitat in Indiis.*

*Similis in multis cum P. Stelene.*

*Aceste.* 191. P. N. alis subdentatis: primoribus nigris basi fasciaque flavis; posticis flavis subtus fasciis fuscis. *Musf. L. U.* 298. \* *Clerck. ic. t. 43. f. 3.*

*Habitat in Indiis.*

*Dido.* 192. P. N. alis dentatis oblongis nigris viridi maculatis; posticis fascia maculisque septem transversis cæruleiscentibus. *Amæn. acad. 6. p. 408. n. 74. Clerck. ic. t. 30. f. 2.*

*Merian. sur. 3. t. 3.*

*Habitat in America meridionali.*

*Haliconii structura; Alæ oblongæ, sed posticæ dentatæ.*

*similis.* 193. P. N. alis subrepandis nigris concoloribus: punctis cæruleiscenti-albis basin versus lineatis. *Musf. L. U.* 299. *Clerck. ic. t. 16. f. 3.*

*Pet. gaz. t. 92. f. 13; an t. 3. f. 4?*

*Habitat in Asia.*

*affimilis.* 194. P. N. alis subrepandis nigris concoloribus: punctis cæruleiscenti albidis; posticis punctis occineis. *Musf. L. U.* 300. \* *Clerck. ic. t. 16. f. 1.*

*Habitat in Asia.*

*Simillimus P. Simili, sed alæ posticæ intra marginem posticum punctis s. maculis 5, quarum una puncto nigro notata.*

*diffimilis.* 195. P. N. alis dentatis dilatato-venosis nigris subconcoloribus: maculis sagittatis albis, postremis subtus luteis. *M. L. U.* 301. \* *Clerck. ic. t. 16. f. 3.*

*Ehret. pict. t. 17.*

*Habitat in Asia.*

*Panope.* 196. P. N. alis dentatis fuscis concoloribus: limbo exteriore albo maculatis; posticis margine luteo maculatis.

*Rheed. mal. 9. t. 1?*

*Habitat in Asia.*

*Alæ*

*Alæ primores ad marginem exteriorem maculis obsoletioribus albis sagittatis. Postica intra marginem posteriolem ordine triplici macularum sagittiformium, quarum postrema reniformes luteæ.*

Nauplia. 197. P. N. alis subdentatis fuscis subconcoloribus: primoribus supra maculis quatuor; posticis fascia albidis.  
*Mus. Lud. Ulr. 309. \* Clerck. ic. t. 46. f. 1, 2.*  
*Habitat in - - -*

Hyper- 198. P. N. alis dentatis nigricantibus postice ferrugineis; mnestra. subtus nebulosis: posticis puncto albo.  
*Amæn. acad. 6. p. 407. n. 69. Papilio alis nigricantibus; posticis postice ferrugineis puncto albo; omnibus subtus ferrugineo nebulosis.*  
*Habitat in Java. Nordgreen.*  
*Alæ primores supra versus apicem fascia carulescente interrupta.*

Nesca. 199. P. N. alis dentatis fuscis pallido lineatis: subtus nebulosis. *Mus. L. Ulr. 302. \**  
*Habitat in Asia.*

Rumina. 200. P. N. alis dentatis variegatis: supra primoribus punctis sex, posticis quatuor rubris.  
*Osbeck iter. 51. Pap. tetrapus, alis ex coccineo luteo argenteo nigroque variegatis, primoribus rotundioribus.*  
*Catesb. car. 2. p. 95. t. 95.*  
*Habitat in Europa australi.*  
*Alæ Postica subtus maculis 8 albis.*

Levana. 201. P. N. alis dentatis variegatis: subtus reticulatis; primoribus supra maculis aliquot albis.  
*Ræf. inf. 1. pap. 1. t. 9. f. 5, 6.*  
*Habitat in Urtica dioica Europa australioris. P. Forskål.*

Prosa. 202. P. N. alis dentatis subfuscis: fascia utrinque alba; primoribus interrupta.  
*Scop. carn. 442.*  
*Merian. eur. 88. f. 1.*

*Ræf.*

---

Fritillarii vulgo dicti, quum alæ maculis fere tessellatae sint; sed ob maculas argenteas Nobiles communiter nominati sunt.

*Raf. inf. 1. pap. 1. t. 8. f. 6, 7.*  
*Habitat in Urtica dioica Germaniæ.*

**Lucina.** 203. P. N. alis dentatis fuscis testaceo-maculatis, subtus fasciis duabus macularum albidarum. *Faun. suec. 1061. \**

*Pet. gaz. t. 16. f. 10.*  
*Raj. inf. 122. n. 12.*  
*Habitat in Europa.*

**Maturna.** 204. P. N. alis dentatis purpurascensibus nigro-maculatis; subtus fasciis tribus flavis. *Fn. suec. 1062. \**

*Pet. gaz. t. 1. f. 8.*  
*Raj. inf. 120. n. 8.*  
*Merian eur. t. 88?*  
*Wilk. pap. 58. t. 2. a. 9.*  
*Habitat in Corylo, Erica, Scabiosa.*

**Cinxia.** 205. P. N. alis dentatis fulvis nigro-maculatis; subtus fasciis tribus exalbido flavis. *Fn. suec. 1063. \**

*Faun. suec. 1. n. 783. Comes.*  
*Geoffr. parif. 2. p. 45. n. 12.*  
*Scop. carn. 437.*  
*Pet. gaz. t. 18. f. 10.*  
*Raj. inf. 121. n. 9.*  
*Wilk. pap. 58. t. 3. a. 8.*  
*Raf. inf. 4. t. 13.*  
*Reaum. inf. 2. t. 9.*  
*Schæff. elem. t. 1. f. 9.*  
*Habitat in Veronica, Plantagine, Trifolio, Gramine.*  
*Mas clinguis; Femina vero lingua spirali a Lucina ad*  
*Vanillum. Rolander.*

**Lena.** 206. P. N. alis subdentatis fuscis; posticis postice atris albo cæruleoque punctatis: subtus biocellatis.

*Raf. addit. t. 10. f. 3, 4.*  
*Habitat in America meridionali.*  
*Medius. Alæ Primores oblongæ: supra fuscae: fascia obsoleta, in medio; puncto albo versus apicem; litura alba versus basin. Posticæ supra basi fuscae, ceterum atræ punctis albis, cæruleisque sparsis. Subtus fuscae striga alba & pone hanc Puncta alba sparsa & ocelli 2 approximati juxta marginem anteriorem; ad basin ocelli aliquot minutissimi.*

207. P. N.



- Dia.** 207. P. N. alis dentatis fuscis testaceo maculatis; subtus maculis quatuor ordinibusque punctorum duobus argenteis.  
*Habitat in Austria. D. Jacquin.*  
*Conf. Rœf. inf. 4. t. 18. f. 3.*  
*Similis P. Lucinae, sed major, tamen minor Cinxia, quibus Alæ pagina superiore simillimæ. Posticæ subtus maculis variis circiter 4 argenteis & guttis pallidis variis; postice series transversa ocellorum minimorum cecorum, præter seriem ipsam marginalem e maculis argenteis.*
- Niphe.** 208. P. N. alis dentatis luteis: primoribus extimo nigris fascia albida; posticis subtus argentatis ocellis quinque.  
*Amœn. acad. 6. p. 408. n. 75. Papilio Hyperbius.*  
*Habitat in China.*
- Paphia.** 209. P. N. alis dentatis luteis nigro-maculatis: subtus lineis argenteis transversis. *Faun. suec. 1064.*  
*Faun. suec. 779. 1. n. Imperator.*  
*Geoffr. paris. 2. p. 42. n. 8.*  
*Scop. carn. 438.*  
*Pet. mus. 35. n. 321.*  
*Raj. inf. 119. n. 4.*  
*Rœf. inf. 1. pap. 1. t. 7.*  
*Wilk. pap. 57. t. 2. a. 7.*  
*Schaff. elem. t. 94. f. 2.*  
*Habitat in Urtica.*
- Cythæra.** 210. P. N. alis crenatis flavis fascia communi argentea: subtus fascia lanceolata argentea. *M. L. U. 305.\**  
*Clerck. ic. t. 39. f. 3.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Alæ supra cinereo nebulosæ: primores disco flavo.*
- Aglaja.** 211. P. N. alis dentatis flavis nigro-maculatis: subtus maculis XXI argenteis. *Fa. suec. 1065.\**  
*Fa. suec. 1. n. 780. Rex.*  
*Geoffr. paris. 8. p. 42. n. 9. t. 11. f. 1, 2.*  
*Scop. carn. 439.*  
*Mouff. inf. 169. t. 101. f. 3, 4.*  
*Aldr. inf. 246. f. 8, 9.*  
*Pet. mus. 35. n. 320.*  
*Raj. inf. 119. n. 5.*  
*Wilk. pap. 59. t. 2. a 12.*

Ha-

*Habitat in Viola tricolore.*

*Alae maculis argenteis: primorum 4 obsoletis, posticarum 21. Posticae subtus ocellis 2 & 2 caecis pupillae argentea. Larva nigra utrinque punctis 8 nigris.*

Adippe. 212. P. N. alis dentatis luteis nigro maculatis; subtus maculis XXIII argenteis. *Fn. suec. 1066. \**

*Habitat in Europa (in Fauna Cydippe perperam pro Adippe legitur).*

*In alis posticis, subtus, inter ordinem penultimum & ultimum, macularum argentearum est ordo e maculis ferrugineis, quarum pleraque centro s. puncto argenteo notantur, qui ordo in Aglaja omnino deficit, cui in reliquis simillimus.*

Lathonia. 213. P. N. alis dentatis luteis nigro-maculatis: subtus maculis XXXVII argenteis. *Fn. suec. 1068. \**

*Fn. suec. 781 r. n. Principissa.*

*Geoffr. parif. 2. p. 43. n. 10.*

*Scop. carn. 440.*

*Hoffm. pict. t. 11. f. 11.*

*Robert. ic. t. 12.*

*Pet. mus. 51. n. 520.*

*Raj. inf. 120. n. 6.*

*Merian. eur. 2. t. 157. f. super.*

*Ruf. inf. app. 1. t. 10.*

*Habitat in Europa: frequentissima Upsalia 1758 vero primo.*

*Alae maculis argenteis primorum 7, posticarum 21.*

Euphrosyne. 214. P. N. alis dentatis fulvis nigro-maculatis: subtus maculis IX argenteis. *Fn. suec. 1069. \**

*Fn. suec. 782. Princeps;*

*Geoffr. parif. 2. p. 4. n. 11.*

*Scop. carn. 441.*

*Pet. mus. 35. n. 382.*

*Raj. inf. 120. n. 7.*

*Habitat in Europa & America septentrionali.*

*Alae maculis argenteis: posticarum 9: harum 1 disci, 1 bascos.*

Niobe. 215. P. N. alis dentatis fulvis nigro-maculatis: subtus maculis pallidis: punctis tribus argenteis ocellatis. *Fn. suec. 1067. \**

Ha-

*Habitat in Europa.*

*Alæ maculis argenteis: posticarum 7 marginalibus, puncta 6 dissi.*

Vanillæ. 216. P. N. alis dentatis flavis nigro-maculatis; subtus maculis XXX argenteis. *Mus. Lud. Ulr.* 306. \*

*Clerck ic. t. 40. f. 2.*

*Gron. zooph. 800.*

*Merian. surin. 25. t. 25.*

*Sloan. jam. 2. t. 239. f. 23, 24.*

*Habitat in Epidendro Vanilla Americes.*

*Alæ maculis argenteis primorum 7, posticarum 22.*

\* PLEBEJI Rurales.

Cupido. 217. P. P. alis posticis sexdentato-caudatis; subtus albidis maculis argenteis. *Mus. L. U.* 313. \*

*Pet. gaz. t. 10. f. 9.*

*Merian. sur. t. 10. f. 1.*

*Mus. petrop. 690. n. 351.*

*Raf. inf. 4. p. 27. t. 3. f. 7.*

*Gron. zooph. 803.*

*Habitat in Gossypio Americes.*

*Speciosissimus ob maculas argenteas saturatissimas & gibbas.*

Polybe. 218. P. P. alis posticis dentatis, reliquis integerrimis fusco-virescentibus, subtus viridi-sericeis venis atris.

*Amoen. acad. 6. p. 404. n. 58. \**

*Habitat in Indiis. Clerck.*

Thero. 219. P. P. alis dentatis subbicaudatis nigricantibus; maculis fulvis; subtus maculis argenteis. *Mus. L. U.* 328. \*

*Habitat ad Cap. b. Spei. \*D. Tulbagh.*

Betulæ. 220. P. P. alis subcaudatis fuscis; primoribus macula reniformi fulva, subtus luteis fascia fulva. *Fn. suec.*

1070.

*Geoffr. parisi. 2. p. 58. n. 27.*

*Wilk. pap. 61. t. 1. a. 2.*

*Raf. inf. 1. pap. 2. t. 6.*

*Raj. inf. 130. n. 10.*

*Hæffn. inf. t. 12. f. 1.*

*Alb. inf. t. 5. f. 7.*

*Pet.*

*Pet. gaz. t. 11. f. 11.*

*Habitat in Betula, Pruno spinosa.*

*Ala macula primorum fulva destituitur, ut in P. Quercus.*

Pruni. 221. P. P. alis subcaudatis supra fuscis; posticis subtus fascia marginali fulva nigro punctata. *Fann. suec. 1071. \**

*Scop. carn. 459.*

*Raf. inf. 1. pap. 2. t. 7.*

*Raj. inf. 130. n. 9?*

*Pet. gaz. 11. f. 10?*

*Reaum. inf. 1. t. 28. f. 6, 7.*

*Schæff. elem. t. 94. f. 5.*

*Habitat in Pruno domestica.*

Quercus. 222. P. P. alis subcaudatis supra cæruleis; subtus cinereis linea alba, puncto ani gemino fulvo. *Fann. suec. 1072. \* Mus. Lud. Ulr. 314. \**

*Pet. gaz. t. 11. f. 9.*

*Raj. inf. 129. n. 8.*

*Alb. inf. t. 52. f. a. 6.*

*Raf. inf. 1. pap. 2. t. 9.*

*Wilk. pap. 61. t. 1. a. 1.*

*Geoffr. paris. 2. p. 57. n. 26.*

*Habitat in Quercu.*

Marsyas. 223. P. P. alis bicaudatis supra cæruleis; subtus cærulescentibus punctis nigris. *Mus. Lov. U. 315. Clerck. ic. t. 41. f. 1.*

*Edw. av. 81. t. 81.*

*Raf. add. t. 5. f. 1, 2.*

*Habitat in Calidis regionibus.*

Echion. 224. P. P. alis bicaudatis supra fuscis; subtus pallescentibus; fascia rufa ocelloque terminali rubro. †

*Raf. add. t. 7. f. 3, 4.*

*Habitat in America.*

*Ala postica ad basin candarum macula ocellari rubra.*

Telamon. 225. P. P. alis biangulatis subcaudatis cinereis; fasciis albis maculaque nigra flavaque. *Mus. Lud. Ulr. 316. \**

*Habitat in Indiis.*

226. P. P.

**Bæticus.** 226. P. P. alis caudatis fusco-cærulefcentibus: subtus cinerascens albedo undulatis; angulo ani ocellis duobus.

*Habitat in Barbaria.*

*Magnitudo Argi.* Alæ supra nigricantes rore viridicærulefcente obductæ. Subtus omnes glauco-cinerascentes, strigis albidis undulatis. Angulus ani cauda setacea nigra albo margine. Opelli ad angulum ani, supra duo, pupillæ nigrae: interiore didyma (præter exteriores cæcas); Subtus ocellis etiam duobus antitice fulvis, postice argentatis.

**Thyra.** 227. P. P. alis unidentatis nigricantibus disco fulvo; subtus purpurascens maculis argenteis. *Mus. Lud. Ulr.* 327. \*

*Habitat ad Cap. b. spei. D. Tulbagh.*

**Thysbe.** 228. P. P. alis subunidentatis denticulatis fulvis nigro maculatis; posticis imprimis subtus striatis auroque maculatis. *Mus. L. U.* 330. \*

*Habitat ad Cap. b. spei. D. Tulbagh.*

**Thamy.** 229. P. P. alis unicaudatis: supra cæruleis margine nigro; subtus nigro alboque ocellatis. *M. L. U.* 317.

*Habitat in Calidioribus regionibus.*

**Arion.** 230. P. P. alis ecaudatis: supra fuscis disco cæruleo maculis atris; subtus canis punctis ocellaribus. *En. succ.* 1073. \*

*Ruf. inf. 3. suppl. t. 45. f. 3, 4.*

*Sultz. inf. t. 14. f. 87.*

*Poda inf. t. 2. f. 4.*

*Habitat in Europa.*

*Statura sequentis, sed duplo major. Alæ posticæ subtus ocellis: 10, præter puncta marginalia.*

**Zeuxo.** 231. P. P. alis ecaudatis integris disco fulvo nigro-maculato; primoribus subtus argenteo-maculatis. *Mus. Lud. Ulr.* 331. \*

*Habitat ad Cap. b. spei. D. Tulbagh.*

*Minutissimus Papilio est.*

**Argus.** 232. P. P. alis ecaudatis cæruleis: posticis subtus limbo ferrugineo: ocellis cæruleo-argenteis. *En. succ.* 1074. \*

*De Geer inf. t. 4. f. 14, 15.*

E c c

Wilk

*Wilk. pap.* 63. t. 1. a. 1.  
*Röf. inf. app.* 1. t. 37. f. 3, 4.  
*Merian. eur.* t. 153, 174.  
*Mouff. inf.* 106. f. 1.  
*Höffn. inf.* 1. t. 4.  
*Robert. ic.* t. 17.  
*Pet gaz.* t. 35. f. 1.  
*Raj. inf.* 131. n. 11.  
*Jonst. inf.* t. 6. f. penult.  
*Geoffr. paris.* 2. p. 61. n. 30.

- β. *P. Idas* alis ecaudatis cæruleis: posticis fascia terminali rufa ocellari; subtus pupillis cæruleo argenteis.  
*Fn. succ.* 1075. \*

*Raj. inf.* 131. n. 12. Papilio parvus, alis supinis pullis cum ordine macularum lutearum ad inum marginem.  
*Röf. inf. app.* 1. t. 37. f. 6, 7.  
*Geoffr. inf.* 2. p. 63. n. 32.  
*Habitat in Europa.*  
*Habitat in Rhamno Europa, Africa.*  
*Femina est β.*

- Philiæsus.* 233. *P. P.* alis subcaudatis nigris subtus maculatis; posticis postice supra ocellis duobus, subtus unico.

*Habitat* Algeriæ. *Brunniche.*

*Minor Argo.* Alæ supra fusca; subtus cinerea nigro albidoque maculata. Alæ Posticæ versus anum angulata, supra ocellis 2 f. 3 nigris; subtus unico nigro iride ferrugineo.

- Argiolus.* 234. *P. P.* alis ecaudatis: supra cæruleis margine nigris; subtus cærulescentibus punctis nigris dispersis. *Fann. succ.* 1076. \*

*Raj. inf.* 132. n. 16.

*Rob. ic.* t. 30.

*Gron. zooph.* 814.

*Habitat in Europa.*

*Præcedenti similis, sed minor; subtus puncta pauciora diffusa absque ocellis nigris.*

- Pirithous.* 235. *P. P.* alis ecaudatis cærulescentibus; subtus undique fusco maculatis: ocellis posticis duobus.

*Habitat* Algeriæ. *Brunniche.*

*Minor Argiolo* Alæ fusco-cærulescentes; subtus undique punctis fuscis fasciatis; ad anum subtus ocelli duo cærulei.

236. *P. P.*

- Tespis.** 236. P. P. alis ecaudatis cæruleis; subtus undique albo maculatis. *Mus. Lud. Utr.* 318. \*  
*Habitat ad Cap. b. spei. D. Tulbagh.*
- Rubi.** 237. P. P. alis dentato-subcaudatis; supra fuscis, subtus viridibus. *Fn. succ.* 1077. \*  
*Scop. carn. p.* 177.  
*Alb. inf. t. 5. f.* 8.  
*Wilkes pap.* 62. t. 1. a. 2.  
*Pet. gaz. t. 2. f.* 11.  
*Habitat in Rubo aculeato.*
- Lara.** 238. P. P. alis integerrimis subtestaceis: primoribus supra uniocellatis; posticis supra biocellatis. *Mus. Lud. Utr.* 320. \*  
*Habitat ad Cap. b. spei. D. Tulbagh.*
- Pamphilus.** 239. P. P. alis integerrimis flavis: subtus primoribus ocello; posticis cinereis fascia ocellisque quatuor obliteratis. *Fn. succ.* 1044.  
*Faun. succ. 1. n.* 789. Papilio Tithyrus.  
*Scop. carn.* 458. Papilio Menalcas.  
*Poda inf.* 79. n. 5. a. Papilio Menalcas.  
*Geoffr. inf.* 5. 3. n. 21.  
*Ros. app. 1. t.* 34. f. 7, 8.  
*Merian. eur. t.* 134.  
*Raj. inf.* 125. t. 19.  
*Pet. mus.* 34. n. 311.  
*Habitat in Europa.*
- Philocles.** 240. P. P. alis integerrimis supra fuscis: subtus primoribus ocello; posticis lineis transversis undatis. *Mus. L. U.* 321. \* *Glerck. ic. t.* 45. f. 3.  
*Habitat in Indiis.*  
*Ala primores supra fascia albo-carnescente.*
- Tirmanthes.** 241. P. P. alis integerrimis fusco cærulescentibus; subtus fasciis fuscis ocellisque. *M. L. U.* 322. \*  
*Habitat in Indiis.*  
*Ocellus viridi-flavus sub apice primorum; ocelli aliquot ad marginem posticarum, etiam subtus.*
- Arcanius.** 242. P. P. alis integerrimis ferrugineis: subtus primoribus ocello unico, posticis quinque: primo fascia remota. *Fn. succ.* 1045. \*

*Scop. carn.* 457. Papilio Amyntas.

*Poda inf.* 52. Papilio Amyntas.

*Schaff. elem.* t. 94. f. 3.

*Habitat in Europa.*

*Simillimus Pamphilo.*

Athemon. 243. P. P. alis integerrimis subfuscis: disco communi albo: fascia postica dimidiata fusca. *Musf. Lud. Ulr.* 323. \* *Clerck. ic.* t. 37. f. 2. & t. 46. f. 3.  
*Habitat in America.*

Caricæ. 244. P. P. alis integerrimis fulvis: disco communi albo, limbo cinereo ocellato. *Musf. L. U.* 324. \* *Clerck. ic.* t. 20. f. 2.  
*Merian. surin.* 40. t. 40. f. 1.  
*Habitat in Carica Americæ.*

Metis. 245. P. P. alis integerrimis ferrugineo-fuscis: maculis fulvis sparfis; posticis subtus immaculatis. *Musf. L. U.* 325. \*  
*Habitat ad Cap. b. spei. D. Tulbagh.*

Neleus. 246. P. P. alis integerrimis concoloribus nigris: primoribus punctis decem albis; posticis disco toto albis. *M. L. U.* 260. \* *Clerck. ic.* t. 45. f. 2.  
*Habitat in Indiis.*

Talaus. 247. P. P. alis integerrimis concoloribus fuscis: primoribus punctis albis basique sanguineis, posticis disco albo. *Amæn. acad.* 6. p. 407. n. 70. \* *Clerck ic.* t. 45. f. 1.  
*Habitat in Indiis.*  
*Simillimus Neleo, sed macula disci posticarum non coadunata.*

Phereclus. 248. P. P. alis integerrimis utrinque atris: primoribus fascia lineari rubra. *Musf. Lud. Ulr.* 326. \* *Clerck. ic.* t. 45. f. 4.  
*Habitat in America.*

Peleus. 249. P. P. alis integerrimis utrinque atris: primoribus fascia lineari rubra: exterius luteo maculatis. *M. L. U.* 327. \* *Clerck. ic.* t. 45. f. 5.  
*Habitat in Indiis.*

*Aff-*



*Affinis nimium* P. Phereclo, *differeus solis punctis extra fasciam.*

Lysippus. 250. P. P. alis subangulatis utrinque atris: omnibus fascia lineari rubra. *Mus. Lud. Ulr.* 332. \* *Clerck.* ic. t. 22. f. 2.  
*Habitat in America.*

Priapus. 251. P. P. alis rotundatis nigris concoloribus: primoribus fascia duplici fulva. *M. L. U.* 319.  
*Habitat in Indiis.*

Phlaas. 252. P. P. alis subangulatis fulvis nigro-punctatis, subtus albo marginatis; posticis canescentibus. *Fn. svec.* 1078. \*  
*Mer. inf.* t. 164.  
*Pet. mus.* 34. n. 317.  
*Raj. inf.* 125. n. 20.  
*Poda inf.* 78. n. 49. *γ. t.* 2. f. 9.  
*Habitat in Europa.*  
*Similis P. Virgaurea.*

Virgaurex. 253. P. P. alis subangulatis fulvis margine fusco, punctis atris sparsis. *Fn. svec.* 1079. \*  
*Geoffr. parif.* 2. p. 65. n. 35.  
*Scop. carn.* 462.  
*Fn. svec.* 1. n. 808. *Butyracea.*  
*Raf. inf. app.* 1. t. 45. f. 5, 6.  
*Habitat in Solidagine Virgaurea Europa, Africa.*

Hippothoe. 254. P. P. alis integerrimis, supra fulvis immaculatis; subtus cinerascens: punctis ocellaribus numerosis. *Fn. svec.* 1046. \*  
*Habitat in Europa.*  
*Similis P. Virgaurea.*

Hero. 255. P. P. alis integerrimis fuscis: subtus primoribus ocellis duobus; posticis senis. *Fn. svec.* 1047. \*  
*Geoffr. parif.* 2. p. 53. n. 22.  
*Habitat in Europa.*

PLEBEJI *Urbicola.*

Comma. 256. P. P. alis integerrimis divaricatis fulvis: punctis albis lineolaque nigra. *Fn. svec.* 1080. \*

*Scop. carn.* 463.

*Geoffr. paris* 2. p. 66. n. 37?

*Merian. eur.* 15. t. 48.

*Raj. inf.* 125 n. 21, 22.

*Poda inf.* 79. n. 51. *P. P. sylvestris.*

*Habitat in Europa.*

**Augias.** 257. *P. P.* alis divaricatis fulvis: fascia obliqua margine-  
que postico nigris. *Amœn. acad.* 4. p. 410. n. 80. \*

*Habitat in Java.* Nordgreen.

*Affinis commati.* *Antennæ mucronatæ.*

**Protu-  
mnus.** 258. *P. P.* alis integerrimis lutescentibus fusco contami-  
natis; subtus canescentibus nebulosis. *Mus. Lud.*  
*Ulr.* 340. \*

*Habitat ad Cap. b. spei.* *D. Tulbagh.*

**Proteus.** 259. *P. P.* alis caudatis fuscis: maculis fenestratis, anten-  
nis uncinatis. *Mus. Lud. Ulr.* 333. \* *Clerck. ic.*  
t. 42. f. 1, 3.

*Merian. surin.* t. 63. f. 2.

*Habitat in Gramine Americæ.*

*Varietates hujus numerosæ sunt in Indiis, tam colore,  
quam alarum posticarum figura.*

*Variat etiam absque cauda, primoribus maculis tribus  
fenestratis.*

**Thrax.** 260. *P. P.* alis ecaudatis fuscis: maculis tribus fenestra-  
tis, antennis subuncinatis. *Clerck. ic.* t. 42. f. 2. 2  
\* *Habitat in Java.*

*Simillimus P. Proteo, sed Alæ absque cauda: superi-  
ores maculis fenestratis 3, exteriore minore. An-  
tennæ subulatæ apice, ad angulam rectam fere re-  
flexæ.*

**Butes.** 261. *P. P.* alis caudatis nigris: fasciis duabus fenestratis,  
caudisque cæruleis. *Amœn. acad.* 6. p. 409. n. 79. \*  
*Clerck. ic.* t. 46. f. 6.

*Habitat in Asia.*

**Actiorion.** 262. *P. P.* alis subcaudatis fuscis: primoribus fascia lute-  
scente exteriore, maculaque cærulea postica; subtus-  
que oculo. *Amœn. acad.* 6. p. 409. n. 78. \* *Clerck.*  
*ic.* t. 36. f. 2.

*Habitat in Indiis.*

263. *P. P.*

- Phidias.** 263. P. P. alis rotundatis atris nitentibus margine albis, ore anoque rubris. *Mus. Lud. Ulr.* 334. *Clerck. ic. t. 44. f. 1, 2, 3, 4.*  
*Pet. gaz. t. 43. f. 15.*  
*Habitat in Asia.*
- Bixa.** 264. P. P. alis rotundatis fuscis basi virentibus: posticis subtus fascia lactea. *M. L. U.* 335. \* *Clerck ic. t. 42. f. 4.*  
*Merian surin. t. 44.*  
*Pet. gaz. t. 32. f. 5.*  
*Habitat in America.*
- Polycle-  
tus.** 265. P. P. alis subcaudatis viridi-fuscis: primoribus macula alba; subtus argenteo punctatis. *Mus. L. Ulr.* 336. \* *Clerck. ic. t. 171. f. 2.*  
*Habitat in Indiis.*
- Pitho.** 266. P. P. alis denticulatis nigris albo maculatis, basi supra cyaneis. *M. L. U.* 337. \*  
*Habitat ad Cap. b. spei. D. Tulbagh.*  
*Affinis maxime P. Malva.*
- Malva.** 267. P. P. alis denticulatis divaricatis nigris albo maculatis. *Fn. suec.* 1081. \* *It. xl. 3.*  
*Geoffr. paris. 2. p. 67. n. 38.*  
*Pet. gaz. t. 36. f. 6.*  
*Merian. europ. 1. t. 38.*  
*Reaumur inf. 1. t. 11. f. 6, 7.*  
*Raf. inf. 1. pap. 2. t. 10.*  
*Wilk. pap. 54. t. 2. c. 1.*  
*Hoffm. inf. t. 2. f. ult.*  
*Schæff. elem. t. 94. f. 9.*  
*Habitat in Malva, Althæa.*
- Tages.** 268. P. P. alis denticulatis divaricatis fuscis obsolete albo punctatis. *Fn. suec.* 1082. \*  
*Geoffr. paris. 2. p. 68. n. 39.*  
*Habitat in Europa.*  
*Similis P. Malva, sed magis fuscus.*
- ilcus.** 269. P. P. alis subdenticulatis fuscis albo maculatis: supra basin anteriorem primorum linea alba.  
*Habitat Algeriæ. Brunnichs.*

*Simillimus P. Pitboni*, sed supra magis albo maculatus, nec cæruleus.

Niso, 270. P. P. alis integerrimis subreversis fuscis: primoribus supra punctis quatuor albis sparsis. *Mus. Lud. Utr.* 339. \*

*Habitat ad Cap. b. Spei. D. Tulbagh.*

*Affinis nimium P. Tages.*

*Antennæ apice acuto, uti P. Comma.*

Spio, 271. P. P. alis integerrimis reversis nigricantibus undique albo maculatis. *M. L. U.* 330. \*

*Habitat ad Cap. b. Spei. D. Tulbagh.*

*Proprium huic sunt alæ reversæ.*

Phaleros, 272. P. P. alis caudatis supra nigro-cæruleis cicatrice orbiculari concava.

*Habitat in India.*

*Magnitudo Argi. Alæ supra omnes nigro-cæruleæ; primores cum puncto majusculo orbiculari concavo versus basin; posticæ cauda setacea. Subtus fuscae fasciis albis, lanceolatis, 3 s. 4, longitudinalibus.*

Cæneus, 273. P. P. alis ecaudatis integerrimis, utrinque luteis: punctis numerosissimis nigro argenteis.

*Habitat in Indiis.*

*Magnitudo minoris Argi. Alæ supra ferrugineo-luteæ; subtus flavæ: omnes utrinque sparsæ punctis numerosis, nigro-argenteis: supra oblongis, transversis; subtus rotundioribus.*

232. SPHINX. *Antennæ* medio crassiores s. utraque extremitate attenuatæ, subprismaticæ.

*Alæ* deflexæ (volatu graviore vespertino s. matutino.)

\* LEGITIME *Alis angulatis.*

ocellata. 1. S. alis repandis: posticis ocellatis. *Fn. suec.* 1083. \*

*Mus. L. U.* 341. \*

*Scop. carn.* 465.

*Raj.*

*Raj. inf.* 148. *Phalæna* major, corpore crasso, alis amplis interioribus macula ophthalmoide.

*Mouff. inf.* 91. f. 3.

*Jonst. inf.* t. 8. f. 30.

*Gæd. inf.* 3. p. 25. t. o.

*List. gæd.* 68. f. 24.

*Alb. inf.* 8. f. 11.

*Uddm. diff.* 58. f. 11.

*Merian. inf.* 2. t. 87.

*Ræf. inf.* 1. phal. 1. t. 1.

*Raj. inf.* 148. n. 2. ♂ 149. n. 3.

*Wilk. pap.* 10. t. 1. B. 5.

*Harriß. inf.* 11. t. 5. f. a - b.

*Ammiral inf.* t. 1.

*Sultz. inf.* t. 15. f. 89.

*Geoffr. paris.* 2. p. 79. n. 1.

*Poda inf.* 80. n. 2.

*Gren. zooph.* 816.

*Habitat in Spiræa, Salice, Pomiferis Drupiferisque arboribus.*

*Larva viridis lineis albis.*

*Imago elinguis Thorace macula ferruginea.*

**Populi.** 2. S. alis dentatis reversis: posticis basi ferrugineis; anticis puncto albo. *Fa. suec.* 1084. \* *Mus. Lud. Ulr.* 342. \*

*Faun. suec.* 1. n. 810. *Phalæna* prismicornis spirilinguis, alis planiusculis crosis griseis, antennis albis.

*Scop. carn.* 466.

*Ræf. inf.* 3 suppl. t. 30.

*De Geer inf.* t. 8. f. 5.

*Merian. eur.* 3. t. 37.

*Wilk. pap.* 11. t. B. 6.

*Alb. inf.* t. 57.

*Ammiral.* t. 10.

*Geoffr. paris.* 2. p. 81. n. 3.

*Habitat in Populo, Salice rubra.*

*Imago elinguis.*

**Tiliæ.** 3. S. alis angulatis virescenti-nebulosis saturatius subfasciatis; posticis supra luteo testaceis. *Faun. suec.* 1085. \* *Mus. Lud. Ulr.* 343. \*

Ecc 5

*Scop.*

*Sphinges matutina & vespertina imprimis volatu sunt, tardiores, ponderosiores quasi, sæpe sono abvolantes, linguaque exserta haurientes nectar florum, nec in floribus facile quiescentes.*

*Scop. carn.* 467.  
*Merian. eur.* 2. t. 24.  
*Wilk. pap.* 10. t. 1. B. 4.  
*Frisch inf.* 7. t. 2.  
*Alb. inf.* t. 10.  
*Raf. inf.* 1. phal. t. 2.  
*Geoffr. paris.* 2. p. 80. n. 2.  
*Schaff. elem.* t. 116. f. 1.  
*Habitat in Tilia.*  
*Imago elinguis.*

Ocypete. 4. S. alis angulatis nebulosis; posticis margine baseos posteriore albis. *M. L. U.* 344. \*  
*Habitat in calidis regionibus.*  
*Magnitudo Afili.*

Nerii. 5. S. alis subangulatis viridibus: fasciis variis pallidioribus saturationibus flavescentibusque.  
*Raf. inf.* 1. phal. 1. t. 16.  
*Frisch. inf.* 7. t. 3.  
*Habitat in Nerio.*

\* \* *Legitimæ Alis integris, ano simplici.*

Convolvuli. 6. S. alis integris: posticis nigro fasciatis margine postico albo punctatis, abdomine rubro cingulis atris. *Musf.*  
*Lud. Ulr.* 345. \*  
*Scop. carn.* 468.  
*Merian. inf.* 39. t. 75. J. 2. t. 25.  
*Gæd. inf.* 3. t. 5.  
*Reaum. inf.* 1. t. 13. f. 8.  
*Raf. inf.* 1. phal. 1. t. 7.  
*Wilk. pap.* 10. t. 1. B. 2.  
*Geoffr. paris.* 2. p. 86. n. 9.  
*Habitat in Convolvulo.*  
*Thorax antice arcubus 2 nigris. Ala postice cinereæ fasciis 3 fuscis.*

Carolina. 7. S. alis integris: omnibus margine postico albo-punctatis, abdomine ocellis sex parium fulvis. *Musf. L.*  
*Ulr.* 346. \*  
*Merian. surin.* 57. t. 57.

*Brown.*

---

Indis *Sphingis pluvina*, quæ difficultus determinantur & synonymis distinguuntur ut *Merian. surin.* t. 14, 38, 39, 45, 46, 55, 61, 62.

*Brown. jam.* 438. t. 43. f. 17.

*Habitat in* Carolina, Jamaica, Surinamo: *edit* Psidium &c.

**Ligustri.** 8. S. alis integris: posticis incarnatis fasciis nigris, abdomine rubro cingulis nigris. *Fn. suec.* 1087. \* *Mus. Lud. Ulr.* 347. \*

*Faun. suec.* 1. n. 809. *Phalæna prismicornis* spirilignis fusca, alis inferioribus abdomineque fasciis transversis rubris.

*Scop. carn.* 470.

*Monff. inf.* 91. f. 2. f. 182. f. 1.

*Fonst. inf. t.* 19. f. 1, 2.

*Jacob. mus.* 1. f. 5. n. 24. t. 1. f. 24.

*Alb. inf. t.* 7. f. 10.

*Swamm. bibl. t.* 29. f. 1, 2, 3.

*Jung. verm.* 108.

*List. gæd.* 71. f. 25.

*Ros. inf. pap.* 1. p. 25. t. 5.

*De Geer inf.* 1. t. 1. f. 6.

*Merin. europ.* 124.

*Raj. inf.* 144. n. 1.

*Gæd. inf.* 1. p. 93. t. 24.

*Reaum. inf.* 2. t. 20. f. 1 - 4.

*Wilk. pap.* 10. t. 1. B. 3.

*Harris. inf. t.* 2. f. a - f.

*Geoffr. paris.* 2. p. 84. n. 7.

*Poda inf.* 81.

*Scheff. elem. t.* 116. f. 2.

*Habitat in* Ligustro, Syringa, Fraxino, Lonicera, Sambuco, Salice.

**Atropos.** 9. S. alis integris: posticis luteis fasciis fuscis, abdomine luteo cingulis nigris. *Amæn. acad.* 3. p. 321.

*Mus. L. U.* 348. \*

*Amæn. acad.* 3. p. 321. Caput mortuum.

*Scop. inf.* 469.

*Alb. inf. t.* 6.

*Osbeck it.* 89.

*Reaum. inf.* 1. t. 14. f. 2.

2. t. 24.

*Sultz. inf. t.* 15. f. 83.

*Geoffr. paris.* 2. p. 85. n. 8.

*Wilk. pap.* 9. t. 1. B. 1.

*Hasselq. it.* 417. n. 104, 105.

**Habi-**

*Habitat in Jasmino Europæ; Ægypti duplo major & India. Stridet allidendo palpos ad linguam. Alæ superiores nigricantes puncto albido.*

- capensis. 10. S. alis integris cinerascens immaculatis: paginis occultatis sanguineis, abdomine cinerascens. *Mus. Lud. Ulr.* 349. \*  
*Habitat ad Cap. b. spei. D. Tulbagh.*

- Caricæ. 11. S. alis integris: posticis supra luteis, abdomine cinereo cingulis nigris. *Mus. L. U.* 350. \* *Clerck. ic. t. 47. f. 1.*  
*Merian. surin. 64. f. 1, 2.*  
*Habitat in Carica Americæ.*  
*Thorax lineis atris. Alæ superiores fusce venis atris undato fasciata.*

- Celerio. 12. S. alis integris griseis lineola albo nigra; inferioribus basi rubris maculis sex.  
*Gæd. inf. 3. f. 4.*  
*Pet. gaz. t. 12. f. 9.*  
*Rai. inf. 159. n. 9.*  
*Frisch inf. 13. t. 1. f. 2.*  
*List. gæd. f. 26.*  
*Raf. inf. 4. t. 8.*  
*Habitat in Vite.*

- Ello. 13. S. alis integris: posticis rufis margine crassiore nigris; abdomine pallido cingulis atris. *Mus. Lud. Ulr.* 351. \*  
*Habitat in India.*

- Labruscæ. 14. S. alis subfuscis: primoribus subtus puncto albo, abdomine luteis punctis quinque albis. *Mus. Lud. Ulr.* 352. \* *Clerck. ic. t. 47. f. 3.*  
*Merian. surin. t. 34.*  
*Habitat in Vite Americæ.*

- Ficus. 15. S. alis fuscis nebulosis: posticis angulo ani albis. *M. L. U.* 353. \* *Clerck. ic. t. 49. f. 2.*  
*Merian. sur. t. 33.*  
*Habitat in Ficu Americæ.*  
*Alæ superiores in medio puncto fusco; macula pallida ad apicem anticum; inferiores supra fasciis 2 fuscis.*

16. S.



Viris. 16. S. alis cinereis fusco variis: posticis margine interiore sanguineis. *Mus. Lud. Ultr.* 354. \*  
*Merian. surin. t. 47. f. 1.*  
*Habitat in Vite Americæ.*  
*Alæ inferiores macula nigra in disco, & fasciâ nigra postice.*

Elpenor. 17. S. alis integris virescentibus: fasciis purpureis variis; posticis rubris basi atris. *Faun. suec.* 1089. \* *Mus. L. U.* 355.

*Scop. carn.* 472.

*Mouff. inf.* 183.

*Pet. gaz. t. 40. f. 11, 12, 17.*

*Merian. inf. 2. t. 33. f. 73.*

*Raf. inf. 1. phal. 1. t. 4.*

*Wilk. pap. 11. t. 1. B.*

*Ruj. inf. 145. n. 2. & 146. n. 3. & 281. n. 16.*

*Alb. inf. t. 9. f. 13.*

*Frisch inf. 12. t. 1.*

*Geoffr. parif. 2. p. 86. n. 10.*

*De Geer inf. 1. t. 9. f. 8, 9.*

*Harris. inf. 14. t. 7. f. a - b.*

*Habitat in Epilobio angustifolio, Impatiente, Vite, Convolvulo.*

*Differt a sequenti simillimo: Magnitudine dupla. Thorace a tergo lineis 4 longitudinalibus arcuatis rubris; Abdominis tergo lineâ rubra longitudinali. Alis in medio Puncto albo; primoribus margine inferiore albis.*

Porcellus. 18. S. alis integris margine rubris; posticis basi fuscis. *Faun. suec.* 1090. \*

*Raf. inf. 1. phal. 1. t. 5.*

*Alb. inf. t. 9.*

*Merian. eur. 3. t. 22.*

*Geoffr. parif. 2. p. 88. n. 12.*

β. *Sphinx bombyliiformis* abdomine coccineo, alis hyalinis luteo variis, posticis margine albis. *Syst. nat.* 10. p. 493.

*Habitat in Epilobio, Impatiente.*

*Simillimus priori ut facile idem insectum, sed Larva minor, nigra, absque cornu; declaratus vero Thorace antice posticeque rubro. Alis Primoribus absque fasciis, absque puncto albo, absque margine tenuiore*

*re albo; Posticis vero basi fuscis. Abdomine supra absque linea rubra.*

- Euphor- 19. S. alis integris fuscis: vitta superioribus pallida; infe-  
bia. rioribus rubra. *Fn. succ.* 1086. \* *Mus. Lud. Ulr.*

356. \*

*Scop. carn.* 47.

*Merian. eur.* 123.

*Reaum. inf.* 1. t. 13. f. 4 - 7.

*Raf. inf.* 1. phal. 1. t. 3.

*Frisch inf.* 2. t. 11.

*De Geer inf.* 1. t. 8. f. 6 - 11.

*Uddm. diff.* 57.

*Lederm. epist.* 48. t. 16.

*Habitat in Euphorbia, Galio.*

*Larva livida, ocellis 10 utrinque, flavicantibus iride nigricante.*

*Imago: Ala superiores, basi angustata; puncto nigro, in medio disci, minimo; vitta longitudinalis ex tribus coadunata. Inferiores supra disco rubro, lineis nigris diviso.*

- Aletho. 20. S. alis integris: primoribus supra griseis; posticis rubris basi margineque attris. *M. L. U.* 357. \*  
*Habitat in India.*

- Megzra. 21. S. alis viridibus: posticis fulvis fusco-maculatis. *M. L. U.* 358. \* *Clerck. ic.* t. 47. f. 2.  
*Habitat in India.*

- Pinaetri. 22. S. alis integris canis margine postico albo maculato, abdomine fusco cingulis albis. *Fahn. succ.* 1088. \*  
*Gadd diff.* 28. *Phalæna fusco cinerea subulicornis, thorace hirsuto griseo, lineis duabus nigris longitudinalibus.*

*Scop. carn.* 473.

*Reaum. inf.* 1. t. 13. f. 8.

*De Geer inf.* 1. t. 10. f. 1, 2, 3.

*Raf. inf.* 1. phal. 1. t. 6.

*Habitat in Pino.*

*Ala superiores in medio lineolis 3 nigris inæqualibus, notata. Thorax lineis 3 longitudinalibus nigris.*

*Larva laevis, glauca, linea laterali flava. Caput luteum. Collum luteo nigroque varium. Segmenta lineis transversis 8 nigris penultimo cornuto; niti-*

*ultimo punctis nigris, scabro. Cornu nigrum, scabrum, apice bifidum.*

- Tiphone. 23. S. alis primoribus cinerascens vitta pallida; postice supra nigris basi rubris. *Mus. Lud. Utr.* 359. \*  
*Habitat in India.*  
*Magnitudo Afili; 3 Alae inferiores lineis 6 obliquis parallelis carneis.*

- Theylia. 24. S. alis ferrugineis vitta nigricante. *Mus. Lud. Utr.* 360. \* *Clerck. ic. t. 46. f. 4.*  
*Habitat in India.*  
*Magnitudo Afili. Alae subtus lineis longitudinalibus superiorum lutescentibus; inferiorum fuscis.*

\* \* \* *Legitimæ Alis integris, ano barbato.*

- Tantalus. 25. S. abdomine barbato: segmento tertio niveo. *Mus. Lud. Utr.* 21. \*  
*Habitat in calidis regionibus.*

- Ition. 26. S. abdomine barbato: lateribus punctis utrinque 4 niveis. *M. L. U.*  
*Habitat in calidis regionibus.*

- Stellatarum. 27. S. abdomine barbato lateribus albo nigroque variis, alis posticis ferrugineis. *Faun. suec.* 1091. \*

*Scop. carn.* 474.

*Merian. eur.* 2. p. 33. t. 29.

*Raj. inf.* 133. n. 1.

*Ged. inf.* 2. p. 41. n. 14.

*Reaum. inf.* 1. t. 12. f. 5, 6.

*Raf. inf.* 1. phal. 1. t. 8.

*Bradl. natur.* t. 26. f. 1. A.

*Geoffr. paris.* 2. p. 83. n. 6. t. 11. f. 5.

*Scheff. elem.* t. 116. f. 3.

- β. Sphinx *Belis* abdomine barbato, supra nebuloso, subtus flavescens, alis posticis basi flavis. *Syst. nat.* 10. p. 493. n. 31.

*Habitat in Galio, Rubia.*

*Alae non fenestratae.*

- facifor- 28. S. abdomine barbato nigro: fascia flavescens, alis  
 mis. fenestratis margine nigro atro-purpureo. *Faun. suec.* 1092. \*

*Scop.*

*Scop. carn.* 475.

*Bradl. nat.* 26. f. 1. B.

*Ræf. inf. app.* 231. t. 38.

4. t. 34. f. 1 - 4.

*Sultze inf. t.* 15. f. 90.

*Poda inf. t.* 2. f. 6.

*Geoffr. parif.* 2. p. 82. n. 4.

β. *Sphinx Tityus* abdomine barbato cingulo nigro. *Syst. nat.* 10. p. 493. n. 24.

*Habitat in Lonicera.*

*Barba abdominis in medio alba est.*

apiformis. 29. S. alis fenestratis, abdomine flavo incisuris atris, thorace nigro maculis duabus flavis. *Faun. suec.* 1093. \* *Clerck. ic. t.* 9. f. 2.

*Fn. suec.* 1. n. 813. Papilio subulicornis clinguis, alis lanceolatis albis: venis nigris.

*Scop. carn.* 477. *Sphinx scopigera.*

*Habitat in Europa.*

culiciformis. 30. S. alis hyalinis margine fasciaque nigris, abdomine barbato: cingulo fulvo. *Fn. suec.* 1094. \*

*Fn. suec.* 1. p. 217. *Phalæna* alis linearibus fuscis, antennis pectinatis: mas.

*Amæn. acad.* 5. t. 3. f. 204.

*Clerck. ic. t.* 9. f. 3.

*Scop. carn.* 476.

*Habitat in Europa.*

vespiformis. 31. S. alis fenestratis, abdomine barbato nigro: incisuris tribus posterioribus margine flavis, capite annulo flavo. *Fn. suec.* 1095. \*

*Habitat in Europa.*

tipuliformis. 32. S. alis fenestratis, abdomine barbato nigro: incisuris, alternis margine flavis. *Fn. suec.* 1096. \* *Clerck. ic. t.* 9. f. 31.

β. *Sphinx Salmaeus* abdomine barbato toto nigro. *Syst. nat.* 10. p. 493. n. 30.

*Pet. gaz.* 1. 42. f. 6. *Phalæna bombylius* parvus, corpore nigro, ano croceo.

*Habitat in Europa.*

\*\*\*\* Ad-

\* \* \* \* *Adscita habitu & Larva diversa.*

- Auxo. 33. S. alis superioribus cyaneo-nigris: fasciis duabus albis; inferioribus albis limbo nigro.

*Habitat in China.*

Corpus magnitudine fere P. Brassica, cyaneum. Collare coccineum. Alæ magis quam in affinis rotundatæ, ut in Heliconiis. Superiores concolores, nigre, basi cyaneæ: Fascia alba in medio & alia versus apicem magis interrupta. Inferiores albæ Limbo nigro, margine antico cyaneo. Antennas non vidi.

- Filipendulæ. 34. S. alis superioribus cyaneis: punctis sex rubris; inferioribus rubris immaculatis. Faun. suec. 1097. \*

Geoffr. parif. 2. p. 88. n. 13.

Scop. carn. 479.

Mouff. inf. 966. f. 97. f. ult.

Fonst. inf. t. 7. f. 3.

Pet. mus. 36. n. 330.

Raj. inf. 134. n. 2.

Gæd. inf. 2. t. 31.

List. gæd. f. 37.

Alb. inf. t. 82. f. C. D.

Merian. eur. 2. t. 17. f. 67.

Reaum. inf. 1. t. 12. f. 14 - 17.

2. t. 2. f. 2.

Rœf. inf. 1. phal. 2. t. 57.

Harris. inf. 2. t. 1. f. c - b.

Sultz. inf. t. 15. f. 91.

Wilkes pap. 46. t. 1. a. 1.

*Habitat in Spiræa Filipendula.*

- Phega. 35. S. viridi-atra, alis punctis fenestratis: superiorum sex, inferiorum duobus, abdomine cingulo luteo. Mus. Lud. Ulr. 364.

Scop. carn. 480.

Frisch inf. 6. p. 33. t. 15. mala.

*Habitat in Germania. P. Förskahl. Syria. Hasselquist.*

Magnitudo & statura prioris, sed tota viridi-atra.

Antennæ filiformes, apicibus supra albicantes. Alæ

maculis s. punctis fenestratis: in superioribus 1, 2,

3; in inferioribus 2: altera minore versus basin alæ.

Abdomen in medio Cingulo luteo unius segmenti,

F f f

quod

Larvæ Sphinxum supra aurum cornu gerunt, quemadmodum Phalana Mori.

*quod subtus non coit; ad basin abdominis rudimentum cinguli lutei.*

- Ephialtes. 36. *S. viridi-atra*, alis superioribus punctis sex rubris, inferioribus unico, abdomine cingulo sanguineo.

*Habitat in Germania. D. Schreber.*

*Statura S. Phegea: Antennæ utrinque attenuatæ, nigrae. Alæ Superiores viridi-atra punctis 2 sanguineis, approximatis ad basin; 2 rasis in medio; 2 versus apicem. Inferiores nigra, puncto albo. Corpus nigrum abdomine cingulo uno sanguineo.*

- caffa. 37. *S. nigra*, alis superioribus fusco-cinereis: punctis quinque sanguineis, inferioribus rubris. *Mus. Lud. Ultr.* 362. \*

*Scop. carn. 478. Sphinx carneolica.*

*Gron. zooph. 830.*

*Habitat ad Cap. b. spei. D. Tulbagh; inque Carniola. Antennæ clavatae sunt.*

- Cerbera. 38. *S. viridis*, alis punctis fenestratis: superioribus sex; inferioribus duobus; abdomine cingulis sanguineis.

*M. L. U. 363. \**

*Habitat ad Cap. b. spei. D. Tulbagh.*

- Creusa. 39. *S. nigra*, alis maculis fenestratis, abdominis basi viridi: segmentorum marginibus rubris. *Mus. L. U.* 365. *Clerck ic. t. 46. f. 5.*

*Habitat in Calidis regionibus.*

- Polymena. 40. *S. nigra*, alis maculis luteis: superiorum tribus, inferiorum duobus, abdomine cingulis binis coccineis.

*Raj. inf. 135. Papilio parva, alis nigris: maculis fulvis variis.*

*Habitat in Asia.*

*Caput nigrum (Antennæ deficiebant). Frons alba. Alæ nigrae: superiores maculis 3 luteis: intermediis didyma; inferiores maculis 2 luteis. Abdomen atro-caeruleum: Segmento 1 coccineo; 2, 3 caeruleis; 4, 5, 6 coccineis; 7 atro.*

- Cassandra. 41. *S. nigra*, abdomine utrinque maculis quinque caeruleis, ano ore batique femorum abdominisque coccineis.

*Habitat in America.*

*Sta-*

*Statura priorum* f. *S. Filipendulae*. Os sanguineum. Lingua spiralis. Alæ nigrae. Puncta thoracis ad alas & basis omnium femorum coccinea. Abdomen atrum, utrinque maculis 5 caeruleis nitidis. Ano sanguineo.

fausta. 42. S. alis rubris concoloribus: superioribus maculis nigris margini nigro annexis.

*Habitat in Europa australi. Gouan.*

Magnitudo dimidia *S. Filipendulae*, statura & Antennæ subclavatae similes. Corpus nigrum. Collare sanguineum. Alæ superiores sanguineae utrinque concolores, macula nigra: prima baseos; secunda fere fascia; tertia ex fascia interrupta margini nigro unita; ultima parva nigra. Inferiores tota sanguineae.

infausta. 43. S. nigra, alis fuscis: inferioribus interius sanguineis, antennis pectinatis.

*Habitat in Europa australi. Gouan.*

Corpus totum nigrum, magnitudine *S. Statice*, Antennæ omnino pectinatae. Collare sanguineum. Alæ nigricantes: superiores margine exteriori antice sanguineo. Inferiores, dimidia sua parte versus corpus, sanguineae.

pectinicornis. 44. S. subfusca, alis violaceis: fasciis duabus albis subinterruptis, collari sanguineo.

*Edw. av. 5. p. 36. t. 226.*

*Habitat in Asia.*

*Statura S. Filipendulae. Antennæ pectinatae, sed apice filiformes & simplices.*

pugione. 45. S. caerulefcenti-atra albo punctata, alis rubris margine postico fusco.

*Habitat in insula f. Thomæ. L. Spengler.*

Corpus magnitudine *S. Filipendulae*, atrum, subcaerulefcent. Thorax punctis albis sparsis. Abdomen utrinque ordine duplici punctorum alborum. Antennæ utraque extremitate angustiores, subpectinatae, apice rubrae. Alæ rubrae, immaculatae, postico tantum margine nigricantes. Pedes nigri.

Auge. 46. S. nigra lateribus sanguinea, alis fenestratis postice nigris, antennis pectinatis.

F f f 2

Habi-

*Habitat in America. L. Spengler.*

Corpus magnitudine *S. Phæa*. Antennæ lanceolatae, pectinatae, nigrae, apice rufescentes. Caput nigrum. Thorax undique ruber, basi superiore atro-violacea; linea dorsali posteriore nigra. Abdomen nigrum lateribus anterioribus rubris; Puncta 2 alba, ad latera abdominis, subtus versus basin. Alæ hyalinae anastomosibus & postice nigrae. Pedes rufi.

**Statice.** 47. *S. viridi-cærulea*, alis inferioribus fuscis. *Fn. succ.* 1098.

*It. wgoth.* 27.

*Scop. carn.* 481.

*Raj. inf.* 134. n. 3. Papilio parva, alis pendulis.

*Pet. mus.* 35. n. 329. Papilionoides pratensis viridis minor.

*Goffr. parif.* 2. p. 129. *Phalæna* 40.

*Schaff. ic. t. 1. f. 9.*

*Habitat in Europa.*

233. **PHALÆNA.** *Antennæ* setaceæ, a basi ad apicem sensim attenuatæ.

*Alæ* (sedentis) sæpius deflectæ (volatu nocturno).

\* 1 \* *ATTACI* alis patulis.

**Atlas.** 1. *P. Attacus* pectinicornis elinguis, alis falcatis concoloribus luteo-variis macula fenestrata: superioribus sesquialtera. *Mus. Lud. Ulr.* 366. \*

*Pet. gaz. t. 8. f. 7.*

*Merian. surin.* 52. t. 52.

*AB. E. N. C. dec. 2. an. 2. app.*

*Valent. mus. 2. p. 168. t. 54.*

*Knorr. delic. t. C. 4. f. 1.*

*Habitat in Citro Asia, America.*

Larva nuda, verticillata verrucis pilosis, nec folliculos grandes tenaces vix extricandos.

Speciosissima *Phalænarum* Antennis ad singulos articulos radius 4 f. utrinque 2 divergentibus.

1. P.

---

Antennas pectinatas genera non constituere a simplicibus diversa docent *Phalæna Bombyces* & *Geometra*, *Sphinx*, *Bruchus*, *Curculio*, *Prinus*, *Elater*, *Tipula* &c.



Hesperus. 2. *P. Attacus* pectinicornis elinguis, alis subfalcatis luteo-  
variis: macula fenestrata solitaria. *Mus. Lnd. Utr.*  
367. \*

*Merian. Surin. 65. t. 65.*

*Habitat in Citro Americæ.*

*Larva glabra tota.*

*Simillima precedenti, ut difficile distinguenda: Corpore  
flavescente, nec fulvo; Collo cincto linea alba. A-  
larum fenestris solitariis (absque minori lanceolata  
in superioribus) intrantibus regionem exteriorem a-  
la, & vix manifesto margine nigro cincta: colore  
demum alarum pallidius flavescente, nec ferrugineo.  
Quomodo hæc a priori orta, dies docebit.*

Cecropia. 3. *P. Attacus* pectinicornis elinguis, alis subfalcatis gri-  
seis: fascia fulva, superioribus oculo subfenestrato  
ferrugineo. *M. L. U.* 368. \* *Clerck ic. t. 49. f. 1.*  
*Catesb. car. 2. p. 86. t. 86.*

*Habitat in America septentrionali.*

Paphia. 4. *P. Attacus* pectinicornis elinguis flava, alis falcatis  
concoloribus oculo fenestratis. *M. L. U.* 369. \*

*Pet. gaz. t. 29. f. 3.*

*Catesb. car. 2. p. 91. t. 91?*

F f f 3

*Rumph.*

*Phalænæ dividendæ, quo facilius inquirentur.*

1. ATTACI alis patulis inclinatæ.

- Pectinicornes elingues:

- - spirilingues

- Seticornes spirilingues

2. BOMBYCES alis incumbentibus; Antennis Pectinatis:

- Elingues absque lingua manifeste spirali.

- - Alis reversis

- - Alis deflexis

- Spirilingues Lingua involuto-spirali:

- - leves

- - cristatæ dorso

3. NOCTUÆ alis incumbentibus; Antennis setaceis, nec pectinatis.

- Elingues

- Spirilingues

4. GEOMETRÆ alis patentibus horizontalibus quiescentes:

- Pectinicornes:

- Seticornes

alis rotundatis.

5. TORTRICES alis obtusissimis ut fere retusis, margine exteriori curvo.

6. PYRALIDES alis conniventibus in figuram deltoideam forficatam.

7. TINÆ alis convolutis fere in cylindrum, fronte prominula.

8. ALUCITÆ alis digitatis fissis ad basin usque.

*Rumph. amb.* 3. t. 75. p. 114.

*Habitat in* Guinea, Asia.

Luna. 5. *P. Attacus* pectinicornis elinguis, alis caudatis flavo-virentibus concoloribus: ocello disci lunato. *Musf.*

*Lud. Ulr.* 370. \* *Clerck ic.* t. 52. f. 1.

*Pet. gaz.* t. 14. f. 5.

*Ctesb. car.* 2. p. 84. t. 84.

*Habitat in* America septentrionali. *Kalm.*

Lunus. 6. *P. Attacus* feticornis spirilinguis, alis caudatis fusco luteoque undulatis: ocellis caudalibus subternis. *M.*

*L. U.* 371. \* *Clerck ic.* t. 52. f. 2.

*Habitat in* Indiis.

pavonia. 7. *P. Attacus* pectinicornis elinguis, alis rotundatis griseo nebulosis subfasciatis: ocello nictitante subsenestrato. *Faun. suec.* 1099. \*

*Scop. carn.* 482.

minor. a. *Faun. suec.* 1. p. 835.

*Monff. inf.* 20.

*Jonst. inf.* t. 8. f. 7.

*Raj. inf.* 146. n. 1.

*Pet. gaz.* t. 33. f. 12.

*Alb. inf.* t. 37.

*Schæff. elem.* t. 98. f. 2.

*Scop. carn.* 483. *Phalæna pavoniella.*

*Merian. eur.* t. 13, 23.

*Reaum. inf.* 1. t. 50.

*De Geer inf.* 1. t. 19. f. 1 - 12.

*Ræf. inf.* 1. phal. 2. t. 5.

*Wilkes pap.* 15. t. 2. a. 3.

major. β. *Gæd. inf.* 3. t. 2.

*List. gæd.* 28.

*Ad. parif.* 1692.

*Scop. carn.* 482. *Phalæna pavoniella.*

*Reaum. inf.* 1. t. 47, 48, 49.

*Ræf. inf.* 4. t. 15, 16, 17.

*Knorr. delic.* t. C. 2. f. 2.

*Habitat in* Rosa, Rubo, Ulmo, Corylo, Salice, Pyro.

*Lar-*

---

Larvæ *Phalanarum* sunt læves l. nodosæ, nudæ l. hirsutæ, & differunt Pedum numero: Pedes 16 Bombycibus, Noctuis; 14 Tineis subcutaneis, falcatis; 12 Gamma; 10 Geometris plerisque; omnes enim instruuntur Pedibus Pedorali-bus 6 & Caudalibus 2, excepta *Vinula*, *Furca*, *Iacertina* paucisque aliis; differ-entia itaque primaria a Pedibus Abdominalibus 8, 6, 4, 2, 0.

*Larva nuda, verticillata verrucis pilosis, ut P. Atlantis; ocellus alarum margine superiore nectitur lunula fenestrata vix conspicua.*

Major ♂ Minor adeo inter se affines ac *Sphinx Elpanor* & *Porcellus* seu *Phalæna antiqua* & recens, confirmante *Larva* & *Pupa*, sed altera duplo Major alis albido-cinerascentibus; Minor vero ferrugineis. Sic una ex altera orta, constanter se multiplicans, nec miscenda ulterius cum altera in copula.

**Tau.** 8. *P. Attacus pectinicornis* elinguis, alis testaceis: ocello subviolaceo pupilla hastata alba. *Faun. suec.* 1100. \* *Scop. carn.* 484.

*Act. stockh.* 1749. p. 130. t. 4. f. 8.

*Uddm. diff.* 61.

*Röf. inf.* 4. t. 7. f. 3, 4.

*Habitat in Betula.*

*Ocellus violaceus in singulis alis pupilla T albo, sed opaca, nec diaphano-fenestrata.*

fenestra. 9. *P. Attacus pectinicornis spirilinguis*, alis concoloribus flavis: superioribus fenestra duplici, inferioribus simplicibus. *Mus. Lud. U.* 372. \* *Clerck ic.* t. 55. f. 1. *Habitat in Indiis.*

perspicua. 10. *P. Attacus pectinicornis spirilinguis*, alis fuscis: superioribus fascia fenestrata brevi. *M. L. U.* 373. \* *Habitat in Indiis.*

Odora. 11. *P. Attacus pectinicornis spirilinguis*, alis crenatis nebulosis: superioribus ocello unico; inferioribus sesquialtero. *Mus. Lud. Ulr.* 374. \* *Clerck ic.* t. 50. f. 1.

*Sloan. jam.* 2. t. 236. f. 13, 14.

*Habitat in America calidiore.*

militaris. 12. *P. Attacus pectinicornis spirilinguis*, alis concoloribus apice maculisque violaceis: superioribus extus albo subfasciatis. *Mus. L. U.* 375.

*Röf. inf.* 4. t. 6. f. 3.

*Habitat in Asia.*

crepuscularis. 13. *P. Attacus feticornis spirilinguis*, alis griseis fascia maculaque albis: superioribus ocello fusco. *M. L. U.* 378. \* *Clerck ic.* t. 53. f. 1, 2.

*Habitat in America.*

occidua. 14. *P. Attacus seticornis spirilinguis*, alis dentatis nebulosis linea pallida: superioribus oculo lunato punctoque. *Mus. Lud. Ulr.* 379 \* *Clerck ic.* t. 54. f. 1.  
*Habitat in America.*

punctige- 15. *P. Attacus seticornis spirilinguis*, alis superioribus  
ra, puncto calloso apiceque ocellato; inferioribus albis.  
*Mus. L. U.* 380. *Clerck ic.* t. 50. f. 3. \*  
*Habitat in Indiis.*

*Alæ superiores cinerascens area lunata albida & puncto calloso ad marginem interiorem.*

Fulloni- 16. *P. Attacus seticornis spirilinguis*, alis flavis: inferioribus concoloribus disco flavis, lunula limboque nigris. *Clerck ic.* t. 48.  
*Habitat in Indiis.*

mundana. 17. *P. Attacus seticornis spirilinguis*, alis denudatis albidis: fasciis duabus moniliformibus obsoletis. *Faun. suec.* 1343.

*Habitat in Europa.*

*Statura & magnitudo Tortricum, sed diversa alis denudatis, unde dubiæ familiæ. Alæ obovatae, albidae, divise æqualiter strigis duabus, quasi concatenatis & punctis fuscis. Punctum in medio fuscum.*

\* *BOMBYCES elingues Alis reversis.*

quercifolia. 18. *P. Bombyx elinguis*, alis reversis semitectis dentatis ferrugineis margine postico nigris. *Fu. suec.* 1110. \*

*Scop. carn.* 485.

*Alb. inf.* 1. t. 16.

*Merian. eur.* 1. t. 17.

*Frisch. inf.* 3. t. 1. f. 3.

*Raj. inf.* 141. n. 1.

*Reaum. inf.* 2. t. 23.

*Raf. inf.* 1. phal. 2. t. 41.

*Wilkes pap.* 27. t. 3. b. 1.

*Sulz. inf.* t. 16. f. 93.

*Poda inf.* t. 2. f. 7.

*Geoffr. parif.* 2. p. 110.

*Habitat in Salice, Pruno spinosa, Pyro, Gramine.\**

*Larva subcaudata, pilosa, ferruginea, collaribus caeruleis.*

*Antennæ brevissima, fusca. Palpi porrecti.*

19. *P.*

*ilicifolia.* 19. *P. Bombyx* elinguis, alis reversis semitectis ferratis griseis margine postico albo variegato. *Faun. suec.* 1109. \*

*De Geer* inf. 1. t. 14. f. 7, 9.

*Habitat* in *Salice.*

*Margo inter dentes alæ albus est. Antennæ pallidæ.*

*capensis.* 20. *P. Bombyx* elinguis, alis reversis helvolis: superioribus strigis duabus repandis albis: posteriore nigro inducta.

*Habitat* in *Africa.*

*Major nostratibus europæis, alis reversis. Antennæ femina pectinata, longitudine thoracis. Thorax flavo-pallescent. Alæ Superiores supra flavæ: Striga priore alba, repando-undulata, latiore; exterior s. posteriore obliqua, repanda, antice nigra, postice alba, -area alæ, pone strigam posteriorem, pallida est. Alæ Superiores subtus, & inferiores utrinque heterocla s. triste cinnamomeæ. Abdomen totum flavum, sed incisuræ glabræ, dum extenduntur nigra. Plantæ geniculis albis.*

*Rubi.* 21. *P. Bombyx* elinguis, alis reversis cervinis immaculatis: strigis duabus albidis; subtus nullis. *Fn. suec.* 1103. \*

*Scop. carn.* 492.

*Rœf. inf. app.* 2. 49.

*Wilkes pap.* 25. t. 3. a. 19.

*Ammiral inf.* 2. 32.

*Habitat* in *Rubo, Salice.*

*Larva lævis, pilosa, ferruginea, nigro annulata.*

*Alæ absque puncto: Striga posterior flexuosa, obsoletior.*

*Pruni.* 22. *P. Bombyx* elinguis, alis reversis luteis: strigis duabus fulvis punctoquo albo.

*Rœf. inf. 1. phal.* 2. t. 36. \*

*Habitat* in *Pruno Germaniæ.*

*Larva lævis, pilosa, fuscescens humeris cæruleis.*

*Simillima sequenti, sed in Alis superioribus Punctum tantum unicum album, nec alterum minus.*

*potatoria.* 23. *P. Bombyx* elinguis, alis reversis flavis: striga fulva repandaque punctis duobus albis.

*Gæd. inf.* 1. t. 12.

FFF 5

List.

*List. gæd. f. 82.*

*Raj. inf. 142. n. 3.*

*Alb. inf. t. 17.*

*Merian. eur. 2. p. 27. t. 16.*

*Rœf. inf. 1. phal. 2. t. 2.*

*Wilkes pap. 27. t. 3. b. 2.*

*Habitat in Gramine Europa australioris.*

*Larva caudata, cristata, pilosa, lateribus albo maculatis.*

*Alæ striga anteriore ferruginea, obliqua; posteriore repanda. Puncta 2 alba approximata: altero minore.*

Pini. 24. *P. Bombyx elinguis*, alis reversis griseis: strigis duabus cinereis; puncto albo triangulari. *Faun. suec. 1104. \**

*Merian. inf. t. 22.*

*Frisch. inf. 10. t. 10.*

*Rœf. inf. 1. phal. 2. t. 59.*

*Wilkes pap. 29. t. 3. b. 5.*

*Poda inf. 84. n. 5.*

*Uddm. diff. 60. Pithyocampus.*

*Habitat in Pino.*

*Larva subcaudata, pilosa, albo fusco griseoque varia, collaribus cæruleis.*

*Striga utraque alæ valde flexuosa & obscurior.*

Quercus. 25. *P. Bombyx elinguis*, alis reversis ferrugineis: fascia flava punctoque albo, *Fn. suec. 1106. \**

*Scop. carn. 487.*

*Mouff. inf. 187. f. 2.*

*Gæd. inf. 1. t. 7.*

*List. gæd. f. 88.*

*Raj. inf. 142. n. 2.*

*Merian. eur. 1. t. 10.*

*Pet. gaz. t. 45. f. 5. Semicolon.*

*Poda inf. 85. n. 6.*

*Alb. inf. t. 18. f. 25.*

*Reaum. inf. 1. t. 35.*

*Rœf. inf. 1. phal. 2. t. 35.*

*Wilkes pap. 22. t. 3. a. 11, 12.*

*Uddm. diff. 59.*

*Amiral t. 31.*

*Geoffr. parif. 2. p. 111. n. 13.*

*Habi-*

Pupæ Phalanarum sunt leves l. hamatæ; singule nudæ l. folliculo obvelatæ.

*Habitat in Quercu, Betula, Pruno spinosa, Erica, Salice.*

*Larva levis, pilosa, grisea, nigro annulata, alboque maculata.*

*Litura flava ad basin Alæ superioris.*

- dumeti. 26. *P. Bombyx elinguis*, alis reversis fuscescentibus: superioribus puncto fasciâ margineque postico luteis. *Fn. suec.* 1107. \*

*Pet. gaz. t. 45. f. 13.*

*Habitat in Europa.*

*Punctum trigonum, luteum, ante fasciam luteam.*

- Catax. 27. *P. Bombyx elinguis*, alis reversis flavis unicoloribus puncto albido. *Fn. suec.* 1108. \*

*Habitat in Europa.*

*Conf. Rœf. inf. 4. t. 34. f. a. b. & 3. t. 71. f. a. sed abdomen in mea lanatum non erat.*

*Parvus magnitudine castrensis; margo alæ reversus albus, striga nulla.*

- lanestris. 28. *P. Bombyx elinguis*, alis reversis ferrugineis: striga alba: superioribus puncto basique albis. *Fn. suec.* 1105. \*

*Scop. carn.* 499.

*Rœf. inf. 1. phal. 2. t. 62.*

*Wilkes pap. 25. t. 3. a. 18.*

*Podq. inf. 86. n. 11.*

*Habitat in Tilia, Pruno spinosa, Salice. Larvæ cohabitant in Societate sub tentoriis cellulosis, unde migrant pabulaturæ, redeuntque per foramina ramis parallela. Sc.*

*Larva pilosa, nigra: segmento singulo punctis 3 albis inter maculas 2 rubras penicillatas.*

*Annus Phalænæ valde lanatus albidus, ac si esset P. Rubi Mas.*

*Alæ striga alba punctoque albo, insuper basi puncto albo.*

- Vinula. 29. *P. Bombyx elinguis albida nigro-punctata*, alis sub-reversis fusco venosis striatisque. *Fn. suec.* 1112. \*

*Geoffr. parif. 2. p. 104. n. 5.*

*Scop. carn.* 488.

*Faun. suec. 1. n. 819.*

*Mouff. inf. 183. f. 10.*

*Aldr. inf. 268. f. 1 - 8.*

*Gæd. inf. 3. t. C.*

Gæd.

Gæd. inf. 1. t. 65.

2. t. 37.

List. gæd. t. 20. b.

Raj. inf. 153. n. 5.

Merian. eur. 3. t. 39. f. 140.

Alb. inf. 11. t. 5.

Friseh. inf. 6. t. 8.

Reaum. inf. 2. t. 21.

De Geer inf. 1. t. 23. f. 12.

Ræf. inf. 1. pal. 2. t. 19.

Wilk. pap. 13. t. 1. c. 1.

Habitat in Populo, Salice, Quercu.

Larva nuda Thorace gibbo transverse compresso; dorso lineis 2 albis cruciatis; Cauda duplex tentaculis retractilibus.

Thorax albus punctis nigris plurimis.

- Fagi. 30. *P. Bombyx elingnis*, alis reversis rufo-cinereis: fasciis duabus linearibus luteis flexuosis. *Faun. suec.* 1113.

Monff. inf. 198.

Alb. inf. t. 58.

Ræf. inf. app. t. 12.

Udm. diss. 61.

Act. stockh. 1749. p. 132. t. 4. f. 10 - 14.

Habitat in Fago, Corylo, Betula.

Larva pedibus 6: anterioribus elongatis; cauda reflexa corniculis 2 setaceis.

- bucephala. 31. *P. Bombyx subelinguis*, alis subreversis cinereis: strigis duabus ferrugineis maculaque terminali magna flavâ. *Fn. suec.* 1115. \*

Scop. carn. 515.

Gæd. inf. 1. t. 34.

List. gæd. f. 35.

Merian. eur. 3. t. 41.

Raj. inf. 162. n. 14.

Alb. inf. 23. f. 33.

Friseh. inf. 11. t. 4.

De Geer inf. 1. t. 13. f. 14 - 19.

Ræf. inf. 1. phal. 2. t. 14.

Wilk. pap. 21. t. 3. a. 8.

Geoffr. paris. 2. p. 123. n. 28.

Habitat in Tilia, Alno, Quercu, Salice.

Larva



Larva pilosa, nigra annulis lineisque luteis, punctis albis lateralibus.

Pupa corniculis duobus posticis.

Imago Antennis angustis Cossi. Lingua brevis. Thorax subcristatus, flavus, postice ferrugineus.

versico-  
lora.

32. *P. Bombyx elinguis*, alis reversis griseis: strigis nigro-albis, fronte albo *Faun. suec.* 1111. \*

*Gadd satag.* 82. *Phal.* alis lineis albis & nigris undatis.

*Ræf. inf. app.* 39. f. 3.

*Wilk. pap.* 45. t. 1. a. 1.

*Habitat in Europa.*

*Speciosa, magna. Thorax antice albus linea nigra terminatus. Alæ superioris angulus posticus maculis 3 albis; inferioris macula diaphana ad apicem.*

Mori.

33. *P. Bombyx elinguis*, alis reversis pallidis: strigis tribus obsoletis fulcis maculaque lunari. *Amæn. acad.* 4. p. 563. \*

*Scop. carn.* 486.

*Faun. suec.* 1. n. 832.

*Mouff. inf.* 181.

*Aldr. inf.* 280.

*Fonst. inf. t.* 22.

*Gad. inf.* 1. t. 42.

*List. gæd. f.* 32.

*Merian. eur.* 1. t. 1.

*Blank. inf.* 60. t. 9.

*Alb. inf. t.* 12. f. 16.

*Bradl. nat. t.* 27. f. 1.

*Reaum. inf.* 2. t. 5. f. 2.

*Ræf. inf. app.* 1. t. 7, 8.

*Triew. act. Stockh.* 1745. p. 253. t. 14. f. 1.

*Ammiral. inf. t.* 9.

*Geoffr. parif.* 2. p. 116. n. 18.

*Habitat in Moro China; Hospitatur per Europam.*

Larva nuda, caudata more *Sphingis*.

*Bombyces telas, Araneorum modo, texunt ad vestem luxumque feminarum. Prima eas redordiri rursumque texere invenit Cæo Mulier Pamphila, Læto filia (Plin. XI. 22.) seu potius Platis filia. Aristot. anim. V: 19.*

*Variat alis albis & flavis.*

**Populi.** 34. *P. Bombyx* elinguis fusca antice pallida, alis reversis immaculatis fufcescentibus: striga sesquialtera albida repanda. *Fn. suec.* 1101. \*

*Raf. inf.* 2. *phal.* 2. t. 60.

*Wilkes pap.* 23. t. 3. a. 13.

*Habitat in* Populo, Corylo, Malo, Pyro.

*Larva pilosa: segmentis singulis punctis duorum parium.*

*Imago Parva uti Tabanus. Thorax antice exalbidus.*

*Margo alarum ciliaris albo-punctatus.*

**Neustria.** 35. *P. Bombyx* elinguis, alis reversis: fascia sesquialtera; subtus unica.

*Gæd. inf.* 1. t. 10.

*List. gæd.* t. 89.

*Blank. inf.* 48. t. 8. f. 7. M.

*Raj. inf.* 213.

*Merian. eur.* 1. t. 33?

*Alb. inf.* 19. f. 27.

*Friseh. inf.* 1. t. 2.

*Reaum. inf.* 2. t. 4. f. 1 - 11.

*Raf. inf.* 1. *phal.* 2. t. 6.

*Wilkes pap.* 21. t. 3. a. 10.

*Geoffr. paris.* 2. p. 114. n. 16.

*Habitat in* Arboribus, polyphaga.

*Larva subpilosa, lineis albis rubris cæruleis. Verruca supra anum; hinc diversa a sequenti, cui maxime affinis statura & natura.*

*Alarum strigæ duæ absque puncto.*

**castrensis.** 36. *P. Bombyx* elinguis, alis reversis griseis: strigis duabus pallidis; subtus unica. *Fn. suec.* 1. p. 831. & 2. n. 1102.

*Friseh. inf.* 10. t. 8.

*Raf. inf.* 4. t. 14.

*De Geer inf.* 1. t. 13. f. 4 - 6.

*Habitat in* Pilosella, Jacea, Alchemilla, Euphorbia; polyphaga, pascitur sub tela, gregaria, migratque sapius novo tentorio; ova, more præcedentis, in annulos conferta circum ramulos. Hæc frequens in Suecia, duplici colore occurrit, eadem tamen, diversa a præcedenti, cum illa arborea, hæc terrestribus.

*Larva pilosa, subcærulea lineis utrinque 2 lateralibus ferrugineis approximatis & dorsali 1 utrinque, la-*  
*sa,*

*ta, nigro maculata. Abdomen albo utroque maculatum. Caput cinereum.*

*Alarum fasciæ duæ absque puncto.*

processio-37. *P. Bombyx elinguis, alis reversis? fuscescentibus striga*  
nca. *obscuriore.*

*Reaum. inf. 2. t. 11.*

*Habitat in Quercu.*

*Larva pilosa, incedens per paria inæqualia numero,*  
l. c.

*Magnitudo media. Thorax villosus, cinereus, lavis.*

*Alæ superiores cinereæ, in medio fascia fusca & ad basin umbra fusca. Inferiores albido-cinereæ fascia in medio fusca-obsoleta.*

\* \* *BOMBYCES elingues, alis depressis, dorso levi.*

Caja. 38. *P. Bombyx elinguis, alis deflexis fuscis; rivulis albis;*  
inferioribus purpureis nigro-punctatis. *Fann. succ.*  
1131. \*

*Fn. succ. 820.*

*Mouff. inf. 93. f. XV.*

*Aldr. inf. 246. f. 11, 12.*

*Gæd. inf. 1. t. 174*

*List. gæd. f. 99.*

*Geoffr. paris. 2. p. 108. n. 8.*

*Scop. carn. 503.*

*Merian. eur. 1. t. 5. & 160.*

*Alb. inf. t. 20. f. C. D.*

*Frisch. inf. 2. t. 9.*

*Reaum. inf. 1. t. 36. f. 6, 7.*

*De Geer inf. 1. t. 12. f. 8, 9.*

*Blank. inf. t. 9. f. A. C.*

*Raj. inf. 151. n. 3.*

152. n. 7.

*Rœf. inf. 1. phal. 2. t. 1.*

*Wilkes pap. 18. t. 3. a. 1.*

*Saltz. inf. t. 16. f. 944*

*Habitat in Lactuca, Oleribusque variis, polyphaga.*

*Larva hirsuta, ferruginca.*

*Abdomen sanguineum maculis 4 dorsalibus nigris. Col-  
lare sanguineum.*

39. P.

Nobiles dictæ pulchrioribus coloribus rubro luteoque pictæ sunt, uti Lectrix, He-  
be, Hera, Caja, Virgo, Plantaginis, Dominula, Matronula, Aulica, Ancilla.

- Virgo. 39. *P. Bombyx* elinguis, alis deflexis atris: rivulis rubicundis; inferioribus rubris nigro-punctatis. *Musf. Lud. Ulr.* 381. *Clerck ic. t.* 42. f. 5.  
*Habitat in Pennsylvania.*  
*Antennæ vix manifeste barbatae & fere setaceæ in mare, magis adhuc setaceæ in femina. Abdomen tergo rubro.*
- Hebe. 40. *P. Bombyx* elinguis, alis deflexis atris: fasciis albis; inferioribus rubris: rivulis nigris.  
*Mouff. inf.* 93. f. 4, 5. n. 18.  
*Frisch inf.* 7. t. 9.  
*Rœf. inf.* 4. t. 27. f. 1, 2.  
*Schæff. elem.* t. 98. f. 1.  
*Gron. zooph.* 853.  
*Geoffr. parif.* 2. p. 109. n. 9.  
*Habitat in Germania. D. D. Schreber. rarior.*  
*Corpus nigrum, Collari sanguineo angustissimo. Abdomen nigrum segmentis utrinque macula rubra. Alæ Superiores nigrae fasciis 5 albidis: quarum 4 & 5 confluentes; 3 angustissima. Inferiores sanguineae margine nigro; arcus in medio niger cum ramento reflexo ad latus inferius; postice fascia nigra interrupta; punctum inter fasciam præcedentem & posteriorem ad angulum ani.*
- villica. 41. *P. Bombyx* spirilinguis? alis deflexis atris: maculis octo albidis, inferioribus flavis nigro-maculatis.  
*Scop. carn.* 504.  
*Merian. eur.* 1. t. 6.  
*Alb. inf.* t. 21.  
*Frisch. inf.* 10. t. 2.  
*Geoffr. parif.* 2. p. 106. n. 1.  
*Reaum. inf.* 1. t. 31. f. 4-6.  
*Wilk. pap.* 18. t. 3. a. 2.  
*Rœf. inf.* 4. t. 28. f. 2. & t. 29. f. 1-4.  
*Poda inf.* 88. n. 154. *P. Vidua.*  
*Habitat in Ulmo, Urtica, Alfine, Millefolio.*  
*Larva hirsuta, ferruginea, verrucis pilosis, fronte pedibusque nigris.*  
*Abdomen rubrum, trifariam nigro-punctatum; subtus nigrum rubro-punctatum.*
- Plantaginis. 42. *P. Bombyx* elinguis, alis deflexis atris: rivulis flavis; inferioribus rubro-maculatis. *Faun. suec.* 1132. \*  
*Geoffr.*

Geoffr. paris. 2. p. 145. n. 74.

It. gotl. 273.

Wilkes pap. 24. t. 3. a. 15.

Rœf. inf. 4. t. 24. f. 9, 10.

Scop. carn. 927. Phalæna alpicola.

Habitat in Plantagine, Hyacintho, Ulmo.

Sexus variat: ubi Mas fulvus, ibi Femina seticornis coccinea.

Corpus atrum. Antennæ setaceæ, serratæ femina, pectinatae maris. Collare fulvum. Abdomen atrum lateribus sanguineis, longitudinaliter nigro-punctatis. Alæ superiores subconcolores, atræ, linea lata longitudinali, postice quasi in cruce terminata, flavæ, & insuper macula media marginalis. Inferiores nigre, postice fulvescentes, nigro maculatæ. Antennæ & Pedes atrî. Tacta emittit utrinque guttulam flavam e collari.

Larva hirsuta, nigra, dorfi segmentis 6 luteis.

monacha. 43. P. Bombyx elinguis, alis deflexis: superioribus albis atro-undatis, abdominis incisuris sanguineis. Faun. suec. 1130. \*

Scop. carn. 490.

Wilkes pap. 19. t. 3. a. 4.

Habitat in Salice, Quercu, Malo.

Larva pilosa, albida, nigro maculata.

Abdomen nigrum incisuris coccineis.

dispar. 44. P. Bombyx elinguis, alis deflexis: masculis griseo fuscoque nebulosis; femineis albidis lituris nigris. Po-da inf. 86. n. 9.

Scop. carn. 491.

Merian. eur. 1. t. 18.

Frisch. inf. 1. p. 14. t. 3.

Reaum. inf. 2. t. 1. f. 11 - 14.

Rœf. inf. 1. phal. 2. t. 3.

Wilkes pap. 20. t. 3. a. 7.

Geoffr. paris. 2. p. 112. n. 14.

Habitat in Quercu, Tilia, Pomonæ arboribus magis australibus, polyphaga.

Larva pilosa, albo lineata: punctis antice cæruleis, postice rubris.

Mas Antennis magnis pectinatis; Alis fusco-griseis nebulosis; dimidio minor.

Femina *Antennis nigris; Alis albidis: lituris aliquot nigris cum puncto nigro intermedio ad marginem anteriorem, margine postico nigro-punctato.*

Chryso- 45. *P. Bombyx elinguis*, alis deflexis albidis, abdominis  
rhœa. apice barbato luteo. *Fn. suec.* 1128.

*Scop. carn.* 493.

*Ray. inf.* 156. n. 1, 15. ♂ 343. n. 5.

*Merian. eur.* 1. p. 8. t. 20.

*Frisch. inf.* 3. p. 28. t. 8.

*Reaum. inf.* 1. t. 16. f. 11.

*Rœf. inf.* 1. phal. 2. t. 22.

*Wilkes pap.* 28. t. 3. b. 3.

*Geoffr. parif.* 117. n. 20.

*Edw. av.* 122. t. 122.

*Habitat in Pomonæ arboribus, Quercu, Alno.*

*Larva nodosa, pilosa, nigra, rubro lineata.*

*Alba tota Feminis ano luteo, uti Pedes solo genu nigro. Antennæ albæ radiis pallidis.*

Salicis. 46. *P. Bombyx elinguis*, alis deflexis albis, pedibus ni-  
gris albo-annulatis. *Faun. suec.* 1129. \*

*Geoffr. parif.* 2. p. 116. n. 19.

*Scop. carn.* 495.

*Fn. suec.* 822.

*It. scan.* 167, 307.

*Gad. inf.* 1. t. 3.

*List. gad.* f. 87.

*Blank. inf.* t. 8. f. A - D:

*Merian. eur.* 1. t. 30.

*Alb. inf.* t. 84. f. a - d.

*Frisch. inf.* 1. t. 4.

*Reaum. inf.* 1. t. 34. f. 4 - 6.

*De Geer. inf.* 1. t. 11. f. 13, 14.

*Rœf. inf.* 1. phal. 2. t. 9.

*Wilkes pap.* 21. t. 3. a. 9.

*Harris. inf.* 10. t. 5. f. k - p.

*Habitat in Salicibus glabris, Populo.*

*Larva pilosa, dorso longitudinaliter albo maculato.*

*Nivea pedibus atris, albo annulatis. Antennarum radii nigri.*

mendica. 47. *P. Bombyx elinguis cinerea tota, femoribus luteis.*  
*Fn. suec.* 1127. \* *Clerck ic.* t. 3. f. 5.

Ha-

*Habitat in Europa.*

*Parva, statura Cratægi.*

- Cratægi. 48. *P. Bombyx* elinguis, alis deflexis cinereis rotundatis: fascia obscuriore, ano barbato. *Fn. suec.* 1126. \*  
*Reaum. inf.* 1. 44. f. 10.  
*De Geer inf.* 1. t. 11. f. 20, 21.  
*Habitat in Cratægo.*  
*Similis Ph. mendica, parva.*  
*An distincta a P. vitis idea aliter, quam solis antennis & jexu?*

- atra. 49. *P. Bombyx* elinguis, tota atra.  
*Habitat in Europa. Upsalia. C. P. Thunberg.*  
*Magnitudo vix muscam carnariam superat. Antennæ valde pectinatae. Alæ deflexæ: superiores majores.*

- Coryli. 50. *P. Bombyx* elinguis, thorace variegato, alis antice griseo nebulosis: postice carulescenti-glaucis, antennis flavis. *Fn. suec.* 1123. \*  
*Alb. inf.* 1. 90.  
*Raf. inf.* 1. phal. 2. t. 58.  
*Wilkes pap.* 31. t. 3. c. 5.  
*De Geer inf.* 1. t. 18. f. 4, 5.  
*Habitat in Corylo.*  
*Similis P. Furcula, imprimis thorace fasciato-maculato; alæ superiores in medio punctum annulare nigrum habent.*  
*Larva fascicularis pilosa rubra fasciculis dorsalibus 2, caudæ 1, lateralibus thoracis solitariis.*

- Furcula. 51. *P. Bombyx* elinguis, thorace variegato, alis griseis basi apiceque albis nigro punctatis. *Fn. suec.* 1124.  
*Habitat in Europa.*  
*Thorax fuscus, luteo punctatus. Alæ omnes utrinque postico margine punctis nigris distinctis.*

- curtula. 52. *P. Bombyx* elinguis, thorace ferruginato, alis deflexis glaucis: striga alba apicibus macula testacea. *Faun. suec.* 1124. \*  
*Frisch. inf.* 5. t. 6.  
*Raf. inf. app.* t. 43.  
 4. t. 11. f. 1 - 6.  
*Habitat in Quercu, Populo, Salice.*

*Thoracis tergum macula oblonga ferruginea, ad apicem alæ superioris macula magna rufa; cæterum facies*  
- *Ph. anastomosis.*

*Larva turrita.*

- anasto- 53. *P. Bombyx elinguis*, thorace ferruginato, alis deflexis  
molis. griseo-cinerascentibus: strigis tribus pallidis subana-  
stomofantibus. *Fn. suec.* 1125. \*

*Scop. carn.* 502.

*Gæd. inf.* 1. t. 33.

*List. gæd.* 23. t. 23.

*Rœs. inf.* 1. phal. 2. t. 26.

*Habitat in Salice.*

*Larva pilosa, fusca, dorso albo-punctato, linea latera-  
li flava rubro-punctata; prominentia humeri anique.*

*Ph. antice brunnea, sedens retracto capite, uti curzu-  
la, cui nimis affinis, sed alæ inferiores fuscescentes,  
nec albæ.*

\* \* \* *BOMBYCES elingues, alis depressis, dorso cristato.*

- pudiban- 54. *P. Bombyx elinguis cristata*, alis cinerascentibus: fa-  
da. sciis tribus fuscis linearibus undulatis. *Fann. suec.*  
1118. \*

*Scop. carn.* 489.

*Gron. zooph.* 838.

*Fn. suec.* 828.

*Gæd. inf.* 3. t. 5.

*List. gæd.* t. 81.

*Raj. inf.* 185. n. 7. ♂ 344. n. 9. ♂ 309. n. 3.

*Merian. eur.* 1. t. 47.

*Alb. inf.* t. 26.

*Reaum. inf.* 1. t. 33. f. 4 - 12.

*De Geer inf.* 1. t. 16. f. 11, 12.

*Rœs. inf.* 1. phal. 2. t. 38.

*Wilkes pap.* 30. t. 3. c. 2.

*Geoffr. paris.* 2. p. 113. n. 15.

*Ammiral.* t. 18.

- β. *Phalæna Scopularia pestinicornis*, alis canescentibus:  
fasciis tribus obscurioribus; posticis albidis. *Syst. nat.*  
10. p. 521. n. 144. *Clerck ic.* t. 5. f. 8.

*Habitat in Arboribus Pomonæ, Corylo, Quercu,  
Fago.*

Lar-

---

*Hortorum calamitas Phalænarum larvæ, argenteæ annulo, lineæ oleo tinctis jun-  
ctis, trunco arborum circumligato.*



Larva fasciculata, pilosa, flava segmentis nigris; fasciculo caudæ longiori rubro; dorsi 4 albis.  
Antennarum radii flavescentes. Caput inter pedes porrectos.

fascelina. 55. *P. Bombyx* elinguis cristata cinerea, alis superioribus antice fasciis duabus angustis fulvo-fuscis, scutello bipunctato-fulvo. *Fn. suec.* 1119.

*Faun. suec.* 829.

*Mouff. inf.* 189.

*Gæd. inf.* 1. t. 36.

*List. gæd. f.* 80.

*Raj. inf.* 186. n. 8.

*Merian. eur.* t. 8.

*Alb. inf.* t. 26.

*De Geer inf.* 1. t. 15. f. 15.

*Ræf. inf.* 1. phal. 2. t. 37.

*Wilkes pap.* 30. t. 3. c. 1.

*Habitat in* Leontodo, Trifolio, Rubo, Populo.

Larva fasciculata, pilosa: fasciculis dorsalibus 5 albis, capitis anique fuscis.

Alæ superiores supra griseæ strigis 2 fuscescentibus repandis; basif lutea striga arcuata rufa; Lunula in medio alæ flava, lineola rufa in medio. Alæ inferiores exalbido fusca; subtus lunula ferruginea.

antiqua. 56. *P. Bombyx* elinguis, alis planiusculis: superioribus ferrugineis lunula alba anguli postici; femina aptera, *Fn. suec.* 1120. \*

*Geoffr. parif.* 2. p. 119. n. 23.

*Scop. carn.* 494.

*Gæd. inf.* 2. t. 29, 30.

*List. gæd. f.* 78.

*Swamm. quart.* t. 10.

*bibl.* t. 33. f. 3, 6.

*Raj. inf.* 173. n. 24. ♂ 344. n. 8.

*Merian. eur.* t. 84.

*Alb. inf.* t. 89.

*Ræxm. inf.* 1. t. 19. f. 12 17.

*De Geer inf.* 1. t. 17. f. 13, 14.

*Ræf. inf.* 1. phal. 2. t. 39.

*app.* t. 13.

*Wilk. pap.* 30. t. 3. c. 3.

*Geoffr. inf.* 2. p. 123. n. 29.

*Habitat in Pruno, Tilia, Cratægo, Alno; Mas feminam apteram copula connexam ex arbore in arborem defert.*

*Larva fasciculata, pilosa: fasciculis dorsalibus 4 albis; antennalibus caudalique obscuris.*

gonostigina. 57. *P. Bombyx elinguis*, alis planiusculis: superioribus ochraceis macula trigona anguli postici; femina aptera.

*Scop. carn. 497. Phalæna gonostigma.*

*Alb. inf. t. 90.*

*Rœf. inf. 1. phal. 2. t. 48.*

*Wilkes pap. 31. f. 3. c. 4.*

*Habitat in Europa.*

*Differt adeo parum a Ph. antiqua, ac Sphinx Porcellus ab Elpanore, vel Ph. patonia minor a majore, ut vix mercantur distingui; ex una certe altera olim orta, non casu.*

tremula. 58. *P. Bombyx elinguis subcristata*, alis superioribus exustis margine interiore denticulo notatis, antennis ferrugineis. *Fn. succ. 1121. \**

*Habitat in Populo tremula.*

*Thorax postice subtrilobus. Alæ superiores in margine tenuiore denticulo subulato piloso.*

caeruleo-cephala. 59. *P. Bombyx elinguis cristata*, alis deflexis griseis: stigmatibus albidis coadunatis. *Fn. succ. 1117. \**

*Geoffr. paris. 2. p. 122.*

*Gœd. inf. 1. t. 61.*

*List. gœd. f. 47.*

*Raj. inf. 163. n. 17.*

*Merian. europ. t. 9.*

*Alb. inf. t. 13. f. 17.*

*Frisch. inf. 10. t. 3. f. 4.*

*Reaum. inf. 1. t. 18. f. 6-9.*

*Rœf. inf. 1. phal. 2. t. 16.*

*Wilk. pap. 6. t. 1. d. 12.*

*Habitat in Pomonæ arboribus; florum pestis.*

*Larva nuda, varulefcens, luteo-lineata, nigro-punctata.*

*Alæ stigmata duo, reniformia, magna, quasi didyma connexa; margo posticus striga nigra undulata.*

dictæa. 60. *P. Bombyx elinguis*, alis deflexis exustis plaga albidâ; inferioribus albis.

*Habitat in Barbaria, rarior in Europa.*

Me-

*Media.* Corpus testaceum uti Antennæ. Alæ superiores supra exustæ: plaga media longitudinali albidâ & puncto lineaque nîvea juxta thoracem. Inferiores albæ, ad angulum ani fuscescentes.

*Atrac.* 61. *P. Bombyx sublinguis*, alis deflexis dorso dentatis apicibusque macula grisea subocellari, antennis lamellatis. *Fn. suec.* 1116.

*Gæd. inf.* 3. t. E.

*List. gæd. f.* 21.

*Merian. eur. t.* 147.

*Alb. inf. t.* 14. f. 20.

*Frisch. inf.* 3. t. 1. f. 2.

*Reaum. inf.* 2. t. 22. f. 9 - 16.

*De Geer inf.* 1. t. 6. f. 1 - 10.

*Ræf. inf.* 1. phal. 2. t. 20.

*Wlk. pap.* 12. t. 1. d. 1.

*Geoffr. paris.* 2. p. 124. n. 29.

*Habitat in Salice.*

*Larva nuda, dorso gibberibus 2; cauda rufa.*

*Alæ margo interior, in medio, denticulo erecto. Thorax postice bilobus.*

*Artemeda-* 62. *P. Bombyx elinguis*, alis deflexis: superioribus nebulosis dorso dentatis: litura baseos anique flavescens. *rius.*

*Ammiral. inf. t.* 14.

*Habitat in Alno, Betula, Corylo. T. Bergman.*

*Alæ fuscescentes strigis 2 pallidis & postica purpurascens.*

*Cossus.* 63. *P. Bombyx elinguis*, alis deflexis nebulosis, thorace postice fascia atra, antennis lamellatis. *Fann. suec.* 1114.

*Scop. carn.* 500.

*Grøn. zooph.* 204. n. 837.

*Fn. suec.* 812.

*Mouff. inf.* 196. f. 1.

*Gæd. inf.* 2. t. 33.

*List. gæd. f.* 39.

*Pet. gaz. t.* 51. f. 9.

*Raj. inf.* 150. n. 2. & 351. n. 25.

*Merian. eur. t.* 36. f. 137. f. 171.

*Alb. inf. t.* 35. f. 56.

*Frisch. inf.* 7. t. 1.

*Reaum. inf.* 1. t. 17. f. 1 - 5.

G g g 4

Lyonet

*Lyonet. leff. t. 1. f. 17 - 22.*

*Ruf. inf. 1. phal. 2. t. 18.*

*Wilk. pap. 15. t. 2. a. 2.*

*Geoffr. paris. 2. p. 102. n. 4.*

*Habitat in Ligno putrescente.*

*Thorax antice albidus. Antennæ pectinata squamis ovatis.*

*Larva subpilosa, rubra, dorso sanguineo, capite nigro.*

*Romanis in hoc luxuria esse cœpit, pragrandesque Ro-*  
*borum vermes delicatiore sunt in cibo, Cossos vocant,*  
*atque etiam farina saginati; hi quoque altilis fiunt.*

*Plin. XVII: 24.*

*Monographia Lyonnet. Hag. 1762. phil. 80. t. 18.*

palpina. 64. *P. Bombyx elinguis cristata, alis deflexis dentatis*  
*striatis nigro-venosis, palpis porrectis pennatis. Fn.*  
*svec. 1146. \**

*De Geer inf. t. 4. f. 7.*

*Habitat in Salice.*

*Palpi ensiformes, diffracti. Alæ superiores margine te-*  
*nuiore lobo ciliari fusco; subtus margine exteriori*  
*puncto fusco.*

arenacea. 65. *P. Bombyx elinguis lutea, alis superioribus supra ad-*  
*spersis atomis nigris.*

*Habitat ad Cap. b. spei.*

*Corpus Bombyce dimidio minus, totum luteum s. fer-*  
*rugineum etiam alis; sed Thorax magis cinereus.*  
*Antennæ magnæ, pectinata, ferrugineæ. Alæ su-*  
*periores supra pallidiores, adspersæ atomis nigris s.*  
*squamis callosis erectis, plerisque atris.*

Morio. 66. *P. Bombyx elinguis, alis nigris atro striatis; abdomi-*  
*nis incisuris flavescens.*

*Gron. zooph. 857. Ph. B. elinguis nigra, alis subhya-*  
*linis marginibus atris.*

*Habitat Wiennæ. D. D. Jacquin.*

*Magnitudo Ph. calamitæ, tota atra. Antennæ ma-*  
*gnæ, pennatæ. Abdominis segmenta margine flava.*

purpurea. 67. *P. Bombyx elinguis, alis deflexis: superioribus flavis*  
*fusco punctatis; inferioribus rubris nigro-maculatis.*

*Merian. eur. 1. t. 6.*

*Alb. inf. t. 22.*

*Geoffr.*

Rœf. inf. 1. phal. 2. t. 10.

Geoffr. parif. 2. p. 105. n. 6.

Habitat in Ribe.

Larva hirsuta, grisea, albo maculata.

\* \* \* \* \* BOMBYCES spirilingues, dorso laevi, alis deflexis.

Aulica.

68. *P. Bombyx spirilinguis*, alis deflexis: superioribus griseis flavo-punctatis; inferioribus fulvis nigro maculatis. *Fn. suec.* 1133. \* *Glerck ic.* t. 4. f. 3.

*Gron. zooph.* 854.

*Merian. eur.* 2. t. 8.

*Alb. inf.* t. 22.

*Wilkes inf.* 19. t. 3. a. 3.

Habitat in Cynoglossa, Angelica, Urtica, Gramine.

Larva hirsuta, similis *Caja*. D. D. Hartman.

Parva. Alæ superiores maculis 5, antica longiore, præter posticas minutas. Abdomen flavum punctis lateralibus nigris.

Inbricipeda.

69. *P. Bombyx spirilinguis*, alis deflexis albidis: punctis nigris, abdomineque quinquefariam nigro-punctato. *Faun. suec.* 1138. \*

*Geoffr. parif.* 2. p. 118. n. 21.

*Scop. carn.* 513.

*Gron. zooph.* 846.

*Fn. suec.* 823.

*Gæd. inf.* 1. t. 23, 38.

*List. gæd.* f. 93.

*Raj. inf.* 196. n. 155. ♂ 195. n. 40.

*Merian. eur.* 1. t. 46. f. 65.

*Alb. inf.* 24. f. 36.

*Frisch. inf.* 3. t. 8.

*Reaum. inf.* 2. t. 1. f. 7-9.

*De Geer inf.* 1. t. 11. f. 7, 8.

*Rœf. inf.* 1. phal. 2. t. 46.

*Wilkes pap.* 20. t. 3. a. 5.

β. *Wilkes pap.* 20. t. 3. a. 6.

*Rœf. inf.* 2. phal. 2. t. 47.

*Amiral* t. 6.

Habitat in Quercu, Atriplice, Urtica, Portulaca.

Larva pilosa, fusca punctis caeruleis, linea dorsali pallida.

*Lyonet. leff. t. 1. f. 17 - 22.*

*Ruf. inf. 1. phal. 2. t. 18.*

*Wilk. pap. 15. t. 2. a. 2.*

*Geoffr. paris. 2. p. 102. n. 4.*

*Habitat in Ligno putrescente.*

*Thorax antice albidus. Antennæ pectinata squamis ovatis.*

*Larva subpilosa, rubra, dorso sanguineo, capite nigro. Romanis in hoc luxuria esse cœpit, pragrandesque Roborum vermes delicatiore sunt in cibo, Cossos vocant, atque etiam farina saginati; hi quoque altilis fiunt. Plin. XVII: 24.*

*Monographia Lyonnet. Hag. 1762. phil. 80. t. 18.*

palpina. 64. *P. Bombyx elinguis cristata, alis deflexis dentatis striatis nigro-venosis, palpis porrectis pennatis. Fn. suec. 1146. \**

*De Geer inf. t. 4. f. 7.*

*Habitat in Salice.*

*Palpi ensiformes, diffracti. Alæ superiores margine tenuiore lobo ciliari fusco; subtus margine exteriori puncto fusco.*

arenacea. 65. *P. Bombyx elinguis lutea, alis superioribus supra adspersis atomis nigris.*

*Habitat ad Cap. b. spei.*

*Corpus Bombyce dimidio minus, totum luteum s. ferrugineum etiam alis; sed Thorax magis cinereus. Antennæ magnæ, pectinata, ferrugineæ. Alæ superiores supra pallidiores, adspersæ atomis nigris s. squamis callosis erectis, plerisque atris.*

Morio. 66. *P. Bombyx elinguis, alis nigris atro striatis; abdominis incisuris flavescens.*

*Gron. zooph. 857. Ph. B. elinguis nigra, alis subhyalinis marginibus atris.*

*Habitat Wiennæ. D. D. Jacquin.*

*Magnitudo Ph. calamitæ, tota atra. Antennæ magnæ, pennatæ. Abdominis segmenta margine flava.*

purpurea. 67. *P. Bombyx elinguis, alis deflexis: superioribus flavis fusco punctatis; inferioribus rubris nigro-maculatis.*

*Merian. eur. 1. t. 6.*

*Alb. inf. t. 22.*

*Geoffr.*

*Raf. inf.* 1. *phal.* 2. t. 10.

*Geoffr. parif.* 2. p. 105. n. 6.

*Habitat in* Ribe.

*Larva hirsuta, grisea, albo maculata.*

\* \* \* \* \* *BOMBYCES spirilingues, dorso lævi, alis deflexis.*

*Aulica.*

68. *P. Bombyx spirilinguis, alis deflexis: superioribus griseis flavo-punctatis; inferioribus fulvis nigro maculatis. Fn. suec.* 1133. \* *Glerck ic.* t. 4. f. 3.

*Gron. zooph.* 854.

*Merian. eur.* 2. t. 8.

*Alb. inf.* t. 22.

*Wilkes inf.* 19. t. 3. a. 3.

*Habitat in* Cynoglossa, Angelica, Urtica, Gramine.

*Larva hirsuta, similis Caje. D. D. Hartman.*

*Parva. Alæ superiores maculis 5, antica longiore, præter posticas minutas. Abdomen flavum punctis lateralibus nigris.*

*Inbricipeda.*

69. *P. Bombyx spirilinguis, alis deflexis albidis: punctis nigris, abdomineque quinquefariam nigro-punctato. Faun. suec.* 1138. \*

*Geoffr. parif.* 2. p. 118. n. 21.

*Scop. carn.* 513.

*Gron. zooph.* 846.

*Fn. suec.* 823.

*Gæd. inf.* 1. t. 23, 38.

*List. gæd. f.* 93.

*Raj. inf.* 196. n. 155. ♂ 195. n. 40.

*Merian. eur.* 1. t. 46. f. 65.

*Alb. inf.* 24. f. 36.

*Frisch. inf.* 3. t. 8.

*Reaum. inf.* 2. t. 1. f. 7-9.

*De Geer inf.* 1. t. 11. f. 7, 8.

*Raf. inf.* 1. *phal.* 2. t. 46.

*Wilkes pap.* 20. t. 3. a. 5.

- β. *Wilkes pap.* 20. t. 3. a. 6.

*Raf. inf.* 2. *phal.* 2. t. 47.

*Amiral t.* 6.

*Habitat in* Quercu, Atriplice, Urtica, Portulaca.

*Larva pilosa, fusca punctis caeruleis, linea dorsali pallida.*

*Varietatem β non distinctam esse speciem docuit D. De Geer.*

*Mas alis flavescens.*

*Abdomen luteum; quinquesariam nigro punctatum.*

- lota.** 70. *P. Bombyx spirilinguis*, alis cinereis: puncto disci atro posticeque striga purpurascens fracta. *Fn. suec.* 1137. *Clerck ic. t. 8. f. 1.*

*Habitat in Europa.*

*Ala superiores cinereae atomis aliquot nigris; in stigmate posteriore ad latus interius punctum atrum.*

- Russula.** 71. *P. Bombyx spirilinguis*; alis deflexis luteis margine sanguineo lunulaque fusca; inferioribus subtus immaculatis.

*Phalæna (Sannio.) Fn. suec. 1135. \**

*Phalæna (vulpinaria.) Syst. nat. 10. p. 520. n. 136.*

*Geoffr. parif. 2. p. 129. n. 39.*

*Robert. ic. t. 30. f. 1.*

*Raj. inf. 228 n. 75.*

- β. Phalæna (russula.) Fn. suec. 1156. \* Clerck ic. t. 4. f. 1.**

*Ræff. add. t. 20.*

*Habitat in Lactuca, Scabiosa.*

*Conjungo tres sexu vel ætate forte diversas. Alarum margo coccineus, uti abdomen inter femora.*

- rufina.** 72. *P. Bombyx spirilinguis*, alis depressis rufis: fasciis fufcescentibus: postica latiore; subtus rufescentibus. *Syst. nat. 10. p. 822.*

*Phalæna helvola. Fn. suec. 1142. Clerck ic. t. 4. f. 8.*

*Habitat in Europa.*

*Affinis P. Russulæ; Tentacula saturatius rufa. Antennæ angustissimæ.*

- Graminis.** 73. *P. Bombyx spirilinguis*, alis depressis griseis: linea trifurca punctoque albidis. *Fn. suec. 1140. \**

*Act. Stockh. 1742. p. 40. t. 2.*

*Raj. inf. 228. n. 104.*

*Habitat in Gramine, excepto Alopecuro; devastat sepius prata nostra & omne gramen consumit, unde colonum calamitas summa; sed coercetur fossulis; prædatur a Cornicibus.*

74. *P.*

---

*Abdomen varius per ordines 3 f. 5 nigro punctatum: Villica, Plantaginis, beliconis, fuliginosa, lubricipeda, grammica.*



- lusoria.* 74. *P. Bombyx spirilinguis*, alis incumben-  
 ribus glaucis lunula thoraceque antice ferrugineis.  
*Reaum. inf.* 1. t. 14. f. 10.  
*Habitat in Germania. Wilke.*  
*Statura & magnitudo Ph. cribrariæ. Thorax cinera-*  
*scens, antice versus caput ferrugineus. Antennæ*  
*parum pectinatae, corpore dimidio breviores. Alæ*  
*incumbentes, glaucae, temere adpersae lineolis trans-*  
*versis griseis; in medio Macula transversa ferrugi-*  
*nea parva, & ante hanc punctum ferrugineum. In-*  
*feriores alæ pallidae.*
- grammi-* 75. *P. Bombyx spirilinguis*, alis deflexis luteis: superiori-  
*ca.* ribus flavis nigro lineatis; inferioribus fascia terminali  
 nigra. *Fn. suec.* 1134. \* *Syst. nat.* 10. p. 822. \*  
*Amæn. acad.* 5. t. 3. f. 31.  
*Merian. eur.* 1. t. 5.  
*Geoffr. paris.* 2. p. 115. n. 17.  
*Raf. inf.* 169. n. 28. & 280. n. 13.  
*Raf. inf.* 4. t. 21. f. A. D.  
*β. Phalæna striata. Syst. nat.* 10. p. 502. n. 31.  
*Habitat in Abrotano, Quercu, Fraxino.*  
*Abdomen luteum, quinquefariam nigro punctatum.*
- eribrum.* 76. *P. Bombyx spirilinguis*, alis incumben-  
 tibus albis, transverse nigro punctatis. *Faun. suec.*  
 1136. \* *Clerck ic.* t. 54. f. 4.  
*Habitat in Europa.*  
*Abdomen postice lutescens. Alæ inferiores fuscae.*
- \*\*\*\*\* *BOMBYCES spirilingues* *Dorso cristato,*  
*Alis deflexis.*
- Celsia.* 77. *P. Bombyx spirilinguis cristata*, alis depressis supra  
 viridibus: fascia grisea dentata. *Fn. suec.* 1141. t.  
 2. f. 1141.  
*Faun. suec.* 1. n. 816. t. 2. f. 816.  
*Habitat in Humulo.*  
*Viridis cruce communi ferruginea, margineque postico*  
*ferrugineo.*
- Libatrix.* 78. *P. Bombyx spirilinguis cristata*, alis incumben-  
 tibus dentato-croasis rufo-griseis: puncto albo. *Fn. suec.*  
 1143. \*  
*Geoffr. paris.* 2. p. 121. n. 26.

*Scop.*

*Scop. carn.* 516.

*Fn. suec.* 833.

*Gæd. inf.* 1. t. 67.

*List. gæd. f.* 30.

*Pet. gaz. t.* 19. f. 4.

*Alb. inf. t.* 32. f. 50.

*Ræf. inf.* 4. t. 20.

*Poda inf.* 92. t. 2. f. 9. *Ph. salictaria.*

*Habitat in* Glechomate, Rosa, Salice.

*Larva geometrica, nuda, viridis.*

*Punctum album ad basin antennarum, in femoribus, ad basin alarum, inque medio alæ.*

*capucina.* 79. *P. Bombyx spirilinguis cristata*, alis deflexis denticulatis ferrugineis: denticuloque dorsali reflexo fasciæque ferruginea. *Fn. suec.* 1144. \*

*Habitat in* Europa.

*Sequenti structura affinis. Alæ superiores subius margine postico obscuriores.*

*camelina.* 80. *P. Bombyx spirilinguis cristata*, alis deflexis denticulatis brunneis: omnibus denticulo dorsali. *Fn. suec.* 1145. \*

*Reaumn. inf.* 2. t. 20. f. 13.

*Ræf. inf.* 1. phal. 2. t. 28.

*Habitat in* Tilia, Malo, Alno, Betula. *T. Bergman.*

*Larva nuda, virescens corniculis 2 purpureis caudæ, punctumque purpureum ad singula stigmata.*

*Ph. sedens erigit a tergo cristas 2, quarum prior ex alarum exteriorum, posterior ex interiorum dentibus f. lobulis conniventibus. Alæ inferiores flavæ, immaculatæ.*

*Oo.* 81. *P. Bombyx spirilinguis cristata*, alis depressis cinerascensibus oo notatis. *Faun. suec.* 1139.

*Ræf. inf.* 1. p. 2. t. 63.

*Wilkes pap.* 6. t. 1. a. 111.

*Habitat in* Quercu.

*Larva nuda, rubra, punctis lineisque albis: dorsali interrupta.*

\* 2 \*

---

*Alæ dorso denticulo prominenter: Zicææ, Dromedarius, Camelina, Capucinus, tremula.*

## \* 2 \* NOCTUÆ elingues.

- Strix.** 82. *P. Noctua elinguis*, alis patulis concoloribus albido nigro reticulatis nebulosisque. *Mus. L. Utr.* 377. \*  
*Clerck ic. t. 51. f. 1.*  
*Merian. surin. 20. t. 20.*  
*Habitat in America meridionali.*  
*Larva subpilosa, nigra annulis lineaque laterali.*  
*Maxima omnium notarum noctuarum.*
- Æsculi.** 83. *P. Noctua elinguis lævis nivea*, antennis thorace brevioribus, alis punctis numerosis cæruleo-nigris, thorace fenis. *Fn. suec.* 1150. \*  
*Poda inf. 88. n. 16.*  
*Reaum. inf. 2. t. 38. f. 1 - 4.*  
*Raf. inf. 3. t. 48. f. 5, 6.*  
*Habitat in Æsculo, Alno, Pyro.*  
*Ala inferiores albida margine postico cæruleo punctato.*  
*Color Ph. cribri, sed major & puncta cærulescentia.*
- Humuli.** 84. *P. Noctua elinguis fulva*, antennis thorace brevioribus; maris alis niveis. *Fn. suec.* 1147. \*  
*Faun. suec.* 917.  
*Raj. inf. 157. n. 3.*  
*De Geer inf. 1. t. 7. f. 5, 6.*  
*Habitat in Lupuli radicibus. It. scan. 49.*  
*Mas alis albis. Femina flavis fulvo-striatis, adeoque diversissima vestitu. Corpus omnibus flavum.*
- Hecta.** 85. *P. Noctua subelinguis lutea*, alis deflexis: superioribus fasciis duabus albidis obliquis punctato interruptis. *Fn. suec.* 1148. \*  
*De Geer inf. t. 7. f. 11.*  
*Habitat in Europa.*  
*Fascia postica ex punctis flavis pallidis conflata.*
- Iupulina.** 86. *P. Noctua elinguis lutea*, antennis thorace brevioribus, alis macula arcuque cinerascere. *Faun. suec.* 1149. \* *Clerck ic. t. 9. f. 4.*  
*Habitat in Europa.*  
*Ala arcus fuscus, albo marginatus, ut etiam macula.*

87. P.

*Bombyces Antennis pectinatis, f. pinnatis f. radiatis. Noctua Antennis setaceis f. simplicissimis dignoscuntur; cum vero Femina Bombycum sæpe antennis setaceas gerunt, laborat interdum hac diviso.*

*sylvina.* 87. *P. Noctua subelinguis*, antennis brevibus ferratis, alis rufo-lutescentibus: fasciis tribus albidis variis. *Fauv. spec.* 1151. \*  
*Habitat in Europa.*  
*Alarum fascia media bifida.*

*Vitis idæa.* 88. *P. Noctua subelinguis*, alis cinereis fascia transversa saturatiore; inferioribus planis. *Fn. spec.* 1163. \*  
*Habitat in Vaccinio Vite idææ.*  
*Distincta alis inferioribus minime plicatis, longitudine superiorum.*

\* \* NOCTUÆ spirilingues, dorso laeves absque crista.

*leatrix.* 89. *P. Noctua spirilinguis*, alis nigris: maculis cæruleis flavis albisque; inferioribus rubro alboque maculatis. *Mus. Lud. Ulr.* 389. \*  
*Edw. av. t.* 318.  
*Habitat in China.*  
*Abdomen croceum fasciis nigris.*

*Dominula.* 90. *P. Noctua spirilinguis*, alis atris sericeis maculis albo flavescentibus; inferioribus rubris nigro-maculatis. *Scop. carn.* 506.  
*Merian eur.* 2. t. 38.  
*Alb. inf. t.* 22.  
*Rœf. inf. 3. t.* 47.  
*Wilkes pap.* 19. t. 3. a. 3.  
*Habitat in Cynoglossio, Fraxino, Salice Germaniæ.*  
*Larva pilosa, nigra, trifariam albo punctata.*  
*Corpus facie & magnitudine Caje, nigrum, nitidum,*  
*Thorax supra lineis 2 albis; in pectore punctum sub*  
*alis anterioribus. Abdomen supra rubrum, suetus*  
*& linea dorsali nigrum. Antennæ angustissimæ, ni-*  
*gra. Alæ superiores atra: versus basin macula 2 fla-*  
*vescentes; dein minor flava; tum 2 albæ majores co-*  
*alita; demum 4 minimæ, albæ. Inferiores saturate*  
*rubræ maculis variis nigris margini annexis. Sub-*  
*tus omnes concolores.*

*Hera.* 91. *P. Noctua spirilinguis*, alis deflexis virescenti-nigris: rivulis flavis; inferioribus rubicundis nigro-maculatis.

*Scop.*

Scop. carn. 505. \*

Mouff. inf. 91. n. 7. f. 4.

Raf. inf. 4. t. 28. f. 3.

Schaff. elem. t. 10. f. 1.

Habitat in Italia, Germania. D. D. Schreber.

Corpus *flavura* Cajæ. Thorax *flavus* linea longitudinali nigra: humeris utrinque testis *Latinula lanceolata*, nigra marginibus flavis. Abdomen *flavum*, quadrifariam nigro-punctatum. Alæ superiores supra viridi-atræ: Fascia linearis obliqua vaseos; alia major bifida; lituræ 2, flavæ, interjectæ ad marginem crassiores. Subtus flavescens nigro contaminata. Inferiores supra rubræ; Punctum nigrum in discio. Macula nigra ad apicem & ad marginem posticum. Subtus fulvæ macula unica nigra.

Matronula.

92. *P. Noctua spirilinguis lævis*, alis superioribus griseis: exterius flavo maculatis; inferioribus flavis nigro subfasciatis.

Mer. eur. 58.

Raf. inf. 3. t. 39. f. 1, 2.

Habitat in Germania.

Thorax lineis 2 rubris. Abdomen rubrum, nigro trifariam punctatum. Alæ superiores ad marginem exteriorem lateo-maculatæ. Inferiores fasciis 2 nigris cum interjecta macula.

Ancilla.

93. *P. Noctua* alis fuscis: superioribus puncto maculisque quatuor albis; inferioribus luteis margine arcuque fusco.

Habitat in Germania. D. D. Schreber.

Corpus luteum, magnitudine Tabani. Abdomen luteum supra punctis longitudinalibus 7 nigris. Antennæ breves. Alæ superiores oblongæ, fuscae; Punctum album in medio versus marginem tenuiorem. Puncta 4 alba, serie transversa, confluentia versus apicem. Inferiores luteæ: margo latus fuscus & arcus in medio fuscus.

Parthenias.

94. *P. Noctua spirilinguis*, alis flexis fusco alboque variis; inferioribus luteis; punctis duobus nigris. Fn. fvec. 1160. \*

It. wgoth. 141. n. 1.

Habitat in Europa.

Minor. Alæ subtus luteæ: inferiores duplici, præter marginem, fascia nigra.

95. *P.*

- fuligino-** 95. *P. Noctua spirilinguis lævis*, alis deflexis rufo-fuliginosis puncto gemino nigro; inferioribus rubro marginatis. *Fn. succ.* 1159. \*
- Scop. carn.* 508.  
*Rai. inf.* 228. n. 13.  
*Raf. inf.* 1. phal. 2. t. 43.  
*Wilk. pap.* 23. t. 3. a. 14.  
*Ammiral.* t. 30.  
*Uddm. diff.* 76.  
*Habitat in* Sinapi, Rapa, Rumice, Omphalode, Gramine.  
*Larva pilosa, ferruginea.*  
*Abdomen sanguineum trifariam nigro punctatum,*
- Fulvia.** 96. *P. Noctua spirilinguis lævis*, alis deflexis concoloribus fulvis margine nigris. *Mus. Lud. Ulr.* 383. \*
- Clerck ic.* t. 55. f. 5, 6.  
*Habitat in* Indiis.  
*Thorax antice bifariam fulvus. Abdomen subtus fulvum.*
- Batis.** 97. *P. Noctua spirilinguis lævis*, alis depressis: superioribus fuscis, maculis simul quinque albidis; inferioribus albis. *Faun. succ.* 1158. \*
- Merian. eur.* 3. t. 21. f. 1. f. 122.  
*Reaum. inf.* 1. t. 7. f. 2.  
*Raf. inf.* 4. t. 26.  
*Habitat in* Rubo.  
*Macule orbiculares albide medio fusco, sparsæ, magnæ.*
- algira.** 98. *P. Noctua spirilinguis lævis*, alis griseiscentibus fascia limboque postico cinereis, apice macula sesquialtera nigra.
- Habitat* Algeriæ. *E. Brander.*  
*Corpus cinereum, mediæ magnitudinis. Alæ supra griseæ, immaculatæ: in medio fascia pallida linearis. Limbus posticus late cinereus punctis marginalibus, nigris, minutissimis; ad apicem extimum superiorum macula nigra sesquialtera. Subtus alæ cinereæ strigis undulatis: anterus fuscentibus, postice pallidis; punctum nigrum minutum in medio. Inferioris supra fusca: fascia pallida.*
- trapetzina** 99. *P. Noctua spirilinguis lævis*, alis depressis pallidis fascia latissima saturiore puncto nigro margineque punctato. *Faun. succ.* 1157. \*

*Mer.*

*Mer. europ. t. 11.*

*Habitat in Europa.*

*Flavescenti-pallida. Alarum fascia trapeziformis, cum puncto nigro in medio; margo posticus supra punctorum nigrorum serie notatus.*

ocularis. 100. *P. Noctua elinguis lævis, alis cinereis fascia pallidior lineis nigris terminata ocelloque notata.*

*Habitat in Italia. Cyrillus.*

*Corpus mediæ magnitudinis, cinereum, non cristatum. Alæ superiores cinereæ, in medio fascia in duas areas divisa: Fascia albidior, antice posticeque linea nigra terminata, versus latera exteriora dilatata, ibique ocello parvo albo, pupilla nigra notata; in area anteriore punctum nigrum; ad apicem alæ lineola atra; margo alæ posticus lineola nigra. Alæ inferiores, omnesque subtus, albida absque area & puncto.*

sanguino- 101. *P. Bombyx spirilinguis lævis, alis grifescence-testaceis stigmato flavicante, corpore sanguinolento.*

*Habitat in Europa australi. Cyrillus.*

*Corpus mediæ magnitudinis, subtus imprimis ad caput & Abdomine sanguineum. Alæ subtestaceæ: fasciis 2 s. 3 obsoletis. Stigma reniforme flavescens lobo interiore obscuriore. Alæ inferiores subtus albida absque puncto & lunula. Antennæ vix manifeste pectinatae.*

lucerna. 102. *P. Noctua spirilinguis lævis, alis cinereis immaculatis: strigis tribus repandis albidis, collari bifido. Fn. Svec. 1152. \* Clerck. ic. t. \* f. 7.*

*Habitat in Europa, frequenter candelis involans.*

*Alæ absque stigmatibus, complanatae, fere canæ; inferiores margine postico niveo. Collare erectum cordis instar bifidum.*

marbona. 103. *P. Noctua spirilinguis lævis, alis superioribus cinereis: fasciis duabus flavis posticeque puncto fusco.*

*Habitat in Lusitania. Vandelli.*

*Magnitudo Ph. urticatæ. Alæ superiores planæ, supra cinereæ: Fascia 2, lineares, transversæ, flavæ, in medio: ante marginem posticum, punctum fuscum, cinctum annulo dimidiato luteo, unde quasi ocellus minutus. Inferiores subtus cinereo-nebulosa cum arcu fuscescente lineari pone punctum fuscum.*

H h h

104.

pellex. 104. *P. Noctua spirilinguis lævis*, alis fuscis; lineis tribus maculaque transversa; inferioribus disco albis. *M. L. U.* 388.

*Habitat in Indiis.*

*Abdomen album ano rubro. Alæ inferiores margine fusco: punctis tribus albis.*

glyphica. 105. *P. Noctua spirilinguis lævis*, alis parulis fuscescentibus: maculis hieroglyphicis nigris; subtus fascia atra.

*Fn. succ.* 1161. \*

*Hoffm. pict.* 4. t. 11. f. 3.

*Reaum. inf.* 1. t. 49. f. 14.

*Geoffr. paris.* 2. p. 136. n. 55.

*Habitat in Verbalco.*

*Parva, Pb. graminis magnitudine, Geometra similis; Alæ characteribus anomalis fuscis, luteo marginatis cum puncto nigro. Alæ supra Superiores griseæ fasciis 3, fuscis: postica brevissima. Inferiores testaceæ fasciola fusca. Subtus vere luteæ: post punctum nigrum arcu nigro. Anus testaceus.*

Mi. 106. *P. Noctua spirilinguis lævis*, alis deflexis cinereis signo securis pallido-marginato, subtus W nigro. *Fn. succ.* 1262. \*

*Habitat in Europa.*

*Similis P. Glyphica. Alæ inferiores subtus pallidæ, M nigro notatæ.*

pallens. 107. *P. Noctua spirilinguis lævis*, alis deflexis pallidis im-maculatis: marginibus posticis subtus nigro punctatis. *Fn. succ.* 1175. \* *Clerck. ic.* t. 4. f. 6.

*Habitat in Europa.*

*Alæ superiores supra puncto. 1. f. 2, nigro, minimo. Subtus alæ atomis nigris, imprimis margine postico nigro-punctato.*

nivea. 108. *P. Noctua spirilinguis lævis*, alis corporeque albis, antennis linguaque testaceis.

*Habitat in Norvegia. Ström per Brunnichium.*

*Magnitudo Pb. Salicis, sed tota alba, etiam pedibus.*

*Sola Antennæ & Lingua testacea. Alarum superiorum margo exterior certo respectu fuscus apparet.*

leporina. 109. *P. Noctua spirilinguis lævis*, alis deflexis albis: punctis nigris ramosis. *Fn. succ.* 1176. \*

*Dr.*



*De Geer. inf. 1. t. 12. f. 10; 11; 17.*

*Habitat in Alno; Salice.*

*Similis Ph. lubricipeda, sed alæ paucioribus punctis adspersæ & corpus album, nec flavum, nec Abdomen nigro punctatum; linea nigra per oculos ad basin alæ.*

**ornatrix. 110.** *P. Noctua spirilinguis lævis, alis depressis rubris atro-punctatis; inferioribus albo nigroque variis. M. L. U. 384. Clerck. ic. 55. f. 2.*

*Habitat in America.*

*Alæ superiores supra flavescentes marginè rubro punctis nigris; subtus rubræ; inferiores maculis nigris; magnitudo P. Argi.*

**Jacobææ. 111.** *P. Noctua spirilinguis lævis, alis fuscis: linea punctisque duobus; inferioribusque rubris nigro marginatis. Fn. suec. 1155. \* Geoffr. paris. 2: p. 146: n. 75: Scop. carn. 511:...*

*It. oel. 120.*

*Mouff. inf. 97. f. antep.*

*Rob. ic. 1. t. 20.*

*Goed. inf. 1. t. 9.*

*List. goed. t. 54.*

*Blanck. inf. t. 1. f. G. K.*

*Pet. gaz. t. 33. f. 6.*

*Raj. inf. 168. n. 26.*

*Mer. eur. 3. t. 28.*

*Alb. inf. t. 34. f. G. H.*

*Reum. inf. 1. t. 16. f. 4 a. 7.*

*Roes. inf. 1. phal. 2. t. 49.*

*Wilk. pap. 26. t. 3. a. 1.*

*Harris. inf. 8. t. 4. f. superiores.*

*Annimal. t. 3.*

*Edu. av. t. 271.*

*Schæff. elem. 98. f. 3.*

*Poda. inf. 88. n. 17.*

*Habitat in Jacobæa Senecionis.*

*Larvâ pilosâ; nigro luteoque annulata.*

**heliconia. 112.** *P. Noctua spirilinguis lævis, alis deflexis fuscis concoloribus: superioribus linea, inferioribus basi albis. M. L. U. 385.*

*Habitat in Calidis regionibus.*

*Abdomen flavum, trifariam fusco-maculatum. Alæ superiores linea alba a basi ad medium: Statuta præcedentis.*

H h h 2

113.

rubricol- 113. *P. Noctua spirilinguis lævis nigra*, collari purpureo,  
lis. abdomine flavo. *Fn. suec.* 1154. *Clerck. ic. t. 2. f. 3.*

*Geoffr. paris. 2. p. 148. n. 79. t. 12. f. 6.*

*Habitat in Europa.*

*Abdomen flavum.*

quadra. 114. *P. Noctua spirilinguis lævis*; alis depressis luteis: su-  
perioribus punctis duobus atro-cæruleis.

*Gron. zooph. 870.*

*Scop. carn. 590.*

*Roef. inf. 1. phal. 2. t. 17.*

*Wilk. pap. 24. t. 3. a. 17.*

*Poda inf. t. 2. f. 8.*

*Schaff. elem. t. 98. f. 5.*

*Habitat in Pinu, Quercu.*

*Larva pilosa dorso punctis rubris maculaque nigra; la-  
teribus lineis nigris.*

*Phalæna habitu accedit phalangi Tinearum, seu P.  
complanæ, sed major.*

compla- 115. *P. Noctua spirilinguis lævis*, alis depressis: superio-  
na. ribus canescentibus: exteriori margine albis; inferioribus totis flavis. *Fn. suec.* 1153. *Clerck. ic. t. 9. f. 7.*

*Alb. inf. t. 70. f. G. H.*

*Habitat in Quercu.*

*Alæ inferiores totæ flavae.*

interrupta. 116. *P. Noctua spirilinguis lævis*, alis depressis: superio-  
ribus subincarnatis linea nigra interrupta, tergo sanguineo.

*Habitas - - -*

*Statura Ph. complanæ, sed alæ magis declinatae. Ca-  
put fuscum. Thorax pallidus plaga longitudinali ni-  
gra. Alæ fusca, sed superiores supra pallide incar-  
natae, linea lata nigra a basi ad apicem longitudina-  
li, quæ versus posteriora abrupta. Abdomen supra  
sanguineum. Femora lutea.*

materna. 117. *P. Noctua? spirilinguis cristata*, alis deflexis grise-  
scentibus: inferioribus luteis puncto-nigro.

*Habitat in Indiis.*

*Corpus Pronuba quadruplo majus. Alæ superiores su-  
pra luteo griseæ, fusco-subnebulosæ, postice ver-  
sus apicem striga alba obsoletiore. Subtus luteæ fa-  
sciis 2 nigris. Inferiores utrinque luteæ, limbo postico  
nigro margine albo-dentato. Punctum majus ni-  
grum, in medio alæ.*

118.

- Sponsa.** 118. *P. Noctua spirilinguis cristata*; alis griseis: inferioribus sanguineis: fasciis duabus nigris, abdomine undique cinereo.  
*Mer. eur.* 2. t. 14.  
*Reaum. inf.* 1. t. 32. f. 1-7.  
*Roes. inf.* 4. t. 19.  
*Habitat in Quercu Robore Germaniæ. D. D. Schreber.*  
*Facies Pb. Paſſa.* Abdomen undique cinereum. Alæ superiores supra fusco griseo undulato-nebulosæ. Punctum pallens juxta maculam lunarem. Subtus nigricantes ciliis marginalibus fuscis inter dentes albos. Inferiores supra saturatissime rubræ; Fasciæ 2 atræ undulatæ. Margo ciliaris cinereus. Subtus sanguineæ fasciis 2 nigris, quorum anterior arcuata in orbem. Margo ciliaris albo punctatus.
- Nupta.** 119. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis cinerascens; inferioribus rubris: fasciis nigris, abdomine cano subtus albo.  
*Raj. inf.* 152. m. 4.  
*Roes. inf.* 4. t. 15.  
*Wilk. inf.* 33. t. 1. f. 1. a. 1.  
*Uddm. diss.* 73. t. 10.  
*Geoffr. parif.* 2. p. 150. n. 82.  
*Habitat in Salice vitellina Germaniæ. D. D. Schreber. Barbariæ. E. Brander.*  
*Simillima Sponsæ, sed Abdomen dilutius subtus album.* Alæ superiores supra cano fuscoque undulato-nebulosæ. Subtus nigræ fasciis 2 albis; Cilia marginalia cana: stria nigra in medio cujusvis dentis. Inferiores supra dilute rubræ: fasciæ 2 nigræ flexuosæ; Margo ciliaris niveus. Subtus concolores: fasciæ 2 nigræ arcuatæ, sed antèrins albide. Margo ciliaris niveus.
- Paſſa.** 120. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis griseiscentibus; inferioribus rubris fasciis duabus nigris, abdomine supra rubro. *Fn. succ.* 1166. \*  
*Scop. carn.* 509.  
*Merian. eur.* 3. t. 38. f. 139.  
*Alb. inf.* 80.  
*Roes. inf.* 1. phal. 2. t. 15.  
*Wilk. pap.* 17. t. 2. b. 1.  
*Habitat in Salice, Quercu.*  
*Larva fusca, subvillosa, subtus ferruginea.*

**Pronuba.** 121. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis incumben-  
tibus griseis; inferioribus luteis: fascia atra submarginali.

*Fn. succ.* 1167.

*Geoffr. parif.* 2. p. 146. n. 76.

*Scop. carn.* 518.

*Goed. inf.* 1. t. 14.

*List. goed.* f. 41.

*Blank. inf.* t. 6. f. D. F.

*Raj. inf.* 237. n. 18.

*Mer. eur.* t. 49.

*Alb. inf.* t. 72. f. C. D.

*Frisch. inf.* 10. t. 15. f. 4.

*Reaum. inf.* 1. t. 41. f. 4.

1. t. 14. f. 89.

*Ammiral.* t. 8.

*Wilk. pap.* 1. t. 1. a. 1.

*Habitat in* Cheirantho, Thlaspi, Senecione, Primula,

*Larva nuda, testacea, linea dorsali interrupta.*

*Alæ superiori puncta 2 nigra, ad extimum angulum.*

**Paranympha.** 122. *P. Noctua* alis deflexis cano fuliginosoque undulatis;  
inferioribus luteis: fasciis duabus arcuatis atris.

*Scop. carn.* 510. Phalæna fulminea.

*Roef. inf.* 4. t. 18. f. 1, 2.

*Habitat in* Pruno; Germania. D. D. Schreber.

*Similis Pronuba, cinerascens.* Alæ superiores supra  
cinerascen-tes undulis repandis nigris fuliginosisque.

Subtus lutea: fasciis tribus fuscis. Inferiores supra

lutea: fasciis 2 arcuatis nigris: posteriore semel in-  
terrupta & fere marginali. Subtus lutea: fasciis

2 fuscis.

**Fimbria.** 123. *P. Noctua spirilinguis lævis*, alis incumben-  
tibus griseo fasciatis; inferioribus helvolis macula lineari atra.

*Schreber. inf.* 12. f. 9.

*Habitat in* Germania.

*Simillima Pronuba.* Corpus incarnato-griseum. Tho-

rax vix cristatus. Abdomen helvolum, subtus albi-

cans. Alæ supra superiores fasciis luteis obscu-

rioribus inequalibus. Inferiores helvæ macula lon-

gitudinali nigricante apicibusque albicantibus. Sub-

tus

*Festiva alis inferioribus rubris f. luteis nigro-fasciata; Sponsa, Nupta, Paſſa,*

*12. Pronuba, Paranympha, Fimbria.*

tus superiores *belvola* macula longitudinali nigricante, apiceque albicante. Inferiores concolores pagina superiori, apicè albida.

- maura.** 124. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis depresso dentatis: fasciis duabus nigris; inferioribus nigris fascia alba.

*Schaff. ic. t. f. 5, 6.*

*Habitat in Mauritania. E. Brander.*

*Ala postice dentata; superiores luridae, costa margine sexies nigro; inferiores & superiores subtus fascia transversa angusta pallida; praeterea margo posticus terminatus subtus fascia lata albida. Magnitudo P. Fraxini fere.*

- Fraxini.** 125. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis dentatis cinereo nebulosis; inferioribus supra nigris fascia caerulecente. *Fn. succ. 1165. \* M. L. U. 387. \**

*Mer. eur. t. 46.*

*Roes. inf. 4. t. 28. f. 1.*

*Ammiral. t. 25.*

*Wilk. pap. 45. t. 1. a. 2.*

*Habitat in Fraxino, Populo.*

*Maxima. Ala superiores macula albida.*

- Chrysitis.** 126. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis deflexis: superioribus orichalceis fascia grisea. *Fn. succ. 169. \**

*Scop. carn. 517.*

*Raj. inf. 182.*

*Merian. eur. 1. t. 39.*

*Roes. inf. 1. phal. 2. t. 31.*

*Geoffr. f. paris. 2. p. 159. n. 97.*

*Alb. inf. t. 71.*

*Sepp. inf. 1. p. 5. f. 1. t. 1. f. 11. 12.*

*Habitat in Galeopside, Mentha, Urtica.*

*Ala fascia media & postica sunt aureo-aneæ.*

- Gamma.** 127. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis deflexis: superioribus fuscis  $\lambda$  aureo inscriptis. *Fn. succ. 1171. \**

*Geoffr. paris. 2. p. 156. n. 92.*

*Scop. carn. 523.*

*Gœd. inf. 2. t. 21.*

*List. gœd. f. 14.*

*Blank. inf. t. 8. f. N. P.*

*Pet. gaz. t. 64. f. 6.*

*Raj. inf. 163. n. 16.*

*Mer. eur. 82. f. 78.*

H h h 4

Alb.

*Alb. inf. t. 79. f. G. H.*

*Friseb. inf. 3. t. 15.*

*Reaum. inf. 2. t. 26, 27. f. 3.*

*Raf. inf. 1. phal. 3. t. 5.*

*Wilk. pap. 34. t. 2. a. 1.*

*Sepp. inf. 1. p. 5. f. 1. t. 1. f. 5, 6.*

*Habitat in Abrotano, Boragine, Lactuca, Brassica, Spinachia, Majorana.*

*Larva geometrica, 12-poda, viridis, subpilosa, nec ideo ad Geometras amandanda.*

*Litteræ γ crura respiciunt marginem anteriorem.*

circum- 128. *P. Noctua spirilinguis cristata, alis deflexis; supe-*  
flexa, *rioribus fuscescentibus caractere flexuoso albido.*

*Habitat in Europa.*

*Facies magnitudine & habitu P. Gammae. Alæ superiores supra subfuliginosæ, pallide variegatæ, notatæ caractere lineari, latiusculo, pallido, albo marginato, qui incipit a basi interiore, arcu tangit marginem anteriorem alæ, desinit in medio alæ. Alæ omnes subtus, & inferiores, etiam supra, fuscae, immaculatæ. Antennæ ferrugineæ.*

Interro- 129. *P. Noctua spirilinguis cristata, alis deflexis: supe-*  
gationis. *rioribus fuscis cinereisque signo? albo inscriptis. Fn. succ. 1172. \* Clerck. sc. t. 6. f. 7.*

*Habitat in Europa.*

*Notâ? mox innotescit & a priore distinguitur. Thorax valde cristatus.*

Jota. 130. *P. Noctua spirilinguis cristata, alis deflexis: supe-*  
*rioribus ferrugineo griseis i resupinato aureo inscriptis.*  
*Habitat in Germania. P. Forskål.*

*Magnitudo trium precedentium. Corpus griseum. Crista collaris semiorbicularis; dorsalis thoracis bifida; supra-abdominalis infundibuliformis. Alæ superiores griseo fuscoque variæ; in medio versus marginem tennuiorem magis luteæ; in centro alæ jota græcum s. signum interrogationis aureum; a precedenti specie diversa alis ferrugineis, nec cinereo-fuscescentibus.*

131.

*Aurata notata auri vel argenti colore ut Chryseis, Festuca, Gamma, Jota & sunt Interrogationis.*

- Festucæ.** 131. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis deflexis: superioribus flavo ferrugineoque variis: maculis tribus argenteis. *Fn. suec.* 1170. \*  
*Alb. inf.* 1. 84. f. G. H.  
*Pet. gaz.* 1. 7. f. 7.  
*Wilk. pap.* 8. 1. a. 17.  
*Act. Stockb.* 1748. 1. 6. f. 3, 4.  
*Habitat in Festuca fluitante.*  
*Larva nuda viridis.*  
*Corpus fulvum; maculae longitudinales aureo-argenteae in alis.*
- meticulo-  
lofa.** 132. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis erosis pallidis: superioribus basi incarnata intra triangulum fuscum. *Fn. suec.* 1164.  
*Scop. carn.* 512.  
*Gæd. inf.* 1. 1. 56.  
*List. gæd.* f. 44.  
*Reaum. inf.* 1. 1. 8. f. 25, 26.  
1. 1. 14. f. 12, 13.  
*Mer. eur.* 1. 24.  
*Alb. inf.* 1. 13.  
*Roes. inf.* 4. 1. 9.  
*Geoffr. paris.* 2. p. 151. n. 84.  
*De Geer inf.* 1. 1. 5. f. 14.  
*Wilk. pap.* 3. 1. a. 3.  
*Habitat in Cheirantho, Mercuriali, Urtica.*  
*Larva nuda viridis lineis lateralibus albis.*  
*Pictura incarnato livido griseoq. varia absque stigmatibus. Inferiores alae albae. Abdomen subtus punctis nigris trifariis.*
- Abfinthii.** 133. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis cinerascens nigricante fasciatis punctatisque; inferioribus albidis. *Fn. suec.* 1182. \* *Clerck ic.* 1. 8. f. 19.  
*Frisch inf.* 7. p. 19. 1. 12.  
*Roes. inj.* 1. phal. 2. 1. 61.  
*Geoffr. paris.* 2. p. 158. n. 95.  
*Habitat in Abfinthio.*  
*Alae inter fascias punctis 4. in tetragonum dispositis.*  
*Thorax operculatus. Corpus album.*
- Alni.** 134. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis deflexis fuliginosis: arcibus duabus cinerascens: priore puncto marginali nigro.

*De Geer inf. t. 11. f. 25 - 28.*

*Habitat in Aino.*

Corpus medium, cinerascens. Alæ superiores supra fuliginoso-nigricantes: arcis 2 versus marginem exteriorem: priore cinereo-albida, oblonga puncto marginali nigro; posteriore subrotunda, albo-cinerascens. Margo posticus cinereus punctis 8 atris, in area fusca & linea longitudinali atra. Subtus griseo-nebulosæ. Inferiores supra albida; Subtus albæ puncto nigro.

- Psi. 135. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis deflexis canis: superioribus characteribus  $\psi$  nigris. *Fn. suec. 1181. \**  
*Geoffr. parif. 2. p. 155. n. 91.*  
*Gæd. inf. 1. t. 22.*  
*List. gæd. f. 92.*  
*Raj. inf. 350.*  
*Merian. eur. 3. t. 42.*  
*Alb. inf. t. 86.*  
*Frisch. inf. 2. t. 2.*  
*Reaum. inf. 1. t. 42. f. 5, 6.*  
*Raf. inf. 1. phal. 2. t. 7, 8.*  
*Wilk. pap. 28. t. 3. b. 4.*  
*Amiral. t. 13.*  
*Habitat in Aino, Corylo, Quercu, Malo, Perficaria.*  
*Larva pilosa, dorso flavo, lateribus nigris rubro-maculatis, thorace supra cornu erecto nigro.*  
*Linea nigra a rostro trans oculos; femina o nigro notata in alis, ad mediam alam.*

- Chi. 136. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis deflexis canis: superioribus  $\chi$  nigro notatis. *Fn. suec. 1180. \**  
*Alb. inf. t. 83. f. C. D.*  
*Raf. inf. 1. phal. 2. t. 13.*  
*Habitat in Aquilegia, Delphinio, Soncho.*  
*Larva nuda, viridis, lateribus lineis 2 flavis.*  
*Similis Psi, alis albis fusca nebulosis.*

- Accris. 137. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis deflexis canis: superioribus lineolis undatis annuloque ovali nigris. *Fn. suec. 1179. \**  
*Scop. carn. 524.*  
*Alb. inf. t. 83.*  
*Frisch. inf. 1. t. 5.*  
*Reaum. inf. 1. t. 34. f. 11.*

*Wilk.*



Wilk. pap. 32. t. 3. c. 6.

Habitat in Acere, Æsculo, Juglande.

Larva birfuta, fasciculis testæ flavis rubrisque, dorso albo nigro-maculato.

Simillima Pfi. Alæ superioris basis lineola fusca, & margo posticus nigro punctatus.

aprilina. 138. P. Noctua spirilinguis cristata, alis deflexis: superioribus virentibus maculis variis atris: postice punctis trigonis. Fn. suec. 1178. \*

De Geer inf. 1. t. 5. f. 22, 23.

Habitat in Europa.

Alæ superiores punctis atris sagittatis.

virens. 139. P. Noctua spirilinguis cristata, alis deflexis: superioribus viridibus lunula alba; inferioribus albis immaculatis.

Habitat in Germania. Schreber.

Media. Antennæ setaceæ, testaceæ costa alba. Lingua ferruginea. Thorax antice virescens, Abdomen albicans. Alæ superiores supra virides puncto lunulaque alba. Subtus albido-virentes. Inferiores utrinque lactea.

turca. 140. P. Noctua spirilinguis cristata, alis cinereo-rufis: strigis duabus fuscis lunulaque alba. Faun. suec. 1221. \*

Habitat in Europa.

Alæ superiores absque stigmatibus ordinariis, sed in medio lunula alba minuta.

nitens. 141. P. Noctua spirilinguis cristata, alis ferrugineo-griseis stigmatibus reniformi niveo pupilla lunari lutea. Fn. suec. 1215. \*

Habitat in Europa.

Puncta 3 alba minutissima pone stigmata.

Perficaria. 142. P. Noctua spirilinguis cristata, alis fusco-nebulosis stigmatibus reniformi albo pupilla lunari flavescente. Fn. suec. 1208. \*

Ros. inf. 1. phal. 2. t. 30.

Amiral. inf. t. 157.

Geoffr. inf. 2. p. 157. n. 94.

Habitat in Polygono Perficaria, Nicotiana.

Alarum superiorum margo posticus albo-dentatus.

143.

ludifica. 143. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis deflexis: superioribus, abdomineque flavo trifariam nigro punctato.  
*Fann. suec. 1177. \**

*Habitat in Europa.*

*Similima Ph. aprilina, at diversa flavedine & sbrace maculato.*

affinis. 144. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis ferrugineis angulo inferiore puncto nigro gemino; inferioribus nigris.

*Habitat in Italia D. D. Vandelli.*

*Magnitudo Tabani.* Alæ superiores ferrugineæ strigæ una alterave pallidiore, quæ ad marginem exteriorem albicans. Puncta 2, nigra, approximata, ad angulum alæ inferiorem. Alæ inferiores nigræ canes margine testaceo.

triptera. 145. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis maculis tribus longitudinalibus rotundatis atomisque sulphureis adspersis.

*Habitat in Lusitania. Vandelli.*

*Corpus magnitudine fere Ph. Caja, sen inter paganos majus, cinereum. Antennæ crassiores quam in ulla mihi nota Noctua. Alæ superiores cinereæ, lituris minimis nigris & passim atomis sulphureis adspersæ. Macula 3 longitudinaliter juxta marginem exteriorem digesta, majuscula, pallida, lineæ nigra marginata; quarum prima ad basim, ovalis; secunda orbiculata, minor; tertia subcordata, quæ cum media constituit stigmata ordinaria. Postice sunt alæ pallidiores. Inferiores alæ subius albida absque lunula & puncto.*

diffinis. 146. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis ferrugineis margine exteriore maculis tribus albis, pectore puncto nigro.

*Habitat in Lusitania. D. Vandelli.*

*Magnitudo Tabani.* Alæ superiores ferrugineæ strigis aliquot obsoletis. Margo lateralis maculis 3 albis: anterioribus minoribus. Puncta 2, nigra, approximata, ad angulum alæ inferiorem. Subtus alæ pallidiores arcu ferrugineo obsoleto, absque puncto.

- occulta.** 147. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis deflexis fusco nebulosis striga inferioribusque brevioribus margine albis. *Fn. suec.* 1203. \* *Clerck. ic. t. 1. f. 6.*  
*Habitat in Europa. Tych. Holm. M. D.*  
*Fascia linearis repanda alba supra superiores, ubi inferiores terminantur margine postico utrinque albo: ala inferiores multo breviores sunt.*
- perspicillaris.** 148. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis deflexis exustriatis postice bis bidentatis, capite umbraculato. *Fn. suec.* 1198. \*  
*Clerck, ic. t. 2. f. 3. Phalæna polyodon.*  
*Habitat Upsaliæ; inque Cap. 6. Ipei.*  
*Umbracula duo, subrotunda, pallida strigis 3 fuscis.*  
*Alarum stigma unicum, lunatum, pallens.*
- conspicillaris.** 149. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis incumbenti-planis pallide griseis, oculorum operculis orbiculatis. *Fn. suec.* 1183. \*  
*Habitat in Europa. T. Bergman.*  
*Ala inferiores subtus albida, pone punctum fascia obsoleta e punctis distinctis, præter illa quæ alas terminant.*
- umbraticæ.** 150. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis lanceolatis canis striatis, thoracis valvulis lunatis. *Fann. suec.* 1184. \*  
*Reaum. inf. 1. t. 43. f. 9, 11.*  
*Raf. inf. 1. phal. 2. t. 25.*  
*Habitat in Soncho:*  
*Larva nuda, nigricans, trifariam rubro-punctata.*  
*Ala inferiores margine postico alba.*
- exfoleta.** 151. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis lanceolatis convolutis exfoletis dorso fuscescentibus, collari compresso. *Fn. suec.* 1185. \*  
*Frisch. inf. 5. t. 11. f. 1.*  
*Wilkes pap. 8. t. 1. a. 18.*  
*Raf. inf. 1. pal. 2. t. 24.*  
*Sultz. inf. t. 16. f. 95.*  
*Habitat in Chenopodio Vulvaria, Atriplice, Piso, Campanula.*  
*Larva nuda, viridis, linea laterali flava & rubra, super priorem puncta 2 alba lineola nigra coadunata.*  
*Ph. color ligni putrescentis, admodum exfolesi, oblonga:*  
*Pectus ustulato colori. Ala superiores longiores, postice repanda.* 152.

putris. 152. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis deflexis obsoletis subpunctatis, margine exteriori fusco adjecta macula subocellari. *Fn. suec.* 1187. \*

*Habitat in Europa.*

*Scutelli loco puncta 2, oblonga, fusca. Color ligni putridi, ut in exsoleta s. verbasci, sed brevis.*

Verbasci. 153. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis deflexis obsoletis: marginibus lateralibus fuscis. *Fn. suec.* 1186. \*

*Scop. carn.* 521.

*Raj. inf.* 168. n. 25. f. 352. n. 31.

*Merian: eur.* 3. t. 29.

*Frisch. inf.* 6. t. 9.

*Aldr. inf.* 2. t. 13.

*Reaum. inf.* 1. t. 43. f. 9-11.

*Röf. inf.* 1. phal. 2. t. 23.

*Wilk. pap.* 7. t. 1. a. 15.

*Geoffr. parisi.* 2. p. 158. n. 96.

*Habitat in Verbasco, Scrophularia.*

*Larva nuda, cinerea flavaque maculis nigris.*

*Ph. similis Ph. exsoleta, sed Thorax pone cucullum area longitudinali nigra, cristata.*

l. album. 154. *P. Noctua cristata spirilinguis subgrisea*, alis superioribus litera l. alba notatis.

*Habitat in Lusitania. Vandelli.*

*Facies Ph. Commatis, sed pallidior. Alæ superiores supra pallide umbra fusca. Litera alba l in medio alæ, longitudinalis, postice levissime hamosa, hanc speciem certissime distinguit. Subtus alæ cinereæ atomis fuscis; postice marginatæ punctis minimis, nigris, distantibus.*

exclamatio- 155. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis incumbentibus  
tionis. fuscis: lineola atra maculaque cordata; inferioribus albis. *Fn. suec.* 1190. *Clerck. ic.* t. 1. f. 4.

*Habitat in Europa vulgaris.*

*Alæ superiores versus basin lineola atra latiuscula brevi, quam sequitur in medio macula cordata fusca, præter stigma posticum nigricans. Thorax antice lunula atra bifida.*

comma. 156. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis cinereis deflexis: lineola nigra adjacente tenuiori albæ. *Fn. suec.* 1191. \*

*Habi-*

*Habitat in Europa.*

*Alae sordido colore, lineola nigra baseos. Stigmata nulla.*

- plecta. 157. *P. Noctua spirilinguis subcristata*, alis brunneis linea nigra margineque crassiore albido. *Fn. succ.* 1216. \*

*Habitat in Europa.*

*Minor. Alarum margo albus distinctus a disco linea longitudinali nigra. Margo exterior postice punctis 3 albis minutis.*

- derasa. 158. *P. Noctua spirilinguis cristata*: alis deflexis supra antice decorticatis.

*Habitat in Europa.*

*Media. Antennae & Lingua ferruginea. Alae superiores griseo undulatae, sed ad marginem anteriorem, antice, area per alam extenditur triangularis cinerea, ac si esset decorticata (secta tamen est), qua ab omnibus distinguitur. Linea alba alam denudatam cingit; striga alba ad marginem posticum alae; albedo ad marginem inferiorem alae. Inferiores alae fuscescentes; macula nulla obscura in paginis inferioribus. Abdomen dextiori lana albida vestitum.*

- gothica. 159. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis deflexis: superioribus fuscescentibus: arcu nigro linea alba marginato. *Fn. succ.* 1192. \* *Clerck ic. t. 1. f. 1.*

*Habitat in Europa.*

*Alae in medio Arcu nigro, extrorsum verso, albo marginato, cum adjecto Puncto nigro ad latus interius.*

- Pinastri. 160. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis deflexis nigris: margine dorsali posticoque pallidis. *Fn. succ.* 1188. *Clerck ic. t. 1. f. 8.*

*Habitat in Pino.*

*Cristae in dorso ipsius abdominis 4 pone thoracem gibbum; characteres in alis atri.*

- strigilis. 161. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis deflexis nebulosis: denticulis setaceis intra fasciam albam terminalem. *Fn. succ.* 1199. \* *Clerck ic. t. 9. f. 6.*

*Habitat in Europa.*

*Parva. Alae griseo-cinerea tribus annulis ovalibus nigris; fascia alba alas terminans latior, intra quam area prior inferis 5 vel 6 strigis nigras fere ad ejus medium.*

C ni- 162. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis depressis cinereis :  
grum. macula nigra extus obsoleta lineolaque apicis atra.  
*Fn. succ.* 1193. \* *Clerck. ic. t. 1. f. 3.*  
*Habitas in Europa.*  
*Lineola nigra ante apicem ad marginem exteriorem.*  
*Abdominis latera punctis 3 f. 4 albis.*

Brassicæ. 163. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis depressis cinereo-  
nebulosis: unco nigro supra maculam priorem. *Fn.*  
*succ.* 1205.  
*Raf. inf. 1. phal. 2. t. 29. f. 4, 5.*  
*Habitas in Brassica, Nicotiana, Menyanthe, Lamio.*  
*Larva fusco-viridis linea dorsali alba.*  
*Stigmata alæ ordinaria punctis albis notata & margo*  
*inferior punctis 3 albis.*

Rumicis. 164. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis deflexis cinereis  
bimaculatis: litura marginis tenuioris alba. *Fn. succ.*  
1200.  
*Mer. eur. t. 82.*  
*Alb. inf. t. 32.*  
*Raf. inf. 1. phal. 2. t. 27.*  
*Wilkes pap. 26. t. 3. a. 1.*  
*De Geer inf. 4. 9. f. 2.*  
*Habitas in Rumice, Soncho.*  
*Larva pilosa, nigra, punctis rubris albisque mixtis.*  
*Alæ stigma ordinarium annulo & puncto nigro. Ma-*  
*cula dein alba medii marginis tenuioris.*

Oxyacan-165. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis deflexis bimacu-  
latis: margine tenuiore cærulescente. *Fn. succ.* 1207.  
*Alb. inf. t. 14.*  
*Raf. inf. 1. phal. 2. t. 33.*  
*Wilk. pap. 12. t. 1. c. 1.*  
*Habitas in Atriplice, Oxyacantha, Pruno spinosa.*  
*Larva inæqualis, albo nigroque varia, cauda gibba.*  
*Linea alba longitudinalis ad alæ superioris marginem*  
*tenuiorem posteriorem.*

Vaccinii. 166. *P. Noctua spirilingulis*, alis ferrugineis obsolete ne-  
bulosis puncto strigæque postica septempunctata fu-  
scis. *Fann. succ.* 1212. \*

*Habi-*

---

*Dagane disse Rustice, videt, cinerea Phalæna, tam inter Bombyces quam No-*  
*ctuas, sæpius in dorso Thoracis & Abdominis cristata, & Alarum superio-*  
*rum Stigmatibus ovali & reniformi, ac inferiorum subtus puncto atque*  
*fusco notata, difficiliter distinguuntur.*

*Habitat in Vaccinio Vite idææ.*

*Minor, colore triste ferrugineo. Subtus alæ ferruginea striga fusca: postice ordo punctorum fuscorum.*

Myrtilli. 167. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis griseis albo variis; inferioribus antice albis posticeque nigris. *Faun. suec.* 1168. \*

*Roes. inf. 4. t. 11. f. A. D. C.*

*Habitat in Vaccinio uliginoso.*

*Minuta: in alæ medio marginali macula alba triquetra; margo posticus albicans.*

plebeja. 168. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis nigro-nebulosis: inferioribus utrinque fulco-ferrugineis nigro maculatis. *Fn. suec.* 1210. \*

*Habitat in Europa.*

*Alæ superiores ad basin punctis 2 albis, & ad marginem anteriorem maculis 2 albis s. puncto albo rhombico, in medio.*

hepatica. 169. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis glaucescentibus: fascia ferruginea abbreviata terminalique plicata. *Fn. suec.* 1209. \* *Clerck ic. t. 8. f. 3.*

*Habitat in Europa.*

*Dorsum pluribus exasperatum. Alarum color hepaticus: fascia ferruginea vix latus interius appropinquante.*

polyodon. 170. *P. Noctua spirilinguis cristata cinereo-nebulosa*: margine postico multidentato. *Fn. suec.* 1219. \*

*Habitat in Europa.*

*Alæ superioris margo posticus circiter 8 dentibus terminatus.*

oleracea. 171. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis deflexis: superioribus ferrugineis lunula lutescente striga alba postice bidentata. *Faun. suec.* 1197. \*

*Faun. suec.* 871.

*Merian. eur. 1. t. 43?*

*Alb. inf. 27. t. 40?*

*Raj. inf. 166. n. 21.*

*Friseh. inf. 7. t. 21.*

*Amiral. t. 7.*

*Reaum. inf. 2. t. 39. f. 4?*

*Raf. inf. 1. phal. 2. t. 33.*

111

*Habie.*

*Habitat in Olerum radicibus, quas consumit; in foliis Pisi, Fabæ.*

*Larva livida, nuda, latere linea nigricante, subtus subincarnata.*

*Ala superiores postice striga alba duplici dente.*

- Pisi. 172. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis deflexis ferrugineo-cinereis bimaculatis: striga postica pallida. *Faun. suec.* 1206. \*

*Raj. inf.* 160. n. 10.

*Ros. inf.* 1. phal. 2. t. 52.

*Wilk. pap.* 4. t. 1. a. 7.

*Habitat in Piso, Genista, legumina consumens; in Jacobæa; interdum in Cucumere? Grossularia?*

*Larva nuda, ferruginea lineis 4 flavis.*

*Ala superiores postice striga flexuosa ad anum maculam albam constituyente.*

- Atriplicis. 173. *P. Noctua spirilinguis cristata*: alis deflexis: superioribus fusco-nebulosis litura flava bifida. *Fn. suec.* 1196. \*

*Ros. inf.* 1. phal. 2. t. 31.

*Wilk. pap.* 3. t. 1. a. 2.

*Habitat in Atriplice, Rumice.*

*Larva levis, nuda, rufescens punctis albis.*

*Ala superiores postice linea flava undata margineque nigro lunulato; inferiores cinereæ, subtus puncto nigro.*

- præcox. 174. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis deflexis cinereis bimaculatis postice rufo subfasciatis. †

*Ros. inf.* 1. phal. 2. t. 51.

*Habitat in Soncho.*

*Larva levis, nuda, ferruginea linea dorsali alba.*

- triplicia. 175. *P. Noctua spirilinguis*, alis deflexis: superioribus arcu duplici contrario maculisque tribus glaucis intermediis. *Fn. suec.* 1202. \*

*Merian. eur.* t. 97.

*De Geær inf.* 1. t. 6. f. 20, 21.

*Ros. inf.* 1. phal. 2. t. 34.

*Geoffr. parif.* 2. p. 152. n. 85.

*Habitat in Soncho, Humulo, Urtica.*

*Larva nuda, viridis gibberibus 2 dorsis & 1 ani fuscis.*

*Crista thoracis reflexa, alta, pallida. Ala superiores griseo-*



*griseo-cinerea arcu ferruginea in ala antico & postico. Macule tres interjectæ glaucæ, quarum due versus marginem lateralem. Posticæ ad marginem inferiorem; puncta 4 alba.*

**latellitia.** 176. *P. Noctua spirilinguis*, alis deflexis: superioribus subgriseis puncto flavo inter punctula duo alba.

*Raf. inf. 3. t. 50.*

*Habitat in Germania. D. Schreber.*

*Corpus medium, griseo-ferrugineum, ut Antenna. Alæ superiores supra griseæ strigis aliquot repandis fuscis; in medio alæ. Punctum flavum inter puncta duo nivea minutissima, quorum exterius visum fere fugit. Posteriores supra fuscescentes. Subtus omnes glaucescentes cum striga fusca & in inferioribus lunula fusca.*

**Tragopo-**177. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis superioribus fuscis: punctis nigris tribus approximatis; inferioribus luteis. *Fn. suec. 1189.\**

*Frisch. inf. 11. p. 33. t. 7.*

*Habitat in Tragopogone, Spinachia, Rumice, Serratula arvensi.*

*Larva viridis, lineis sex albis, spiraculis nigris.*

**nigricans.** 178. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis nigricantibus: stigmatibus ordinariis pallidioribus. *Fn. suec. 1220.\**

*Habitat in Europa.*

*Hæc magis fusca, quam e nostratibus facile ulla.*

**Tritici.** 179. *P. Noctua spirilinguis cristata cinerea*, alis maculis duabus pallidioribus unaque nigricante. *Fn. suec. 1211.\**

*Frisch. inf. 10. t. 19.*

*Habitat in Tritici Spicis.*

*Larva nuda, flava: lineis 3 albis.*

*Stigma ovale & reniforme ut in reliquis; juxta ovale interius macula nigra ejusdem magnitudinis. Cate-rum similis Ph. Graminis.*

**polymita.** 180. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis cinereis fasciatis macula atra minima marginis tenuioris. *Fn. suec. 1217.\**

*Merian. eur. 35?*

*Habitat in Raphano, Spinachia.*

*Alæ superiores ad marginem tenuiorem, in medio, macula atra minima. Thorax maculis 3 albis majusculis.*

- pyrami- 181. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis cinerascens: dea. superioribus strigis tribus undatis flavescens repandis, maculaque fusca.  
*Merian. eur. 2. p. 23. t. 9.*  
*Reaum. inf. 1. t. 15. f. 1-5.*  
*Rœf. inf. 1. phal. 2. t. 11.*  
*Ammiral. t. 11.*  
*Habitat in Pruno, Juglande, Quercu.*  
*Larva postice conico-gibba, nuda, viridis linea dorsali flava, laterali alba.*  
*Abdomen Phalaenae ad latera punctis 3 s. 4 albis notatur, ut in Ph. C nigro.*
- flavicornis. 182. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis superioribus cinereis: strigis tribus atris, antennis luteis. *Fn. suec. 1204. \* Clerck ic. t. 6. f. 9.*  
*Habitat in Svecia. T. Bergman.*  
*Antennae flavae quasi gradibus lamellose. Stigmata albida.*
- leucomelas. 183. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis nigricante nebulosis macula alba; inferioribus antice niveis. *Faun. suec. 1184. Clerck. ic. t. 1. f. 2.*  
*Geoffr. paris. 2. p. 149. n. 80.*  
*Habitat in Europa, Barbaria.*  
*Alae inferiores a medio ad basin lactea, a medio versus apicem nigrae, sed apice ipso albicantes.*
- bimaculosa. 184. *P. Noctua spirilinguis*, alis albidocanescentibus: superioribus subnebulosis; inferioribus nigro bimaculatis.  
*Habitat in Germania. D. Schreber.*  
*Majuscula. Alae superiores supra albidocanescentes maculis albidis liturisque variis fuscis. Margo posticus quasi sectus 8 dentibus obtusis. Subtus albidæ lunula fusca obsoleta. Inferiores supra albidocanescentes macula fusca in disco & alia ad marginem posticum. Subtus albidæ maculis duabus fuscis, ut supra.*
- dipfacea. 185. *P. Noctua spirilinguis*, alis superioribus glaucescentibus punctis maculisque fuscis; inferioribus nigro alboque variis.  
*Merian. eur. 2. t. 49.*  
*Habitat in Svecia, Fabricius; in agris Secalinis, Götter.*  
*Mellicans in Dipfaci floribus. D. Schreber.*  
*Minor.*

*Minor.* Alæ superiores supra cinereo-glaucescentes adspersæ punctis minutissimis fuscis & fascia fusca in medio; Fasciæ rudimentum versus apicem. Subtus pallidæ puncto aterrimo, dein macula nigra, tum fascia fusca. Inferiores supra nigrae: fascia dimidiata alba in medio; macula alba versus basin; macula transversa intra marginem posticum. Subtus pallidæ macula centrali & fascia posteriore fuscis.

typica. 186. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis deflexis fuscescentibus; stigmatibus marginatis, strigis pallidis reticulatis. *Fa. suec.* 1195. \*

*Raf. inf.* 1. *phal.* 2. t. 56.

*Mer. eur.* t. 81?

*Habitat in Salice.*

*Larva viridis, nuda, grisea, lineis lateralibus flavis.*

*Alæ strigæ albida: postica posterius in strias excurrente.*

lucipara. 187. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis purpurascensibus lucidis: fascia nigra, stigmate postico flavo. *Fa. suec.* 1201. \*

*Habitat in Europa.*

*Alæ nitida stigmate posteriore ordinario luteo.*

Delphinii. 188. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis deflexis purpurascensibus: fasciis duabus flavescensibus; inferioribus obscuris. †

*Mer. eur.* 1. t. 40.

*Raf. inf.* 1. *phal.* 2. t. 12.

*Wilk. pap.* 3. t. 1. a. 4.

*Habitat in Delphinib.*

*Larva nuda, flavescens, nigro-punctata.*

citrago. 189. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis depresso luteis: superioribus fasciis tribus ferrugineis obliquis. *Faun. suec.* 1174. \*

*Alb. inf.* t. 33.

*Wilk. inf.* 5. t. 1. a. 8.

*Habitat in Pado, Salice.*

*Larva nuda, fusca, lateribus flava.*

*Ala superiores inter strigas 2 & 3 Punctum ferrugineum annulo rufo habent.*

fulvago. 190. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis flavis; fasciis ferrugineis; inferioribus albis. *Fn. suec.* 1173. \*

*Clerck ic. t. 6. f. 15.*

*Habitat in Europa.*

*Similis citragini. Ala superiores postice ordine punctorum ferrugineorum.*

depuncta. 191. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis griseiscentibus: litoris marginalibus nigricantibus strigaeque postica punctata. *Faun. suec.* 1214. \*

*Habitat in Europa*

*Ala superiori puncta 2 nigra baseos; dein 3 connata in lituram ad costam.*

litura. 192. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis canis fascia fusca litorisque tribus marginalibus nigris. *Fn. suec.* 1213. \*

*Habitat in Europa.*

*Statura P. gothica. Sub alis superioribus subque litura postica etjam litura marginalis est.*

retusa. 193. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis griseis retusis; strigis tribus pallidioribus. *Faun. suec.* 1218. \*

*Habitat in Europa.*

*Alis retusis distincta.*

\* 3 \* *GEOMETRÆ pectinatae*, alis posticis subangulosis.

lactearia. 194. *P. Geometra bipectinicornis*, alis angulatis albis immaculatis, antennis apice setaceis. *Fn. suec.* 1226. \*

*Scop. carn.* 529.

*Habitat in Europa.*

vernaria. 195. *P. Geometra pectinicornis*, alis subangulatis virescentibus: strigis duabus albis repandis, antennis apice setaceis. *Faun. suec.* 1227. \*

*Habitat in Europa.*

196.

---

*Geometrarum Larvæ pedibus pectoralibus 6, caudalibus 2, subcaudalibus 2 plevæque insistentur, hinc incedunt fere uti Hirudine; & quiescunt erectæ; harum pectinicornium Larvæ imprimis referunt ita ramulum ultimum cui insident, ut difficile ab eo distinguantur,*

putataria. 196. *P. Geometra* pectinicornis, alis angulatis: omnibus albis: strigis duabus candidis repandis. *Faun. suec.* 1225. \* *Clerck. phal. t. 3. f. 9.*

*Habitat in Europa.*

striataria. 197. *P. Geometra* subpectiniornis, alis angulatis nivis: strigis duabus favescentibus obsoletis. *Clerck. phal. t. 55. f. 4.*

*Habitat in Europa.*

vibicaria. 198. *P. Geometra* pectinicornis, alis angulatis glaucescentibus puncto fascia strigaeque purpureis. *Faun. suec.* 1228. \* *Clerck. phal. t. 3. f. 2.*

*Habitat in Europa.*

Thymia- 199. *P. Geometra* pectinicornis, alis angulatis denticulatis viridibus: striga undulata obsoleta.

*Frisch. inf. 10. p. 20. t. 17.*

*Habitat in Thymo, D. Schreber.*

Major duplo *P. viridatae* & magis viridis. *Margine alarum ciliis pallidis. Antennae pallidae, tenuius pectinatae.*

punctaria. 200. *P. Geometra* pectinicornis, alis angulatis cinereo-grisefcentibus: striga ferruginea ordineque transverso punctorum atrorum. *Fn. suec.* 1250. \* *Clerck. phal. t. 5. f. 11.*

*Uddm. diff. 67.*

*Habitat in Europa.*

*Ordo punctorum in medio, pone strigam, in utraque pagina omnium alarum distinctus.*

amataria. 201. *P. Geometra* pectinicornis, alis angulatis: omnibus pallidis pulverulentis: striga ferruginea recta fuscaque repanda. *Fn. suec.* 1223. \*

*Scop. carn. 528.*

*Reaum. inf. 2. t. 29. f. 1 - 4.*

*Wilkes pap. 37. t. 1. a. 5.*

*Habitat in Quercu.*

*Larva geometra viridis cingulis flavis, inferne rubris.*

falcataria. 202. *P. Geometra* pectinicornis, alis falcatis glaucis: anticis undis fasciaque griseis puncto fusco. *Fn. suec.* 1224. \*

*De Geer inf. 1. t. 24. f. 7.*

I i i 4

*Habi-*

*Habitat in Betula alba, Alno.*

*Mas puncto ferrugineo in medio alæ juxta fasciam, quo semina caret.*

*Larva coarctata uti Lacertinarie. Bergman.*

- Sambu- 203. *P. Geometra subfeticornis*, alis caudato-angulatis  
caria, flavescens lineis duabus; posticis apicibus bipun-  
ctatis. *Fn. suec. 1222. \* M. L. U. 391. \**

*Gad. inf. 2. t. 34.*

*List. gad. f. 10.*

*Pet. gaz. t. 51. f. 6.*

*Raj. inf. 177. n. 9.*

*Alb. inf. t. 94.*

*Ræf. inf. 1. phal. 3. t. 6.*

*Wilk. pap. 38. t. 1. b. 2.*

*Clerck. phal. t. 50. f. 2.*

*Geoffr. inf. 2. p. 138. n. 58.*

*Habitat in Sambuco.*

*Larva geometra, lavis, pulla.*

- Lacertina- 204. *P. Geometra pectinicornis*, alis crosis lutescentibus  
ria, postice saturatoribus; lineis duabus puncto-que-fuscis.  
*Fn. suec. 1229. \**

*Alb. inf. 65.*

*Reaum. inf. 2. t. 22. f. 4. 6.*

*De Geer inf. 1. t. 10. f. 7, 8.*

*Wilk. pap. 14. t. 1. c. 3.*

*Habitat in Quercu, Betula.*

*Larva cauda simplici, apoda, Vinule affinis, nuda;  
rubra, dorso angulato.*

*Alarum margo postice inter dentes albus.*

- Alniaria. 205. *P. Geometra pectinicornis*, alis crosis flavis fusco  
pulveratis; strigis duabus fuscis. *Fn. suec. 1230. \**

*De Geer inf. 1. t. 10. f. 13, 14.*

*Ræf. inf. 1. phal. 3. t. 1?*

*Habitat in Alno.*

- Syringa- 206. *P. Geometra pectinicornis*, alis suberosis: omnibus  
ria, griseo-flavescens, strigis repandis punctisque duo-  
bus fuscis. †

*Ræf. inf. 1. phal. 3. t. 10.*

*Wilk. pap. 39. t. 1. b. 6.*

*Geoffr. inf. 2. p. 125. n. 32.*

*Habitat in Syringa, Jasminio.*

Larva

Larva glauco luteoque varia, dorso aculeata, spinaque lutea curva.

dolabra- 207. *P. Geometra* pectinicornis, alis subflavescentibus: strigis ferrugineis sparsis, lobo postico violaceo.

*Habitat in Quercu, Germaniæ. D. Schreber.*

*Media. Thorax flavescens, antice obscure violaceus.*

Abdomen subtus rufescens, ano obscure purpureo adscendente. Alæ versus angulum ani obsolete emarginate. Superiores supra flavescens strigis ferrugineis, numerosis, confertis, inaequalibus, versus angulum violaceum concurrentibus in maculam ferrugineam. Subtus magis flava strigis magis rubris. Inferiores albidiores.

Prunaria. 208. *P. Geometra* pectinicornis, alis subdentatis luteis fusco-pulverulentis: anticis lunula fusca. *Fn. suec. 1232. \**

*Wilk. pap. 40. t. 1, 6, 8. f. 1, 2.*

*Alb. inf. 42. t. 69.*

*Uddm. diff. 69.*

*Habitat in Pruno spinosa.*

Larva geometra, ferruginea, dorso antice posticeque spinis 2.

Mas alis luteis, Femina flavis.

pennaria. 209. *P. Geometra* pectinicornis, alis rufescentibus: strigis duabus fuscis punctoque subterminali nigro centro albo. *Faun. suec. 1231. \**

*Habitat in Europa.*

Piniaria. 210. *P. Geometra* pectinicornis, alis subtus griseis linea alba interrupta fasciisque duabus obscurioribus.

*α. Phalæna Piniaria. Fn. suec. 1233. \* Clerck. phal. t. 1. f. 10.*

*Uddm. diff. 64.*

*Ammiral. inf. t. 20.*

*β. Phalæna Tiliaria. Fn. suec. 1234. \* Clerck. phal. t. 4. f. 11.*

*Reaumn. inf. 2. t. 28. f. 6.*

*Habitat in Pinu, Betula.*

Alæ dissimiles supra, in *α* Mære fusca maculis 2 albis antennis pectinatis; in *β* cœvina s. ferruginea antennis setaceis.

\* \* GEOMETRÆ *pectinicornes*, *Alis rotundatis*.

clinguatæ. 211. *P. Geometra pectinicornis*, alis flavis: anticis fascia lata lutea: medio puncto nigro. *Fn. suec.* 1235 \*  
*Raf. inf.* 1. *phal.* 3. t. 9.

*Habitat in Pyro.*

Larva *geometra*, *lævis*, *ramiformis*. *Pb. Geometra c-*  
*linguis*.

melanaria. 212. *P. Geometra pectinicornis*, alis nigro-punctatis maculatis: anticis albidis; posterioribus luteis. *Fn. suec.* 1240. \* *Clerck. phal.* t. 4. f. 2.

*Uddm. diff.* 65.

*Habitat in Europa.*

macula- 213. *P. Geometra pectinicornis*, alis omnibus nigro-ma-  
ria. culatis flavis.

*Scop. carn.* 557. *Phalæna maculata*.

*Habitat in Germania.*

*Præcedenti similima, sed minor & alis etiam superioribus flavis. Antennæ in mea setaceæ, sed femina.*

atomaria. 214. *P. Geometra pectinicornis*, alis omnibus lutescentibus: fasciis atomisque fuscis. *Fn. suec.* 1245. \*

*Fn. suec.* 840.

*Frisch. inf.* 13. p. 12. t. 5.

*Alb. inf.* 42. f. 69.

*Habitat in Tilia.*

pulvera- 215. *P. Geometra pectinicornis*, alis omnibus testaceo-  
ria. pulverulentis: fascia lata ferruginea, subtus purpurascenti ferrugineis. *Faun. suec.* 1243. \* *Clerck. phal.* t. 5. f. 6.

*Habitat in Europa.*

fasciaria. 216. *P. Geometra pectinicornis*, alis omnibus rufescentibus: fascia lata ferruginea margine albo. *Fn. suec.* 1242. *Clerck. phal.* t. 5. f. 5.

*Habitat in Europa.*

Betularia. 217. *P. Geometra pectinicornis*: alis omnibus albis subfasciatis atomisque nigris, thorace fascia atra. *Fn. suec.* 1287. \*

*Pes.*

---

*Geometrarum pectinicornium feminae pleræque antennis simplicibus setaceis sunt. proinde sexus completus acquirendus, ne seticornis femina inter non suos quæatur.*



*Pet. gaz. t. 7. f. 8.*

*Æt. stockh. 1755. p. 214. t. 6. f. 3.*

*Alb. inf. t. 91, 92, 40, 41.*

*Wilk. pap. 38. t. 1. b. 1.*

*Gadd. satag. 82.*

*De Geer inf. t. 17. f. 22.*

*Ammiral. inf. t. 21,*

*Habitat in Betula, Ulmo, Rosa, Salice.*

*Larva geometra pallida, postice maculis 2 atris.*

pantaria. 218. *P. Geometra pectinicornis*, alis albis fascia maculari flavicante, abdomine luteo nigro punctato.

*Habitat in Lusitania. Vandelli.*

*Statura & magnitudo Ph. defoliariae. Alæ albæ, basi lutescentes. Fascia in medio vel paulo posterior e maculis sordidis confertis, versus interiorem marginem confertioribus. Abdomen luteum punctis nigris ocellaribus (in medio luteis) confertis. An semina hujus aptera?*

wauaria. 219. *P. Geometra pectinicornis*, alis cinereis: anticis fasciis quatuor nigris abbreviatis inæqualibus. *Fr. suec. 1248.*

*Gæd. inf. 1. t. 45.*

*List. gæd. t. 12.*

*Pet. mus. 3. n. 4.*

*Raj. inf. 179.*

*Alb. inf. 47. f. 78.*

*Merian. eur. 1. f. 25. f. 151.*

*Friscb. inf. 3. t. 3. f. 1.*

*Ræf. inf. 1. phal. 3. t. 4.*

*Wilk. pap. 52. t. 2. a. 2.*

*Ammiral. inf. t. 13. f. 2, 3.*

*Habitat in Grossularia Ribe rubro.*

*Larva geometra, viridis, subpilosa.*

sacraria. 220. *P. Geometra pectinicornis*, alis flavis: fascia obliqua sanguinea.

*Habitat in Barbaria.*

*Corpus totum flavum. Alæ superiores fascia lineari sanguinea a medio marginis interioris ad apicem ducta, subtus vix conspicua. Alæ inferiores flavo-albicantes. Antennæ valde pectinatae, sed apice setaceæ.*

- purpura-ria.* 221. *P. Geometra pectinicornis*, alis luteis margine anticarumque fasciis duabus purpureis. *Fn. suec.* 1254. \*  
*Clerck phal. t. 9. f. 11.*  
*Gæd. inf. 2. t. 12.*  
*List gæd. 60.*  
*Uddm. diff. 69.*  
*Habitat in Quercu, Pruno spinosa.*  
*Minima (cum sequenti) facile inter Geometras est.*
- profapia-ria.* 222. *P. Geometra pectinicornis*, alis lutescentibus: fasciis utrinque duabus saturatioribus. *Faun. suec.* 1252. \*  
*Clerck phal. t. 3. f. 1.*  
*Uddm. diff. 66.*  
*Habitat in Europa.*
- pufaria.* 223. *P. Geometra pectinicornis*, alis omnibus niveis: strigis tribus obsoletis. *Faun. suec.* 1251. \* *Clerck. phal. t. 3. f. 6.*  
*Habitat in Alno, Betula alba.*
- vespertina-ria.* 224. *P. Geometra pectinicornis*, alis subgriseis: strigis duabus: posteriore limbum obscurum determinante.  
*Habitat in Lusitania. Vandelli.*  
*Media f. minor. Alæ griseæ, strigis duabus obscurioribus in 3 areas divisæ: postrema area multo magis obscura & quidem subtilius etiamnum obscurior. Subtus similis, magis flavicans cum puncto centrali fusco absque strigis.*
- papilionaria.* 225. *P. Geometra pectinicornis*, alis omnibus viridibus subrepandis: striga sesquialtera pallida. *Faun. suec.* 1247.  
*Frisch. inf. 10. t. 17.*  
*Raf. inf. 4. t. 18. f. 3.*  
*Habitat in Thymo?*  
*Conf. Raf. inf. 1. phal. 3. t. 12.*  
*Wilkes pap. 37. t. 1.*  
*a. 6. sed nostra duplo major.*
- tripuncta-ria.* 226. *P. Geometra pectinicornis*, alis fuscescentibus: anterioribus fascia interrupta bascosque stria; posterioribus disco albis. *M. L. U.* 392.  
*Pet. gaz. t. 28. f. 8.*  
*Edw. av. 35 t. 35.*  
*Habitat in Asia.*

*Ala-*

*Alarum fascia e maculis 6 s. 7 coudunatis. Abdomen trifariam nigro-punctatum, Ano flavo.*

- tricincta- 227. *P. Geometra pectinicornis*, alis flavescentibus concoloribus: arcubus tribus fuscis. *Mus. Lud. Utr.* 394. \*

*Habitat in America.*

*Alarum arcus: 1. a margine anteriore ductus ad anum; 2. a margine antice ad marginem posticum; 3. apicem alæ anterioris includit.*

- caffraria. 228. *P. Geometra pectinicornis*, alis canis: punctis aliquot ferrugineis luteo annulatis. *Mus. L. U.* 393. \*  
*Habitat ad Cap. b. spei. D. Tulbagh.*  
*Puncta alarum quasi per duas fascias digesta cum solitario in medio; alæ utrinque concolores. Antennæ ex hac familia admodum magnæ.*

- Jatropha- 229. *P. Geometra pectinicornis*, alis nigris concoloribus: anterioribus maculis duabus; posterioribus unica flavis. *Mus. Lud. U.* 395. \* *Clerck. pap. t. 55. f. 3.*  
*Merian. surin. 38. t. 38. f. 1.*

*Habitat in Jatropha gossypifolia Americes.*

*Alæ anteriores macula ovata transversa & minore; hæc in altero sexu deest, ad basin.*

\* \* \* GEOMETRÆ feticornes alis angulatis.

- viridata. 230. *P. Geometra feticornis*, alis angulatis omnibus viridibus: striga pallida. *Fn. succ.* 1256.  
*Scop. carn.* 530.

*Harris. inf. 7. t. 3. f. e-i.*

*Habitat in Quercu, Oxyacantha.*

*Similis Rœf. 1. phal. 3. t. 13, sed linea unica & margo concolor.*

- margaritata. 231. *P. Geometra feticornis*, alis angulatis margine rubris fascia saturatiore strigaque alba.

*Habitat in Germania. D. Schreber.*

*Media. Alæ albo-virescentes s. margaritaceæ: Fascia lata, saturatior, antice posticeque albo marginata; sed alæ posticæ posterius tantum albo marginatæ. Subtus omnes albæ.*

- notata. 232. *P. Geometra feticornis*, alis angulatis pallidis: fasciis tribus subfuscis: anticarum postica nigricantimaculata. *Faun. suec.* 1258. \* *Clerck. phal. t.* 6. f. 11.

*Habitat in Europa.*

*Margo posticus omnium alarum striga fusca terminatur, quæ evidentior ubi ala anterior emarginata; in alarum anticarum medio s. in fascia tertia sunt quatuor puncta equaliter disposita inter se, quæ stercore muscarum referunt.*

- porata. 233. *P. Geometra feticornis*, alis subangulatis pallescentibus; posticis ocello minuto.

*Habitat in Italia. Cyrillus.*

*Media. Alæ supra pallidæ atomis fuscis ferrugineisque, postice substriatæ margine tenuissima linea nigricante terminato. Ocellus in medio alarum posticarum, minutus, fuscus pupilla lutca. Subtus pallidæ atomis rarioribus fuscis. Superiores puncto centrali fusco. Corpus & Antennæ pallidæ.*

- repandata. 234. *P. Geometra feticornis*, alis cinereis: omnibus fusco-undatis; posticis margine repando atro. *Faun. suec.* 1260. \* *Clerck. phal. t.* 6. f. 8.

*Habitat in Europa.*

- dubitata. 235. *P. Geometra feticornis*, alis anticis griseo glaucescentibus fascia purpurascens; posticis dentatis. *Fa. suec.* 1259. \* *Clerck. phal. t.* 6. f. 2.

*Habitat in Europa.*

*Statura Geometræ, magnitudo Noctuæ, facies Tineæ.*

- emarginata. 236. *P. Geometra feticornis*, alis omnibus pallidis emarginato-angulatis: strigis duabus griseis. *Faun. suec.* 1257. \* *Clerck. phal. t.* 4. f. 12.

*Habitat in Europa.*

*Alæ flavescenti-pallidæ lineis 2 griseis remotissimis; punctum fuscum in disco; omnes alæ postice fere emarginate sunt.*

\* \* \* \* *GEOMETRÆ feticornes alis rotundatis.*

- Chærophyllata. 237. *P. Geometra feticornis atra*, alis erectis: anticis apice albis. *Fa. suec.* 1274. \*

*Phalæna atra. Fa. suec.* 1. p. n. 864.

*Pet.*

*Pet. gaz. t. 69. f. 8.*

*Habitat in Chærophyllo sylvestri. Kekeritz.*

*Larva viridis, glabra.*

clathrata. 238. *P. Geometra feticornis*, alis omnibus flavescenti-albis: lineis nigris decussatis. *Fn. suec. 1275. \* Clerck. phal. t. 2. f. 11.*

*Scop. carn. 536. retialis.*

*Geoffr. paris. 2. p. 135. n. 53.*

*Habitat in Europa.*

undulata. 239. *P. Geometra feticornis*, alis omnibus supra strigis confertissimis transversis undulatis fuscis. *Fn. suec. 1272. \* Clerck. phal. t. 6. f. 3.*

*Uddm. diss. 71.*

*Habitat in Salice caprea.*

flaveolata. 240. *P. Geometra feticornis*, alis nigris concoloribus: disco communi flavo crenato. *M. L. U. 396. \**

*Habitat in Indiis.*

*Corpus flavum.*

æstuata. 241. *P. Geometra feticornis*, alis fuscis concoloribus: maculis albis oblongis coadunatis. *M. L. U. 397. \**

*Habitat in Indiis.*

*Alæ anteriores basis maculis 2, disco 6 coadunatis; posteriores maculis 7 linearibus coadunatis.*

Grossula-riata. 242. *P. Geometra feticornis*, alis albidis maculis rotundatis nigris: anticis strigis luteis. *Fn. suec. 1261. \**

*Scop. carn. 544.*

*Mouff. inf. 96. n. 10.*

*Jonst. inf. 84. n. 10. t. 6.*

*Gæd. inf. 1. t. 31.*

*List. gæd. f. 9.*

*Blank. inf. t. 7. f. E. H.*

*Raj. inf. 178. n. 14 ♂ 373. n. 1.*

*Merian. eur. 1. t. 29.*

*Alb. inf. t. 43. f. 71.*

*Frisch. inf. 3. t. 2.*

*Ræf. inf. 1. phal. 3. t. 2.*

*Wilkes pap. 42. t. 2. a. 1.*

*Edw. av. 202.*

*Ammiral. inf. t. 26.*

*Geoffr. paris. 2. p. 137. n. 56.*

*Poda*

*Poda inf.* 92. n. 30.

*Habitat in Rube Grossularia, Amygdalo.*

*Abdomen luteum nigro-maculatum.*

*Larva geometra subpilosa, supra fusca, subtus flava.*

- Cratæ-** 243. *P. Geometra feticornis*, alis flavissimis: anterioribus  
**gata.** maculis costalibus tribus ferrugineis: media subar-  
gentea.

*Scop. carn.* 556. \*

*Wilkes pap.* 39. t. 1. b. 4.

*Uddm. diss.* 70.

*Geoffr. paris.* 2. p. 139. n. 59.

*Phalæna luteolata. Fn. suec.* 1283. \*

- β. *Phalæna dotata. Clerck. phal.* t. 5. f. 15.

*Habitat in Oxyacantha, Aria.*

*Larva geometra nuda, fusca: spina dorsali recta.*

- Populata.** 244. *P. Geometra feticornis*, alis flavo-pallidis: anticis  
subfasciatis: apice subtus fusco contaminatis. *Fn. suec.*  
1266. \* *Clerck phal.* t. 5. f. 14, 13.

*Habitat in Populo.*

*Alæ primores supra obsolete griseo fasciatæ; postice sub-  
tus flavescentes arcu fusco ex punctis cum puncto ni-  
gro centrali.*

- bilineata.** 245. *P. Geometra feticornis*, alis omnibus luteis testaceo  
undatis: fascia repanda margine fusco alboque. *Fn.*  
*suec.* 1284. \* *Clerck phal.* t. 6. f. 13.

*Scop. carn.* 566.

*Habitat in Suecia.*

- Chenopo-** 246. *P. Geometra feticornis*, alis anticis testaceis; fasciis  
**diata.** tribus griseis puncto prominulo apicisque lineola supra  
fusca. *Fn. suec.* 1263. \*

*Alb. inf.* t. 47. f. 79.

*Habitat in Chenopodio.*

*Mas pectinicornis. Th. Bergman.*

- comitata.** 247. *P. Geometra feticornis*, alis anticis flavescensibus:  
fasciis tribus griseis puncto apicisque lineola utrinque  
fusca. *Fn. suec.* 1264. \*

*Habitat in Europa.*

- plagiata. 248. *P. Geometra feticornis*, alis anticis canis: fasciis tribus trilineatis nigricantibus repandis. *Fn. succ.* 1271. \* *Clerck. phal. t. 6. f. 1.*  
*Habitat in Europa.*
- miata. 249. *P. Geometra feticornis*, alis virescenti undulatis: fascia media lata triplici o notata. *Fn. succ.* 1268. \* *Clerck. phal. t. 8. f. 2.*  
*Reaum. inf. 2. t. 29. f. 11 - 13.*  
*Ammiral. inf. t. 32. f. 2.*  
*Habitat in Betula. Bergman. Sedet alis erectis.*  
*Media.* Alæ superiores canescentes: Fascia bascos, media & marginis: harum media latior, quasi ex duabus combinata; in medio ad corpus notata ooo f. annulis tribus arcte connexis. Fasciae fusco-virescentes. Subeas alæ primores pallidæ fascia obsoleta cum puncto. Inferiores alæ utrinque pallidæ arcu punctoque fusco obsoletiore, utrinque.
- Prunata. 250. *P. Geometra feticornis*, alis griseis: anticis fasciis duabus pallidis repandis: postica semiterminali. *Fn. succ.* 1267. \* *Clerck. phal. t. 7. f. 3.*  
*Friseh. inf. 5. t. 14.*  
*Ammiral. inf. t. 23. f. 1, 4.*  
*Habitat in Pruno, Ribe.*
- aversata. 251. *P. Geometra feticornis*, alis pallidis: striga bascos fasciaque media punctoque fuscis. *Fn. succ.* 1286. *Clerck. phal. t. 5. f. 7.*  
*Uddm. diff. 72.*  
*Habitat in Finlandia.*  
*Punctum in pagina inferiori magis saturatum.*
- tristata. 252. *P. Geometra feticornis*, alis omnibus nigris albo subundatis: fasciis duabus albis undatis nigro-punctatis. *Fn. succ.* 1277. \* *Clerck. phal. t. 1. f. 13.*  
*Habitat in Betula, inter duo folia connexa. T. Bergman.*
- Alchemillata. 253. *P. Geometra feticornis*, alis canescentibus: anticis undatis: fascia nivea cinereo undata, lineolaque intra apicem. *Fn. succ.* 1282. \*  
*De Geer inf. 1. t. 22. f. 16.*  
*Habitat in Alchemilla.*

K k k

Fascia

*Fascia & lineola repanda intra apicem alba sunt, striga cinerea repandaque priori; dimidio minor.*

haftata. 254. *P. Geometra feticornis*, alis omnibus nigris albo maculatis: fasciis duabus albis immaculatis haftato dentatis. *Fn. suec.* 1276. \* *Clerck. phal. t. 1. f. 9.*  
*Habitat in Svecia.*

*Majuscula inter proximas; alis concoloribus absque puncto nigro subtus.*

albicillata. 255. *P. Geometra feticornis*, alis omnibus nigricantibus: fascia unica latissima alba immaculata. *Faun. suec.* 1278. \* *Clerck. phal. t. 1. f. 12.*

*Habitat in Svecia.*

dealbata. 256. *P. Geometra feticornis*, alis albis subtus nigro nervosis: anterioribus lunula nigra.

*Habitat in Germania. D. Schreber.*

*Magnitudo Papil. Napi. Thorax antice flavescens. Abdomen lateribus linea lutea & nigra; subtus linea nigra. Alæ subtus nervis nigris & in anticis lunula nigra.*

marginata. 257. *P. Geometra feticornis*, alis omnibus albis: margine exteriori limbo fusco interrupto. *Fn. suec.* 1279. \*

*Clerck. phal. t. 2. f. 5.*

*Sulz. inf. t. 16. f. 96.*

*Geoffr. paris. 2. p. 139. n. 60.*

*Habitat in Corylo.*

*Quibusdam macula 2 f. 3 in singula ala disco.*

ocellata. 258. *P. Geometra feticornis*, alis albidis: anticis fasciis duabus fuscescentibus maculaque apicis ocellari didyma. *Fn. suec.* 1280. \*

*Habitat in Europa.*

Janata. 259. *P. Geometra feticornis*, alis anterioribus subtus cinereis; posterioribus supra fascia punctisque tribus albis. *M. L. U.* 398. \*

*Habitat in Indiis.*

*Si Ph. subtus inspicatur, ut cauda sit capitis loco, refert eandem supra, antice visam; hinc hysteron-proteron vel Janus bifrons audit.*



*Auctuata.* 260. *P. Geometra feticornis*, alis cinerascens: anticis fasciis abbreviatis tribus fuscis. *Fn. suec.* 859.

*Gæd. inf.* 3. t. K.

*List. gæd. f.* 13.

*Merian. eur.* t. 120.

*Friseh. inf.* 7. t. 19.

*Habitat in arboribus variis, Tropæolo.*

*Junipera-* 261. *P. Geometra feticornis*, alis cinerascens: anterioribus fasciis duabus griseis lineolaque apicis fusca. *Fn. suec.* 1269. \* *Clerck. phal.* t. 2. f. 8.

*Habitat in Junipero. D. C. Solander.*

*Fascia alarum posterior versus marginem anteriorem fere interrupta; anterior ad basin, minor; ad apicem alæ supra lineola nigricans longitudinalis.*

*sordidata.* 262. *P. Geometra feticornis*, alis subtestaceis immaculatis.

*Ræf. inf.* 3. t. 3. f. 3. 63. a. n?

*Habitat in Lusitania. Vandelli.*

*Corpus magnitudine Papil. Argi, totum pallide fuscescens s. pallide testaceum, una cum alis rotundatis. Antennæ filiformes.*

*incanata.* 263. *P. Geometra feticornis*, alis omnibus canis postice striga alba repanda disco puncto margineque nigro-punctatis. *Fn. suec.* 1287. \* *Clerck. phal.* t. 3. f. 3.

*Habitat in Europa.*

*immutata.* 264. *P. Geometra feticornis*, alis albis concoloribus: strigis pallidis puncto margineque postico nigro-punctatis. *Faun. suec.* 1288. \* *Clerck. phal.* t. 6. f. 12.

*Geoffr. parif.* 2. p. 140. n. 63.

*Scop. carn.* 553. Ph. variegata.

*Habitat in Europa.*

*Alæ pone strigam obsolete nebuloſa. Punctum centrale in omnibus alis, sed in anterioribus minutissimum. Subtus alæ multo obscuriores fascia unica, eaque postica. Antennæ pubescentes.*

*immorata.* 265. *P. Geometra feticornis*, alis omnibus lutescentibus: fasciis obsoletis albidis marginisque striga nigricante. *Fn. suec.* 1290. \*

*Habitat in Europa.*

K k k 2

Alæ

*Alæ concolores, absque puncto, undique atomis fuscis adpersæ.*

- remutata. 266. *P. Geometra feticornis*, alis flavescentibus: strigis tribus fuscis, puncto inargineque postico nigro-punctato. *Faun. suec.* 1289. \* *Clerck. phal. t. 5. f. 12.*  
*Habitat in Europa.*

- succentu- 267. *P. Geometra feticornis*, alis omnibus canescenti ex-  
 riata. albidis puncto nigro: limbo obcuriore. *Faun. suec.*  
 1294. \*

*Clerck phal. t. 5. f. 2.*

*Habitat in Europa. De Geer.*

*Thorax albus ad latera tectus duabus valvulis, alarum rudimentis, basi alarum anteriorum incumbens. Abdomen griseum, sed primum & ultimum segmentum album: stigmata omnia nigra. Alæ oblongæ.*

- strigilata. 268. *P. Geometra feticornis*, alis cinereis: postice striga transversa recta pallida. *Fn. suec.* 1291. \* *Clerck. phal. t. 5. f. 2.*  
*Habitat in Europa.*

- didymata. 269. *P. Geometra feticornis*, alis albidis obsolete cinereo-bifasciatis: posteriori macula fusca biloba. *Fn. suec.* 1270. \* *Clerck. phal. t. 6. f. 10.*  
*Habitat in Europa. D. C. Solander.*

- rectangu- 270. *P. Geometra feticornis*, alis viridibus fusco-subfa-  
 lata. sciatis. *Fn. suec.* 1295. \* *Clerck. phal. t. 8. f. 6.*  
*Habitat in Europa. Claud. Alströmer.*  
*Alæ subtus fascia rectangula e punctis nigricantibus.*

- ocellata. 271. *P. Geometra feticornis*, alis luteis: strigis albidis undatis ocellisque quatuor subviolaceis.  
*Habitat . . . D. Brunniche.*

*Magnitudo Ph. Potamogata, tota lutea, pulcherrima. Alæ superiores supra luteæ strigis 3 fractis albidis. Ocelli nigri pupilla violacea iride albo; 2 ad marginem exteriorem: posteriore didymo; 1 ad angulum ani; 1 ante marginem posticum. Margo posticus, ante cilia, striga atra terminatus. Alæ inferiores luteæ fasciis duabus albidis striga nigra superinductis; oculo violaceo ad angulum ani; margo posticus striga nigra. Subtus albedo fuscoque variæ.*

- articata.** 272. *P. Geometra seticornis*, alis albis: fusco fasciato maculatis, thorace anoque flavis. *Fn. suec.* 1297. \*  
*Scop. carn.* 547.  
*Gæd. inf.* 2. t. 13.  
*List. gæd.* i. 61.  
*Pet. gaz.* t. 32. f. 8.  
*Raj. inf.* 222.  
*Alb. inf.* t. 37. f. 60.  
*Reaum. inf.* 1. t. 49. f. 17, 18.  
*De Geer inf.* 1. t. 28. f. 18, 19.  
*Rœs. inf.* 1. phal. 4. t. 14.  
*Harris. inf.* 13. t. 6. f. 1 - p.  
*Schaff. elem.* t. 98. f. 4.  
*Habitat in Urtica, in hortis pomonæ.*  
*Larva 16-poda, nuda, albida, dorso fusco.*
- limbata.** 273. *P. Geometra seticornis*, alis rotundatis luteis puncto ocellari limboque fusco.  
*Habitat in Germania. D. Schreber.*  
*Statura Ph. nymphaæa. Alæ luteæ: striga fusca & puncto ocellari fere in medio; margo posticus late fuscus. Posticæ alæ luteæ limbo postico fusco.*
- Nym-  
phæata.** 274. *P. Geometra seticornis*, alis cinereis: omnibus conformiter albo maculatis reticulatis. *Fn. suec.* 1298. \*  
*Raj. inf.* 227. n. 87.  
*Habitat in Nymphæa, Lemna.*
- Potamo-  
gata.** 275. *P. Geometra seticornis*, alis cinereis albo maculatis: anterioribus obsolete reticulatis. *Fann. suec.* 1299. \*  
*Reaum. inf.* 2. t. 32. f. 11.  
*Lœs. pruss.* 178.  
*Habitat in Potamogetone natante; subiens metamorphosin intra solii segmentum, folio adscitum.*
- Stratio-  
rata.** 276. *P. Geometra seticornis*, alis pallidis subfasciatis: anterioribus punctis tribus nigris. *Fn. suec.* 1200. \*  
*De Geer inf.* 1. t. 37. f. 16-18.  
*Geoffr. paris.* 2. p. 142. n. 66.  
*Habitat in Stratiote Aloide sub aquis.*
- paludata.** 277. *P. Geometra seticornis*, alis omnibus niveis: postice ocellis dimidiatis binis striga connexis.  
*Habitat in Lusitania. D. D. Vandelli.*

*Similis Phal. aquaticis: Potamogetonis f. Nymphaea, sed minor. Alæ niveæ: omnes postice striga repanda, nigricante, cui a latero postico annexæ quasi ocelli dimidiati, 2, distantes, antice cincti margine nigro. Margo alarum posticus striga nigra vix manifesta; in inferioribus quasi angulata s. dentata. Subtrus Alæ fere similes, sed obsoletiora omnia cum puncto centrali nigro.*

**Lemnata.** 278. *P. Geometra seticornis*, alis albis: posticis fascia terminali nigra: punctis quatuor albis. *Fn. suec.* 1301. \*  
*Raj. inf.* 205. n. 102.  
*Reaum. inf.* 2. t. 12. f. 14, 15.  
*Harris. inf.* 15. t. 7. f. 1. p.  
*Habitat in Lemna, ex qua collecta nidum struit.*

**hyalinata.** 279. *P. Geometra seticornis*, alis hyalino-albis margine nigro cinctis, ano lutescente.  
*Habitat in America. L. Spengler.*  
*Corpus album, magnitudine P. urticatæ. Caput nigricans. Lingua spiralis, flavescent. Antennæ setaceæ. Alæ concolores, albæ. Superiores margine exteriori posterioreque late fusco; Inferiores margine postico tantum lato fusco. Pedes albid. Alæ compositæ triangulum referunt.*

**cingulata.** 280. *P. Geometra seticornis*, alis omnibus atris: striga nivea. *Fn. suec.* 1303. \* *Clerck. phal. t. 2. f. 10.*  
*Habitat in Europa.*  
*Statura & magnitudo Tineæ. Antennæ corpore breviores.*

**brumata.** 281. *P. Geometra seticornis*, alis griseo-fuscis: striga nigra postice pallidioribus; femina aptera. *Fn. suec.* 1293. \*  
*Raj. inf.* 369. n. 9. f. 181. n. 4.  
*Reaum. inf.* 2. t. 30. f. 8, 9.  
*De Geer inf.* 1. t. 24. f. 11, 19.  
*Habitat in Pomonæ arboribus; quas misere devastat, octobri ova ponens. Amæn. acad.* 3. p. 349.

**Cercata.** 282. *P. Tortrix* alis griseis: area dorsali complanata exasperato-carinatis; scutelli apice albo.  
*Reaum. inf.* 3. t. 19. f. 14, 15.

*Blum.*

*Blom. Am. holmensf. 1764. t. 6.*

*Habitat in Apum alvearibus, ceram depascens ut Mel-  
lonella. Alæ complicatæ sunt postice compressæ, re-  
tusa, inferiores subtus postice fascia fusca & strigis  
minutis.*

fasciana. 283. *P. Tortrix* alis fusco-cinerascentibus: fascia alba.

*Fn. suec. 1304. \**

*Scop. carn. 586.*

*Habitat in Europa.*

uncana. 284. *P. Tortrix* alis fuscis margine exteriori albido: me-  
dio ramum recurvum album introrsum exserente.

*Fn. suec. 1305. \* Clerck. phal. t. 3. f. 7.*

*Habitat in Europa.*

#### \* 4 \* TORTRICES.

prasinana. 285. *P. Tortrix* alis superioribus viridibus: strigis duabus  
obliquis flavis, margine postico antennis pedibusque  
fulvis. *Faun. suec. 1306. \**

*Pet. gaz. t. 7. f. 11.*

*Alb. inf. t. 31.*

*Reaum. inf. 1. t. 39. f. 13, 14.*

*De Geer inf. 1. t. 3. f. 1.*

*Wilkes pap. 6. t. 1. a. 13.*

*Poda inf. 93. t. 2. f. 8.*

*Raf. inf. 4. t. 22.*

*Ammiral. t. 2. f. 1. Autumnus.*

*Habitat in Alno, Quercu.*

*Larva nuda, luteo-virens punctis albis, ano fulvo.*

viridana. 286. *P. Tortrix* alis rhombeis: superioribus viridibus im-  
maculatis. *Fn. suec. 1307. \* It. v. goth. 69. \**

*Frisch. inf. 3. t. 8.*

*Reaum. inf. 2. t. 18. f. 6, 7.*

*Raf. inf. 1. phal. 4. t. 3.*

*Wilk. pap. 4. t. 1. n. 5.*

*Pod. inf. t. 2. f. 10.*

*Habitat in Quercu.*

*Larva nuda, viridis punctis nigris, capite candaque  
luteis.*

K k k 4

287.

*Tortricum Larvæ contorquent & filo connectunt folia, quæ vorant & intra quæ se  
recipiunt.*

clorana. 287. *P. Tortrix* alis rhombeis: superioribus viridibus  
marginè albido. *Fn. suec.* 1308. \*

*Raf. inf.* 1. *phal.* 4. t. 3.

*Habitat in Salicibus hirsutis.*

litterana. 288. *P. Tortrix* alis rhombeis: superioribus viridibus cha-  
racteribus atris.

*Habitat in Germania.*

*Simillima precedenti, sed alis saturatius viridibus;  
characteribus plurimis atris.*

Zoegana. 289. *P. Tortrix* alis flavis puncto media ferrugineo: po-  
stice ferrugineis macula flava.

*Clerck. phal.* t. 4. f. 4.

*Habitat in Europa. Hammarby. Joh. Zoega.*

hamana. 290. *P. Tortrix* alis superioribus flavis puncto lituraque  
postica hamata ferrugineis. *Fn. suec.* 1309. \* *Clerck.*

*phal.* t. 4. f. 47.

*Habitat in Europa.*

Kækerit- 291. *P. Tortrix* alis flavescentibus puncto unico fusco.  
ziana.

*Habitat in Europa. Upsalia.*

*Alæ pallide testaceæ: singulis in medio fere vel ante-  
rius punctum minutum, ferrugineo-fuscum; ad an-  
gulum ani litura ferrugineo-obsoluta. Antennæ fuscae.*

oporana. 292. *P. Tortrix* alis superioribus ferrugineis griseo macu-  
latis reticulatisque. *Fn. suec.* 1315. \*

*Wilkes pap.* 17. t. 2. a. 4.

*Habitat in Malo.*

Rosana. 293. *P. Tortrix* alis superioribus testaceo-reticulatis: fa-  
scia grisea obliqua. *Fn. suec.* 1314. \*

*Merian. eur.* 1. p. 7. t. 19.

*Habitat in Rosa, Berberide.*

gnomana. 294. *P. Tortrix* alis flavis: fascia obliqua testacea macu-  
laque postica marginali ferruginea. *Fn. suec.* 1337. \*

*Clerck. phal.* t. 4. f. 13.

*Habitat in Europa.*

Xylotse- 295. *P. Tortrix* alis superioribus testaceis: cruce communi  
ana. ferruginea. *Fn. suec.* 1313. \* *Clerck. phal.* t. 2. f. 6.

*Habitat in Xyloteco, Malo.*

arcuana. 296. *P. Tortrix* alis luteis: fasciis tribus arcuatis, macula nigra tripunctata lineolisque duabus argenteis. *Fn. succ.* 1317. *Clerck. phal. t. 10. f. 8.*  
*Habitat in Europa.*

Avellana. 297. *P. Tortrix* alis superioribus testaceis: fasciis ferrugineis sesquitertiis. *Fn. succ.* 1316.\*  
*Alb. inf. 1. t. 95. f. g. b?*  
*Habitat in Corylo, Pyro.*

Ameriana. 298. *P. Tortrix* alis superioribus testaceis: litura communiferruginea. *Fn. succ.* 1310.\*  
*Reaum. inf. 2. t. 18. f. 6, 7.*  
*Habitat in Salice.*

Piceana. 299. *P. Tortrix* alis superioribus griseo nigroque variis: dorso ferrugineis. *Fn. succ.* 1312.\* *Clerck. phal. t. 2. f. 9.*  
*Habitat in Pini foliis, quæ combinat.*  
*Larva nuda, viridis, 16-poda. Rolander.*

ministra- 300. *P. Tortrix* alis superioribus testaceis: margine postico  
na. rufo, medio litura ferruginea: lineola alba. *Fn. succ.* 1311.\* *Clerck. phal. t. 2. f. 12.*  
*Habitat in Europa.*

Lecheana. 301. *P. Tortrix* alis superioribus luteis: characteribus J L, thoraceque argenteis. *Fn. succ.* 1318.\* *Clerck. phal. t. 10. f. 2.*  
*Habitat in Pado.*

Brande- 302. *P. Tortrix* alis superioribus testaceo-fuscis immacu-  
riana. latis. *Fn. succ.* 1320.\*  
β. Ph. fuscana *Fn. succ.* 1321. *Clerck. phal. t. 4. f. 7.*  
*Habitat in Europa.*  
*Antecedentibus paulo major, alis obscure cinereis.*

Christier- 303. *P. Tortrix* alis superioribus flavissimis venis sangui-  
nana. neis reticulatis.  
*Schæff. regensb. 1758. t. 2. f. 12.*  
*Habitat in Europa, Upsalia lecta ante diem 1763.*  
*jun: 26 fatalem observatori Car. Christierni, exi-*  
*miae spei juveni.*  
*Media. Caput, Thorax, Ale superiores flavissima, pi-*  
*æ lineis latis, anastomosantibus, flexuosis, saturate*  
K k k 5 san-

*sanguineis; pagina reliqua uti pedes & antennæ pallide.*

Forskå- 304. *P. Tortrix* alis superioribus flavis luteo reticulatis:  
leana. medio litura fuscescente. *Fn. suec.* 1319. \* *Clerck.*

*phal. t. 10. f. 2, 6.*  
*Habitat in Rosa. Kekeritz.*  
*Præcedentibus omnibus minor est.*

Lœflin- 305. *P. Tortrix* alis superioribus flavis luteo reticulatis:  
giana. duplici xx. notatis. *Fn. suec.* 1323. *Clerck. phal. t. 10 f. 6.*

*Habitat in Europa.*  
*Facies & magnitudo antecedentis.*

Hartman- 306. *P. Tortrix* alis cinereis: superioribus linea nigra albæ  
niana. adnata. *Fn. suec.* 1322. \*

*Habitat in Europa.*

Bergman- 307. *P. Tortrix* alis superioribus luteis flavo punctatis:  
niana. fasciis quatuor argenteis: tertia bifida. *Fn. suec.* 1324.

*Clerck. phal. t. 10. f. 5.*  
*Scop. carn. 543.*  
*Habitat in Europa.*  
*Parva & præcedenti simillima.*

Holmia- 308. *P. Tortrix* alis superioribus luteo ferrugineis, macu-  
na. la inarginali trigona argentea. *Faun. suec.* 1325. \*

*Clerck. phal. t. 10. f. 7.*  
*Habitat in Pomonæ arboribus.*  
*Præcedentibus paulo minor.*

Rolan- 309. *P. Tortrix* alis superioribus pallide testaceis, strigis  
driana. ferrugineis inferne antrorsum versis. *Fn. suec.* 1326.

*Habitat in Europa.*

Solandri- 310. *P. Tortrix* alis superioribus pallidis: macula com-  
ana. muni dorsali ferruginea. *Fn. suec.* 1327. \*

*Scop. carn. 587.*  
*De Geer inf. 1. t. 28. f. 29, 30.*  
*Habitat in Betula.*

Hastiana. 311. *P. Tortrix* alis superioribus fuscis: fascia antrorsum  
obliqua alba. *Fn. suec.* 1328. *Clerck. phal. t. 2. f. 7.*

*Habitat in Salice. Reinh. Hast.*

*Hast*



*Haft (Reinh.) fenno, natus ad Inſectorum Hiftoriam, at in flore ætatis periit egregius diſcipulus.*

- Wahlbo- 312. *P. Tortrix* alis ſuperioribus cinereis: faſciis duabus  
miana. fuſco-nebulofis litura poſtica obſoleta, palpis obtuſis.  
*Fn. ſvec. 1329.\**  
*Habitat in Europa.*  
*Ala cinerea. Faſcia anterior cinereo-fulca, poſtice ſubtriloba; Faſcia media latior cinereo-fulca; litura obliqua obſoleta ante apicem; margo exterior alarum extrorſum marginatus, ut in præcedentibus; ceterum in variis ſimilis P. tertianella.*
- Lediana. 313. *P. Tortrix* alis fuſcis: faſciis duabus rubro-argen-  
teis: poſteriore puncto intruſo. *Fn. ſvec. 1330.\**  
*Clerck. phal. t. 10. f. 12.*  
*Habitat in Ledo. T. Bergman.*  
*Alæ nigricantes maculis cinereis & una alterave ruſa, etiam ad annum, interlucentibus paſſim ſquamis argenteis; ſquama major baſi alæ incumbens, apice ruſeſcens. Similitudo quadam Pomonella.*
- Alſtro- 314. *P. Tortrix* alis albidis: ſuperioribus macula medio  
meriana. laterali fuſco-ferruginea. *Fn. ſvec. 1335.\** *Clerck.*  
*phal. t. 10. f. 1.*  
*Habitat in Europa.*
- Schalle- 315. *P. Tortrix* alis canis: macula laterali ferruginea  
riana. apicem alæ attingente. *Fn. ſvec. 1339.\**  
*Habitat in Europa.*
- Schræbe- 316. *P. Tortrix* alis ſuperioribus grifeis: macula margi-  
riana. nali trigona alba. *Fn. ſvec. 1338.\**  
*Habitat in Europa.*
- Logiana. 317. *P. Tortrix* alis ſuperioribus canis: atomis nigris ſpar-  
ſis; inferioribus exalbidis. *Fn. ſvec. 1336.\** *Clerck.*  
*phal. t. 10. f. 3.*  
*Habitat in Europa.*
- Gouana. 318. *P. Tortrix* alis ſuperioribus niveis, ſubtus fuſcis.  
*Fn. ſvec. 1342.\**  
*Habitat in Europa.*

- Brunni- 319. *P. Tortrix* alis superioribus griseis: macula commu-  
chana. ni dorsali alba rhombea.  
*Habitat in Suecia.*  
*Magnitudo P. hamanz.* Alæ omnes plumbeæ, sed su-  
periores supra obscurius griseæ: macula alba rhombea  
f. trigona, utrisque alis communi, in medio dorsi.
- pariana. 320. *P. Tortrix* alis brunneis: fascia glauca strigaeque an-  
tica posticaque atris. *Fn. suec.* 1341.\*. *Clerck. phal.*  
t. 10. f. 9.  
*Habitat in Europa.*
- Moderia- 321. *P. Tortrix*, alis superioribus flavescentibus: macula  
na. marginali posterius fusca. *Fn. suec.* 1331.\*  
*Syst. nat.* 10. p. 823. *Phalæna* *ruinana*.  
*Habitat in Europa.*
- Uddman- 322. *P. Tortrix* alis cinereis: macula ferruginea marginis  
niana. dorsalis transversa. *Fn. suec.* 1332.\*  
*Habitat in Europa.*
- cruciana. 323. *P. Tortrix* alis exalbido-cinereis, postice macula fer-  
ruginea arcuata. *Fn. suec.* 1333.\*  
*Habitat in Europa.*
- Fabricia- 324. *P. Tortrix* nigra, alis superioribus pari punctorum  
na. albidorum.  
*Habitat in Europa: Hammarby. D. Fabricius.*  
*Reliquis minor, magnitudine pediculi, brevis, latius-  
cula, nigra. Puncta 2 alba majuscula equalia,  
transverse posita, paria, in alis superioribus.*
- pupillana. 325. *P. Tortrix* alis albidis, fasciis duabus obliquis fusce-  
scentibus apiceque ocello argenteo-pupillari. *Fann.*  
*suec.* 1340.\*  
*Habitat in Europa.*
- Heracli- 326. *P. Tortrix* elinguis recurvicornis, alis griseis puncto  
ana. fusco, thorace flavo. *Fn. suec.* 1334.\*  
*Reaum. inf.* 2. t. 16. f. 1-4.  
*De Geer inf.* 1. t. 29. f. 6, 7.  
*Schæff. ic.* 1758. t. 2. f. 3, 4.  
*Habitat in umbellis plantarum umbelliferarum, impri-  
mis Heraclii, contortis destruetisque floribus caules  
ex alis foliorum penetrans.*

## \* 5 \* PYRALES.

- Farinalis.** 227. *P. Pyralis* palpis recurvatis, alis politis fuscescentibus: strigis repandis, albidis area interjecta glauca. *Fn. suec.* 1348. \* *Clerck. phal. t. 2. f. 14.*  
*Scop. carn.* 508.  
*Habitat in Farina culinari cibis parata, sedens cauda erecta.*
- glaucina-** 328. *P. Pyralis* palpis recurvatis, alis glabris glaucis: strigis duobus flavis arcuatis remotissimis. *Fn. suec.* 1349. \* *Clerck. phal. t. 5. f. 4.*  
*Habitat in Europa.*
- barbalis.** 329. *P. Pyralis* palpis brevioribus, antennis pectinatis, femoribus antieis barba porrecta. *Fn. suec.* 1345. \* *Clerck. phal. t. 5. f. 3.*  
*Scop. carn.* 605.  
*Raj. inf.* 227. n. 103. b. ?  
*Habitat in Europa.*
- tentacula-** 330. *P. Pyralis* palpis porrectis longitudine antennarum ris. pectinatarum, alis omnibus cinerascens: strigis tribus obsoletis. *Faun. suec.* 1349. \*  
*Phalæna tentacularia. Syst. nat.* 10. p. 522. n. 146.  
*De Geer inf.* 1. t. 5. f. 1.  
*Habitat in Europa.*
- proboscis-** 331. *P. Pyralis* palpis porrectis approximatis thorace longioribus, antennis pectinatis, alis griseis strigis ferrugineis. *Fn. suec.* 1346. \* *Clerck. phal. t. 5. f. 4.*  
*Scop. carn.* 606.  
*Habitat in Europa.*
- rostralis.** 332. *P. Pyralis* palpis porrectis thorace longioribus, alis subgriseis: punctis duobus muricatis lineaque apicis nigra. *Fn. suec.* 1347. \*  
*Raj. inf.* 214. n. 9.  
*Roef. inf.* 1. phal. 4. t. 6.  
*Reaum. inf.* 1. t. 18. f. 16?  
*Habitat in Carpino, Humulo.*
- sulphura-** 333. *P. Pyralis* alis superioribus flavis: lineis 2, punctis 5, his. fasciisque 2 posticis nigris.  
*Habitat in Germania. D. Schreber.*

*Alæ flavæ: postice fasciæ 2 nigra, quarum posterior e punctis confertis; lineæ 2 nigra juxta marginem anteriorem, a basi ad fasciam. Puncta 5 nigra sparsa, extra lineas, ante fascias. Alæ inferiores subtus flavescences, fasciis 2 posticis nigris, pone punctum nigrum.*

*forficalis.* 334. *P. Pyralis* alis glabris pallidis: strigis ferrugineis retrorsum obliquis lituraque anterioris. *Fann. suec.* 1352. \*

*Reaum. inf. 1. t. 16. f. 13, 14.*

*Geoffr. parif. 2. p. 166. n. 111.*

*Habitat in Brassica.*

*verticalis.* 335. *P. Pyralis* alis glabris pallidis subfasciatis: subtus fusco undatis. *Fn. suec.* 1353. \*

*Mer. ear. t. 88. f. infim.?*

*Reaum. inf. 2. t. 19. f. 1-5*

*Roes. inf. 1. phal. 4. : 4.*

*Wilk. pap. 24. t. 3. a. 16.*

*Habitat in Urtica. Tortrix.*

*pinguinalis.* 336. *P. Pyralis* palpis recurvatis elinguis, alis cinereis: margine crassiore nigro subfasciato. *Fn. suec.* 1350.

*Roland. Act. stockh. 1755. p. 51. t. 2.*

*Habitat in Pinguibus, Butyro aliisque frequens, intra domos & culinas; rarius in ventriculo humano, inter vermes pessima, expellenda Lichene curvatile.*

*Frumentalis.* 337. *P. Pyralis* alis cinerascens glabris: fasciis obliquis albidis articulatis. *Fn. suec.* 1351. \*

*Habitat in Agris Tritico confitis.*

*Secalis.* 338. *P. Pyralis* alis griseo-fuscis striatis: macula reformi A latino inscripta.

*Roland. act. stockh. 1752. p. 62.*

*Habitat intra Secales culmos, eos intra vaginam exedens, ex uno in alterum migrans, unde Spica alba cassæ.*

*sanguinalis.* 339. *P. Pyralis* alis flavis: fasciis duabus sanguineis: priore exterius dilatata perforata.

*Habitat in Lusitania. Vandelli.*

*Culice paulo major. Alæ superiores supra luteæ. Fascia in medio, purpurea, ad marginem exteriorem latiore,*

*latiore, ubi format quasi isthmum s. punctum lateum. Fascia altera ad marginem alæ posticam.*

*sticticalis.* 340. *P. Pyralis* alis griseis: striga marginali flava margi-  
neque nigro ciliari. *Fn. suec.* 1354. \*

*Habitat in Europa.*

*reticularis.* 341. *P. Pyralis* alis griseis: punctis lineola striga-  
que flavis, margine ciliari variegato. *Fn. suec.* 1355. \*

*Habitat in Europa.*

*purpuralis.* 342. *P. Pyralis* alis fusco-purpurascens: omnibus lu-  
teo maculatis. *Fn. suec.* 1356. \*

*Habitat in Europa.*

*duplaris.* 343. *P. Pyralis* alis superioribus cinereis nebulosis: me-  
dio punctis duobus atris parallelis. *Fn. suec.* 1357. \*

*Habitat in Europa.*

*gelatella.* 344. *P. Tinea* alis cinereis: superioribus linea albida pun-  
ctisque duobus nigris remotis; femina aptera. *Fn.*  
*suec.* 1450. \* *Clerck. phal.* t. 8. f. 3.

*Habitat in Pomariis sub mense defoliationis; frequens  
in Chærophyllo sylvestri.*

#### \* 6 \* *TINEÆ.*

*sociella.* 345. *P. Tinea* alis oblongis cinereis: antice albidis: po-  
stice striga pallida. *Fn. suec.* 1359. \* *Clerck phal.*  
t. 3. f. 11.

*Habitat in Favis Apis lapidarum, quos more Cereæ  
& Mellonellæ destruit.*

*Antennæ longitudine fere corporis. Alæ superiores  
purpurascens-cane: striga transversa dentata, &  
postice fusca. Inferiores subtus canæ cum striga fu-  
sca, denticulata, versus posticam sita.*

*colonella.* 346. *P. Tinea* alis oblongis cinereis: punctis duobus a-  
tris ante strigam curvam undulatam obsoletam. *Fn.*  
*suec.* 1358. \* *Clerck. phal.* t. 3. f. 8.

*Habitat in Europa.*

*Palpi*

---

*Larvæ a pulchella in Cratægellam vivunt in societate, conjunctim retia membra-  
nacea nent, nec cucullo occultantur uti Tineæ pleræque; alis expansis declarata  
obambulant contra morem gentis Tinearum; sed proprius his character etiam  
quædam deficit.*

*Palpi duo, prominentes, distantes, ut in antecedenti.*  
*Scutellum quasi lunula cinctum.*

- pufiella.* 347. *P. Tinea* alis superioribus albis: punctis lineaque communi longitudinali dentata atra; inferioribus nigris.

*Habitat in Germania. P. Forskål.*

*Statura P. T. Evonymellæ. Alæ fuscae: sed superiores supra niveæ, fascia longitudinali atra obtuse dentata, præter puncta varia.*

- bella.* 348. *P. Tinea* alis flavis: superioribus fasciis sex punctorum nigrorum. *M. L. U.* 399. \*

*Pet. gaz. 6. t. 3. f. 2.*

*Raj. inf. 211. n. 1.*

*Catesb. car. 2. p. 96. t. 96.*

*Habitat in America septentrionali.*

*Majuscula. Caput albidum puncto nigro inter antenas. Thorax albidus punctis 3 parium nigris. Alæ superiores flavescentes: fasciis albidis pluribus & in his punctis nigris serialibus. Inferiores postice nigrae, extrorsum albidae, nigro nebulosae; introrsum sanguineae. Variat punctis alarum superiorum simplicissimis & ocellatis.*

- pulchella.* 349. *P. Tinea* alis albis: superioribus nigro sanguineoque punctatis; inferioribus margine postice nigris.

*Scop. carn. 514.*

*Pet. gaz. t. 3. f. 3.*

*Habitat in Europa australi; in Mauritania. Brander. Sedens s. quiescens alas minime convolutas, sed planissimas gerit. Scop.*

*Similis Tineæ Evonymellæ, sed duplo major, pulcherrima. Alæ superiores supra punctis rubris & nigris sparsis mixtis; margo superiorum posticus nigro punctatus. Subtus alba nigro punctata: macula anteriore nigra minore; posteriore majore transverse cincta maculis rubris confluentibus. Inferiores supra albae Lunula nigra centrali & Limbo postico nigro. Subtus albae Maculis nigris variis. Thorax flavicans tectus valvulis duabus baseos & solitariis lateralibus, in quibus simul puncta 8 nigra. Abdomen album: lateribus ordine punctorum nigrorum. Antennæ setaceae, fuscae. Lingua lutescens.*

**Evonymella.** 350. *P. Tinea* alis superioribus albis: punctis 50 nigris; inferioribus fuscis. *Fn. svec.* 1363. \*

*Geoffr. parif.* 183. n. 4.

*Scop. carn.* 631.

*Frisch. inf.* 5. t. 16.

*Mer. inf.* 2. t. 2.

*Alb. inf.* t. 60. f. A. C.

*Raj. inf.* 197.

*Reaum. inf.* 2. t. 13. f. 12, 13.

*Rosf. inf.* 1. phal. 4. t. 8.

*Wilk. pap.* 4. t. 1. a. 6.

*Sultz. inf.* t. 16. f. 99.

*Habitat in Evonymo! Pado, Sorbo &c.*

*Larvæ vivunt in societate sub tentoriis communibus.*

**Padella.** 351. *P. Tinea* alis superioribus lividis: punctis 20 nigris; inferioribus fuscis. *Fn. svec.* 1364. \*

*Scop. carn.* 632.

*Frisch. inf.* 5. t. 16?

*Reaum. inf.* 2. t. 12. f. 5-9.

*Rosf. inf.* 1. phal. 4. t. 7.

*Wilk. pap.* 4. t. 1. a. 6?

*Harris. inf.* 7. t. 3. f. k-m?

*Habitat in Arboribus pomonæ.*

*Simillima P. Evonymellæ, sed supra minus alba fere: que plumbea punctis nigris paucioribus. Palpi magis prominentes, ut fere bicornis.*

*Larvæ vivunt in societate sub tentoriis, uti præcedentis.*

**Sequella.** 352. *P. Tinea* alis superioribus albis: linea communis sinuato-repanda maculisque lateralibus nigris. *Fn. svec.* 1365. \* *Clerck. phal.* t. 10. f. 14.

*Habitat in Europa.*

**Cratægella.** 353. *P. Tinea* alis albidis: fasciis duabus tertiaque terminali nigricantibus.

*Habitat in Oxyacantha, vivit in societate sub rete membranaceo. Filius.*

*Magnitudo Tapetzellæ, fere alba atomis cinereis: Fasciæ 2, fuscae, æquales, transversæ, tertia in apice alarum curvata.*

**irrorella.** 354. *P. Tinea* alis luteis: superioribus punctis nigris triangularibus. *Fn. svec.* 1361. \* *Clerck. phal.* t. 4. f. 5.

*Habitat in Europa.*

*lutarella*. 355. *P. Tinea* alis corporeque luteis immaculatis. *Faun. suec.* 1360. \* *Clerck. phal. t. 4. f. 9.*

*Habitat in Europa.*

*Magnitudo & statura P. T. Padellæ aut Phryganeæ, sed magis angusta.*

*mesomella*. 356. *P. Tinea* alis supra albidis, subtus luteis, interne nigris. *Fn. suec.* 1362. \* *Clerck. phal. t. 4. f. 14.*

*Habitat in Gramine.*

*Similis P. complanata, sed thorax luteus, alæque convulsæ.*

*Oxyacantha*. 357. *P. Tinea* alis fusco-nebulosis striga albida, margine postico albo.

*Habitat in Cratægo Oxyacantha. D. Blom.*

*Alæ fusco-nebulosæ striga media vel potius postica luteo-albida undulata. Margo posticus, imprimis inferiorum, ciliis albis.*

*Pinetella*. 358. *P. Tinea* alis superioribus flavis: maculis duabus argenteis: anteriore oblonga, posteriore ovata. *Faun. suec.* 1368. \* *Clerck. phal. t. 4. f. 15.*

*Scop. carn. 622.*

*Habitat in Pinetis Europæ.*

*pascuella*. 359. *P. Tinea* alis superioribus pallidis linea maculisque duabus oblongis albidissimis. *Fn. suec.* 1367. \*

*Scop. carn. 621.*

*Habitat in Pascuis.*

*pratella*. 360. *P. Tinea* alis superioribus albidis: linea albidissima postice ramosa: apice striis obliquis. *Faun. suec.* 1369. \* *Clerck. phal. t. 3. f. 14.*

*Habitat in Pascuis.*

*culmella*. 361. *P. Tinea* alis superioribus albidis excavato-striatis: punctis nigris septem ciliisque nitentibus. *Fn. suec.* 1370. \*

*Scop. carn. 630.*

*Reaum. inf. 1. t. 17. f. 13, 14.*

*Raj. inf. 229. n. 106.*

*Habitat in Pascuis.*

*orella*. 362. *P. Tinea* alis albidis: striis longitudinalibus variis strigisque duabus fuscis.

*Habitat in Italia, Cyrillus.*

**Statura**



*Statura Ph. culmellæ f. pratellæ. Palpi setacei, porrecti, thorace longiores. Alæ superiores striga fusca, altera in medio, repanda; altera posterior, rectiuscula; Striæ longitudinales variæ, posterius copiosiores; margo posticus ciliis brevibus argenteis.*

**carbella.** 363. *P. Tinea* alis flavis lateribus sanguineis.

*Habitat in Lusitania. Vandelli.*

*Statura, magnitudo & convolutio alarum ut in Ph. pascuella, pratella, culmella. Tota lutea est, sed in convolutis alis latera longitudinalia sanguineo colore picta, remanente tamen margine exteriori luteo, latius tamen luteo ad latus interius. Palpi adscendentes.*

**nemorilla.** 364. *P. Tinea* alis albidis incurvaris: superioribus puncto nigro. *Fn. suec. 1371. \**

*Habitat in Xyloteco. Clerck.*

**unguicella.** 365. *P. Tinea* alis cinereis subsæciatis apice recurvato-acuminatis, margine exteriori postico transverse albidistriatis. *Fn. suec. 1382. Clerck. phal. t. 12. f. 7.*

*Habitat in Europa.*

**ramella.** 366. *P. Tinea* alis cinereo-albidis apice acuminatis: arcu communi fusco. *Fn. suec. 1376. \**

*Habitat intra ramos Quercus.*

**Salicella.** 367. *P. Tinea* alis cærulescenti-cinereis: latere dorsali punctis albidis, thorace cristato. *Fn. suec. 1378. \**

*Raf. inf. 1. phal. 4. t. 9.*

*Wilk. pap. 5. t. 1. a. 10.*

*Habitat in Salice; Tortrix.*

*Parva fusca, punctis albis, 16-poda.*

**Cynosbatella.** 368. *P. Tinea* alis griseis antice albidis, thorace cristato. *Fn. suec. 1379. \**

*Reaum. inf. 3. t. 2. f. 6?*

*De Geer inf. 1. t. 34. f. 4, 5.*

*Habitat in Rosæ gemmis.*

Cuculliones sunt harum pleraque, quæ instar fuerit litteratorum malevolo dente rodunt aliena opera, ut sibi opusculum conficiant, sub quo latent. Scop. 669.

foenella. 369. *P. Tinea* alis fuscis: maculis albissimis: anteriore falcata, posteriore reniformi. *Fn. suec.* 1375. \* *Clerck. phal. t. 2. f. 13.*  
*Habitat in Europa.*

vestianel- 370. *P. Tinea* alis cinereis costa albis: apicibus adscen-  
 la. dentibus plumosis, palpis recurvatis. *Fn. suec.* 1417. \*  
*Scop. carn.* 669.

*Habitat in Vestimentis, quæ destruit.*

*Alæ lanceolatae, glauca atomis nigris, costa marginali nivea. Inferiores subulatae, plumbeae, utrinque latissime ciliatae. Palpi prominentes, recurvi. Antennæ breviores, albo annulatae.*

tapetzella. 371. *P. Tinea* alis nigris postice albidis, capite niveo.  
*Fn. suec.* 1414. \* *Clerck. phal. t. 11. f. 12.*

*Reaum. inf. 3. t. 20. f. 2-4.*

*Raf. inf. 204. n. 98.*

*Habitat in Tapetibus, Pellibus, intra cylindros meatuum rodens.*

pellionel- 372. *P. Tinea* alis canis medio puncto nigro, capite sub-  
 la. griseo. *Fn. suec.* 1415.

*Reaum. inf. 3. t. 6. f. 12-16.*

*Raf. inf. 1. phal. 4. t. 17.*

*Geoffr. paris. 2. p. 184. n. 6.*

*Habitat in Vestimentis pilosis, quæ misere devastat, intra cucullum latitans.*

farcitel- 373. *P. Tinea* alis cinereis, thorace utrinque puncto albo.  
 la. *Fn. suec.* 1416. \*

*Reaum. inf. 3. t. 6. f. 9, 10.*

*Raf. inf. 1. phal. 4. t. 17.*

*Habitat in Vestimentis, quæ destruit, intra folliculum occultata.*

nifella. 374. *P. Tinea* alis superioribus cinereo-nebulosis: macula communi ovata nigra. *Faun. suec.* 1377. \*  
*Clerck. phal. t. 12. f. 6.*

*Scop. carn.* 634.

*Habitat in Europa.*

Mello- 375. *P. Tinea* alis canis postice purpurascens striga  
 nella. alba, scutello nigro apice candido. *Fn. suec.* 1383.  
*Svamm. bibl. 1. t. 26. f. 2.*

*Raf.*

*Roef. inf. app.* 242. *t.* 41.

*Reaum. inf.* 3. *t.* 19. *f.* 7 - 9.

*Habitat in Apum alvearibus, angiportus favos penetrantes struens, uti Cereana & Sociella.*

**euculla-** 376. *P. Tinea* alis albido-cinereis: antice striga nigra recurvata. *Fn. suec.* 1384. \*

*Rœf. inf.* 1. *phal.* 4. *t.* 11.

*Habitat in Sorbo intra folliculum conicum pilosum.*

**granella.** 377. *P. Tinea* alis albo nigroque maculatis, capite albo. *Fn. suec.* 1413. \*

*Leuw. epist.* 1692. *mart.* 7.

*Rœf. inf.* 1. *phal.* 4. *t.* 12.

*Reaum. inf.* 3. *t.* 20. *f.* 14, 16.

*Baker. microsc.* 1. 13. *f.* 13.

*De Geer Act. Stockb.* 1746. *p.* 48.

*Geoffr. parif.* 2. *p.* 186. *n.* 11.

*Habitat in Frumentorum granariis semina rodens conglomeransque, hyeme parietes adscendens*

**Lappella.** 378. *P. Tinea* alis pallidis puncto nigro: apice adscendentibus. *Fn. suec.* 1425. \* *Clerck. phal.* *t.* 11. *f.* 15.

*Act. Stockb.* 1752. *p.* 66.

*Habitat in Arctii capitulis intra Semina. Renström.*

*Larva hexapoda uti Proletella.*

**proletella.** 379. *P. Tinea* alis albidis punctis duobus fuscis, lingua inflexa. †

*Vallisn. nat.* 1. *p.* 372. *t.* 379.

*Reaum. inf.* 2. *t.* 25.

*Habitat in Brassica, Chelidonio; an etiam in Quercu?*

*Parit quotannis 200000 joboles; dum 12 progenies ponant 12 ova singula.*

**Arbutella.** 380. *P. Tinea* alis sanguineis: fasciis argenteis tenuissimis. *Fn. suec.* 1385. \*

*Habitat in Uva ursi.*

**teffella.** 381. *P. Tinea* alis nigris: fasciis duabus albis remotissimis teffellatis. *Fn. suec.* 1430. \*

*Habitat in Europa.*

- vittella. 382. *P. Tinea* alis cinereis: vitta dorsali communi nigra, margine postico atro-punctato. *Fn. suec.* 1366.\*  
*Clerck. phal. t. 15. f. 10.*  
*Habitat in Europa.*  
*Linea obsoletior nigra, in medio alba & brevis in apice.*
- ustella. 383. *P. Tinea* alis superioribus margine inferiore longitudinali cinereo. *Fn. suec.* 1434.\* *Clerck. phal. t. 3. f. 13.*  
*Habitat in Europa.*
- parenthe- 384. *P. Tinea* alis superioribus testaceis linea longitudinali albida. *Fn. suec.* 1435.\*  
 sella. *Habitat in Europa.*
- elongella. 385. *P. Tinea* alis linearibus testaceis, antennis mediocribus. *Fn. suec.* 1436.\*  
*Habitat in Europa.*
- punctella. 386. *P. Tinea* alis superioribus linearibus testaceis: punctis 4 fuscis. *Fn. suec.* 1437.\*  
*Habitat in Pomariis; sedens apicibus alarum innititur. Bergman.*
- bicoftella. 387. *P. Tinea* alis lanceolatis cinereo-albidis costa longitudinali fusca margine niveo. *Fn. suec.* 1438.\*  
*Clerck. phal. t. 3. f. 15.*  
*Scop. carn. 642.*  
*Habitat in Europa.*  
*Palpi longi. Alæ linea fusca margini alba adnata.*
- tetrapo- 388. *P. Tinea* grisea: linea longitudinali nivea: lunula  
 della. fusca postice dissecta.  
*Habitat in Ceraso; quiescens pedibus 4 innititur, posticis occultatis.*  
*Linea alba a fronte per dorsum ducta, postice lunula interrupta.*
- Xylostel- 389. *P. Tinea* alis cinereo-fuscis: vitta dorsali com-  
 la. muni albo-flavescente abbreviata. *Fn. suec.* 1390.\*  
*Raf. inf. 1. t. 10.*  
*Habitat in Lonicera Xylosteo, in Cheiranthi floribus. Kækeritz.*

*Sedens*

*Sedens fusca, sed tenia communi alba flavescent ab apice rostri ad medium alarum. Apices alarum adscendentes biantes. Antennæ rectæ protensæ, distantes.*

cinclælla. 390. *P. Tinea* alis nigris: superioribus fascia lineari argentea transversa. *Faun. suec.* 1380. \*

*Scop. inf.* 651. *Phalæna verticella.*

*Habitat in Populo? sedens sese circumgyrat sapius circa idem punctum.*

*Alæ planæ sunt in sedente. Scop.*

leucatella. 391. *P. Tinea* alis nigricantibus: fasciis 2, posteriore obsolete capiteque albis, palpis reflexis. *Fn. suec.* 1444. \*

*Habitat in Europa.*

*Media. Antennæ nigro annulata. Dorsû fascia anterior antice transversa, postice rotundata.*

einerella. 392. *P. Tinea* alis fusco-cinereis immaculatis nitidulis, palpis corniformibus. *Faun. suec.* 1445. \*

*Habitat in Europa.*

*Palpi clavati, recurvi, apice setacei.*

trigonella. 393. *P. Tinea* alis fuscis: macula communi dorsali duplici alba trigona. *Fn. suec.* 1373. \*

*Habitat in Juniperetis Europæ.*

rhomboidella. 394. *P. Tinea* alis fuscis: macula rhombea nigra. *Fn. suec.* 1372.

*Habitat in Europæ sylvis.*

tertianella. 395. *P. Tinea* alis cinereis: fasciis obscurioribus sesquitertiis. *Fn. suec.* 1429.

*Habitat in Europa.*

scabrella. 396. *P. Tinea* alis albis: dorso nigro-striatis exasperatis, palpis spinosis. *Fn. suec.* 1446. \*

*Habitat in Europa.*

*Palpi porrecti cum spina in horum dorso; in dorso alarum squamæ erectæ, unde scabra evadit.*

asperella. 397. *P. Tinea* alis albidis: macula communi fusca; apicibus nigro punctatis retulis. *Fn. suec.* 1447.

*Habitat in Europa.*

*Palpi porrecti. Macula alarum dorsalis exasperata squamis recurvatis; Alæ inferiores emarginatæ lobo superiore rotundato.*

ferratella. 398. *P. Tinea* fusca, tribus posticis corpore longioribus barbatis. *Fn. suec.* 1448. \*

*Habitat in Pyri foliis, intra cucullum cristatum. D. C. Solander.*

Populella. 399. *P. Tinea* alis canescentibus fusco nigroque nebulo-  
sis; posticis pilis flavescens. *Fn. suec.* 1442. \*

*Habitat in Populo. J. Alströmer.*

*Statura P. Mercurellæ.*

mercurel- 400. *P. Tinea* alis albido cinereis subfasciatis medio pun-  
la. ctio albo & cincto. *Fn. suec.* 1441. \*

*Habitat in Europa.*

Pomo- 401. *P. Tinea* alis nebulosis postice macula rubra aurea.  
nella. *Fn. suec.* 1418. \*

*Frisch. inf.* 7. t. 10.

*Raf. inf.* 1. phal. 4. t. 13.

*Reaum. inf.* 2. t. 40. f. 9, 10.

*Wilkes pap.* 5. t. 1. a. 9.

*Habitat intra Poma Pyri.*

Strobi- 402. *P. Tinea* alis fuscis argenteo-undatis: inferioribus  
lella. fuscis margine albo. *Fn. suec.* 1419. \* *Clerck. phal.*  
t. 12. f. 10.

*Habitat in Abietis strobilis.*

Turio- 403. *P. Tinea* alis griseo-albis nitidulis, thorace luteo.  
nella. *Fn. suec.* 1420. \* *Clerck. phal.* t. 12. f. 15.

*Habitat intra Pini turiones.*

dodecel- 404. *P. Tinea* alis griseis pallido fasciatis: punctis trium  
la. parium fuscis. *Fn. suec.* 1421. \*

*De Geer inf.* 1. t. 22. f. 22, 23.

*Habitat intra Pini turiones.*

Cembrel- 405. *P. Tinea* alis fuscis, atomis albis irroratis. *Fn. suec.*  
la. 1422. \*

*Habitat in Pino sylvestri, intra folliculum scabrum.*

Resinella. 406. *P. Tinea* alis fuscis: fasciis cinereo-argenteis. *Fn.*  
*suec.* 1423. \*

*Frisch. inf.* 10. t. 9.

*De Geer inf.* 1. t. 33. f. 12, 13.

*Raf. inf.* 1. phal. 4. t. 16.

*Habi-*

*Habitat intra Resinæ glomerem exsudantem e vulnere ramorum Pini.*

- Tædella. 407. *P. Tinea* alis fuscis: fasciis tribus maculisque totidem albis bifidis. *Fn. suec.* 1424. *Clerck. phal. 2.* 10. f. 13.

*Habitat in Abiete. Claud. Alstræmer.*

- Juniperella. 408. *P. Tinea* alis cinereis: striga alba undulata punctisque 4 nigris. *Fn. suec.* 1449. \*

*Habitat in Junipero, ramulos connectens. C. Clerck. Striga alba pone puncta 4 nigra.*

- fuscella. 409. *P. Tinea* alis fusco-cinereis: superioribus punctis duobus anoque subrus macula nigris. *Faun. suec.* 1349. *Habitat in domibus.*

*Litura etiam fusca versus angulum posticum exterioremque alæ superioris.*

- minutella. 410. *P. Tinea* alis nigricantibus: maculis transversis ferrugineis. *Fn. suec.* 1440. \*

*It. Scan. 216. Ph. nigra maculis 4 transversis ferrugineis.*

*Habitat in Europa.*

*Compositis alis in tergo angulus ferrugineus.*

- Corticella. 411. *P. Tinea* alis griseis margine aureo-punctatis postice trilunatis. *Fn. suec.* 1428.

*Habitat intra Corticem Arborum virentium, imprimis pomiferarum,*

- stipella. 412. *P. Tinea* alis nigris: maculis 3 sulphureis. *Fn. suec.* 1427. \* *Clerck. phal. 2. 12. f. 5.*

*Habitat in Europa. D. C. Solander.*

*Alæ superiores nigre macula sulphurea ad basin; alia in medio non tangens marginem anteriorem; alia ante apicem non tangens marginem tenuiorem.*

- sylvella. 413. *P. Tinea* alis lutescentibus: fasciis duabus ferrugineis obliquis.

*Habitat in Europa: Upsaliæ. D. Fabricius.*

*Corpus subluteum. Caput barbatur. Palpi acuminati, subtus longius fasciculato-barbati. Antennæ mediores, fuscae, pallidi annulatae. Alæ superiores ob-*

*longa, testaceo-flava fasciis 2 obliquis a dorso versus posteriora ductis; alæ postice adscendunt.*

**gemmel-** 414. *P. Tinea* alis nigro albo argenteoque nebulosis, capite albo. *Fn. succ.* 1388. \* *Clerck. phal.* 1. 10. f. 10.

*Habitat intra Quercus folia, subentanea.*

**bractella.** 415. *P. Tinea* alis nigris macula marginali anticeque luteo-aureis. *Fn. succ.* 1426. \* *Clerck. phal.* 1. 12. f. 4.

*Habitat in Europa*

*Alarum basis ad  $\frac{1}{3}$  totius flava; frons flava; antennæ breves.*

**aristella.** 416. *P. Tinea* albida, alis linea argentea, palpis porrectis capite longioribus aristatis.

*Habitat in Lusitania. D. D. Vandelli.*

*Corpus teres, lineare, Alis convolutis albidum: Linea in medio alæ, longitudinalis, argentea. Palpi capite thoraceque duplo longiores, crassi, hirsuti, porrecti, cum arista prope apicem. Antennæ palpis sesqui-longiores.*

**caudella.** 417. *P. Tinea* alis testaceis caudali linea fusca, palpis porrectis.

*Habitat in Lusitania. D. Vandelli.*

*Corpus teres, magnitudine Ph. pascuella. Alæ superiores in media linea longitudinali fusca; hæc alæ postice caudatæ. Palpi supra basin aristati.*

**capitella.** 418. *P. Tinea* alis nigris: maculis tribus flavescentibus, capite luteo. *Fn. succ.* 1374. \*

*Uddm. diff.* 79. *Ph. nasuta*, alis aureo-fuscis: fasciis argenteis: media interrupta.

*Habitat in Europa.*

**porrectel-** 419. *P. Pinea* alis albicantibus, antennis porrectis approximatis longitudine corporis, palpis recurvis. *Fn.*

*succ.* 1443. \*

*De Geer inf.* 1. 1. 26. f. 15, 16.

*Habitat in Tetradyname plantis variis.*

**Pedella.** 420. *P. Tinea* alis superioribus linearibus luteis: fasciis 3 fuscis, pedibus pollicis transverse extensis. *Fn. succ.*

1433. \*

*Habi-*



*Habitat in Alni foliis subcutanea. T. Bergman.*  
*Minuta alis linearibus.*

argentea. 421. *P. Tinea* tota argentea, antennis fusco annulatis.  
 la. *Fn. succ. 1432. \**

*Habitat in Abiete.*

*Minuta. Alæ inferiores lanceolatae.*

Calthella. 422. *P. Tinea* atra, alis superioribus totis aureis, capite  
 ferrugineo. *Fn. succ. 1432.*

*Habitat in Calthæ palustris floribus.*

*Minuta; differt a Fischella capite ferrugineo & anten-*  
*nis basi minime auritis.*

Petive- 423. *P. Tinea* alis subgriseis litura dorsali flava, apiceque  
 rella. punctis tribus nigris. *Fn. succ. 1381. \* Clerck, phal.*  
*t. 12. f. 11.*

*Habitat in Svecia.*

*Magnitudo P. subcutanearum. Alæ fusco-griseæ; in*  
*medio litura flava, quæ unitur cum alæ opposita ma-*  
*cula; margo exterior intra apicem striatus, & apex*  
*postice punctis tribus nigris notatus.*

Swam- 424. *P. Tinea* antennis longissimis, alis flavescentibus  
 merda- pallidis immaculatis. *Fn. succ. 1391 \* Clerck, phal.*  
 mella. *t. 12. f. 1.*

*Habitat in Europa.*

Reaumu- 425. *P. Tinea* antennis longissimis, alis nigris extrorsum  
 rella. deauratis. *Fn. succ. 1392. \* Clerck, phal. t. 12. f. 2.*  
*Geoffr. parif. 2. p. 193. n. 28.*

*Habitat in Salice.*

*Reaumur obiit 1757. X. 18. ætatis 76.*

De Gee- 426. *P. Tinea* antennis longissimis, alis atris: fascia ar-  
 rella. gentea. *Fn. succ. 1393 \* Clerck, phal. t. 12. f. 3.*  
*Scop. carn. 697.*

*De Geer. inf. 1. t. 32. f. 13.*

*Uddm. diff. 78.*

*Geoffr. parif. 2. p. 28. t. 12. f. 5. /*

*Habitat in Svecia, imprimis ad acidulas sätrenses.*

427.

---

*In his tam parvis, tamque fere nullis, quæ ars! quanta majestas! quam inextricabilis pulchritudo!*

Sultzella. 427. *P. Tinea* antennis mediocribus, alis nigris: superioribus fascia aurea.

*Habitat in Europa.*

*Similis De Geerella, sed Antennae mediocres. Color purpurascens-niger.*

Podacella. 428. *P. Tinea* antennis mediocribus, alis nigris fascia albida.

*Habitat in Svecia.*

*De Geerella dimidio minor. Antennae longitudine alarum. Ala fascia aequali.*

Robertel- 429. *P. Tinea* antennis longissimis albis, alis fuscis: angulo ani albo. *Fn. svec. 1394.\**

*Habitat in Europa.*

Geoffrel- 430. *P. Tinea* antennis mediocribus, alis fuscis argenteo striatis: maculis duabus flavis marginalibus.

*Habitat in Germania. D. Blom.*

*Alae fusco-flavescentes. Maculae in medio, 2, flavae, subtrigona; altera ad marginem exteriorem, ad interiorem altera. Ante maculas alae argenteo, post nigro strintae. Pedes longi, barbati, spinosi.*

Mouffetella. 431. *P. Tinea* antennis brevibus albo annulatis, alis lividis: atomis oblongis fuscis. *Fn. svec. 1397.\**

*Habitat in Europa.*

*Alae valde acuminatae.*

Listerella. 432. *P. Tinea* antennis mediocribus albo subannulatis, alis fuscis. *Fn. svec. 1395.\**

*Habitat in Europa.*

Frischel- 433. *P. Tinea* antennis mediocribus apice albis, alis fusco auratis. *Fn. svec. 1396.*

*Habitat in Europa.*

*Frischius natus 1666. Mart. 15. Mortuus 1743. Mart. 21.*

Scopolel- 434. *P. Tinea* alis fuscis: punctis albis auratisque vagis, antennis albo annulatis subciliatis.

*Habitat Upsaliae. Kakeritz.*

*Parya. Alae nigricantes, minus angustae, quam proximae.*

*Superiores adpersae punctis s. f. 6, albis, vagis, in-*

*aequalibus & aliquot lituris obsoletius albis vagis;*

*& supra unica litura transversa, alba, postica. Omnes*

*mnēs alæ postice albo ciliatæ. Antennæ corpore breviores, ciliatæ, si oculo armato inspiciantur.*

**Albinella.** 435. *P. Tinea* alis fuscis: linea 1 aurea antrorsum arcuata. *Fn. suec.* 1398. \*

*Habitat in Europa.*

**Gædar-tella.** 436. *P. Tinea* alis auratis: fasciis 2 argenteis: priore antrorsum, posteriore rettorsum arcuata. *Faun. suec.* 1401. *Clerck. phal. t. 12. f. 14.*

*Habitat in Alnetis, pedibus tantum quatuor insidens; posticis duobus protensis. T. Bergman. in Betula gemmis. Kækeritz.*

**Leuven-hœkella.** 437. *P. Tinea* nigra, alis superioribus fuscis: fasciis 2 macula lineaque argenteis. *Fn. suec.* 1400. \*

*Habitat in Europa.*

**Meria-nella.** 438. *P. Tinea* alis nigris: fasciis 3 argenteis transverse divaricatis. *Fn. suec.* 1402. \*

*Reaum. inf. 1. t. 17. f. 12.*

*Geoffr. parif. 2. p. 198. n. 43.*

*Habitat in Pruno, Pado.*

**Wilkella.** 439. *P. Tinea* alis nigris: fasciis 4 argenteis arcuatis: 1 secunda recta. *Fn. suec.* 1403. \*

*It. gotl. 260.*

*Reaum. inf. 3. t. 4. f. 8.*

*Geoffr. inf. 2. p. 43. B.*

*Habitat in Europa.*

**Lyonne-tella.** 440. *P. Tinea* alis flavis: fasciis 4 argenteis: tertia superne bifida. *Fn. suec.* 1404. \*

*Habitat in Europa.*

**Bonnetella.** 441. *P. Tinea* alis albis: lineis 2 argenteis, posticisque undatis. *Fn. suec.* 1399.

*Habitat in Europa.*

**Jungiella.** 442. *P. Tinea* alis fuscis: maculis septem albis duplicatis: tertia fasciali ultimaque simplici. *Fn. suec.* 1410. \*

*Clerck. phal. t. 12. f. 9.*

*It.*

*Subcuranæ hæc minutissimæ, quæ intra folii substantiâ vivunt, rodunt, sæpius 14-podæ, sed sunt etiam subventanæ Muscæ, Tenthradines, Curculiones, Chrysomela, Dermestides &c.*

*It. wgoth.* 141. *P. T.* alis superioribus lunula alba &c.  
*Habitat in Europa.*

**Scheffella.** 443. *P. Tinea* alis nigris disco flavis: striga lineisque  
duabus punctisque tribus argenteis. *Fn. suec.* 1409.\*  
*It. scanic.* 112. *Phalæna Fagi.*  
*Habitat in Fagi foliis subcutanea.*

**Rhediella.** 444. *P. Tinea* alis nigris apice fulvis: strigis interruptis  
argenteis. *Fn. suec.* 1405.\* *Clerck. phal. t. 12. f. 12.*  
*Habitat in Europa.*

**Rœfella.** 445. *P. Tinea* alis nigro-auratis: punctis 9 argenteis  
convexis submarginalibus. *Fn. suec.* 1406.\* *Clerck.*  
*phal. t. 12. f. 13.*  
*Frisch. inf. 3. p. 31. t. 4.*  
*De Geer inf. 1. t. 30. f. 10-12.*  
*Habitat in Mali foliis subcutanea, omnium pulcherri-*  
*ma; etiam in Abietis foliis.*  
*Ala lutea. Punctum tertium argenteum in fasciam*  
*excurrit opposita ala puncto junctum, ut & aliud*  
*punctum brevius dorso connexum. Antenna albo an-*  
*nulata.*

**Linne-**  
**ella.** 446. *P. Tinea* alis fuscis: punctis tribus argenteis eleva-  
tis. *Clerck. phal. t. 12. f. 8.*  
*Fn. suec.* 1408.\*  
*Geoffr. paris. 2. p. 200. n. 45.*  
*Habitat in Pomariis.*  
*Antennæ apice albæ.*

**Rajella.** 447. *P. Tinea* alis auratis: maculis 7 argenteis: secunda  
tertiæque connatis. *Fn. suec.* 1407.\*  
*De Geer inf. 1. t. 31. f. 11, 12.*  
*Habitat in Alni foliis subcutanea.*  
*Similis Gudartellæ.*

**Brunni-**  
**chella.** 448. *P. Tinea* atra, alis fasciis tribus violaceis.  
*Habitat in Lusitania. Vandelli.*  
*Corpus minutum, lineare, planiusculum, atrum. An-*  
*tennæ corpore breviores, infra apicem albæ. Alæ atræ*  
*fasciis tribus violaceis s. chalybis candefacti colore,*  
*quarum prima ad basin, secunda in medio, tertia*  
*curva ad apicem. Cilia postice inter alarum apices,*  
*subulata in plures dentes.*

Harrisell- 449. *P. Tinea* alis aureo-argenteis apice obtuso ustulato  
la. subocellato. *Faun. suec.* 1412.\*  
*Habitat in Europa.*

Clerckel- 450. *P. Tinea* alis argenteis postice fusco-auratis cauda-  
la. tis: ocello terminali atro. *Faun. suec.* 1411.\*  
*Habitat in Svecia. C. Clerck. oblit.* 1765. *Julii* 22.  
*Phibisi.*  
*Corpus minimum, totum argenteum. Alæ superiores*  
*ad apicem caudatæ cum ocello rotundo atro.*

occultel- 451. *P. Tinea* fusca albido-subfasciata.  
la. *Habitat in meo Hammarby, hora matutina in fenestris*  
*lecta sæpius.*  
*Phalanarum omnium minutissima, vix seta equina*  
*crassitie, palpis prominentibus; nisi velites vix digno-*  
*scenda.*

Liche- 452. *P. Tinea* femina aptera lævis nigra. *Fa. suec.* 1451.\*  
nella. *Habitat in Lichene candelari super muros & rupes in-*  
*tra cucullum; plures Larvas exclusit, nullas allatas*  
*phalenas obtinuit T. Berman.*

\* 7 \* ALUCITÆ.

monoda- 453. *P. Alucita* alis patentibus linearibus indivisis. *Fa.*  
ctyla. *suec.* 1452.\*  
*Reaum. inf.* 1. t. 20. f. 12-16.  
*Habitat in Europa.*

didactyla. 454. *P. Alucita* alis patentibus fissis fuscis: strigis albis:  
anticis bifidis, posticis tripartitis. *Faun. suec.* 1453.\*  
*Scop. carn.* 672.  
*Raj. inf.* 205. n. 101.  
*Reaum. inf.* 1. t. 20. f. 12-15.  
*Pet. gaz.* t. 66. f. 10.  
*Geoffr. parif.* 92. *Pterophorus* fuscus.  
*Schæff. elem.* t. 104.  
*Habitat in Convolvulo, Geo rivali.*

tridactyla. 455. *P. Alucita* alis patentibus fissis pallidis: lineis albis.  
*Habitat in Europa.*  
*Alæ superiores bifidæ, inferiores trifidæ.*

tesseradactyla. 456. *P. Alucita* alis patentibus fissis cinereo-nebulosis; posticis fuscis. *Fn. Suec.* 1454. \*  
*Habitat in Europa.*

tetractyla. 457. *P. Alucita* alis patentibus fissis flavescentibus. *Fn. Suec.* 1455. \*  
*Habitat in Europa.*

pterodactyla. 458. *P. Alucita* alis patentibus fissis testaceis: puncto fusco. *Faun. Suec.* 1456. \*  
*Scop. carn.* 674.  
*Habitat in Europa.*

pentadactyla. 459. *P. Alucita* alis patentibus fissis quinquepartitis nigris: digito quinto distincto. *Fn. Suec.* 1257. \*  
*Reaum. inf.* 1. t. 20. f. 1-2.  
*Raf. inf.* 1. phal. 4. t. 5.  
*Pet. gaz.* t. 67. f. 6.  
*Amiral. inf.* t. 23.  
*Sultz. inf.* t. 16. f. 10.  
*Geoffr. paris.* 2. p. 91. *Pterophorus albus.*  
*Habitat in Suecia.*

hexadactyla. 460. *P. Alucita* alis patentibus fissis: singulis sexpartitis cinereis. *Fn. Suec.* 1458.  
*Scop. carn.* 676.  
*Reaum. inf.* 1. t. 19. f. 19-21.  
*Frisch. inf.* 7. t. 73.  
*Geoffr. paris.* 2. p. 92. *Pterophorus cinereus.*  
*Pet. gaz.* t. 67. f. 7.  
*Habitat in Lonicera Xylosteo.*

## IV. NEUROPTERA.

Alæ IV, *nudæ, venis reticulatæ.*

Cauda *sæpius aliquo sexus adminiculo instructa, inermis.*

234. LIBELLULA. Os maxillosum: maxillis pluribus.

*Antennæ thorace breviores.*

*Alæ extensæ.*

*Cauda (Maris) hamoso-furcata.*

\* *Alis patentibus acquiescentes.*

4-maculata. 1. L. alis posticis basi omnibusque mediis antico macula nigricante. *Fn. suec. 1459.*

*Scop. carn. 679.*

*Fn. suec. 1. n. 764. L. alis macula marginali duplici.*

*Raj. inf. 49. n. 3.*

*Reaum. inf. 6. t. 35. f. 1, 2.*

*Geoffr. paris. 2. p. 224. n. 6.*

*Habitat in Europa.*

*Thorax maculis 2 glaucis: altera biloba.*

flaveola. 2. L. alis basi luteis. *Fn. suec. 1460. \**

*Raj. inf. 49. n. 4.*

*Roef. inf. 2. aqu. 2. t. 5. f. 4.*

*Geoffr. paris. 2. p. 225. n. 7. t. 13. f. 1.*

*Schæff. inf. t. 4. f. 1.*

*Habitat in Europa.*

*Hæc inter minores: variat variis alis absque basi lutea; forte sexu. Thorax basi maculis punctisque luteis.*

vulgata. 3. L. alis hyalinis, corpore gilisco, cauda simplici. *Fn. suec. 1461. \**

M m m

*Scop.*

*Libellule declarantur sunt Accipitres gymnopterorum; Larvæ intra aquam currunt. Crocodyli crudes insectorum a naticorum; Illarum patentes Lepidoptera, ceteræ Diptera imprimis prædantur.*

*Scop. carn.* 680.

*Raj. inf.* 49. n. 6.

*Raf. inf.* 2. *aqv.* 2. t. 8.

*Habitat in Europa.*

rubicunda. 4. *L. alis tantum posticis basi nigricantibus.* *Fn. suec.* 1462. \*

*Raf. inf.* 2. *aqv.* 2. t. 7. f. 4.

*Raj. inf.* 50. n. 8.

*Habitat in Europa.*

*Sexus alter a tergo thoracis & abdominis maculis rubris; alter luteis.*

depressa. 5. *L. alis omnibus basi nigricantibus, thorace lineis duabus flavis, abdomine lanceolato lateribus flavescente.*

*Fn. suec.* 1413. \*

*Scop. carn.* 678.

*Raj. inf.* 140. & 49. n. 4. 5.

*Reaum. inf.* 6. t. 35. f. 1.

*Raf. inf.* 2. *aqv.* t. 6. f. 4.

t. 7. f. 3.

*Edw. av.* t. 333.

*Geoffr. paris.* 2. p. 226. n. 9.

*Habitat in Europa.*

*Hæc interdum abdominis tergo carulescente occurrit.*

vulgatissima. 6. *L. thorace flavo strigis octo nigris.* *Fn. suec.* 1464. \*

*Swamm. quart.* t. 8. f. 6.

*Raf. aquat.* 2. t. 5. f. 3.

*Geoffr. paris.* 2. p. 227. n. 11.

*Habitat in Europa.*

cancellata. 7. *L. alis basi immaculatis, abdomine dorso lateribusque interrupte luteis.* *Fn. suec.* 1465. \*

*Habitat in Europa.*

*Thorax luteo fuscoque fasciatus.*

ænea. 8. *L. thorace æneo-viridi.* *Fn. suec.* 1466. \*

*Fn. suec.* 1. n. 768, 769. *L. thorace viridi nitido lineis flavis.*

*Raj. inf.* 49. n. 5. & 140.

*Raf.*

---

*Libellula Mar, visa sociâ, ut eam devirginet, caudâ forcipe apprehendit femina collum, quo verâ illa, vinci nolens volensve, liberatur, caudâ suâ vulviserâ repellit proci pectus, ubi maris arma latent, sic unitis sexibus obvolitat propria lege. Vido Swammerd., Rajum, Reaumurium,*



*Ræs. inf. 2. aqu. 2. t. 5. f. 2.*

*Geoffr. parif. 2. p. 226. n. 10.*

*Habitat in Europa.*

grandis. 9. *L. alis glaucescentibus, thoracis lineis quatuor flavis,*  
*Fn. suec. 1467.*

*Act. nidr. 3. p. 412. t. 6. f. 9.*

*Mouff. inf. 67. n. 2, 3.*

*Raj. inf. 49. n. 2. & 140. n. 2.*

*Reaum. inf. 6. t. 35. f. 3.*

*Ræs. inf. 2. aqu. 2. t. 4. f. 14.*

*Schæff. inf. t. 2. f. 4.*

*Geoffr. parif. 2. p. 227. n. 12.*

*Habitat in Europa.*

*Macula carulea supra basin alarum.*

junceæ. 10. *L. alarum membranula accessoria nigricante, thorace*  
*lineis sex flavis, abdomine basi attenuato. Fn. suec.*  
*1468.*

*Schæff. inf. t. 6. f. 10.*

*Habitat in Europa.*

*Alarum posticarum membranula bascos nigricans in*  
*hac specie.*

forcipata. 11. *L. thorace nigro characteribus variis flavescentibus,*  
*cauda unguiculata. Fn. suec. 1469.\**

*Pet. mus. 84. n. 819.*

*Reaum. inf. 4. t. 10. f. 4.*

*6. t. 35. f. 5.*

*Geoffr. parif. 2. p. 228. n. 13.*

*Habitat in Europa.*

*Cauda unguibus tribus incurvatis.*

fasciata. 12. *L. alis planis fuscis: fascia alba lineari.*

*Edw. av. 174. t. 174.*

*Habitat in India. De Geer.*

umbrata. 13. *L. alis planis albis: fascia fusca.*

*Habitat in America. Rolander.*

*Alarum fascia in medio; apices alarum obscuriores.*

dimidiata. 14. *L. alis planis a basi ad medium nigris.*

*Habitat in America. Rolander.*

*Margo alarum etiam fuscus est, cæterum hyaline. Cau-*  
*da duobus parvis mucronibus.*

M m m 2

15. *L.*

chinensis. 15. *L. alis superioribus testaceo-obsoletis; secundariis viridibus apicè fuscis.*

*Edw. av. 112 t. 112.*

*Habitat in China.*

america. 16. *L. alis purpurascētibz: fascia alba, primoribus apice albis; posticis linea bascos alba.*

*Edw. av. 174 t. 174.*

*Habitat in America.*

*Corpus viride. Alæ fusco-purpurascētes.*

carolina. 17. *L. alis patentibus hyalinis: posticis basi tota late ferruginea. Amoen. acad. 6. p. 411. n. 85.\**

*Habitat in Carolina.*

variegata. 18. *L. alis patentibus fusco-cærulescente flavoque variegatis: apice hyalinis. Amoen. acad. 6. p. 412. n. 86.\**

*Habitat in Indiis.*

capensis. 19. *L. alis patentibus albidis fusco undique maculatis punctatisque.*

*Habitat ad Cap. b. spei.*

*Corpus magnitudine L. grandis, flavescens, pilosum, imprimis pectore. Abdomen lineare, subtus nigricans, apice forcipatum unguibus duobus, acutis, incurvis. Alæ superiores pallido-albicantes, undique maculis parvis & copiosis punctis fuscis adspersæ. Inferiores albidiores fasciis 3 s. 4, inæqualibz, fuscis & punctis sparsis fuscis.*

\* \* *Oculi distantes remotique.*

Virgo. 20. *L. alis erectis coloratis. Faun. suec. 1470.\**  
*Scop. carn. 681.*

*α. Libellula corpore sericeo nitido, alis luteo-fuscis margine immaculatis Faun. suec. 1. n. 756.*

*Raf. aqu. 2. t. 9. f. 7.*

*Raj. inf. 50. n. 11.*

*Schoeff. elem. 1. 78. f. 1.*

*Geoffr. parisi. 2. p. 221. n. 1.*

*β. Libellula corpore sericeo nitido, alis viridi-cærulescentibus apice fuscis; margine immaculatis. Faun. suec. 1. n. 757.*

*Raj.*

*Raj. inf.* 50. n. 10.

*Homb. Aët. Paris.* 3. p. 145.

*Reaum. inf.* 6. t. 35. f. 7.

*Leuwenh. arc.* 19. t. 19.

- γ. Libellula corpore viridi-cæruleo, alis subfuscis: puncto marginali albo. *Faun. suec.* 1. n. 758.

*Raf. aqu.* 2. t. 9. f. 6.

*Raj. inf.* 51. n. 12.

- δ. Libellula corpore sericeo nitido, alis inaurato-fuscis: macula nigra. *Fn. suec.* 1. n. 759.

*Monff. inf.* 68. f. 1, 3.

*Raf. aqu.* 2. t. 9. f. 5.

*Raj. inf.* 50. n. 9. & p. 140. n. 2.

*Habitat in Europæ fluviiis.*

Varietates hujus numerosæ: 1. alis glaucis. 2. Alis fuscescentibus. 3. Alis nigris. 4. Alis hyalinis fasciâ lata nigra. 5. Alis hyalinis apice albis. 6. Alis apice fuscis puncto albo.

- Puella. 21. L. alis erectis hyalinis. *Fn. suec.* 1471. \*

*Scop. carn.* 682.

- α. Libellula corpore sericeo, alis puncto marginali fusco. *Fn. suec.* 1. n. 760.

*Raj. inf.* 51. n. 15.

*Raf. aqu.* 2. t. 10, 11. omnes.

*Reaum. inf.* 6. t. 40. f. omnes.

*Sultz. inf.* t. 17. f. 102.

- β. Libellula corpore incarnato, alis puncto marginali fusco. *Faun. suec.* 1. n. 761.

*Raj. inf.* 51. n. 16. & 52. n. 17.

*Reaum. inf.* 6. t. 35. f. 4. & t. 4. t. 11. f. 6.

*Raf. inf. aqu.* 2. t. 10, 11.

- γ. Libellula corpore sericeo, alis puncto marginali nigro. *Faun. suec.* 1. n. 762.

*Raj. inf.* 140. n. 1.

- δ. Libellula corpore cæruleo cinereoque alterno, alis puncto marginali nigro. *Faun. suec.* 1. n. 763.

*Gæd. inf.* 3. p. 29. f. R.

*List. gæd.* 228. f. 103.

*Reaum. inf.* 6. t. 35. f. 6.

*Geoffr. paris.* 2. p. 222. n. 3.

*Merian. eur.* 78. t. 156.

*Raj. inf.* 53. n. 18.

*Trisch. inj.* 8. t. 11.

M m m 3

Habi-

*Habitat ad prata paludosa, visitans Muscis.*

*Varietates conjunxi, quas copula sepius junctas vidi.*

235. EPHEMERA. Os edentulum absque palpis.  
*Stemmata* II, maxima, supra oculos.  
*Alæ erectæ*: posticis minimis.  
*Cauda* setosa.

\* *Cauda trifeta.*

- vulgata. 1. *E. cauda trifeta*, alis nebuloso-maculatis. *Fn. Suec.* 1472. \*

*Scop. carn.* 683.

*Sultz. inf.* 2. 17. f. 103.

*Geoffr. parif.* 2. p. 238. n. 1.

*Habitat in Europæ aquis.*

*Hujus tanta copia circa Laz Carniolæ, e rivulo quodam, junio M. nascitur, ut Rustici vicini exiguum messum se collegisse putent, nisi quilibet ultra 20 curvus his probe onustos in agrum exoneraverit, stercorationi optime inservientes. Scopol.*

- lutea. 2. *E. cauda trifeta*, corpore luteo, alis hyalinis reticulatis.  
*Habitat in Europa.*

- marginata. 3. *E. cauda trifeta*, corpore fusco, alis albis margine exteriori fusco.

*Habitat in Europa. Fabricius.*

*Similis E. vulgatæ, sed minor & corpore fusco.*

- vespertina. 4. *E. cauda trifeta*, alis nigris: inferioribus albis. *Fann. Suec.* 1480. \*

*It. cel.* 21.

*Geoffr. parif.* 2. p. 139. n. 4.

*Habitat in Europa.*

\* \* *Cauda bifeta.*

- bioculata. 5. *E. cauda bifeta*, alis albis reticulatis, abdomine diaphano. *Fn. Suec.* 1473. \*

*Habi-*

---

*Ephemera Larvæ natant in Aquis; volatiles factæ brevissima fruuntur gaudio. Uno sæpe eodemque die Nuptias, Puerperia, & Exsequias celebrantes.*

*Habitat in Europæ aquis.*

*Alæ, ut totum corpus, pallide flavescentes.*

- fulcata. 6. *E. cauda bifeta, corpore fusco, alis segmentisque abdominis variis albis. Faun. suec. 1474. \**

*Habitat in Europa.*

*Abdominis segmenta 1, & ultima quatuor, nec non spiracula fusca sunt.*

- nigra. 7. *E. cauda bifeta, corpore nigro, alis nigricantibus: inferioribus minimis. Fn. suec. 1478.*

*Habitat in Europa.*

- culiciformis. 8. *E. cauda bifeta, alis albis, corpore fusco. Fn. suec. 1475. \**

*Pod. inf. t. 1. f. 10.*

*Geoffr. paris. 2. p. 240. n. 6.*

*Habitat in Europæ aquis.*

- horaria. 9. *E. cauda bifeta, alis albis margine crassiore nigricantibus. Fn. suec. 1476. \**

*Swamm. quart. 87. Ephemera minima.*

*Geoffr. paris. 2. p. 240. n. 8.*

*Habitat in Europæ aquis.*

- striata. 10. *E. cauda bifeta, alis hyalinis striatis, thorace fusco, abdomine albo.*

*Fn. suec. 1479. Ephemera mutica.*

*Geoffr. paris. 2. p. 240.*

*Habitat in Europa.*

- diptera. 11. *E. cauda bifeta, alis duabus, costa marginali fusca cinereo maculata. Fn. suec. 1477. \**

*Habitat in Europa.*

*Alæ inferiores vix ullæ.*

236. PHRYGANEA. Os edentulum: Palpis IV.  
*Stemmata* III.  
*Antennæ* thorace longiores.  
*Alæ* incumbentes: inferioribus plicatis.

\* *Cauda aristata setis 2 truncatis* (Perlæ Geoffr.)

- bicaudata. 1. *P. cauda bifeta, alis venoso-reticulatis.* *Fn. suec.* 1489.  
*Scop. carn.* 705. *Phryganea maxima.*  
*Wagn. belv.* 227, 228, 229.  
*Reaum. inf.* 3. t. 13. f. 12.  
*Sulz. inf.* 1. 17. f. 6.  
*Geoffr. paris.* 2. p. 231. t. 13. f. 2. *Perla* 1.  
*Habitat in Europæ aquis; Ova unita sub ventre circumfert, ut aranea.* *Scop.*

- nebulosa. 2. *P. cauda bifeta, alis subcinereis.* *Fn. suec.* 1499.  
*Geoffr. paris.* 232. *Perla* 3.  
*Habitat in Europa.*

- Phalænoi-3. *P. nigra, alis albidis: maculis nigris sparsis.* *Fn. suec.*  
*des.* 1481. \*  
*Udam. diff.* 53. f. 16. *Phryganea nigra, alis albo-pal-*  
*lidis: maculis plurimis nigris.*  
*Habitat in Europa.*  
*Speciosissima inter nostrates.*

\* \* *Cauda mutica.*

- reticulata. 4. *P. nigra, alis subferrugineis atro-reticulatis.* *Fn. suec.*  
*1482.\**  
*Habitat in Europa.*  
*Hæc magis rersa, quam reliquæ species.*

- striata. 5. *P. nigra, alis testaceis nervoso-striatis.* *Fann. suec.*  
*1483.\**  
*Scop. carn.* 688.  
*Alb. inf.* 763.  
*Frisch. inf.* 13. t. 3.

*Reaum.*

---

*Phryganeæ Larvæ latent sub aqua intra tubos cylindricos mobiles, a se confectos;  
Declaratæ choreas vespertinas in aëre insirunt; piscantur ab Hirundinibus,  
Perlæ utrum genere differant a Phryganis, nec non, determinabit metamorphosis.*

*Reaum. inf.* 3. t. 13. f. 8, 9, 11.

*Geoffr. paris.* 2. p. 246. n. 1. t. 13. f. 5.

*Habitat in Europa.*

grisea. 6. *P. grisea*, alis superioribus nebulosis: macula marginali nigra. *Fn. suec.* 1484.

*Habitat in Europæ aquosis.*

grandis. 7. *P. alis cinereo-testaceis: lineolis duabus longitudinalibus nigris: puncto albo.* *Fn. suec.* 1485. \*

*Reaum. inf.* 3. t. 14. f. 4?

*Raf. aqu.* 2. t. 17.

*Habitat in Europa, intra cylindrum ex ramentis longitudinalibus ligneis.*

rhombica. 8. *P. alis flavescentibus deflexo-compressis: macula rhombea laterali alba.* *Fn. suec.* 1486. \*

*Reaum. inf.* 3. t. 14. f. 5.

*Raf. inf.* 2. *aqu.* 2. t. 16.

*Schæff. clem.* t. 100.

*Geoffr. paris.* 2. p. 246. n. 2.

*Habitat in Europæ aquosis, intra nidum ex ramentis gramineis transversis.*

bimaculata. 9. *P. alis fuscis: macula laterali duplici flava.* *Fn. suec.* 1487. \*

*Habitat in Europæ aquosis.*

flavilatera. 10. *P. alis reticulatis, cauda inermi, thoracis lateribus flavis.* *Fn. suec.* 1488. \*

*Geoffr. paris.* 2. p. 255. Hemerobius 3.

*Habitat in Europa.*

nigra. 11. *P. alis cæruleo-atris, antennis corpore duplo longioribus.* *Fn. suec.* 1490. \*

*Raf. inf.* 275.

*Geoffr. paris.* 2. p. 250. n. 10.

*Habitat in Europa.*

azurea. 12. *P. alis nigris: postice violaceis.* *Fn. suec.* 1491. \*

*Habitat ad aquas Europæ.*

M m m 5

13. P.

---

*Phryganæ minores a Phalaenarum Tineis minoribus distinguuntur palpis, quibus carent Phalaenæ.*

- ciliaris. 13. *P. nigra*, abdomine utrinque linea alba, tibiis posticis pallidioribus, antennis mediocribus. *Fn. suec.* 1497.\*  
*Habitat in Europa.*
- marginata. 14. *P. nigricans*, alis margine omni flavo.  
*Habitat in Svecia. Th. Bergman.*  
*Corpus nigrum, magnitudine culicis. Thorax vellere testaceo. Alæ nigrae, cinctæ margine luteo. Pedes testacci.*
- longicornis. 15. *P. alis superioribus nebulosis, antennis corpore triplo longioribus. Fn. suec.* 1492.\*  
*Geoffr. parisi. 2. p. 249. n. 7.*  
*Habitat in Europa.*
- filosa. 16. *P. alis cylindrico-incumbentibus flavescens, antennis corpore triplo longioribus. Fn. suec.* 1493.  
*Habitat in Svecia.*
- wæneri. 17. *P. cinerea*, alis posticis pallidioribus: margine interiore piloso albido. *It. wgoth. 44. Faun. suec.* 1494.\*  
*Habitat in Europa, frequens ad Lacum Wænerum Sveciae.*
- albifrons. 18. *P. nigra*, alis exterioribus: strigis linearibus quatuor albis. *Fn. suec.* 1495.\*  
*Habitat in Svecia. T. Bergman.*
- bilineata. 19. *P. nigricans*, alis superioribus utroque margine lineolis duabus transversis albidis. *Fn. suec.* 1496.  
*Habitat in Europa.*
- fusca. 20. *P. fusca immaculata*, alis inferioribus hyalinis. *Fn. suec.* 1500.\*  
*Habitat in Europa.*  
*Pedes subferruginei. Antennæ mediocres.*
- flava. 21. *P. alis flavo-reticulatis, antennis longitudine abdominis. Fn. suec.* 1502.  
*Habitat in Europa.*
- umbrosa. 22. *P. nigra*, alis superioribus lutescenti-nebulosis. *Fn. suec.* 1498.\*  
*Habitat in Europa, ad aquas.*



minuta. 23. *P. nigra*, palpis villosis capite longioribus. *Fn. suec.* 1501. \*

*Habitat in Europa.*

faltatrix. 24. *P. alis hyalinis*: macula viridi albaque, antennis longioribus. *Fn. suec.* 1503. \*

*Habitat in Europa.*

### 237. HEMEROBIUS. *Os dentibus duobus: Palpis IV.*

*Stemmata nulla.*

*Alæ deflexæ (nec plicatæ.)*

*Antennæ thorace convexo longiores, setaceæ, porrectæ.*

pectinicornis. 1. *H. antennis pectinatis*, alis albidis: signaturis nervisque fuscis albo subarticulatis. *Amoen. acad.* 6. p. 412.

*Habitat in America septentrionali.*

*Maxima; Antennæ uno versu pectinata.*

Perlæ. 2. *H. luteo-viridis*, alis hyalinis: vasis viridibus. *Faun. suec.* 1504. \*

*Scop. carn.* 709.

*Geoffr. parif.* 2. p. 253. n. 1. t. 13. f. 6.

*Mouff. inf.* 937. *Musca chrysops.*

*Gæd. inf.* 2. p. 40. t. 14.

*Alb. inf.* t. 64.

*Merian. eur.* 3. p. 49. t. 8.

*Vallisn. nat.* 1. p. 77. t. 2.

*Pet. mus.* 4. n. 6. *Perlæ merdam olens.*

*Raj. inf.* 274. *Musca quadripennis*, corpore luteo viridi.

*Reaum. inf.* 3. t. 33. f. 2. 5, 6. *Leo Aphidum.*

*Raf. inf.* 3. p. 127. t. 21. f. 4, 5.

*Schæff. inf.* t. 5. f. 7.

*Habitat in Europæ plantis, visitans Aphidibus. Ova stipiti capellari insidentia.*

albus. 3. *H. albus*, oculis viridi-æneis. *Fn. suec.* 1506. \*

*Habitat in Europa.*

*Simillimus H. Perlæ, sed alæ vasis etiam albis, simulque venis ciliatis.*

4. *H.*

Chrysops 4. *H. viridi nigroque varius, alis hyalinis maculis reticulatis. Fn. suec. 1505. \**

*Scop. carn. 708.*

*Frisch inf. 4. p. 40. t. 23.*

*Reaum. inf. 3. t. 33. f. 14-15, 16.*

*Rœf. inf. app. 1. p. 126. t. 21. f. 3.*

*Geoffr. parif. 2. p. 454. n. 2.*

*Habitat in Europa.*

Phalænoi-5. *H. testaceus, alis basi macronatis, pollice excisis. Fn. des. suec. 1508. \**

*Schaff. inf. t. 3. f. 11, 12.*

*Habitat in Europa.*

hirtus. 6. *H. alis albis fusco reticulatis: fasciis duabus fuscescentibus. Fa. suec. 1507. \**

*Habitat in Humuletis.*

speciosus. 7. *H. fuscus, alis griseis nigro maculatis.*

*Rœf. inf. B. t. 21. f. 1.*

*Habitat in Africa septentrionali, Germania.*

testaceus. 8. *H. fusco - testaceus, alis nigris corpore triplo longioribus.*

*Habitat in America. Rolander.*

*Corpus totum obscure testaceum. Caput atrum, glaberrimum. Antennæ testaceæ ex globis pilosis, vix thorace longiores. Abdomen brevissimum. Alæ planæ, incumbentes una supra alteram.*

marginata-9. *H. flavus, alis hyalinis margine fuscis corpore triplo longioribus.*

*Habitat in America. Rolander.*

*Similis priori, excepto colore & Antennis paulo longioribus.*

Humuli. 10. *H. alis albis: punctis sparsis fuscis, antennis albo-fuscoque annulatis. Fa. suec. 1510. \**

*Habitat in Europa.*

paganus. 11. *H. alis albis: superioribus obscure subfasciatis, antennis albis.*

*Habitat in Europa: Upsalia.*

*Simi-*

---

*Hemerobii visitant plurimum Aphidibus.*

*Similis H. Humuli: Antennæ & Pedes albi s. pallidi.*  
*Alæ superiores postice quasi strigis nebulosæ, vix manifestis. Alæ omnes, lynceo inspectæ, auratæ fere evadunt.*

- sexpunctatus. 12. H. alis albis: maculis fuscis postice punctis sex distinctis, antennis fuscis. *Fn. succ. 1511. \**  
*Geoffr. parif. 2. p. 250. Phryganea 10.*  
*Habitat in Europa.*  
*Generis forte Phryganeæ.*

- flavicans. 13. H. niger, thorace abdomineque flavis. *Faun. succ. 1512. \**  
*Habitat in Europa.*

- lutarius. 14. H. niger, alis albidis striatis albo maculatis. *Fn. succ. 1513. \**  
*Haffn. pict. t. 12.*  
*Raf. inf. 2. aq. 2. t. 13.*  
*Schæff. elem. t. 97.*  
*Habitat in Europæ plateis, imprimis vere.*  
*Larva Ræselii accedens Ephemeris singulare insectum reddit.*

- pedicularius. 15. H. virefcens, antennis mediocribus. *Fn. succ. 1515. \**  
*Habitat in Europa.*  
*Hic ita Termiti pulsatorio similis, ut dentis alis vix differat facie; an sexu solo?*

238. MYRMELEON. Os maxillosum: Dentibus duobus. *Palpi IV, elongati.*  
*Stemmata nulla.*  
*Cauda maris forcipe e filamentis duobus rectiusculis.*  
*Antennæ clavatæ, longitudine thoracis.*  
*Alæ deflectæ.*

- Libelluloides. 1. M. alis nigro-punctatis maculatisque.  
*M. L. U. 401. Hemerobius Libelluloides. \**  
*Raf. inf. 53. Musca rarissima ad libellas referenda.*  
*Ped. gaz. 6. t. 3. f. 1. Libellula turcica major, alis locutæ.*  
*Libell.*

*Habitat in Europa australi, Oriente, Africa, inque*  
*Cap. b. spei.*

longicorn- 2. *M. alis flavis: maculis duabus nigris difformibus, an-*  
*ne. tennis longitudine corporis.*

*M. L. U. 402. Hemerobius longicornis.*

*Habitat in Europa australi, Africa.*

Formica- 3. *M. alis macula alba marginati postica.*  
*rium.*

*Syst. nat. 10. p. 550. n. 4. Hemerobius Formicaleo.*

*Fn. suec. 1509. \* It. oel. 149, 206.*

*Vallif. oper. 1. p. 77. t. 2.*

*Reaum. inf. 4. t. 14. f. 18, 19. & t. 11. f. 8 & 6.*  
*t. 32, 33, 34.*

*Roes. inf. 3. p. 101. t. 17-20. & t. 21. f. 2.*

*Sultz. inf. t. 17. f. 105.*

*Schaff. elem. t. 65.*

*Poda inf. t. 1. f. 8.*

*Geoffr. paris. 2. p. 258. t. 14. f. 1. Formica-leo.*

*Habitat in Europæ arenosis, retrogradus, sub fovea ex-*  
*cavata Formicis præcipitatis victitans.*

*Os flavescens, uti Pedum articuli ad basin. Alæ no-*  
*stratis absque maculis fuscis.*

Formica- 4. *M. alis immaculatis hyalinis, antennis setaceis.*  
*lyn.*

*Syst. nat. 10. p. 550. n. 5.*

*Roes. inf. 3. t. 21. f. 2.*

*Habitat in Africa.*

barbarum. 5. *M. alis hyalinis, antennis longitudine corporis: clava*  
*suborbiculata.*

*Schaff. elem. t. 77. Libelluloides.*

*Habitat in Barbaria.*

*Corpus M. formicario minus, nigrum; testaceo-varie-*  
*gatum, excepto abdomine hirsutum. Antennæ fili-*  
*formes nigre, apice clava rhombo-orbiculata, compressa.*  
*Oculi fusci, quibus incumbit quasi palpebra ovata,*  
*testacea. Alæ deflexæ, lanceolatae, hyalinae, reticu-*  
*late, puncto marginali fusco, ut in Libellulis. Ab-*  
*domen nigrum linea dorsali flava; subius flavo-*  
*variegatum. Pedes flavi. Frons pilosa.*

239. PANORPA. *Rostrum* corneum, cylindricum:  
Palpis duobus.

*Stemmata* III.

*Antennæ* thorace longiores.

*Cauda* maris chelata.

communis 1. *P. alis æqualibus nigro maculatis.* *Fr. swec.* 1516. \*  
*Scop. carn.* 710.

*Aldr. inf.* 386. f. 8, 9. & 387. f. 5, 6. *Musca*  
*scorpiura*.

*Frisch. inf.* 9. p. 29. t. 14. f. 1. *Scorpio Musca*.

*Mouff. inf.* 62. f. 3, 4.

*Reaum. inf.* 4. t. 8. f. 9.

*Schæff. elem.* t. 93.

*Salz. inf.* t. 17. f. 106.

*Geoffr. paris.* 2. p. 260. t. 14. f. 2.

*Act. nidros.* 3. p. 414. t. 6. f. 10.

*Habitat in Europa.*

*Mas cauda chelifera; Femina inermi.*

germanica 2. *P. alis æqualibus hyalinis apice fuscis.*  
*Habitat in Germania.* *P. Förskål.*

*Priore dimidio minor. Cauda magis pallida. Alæ*  
*tantum apice fusca & puncto ad marginem exte-*  
*riorem.*

hyemalis. 3. *P. alis subulatis subincurvatis ciliatis, femina aptera.*  
*Habitat in Thuringiæ Muscis, tempore hyemali.* *D.*  
*Schreber.*

*Corpus magnitudine pediculi, supra fusco - aneum.*  
*Antennæ corpore breviores. Rostrum corneum, cy-*  
*lindricum, thorace longius. Thorax teres, rugosus.*  
*Alæ Maris 4, abdomine breviores apice incurvo su-*  
*bulato, fusca. Abdomen Maris muticum; Femina*  
*ense terminali, abdomine brevior. Pedes longi.*

Coa. 4. *P. alis erectis: posticis sublinearibus longissimis.*  
*Hasseltqv. iter.* 423. *Ephemera coa.*

*Act. Stockb.* 1747. p. 176. t. 6. f. 1.

*Habitat in Coa Metellina & insulis Archipelagi, in*  
*Hispania. Loeßling, Alstroemer.*

240. RAPHIDIA. *Os* dentibus duobus in Capite depressio corneo. *Palpi* IV. Stemmata. III. *Alæ* deflexæ. *Antennæ* longitudine Thoracis antice elongati, cylindrici. *Cauda* feminae seta recurva laxa.

●phiopsis. 1. RAPHIDIA thorace cylindrico. *Fn. suec.* 1517. \*

*Scop. carn.* 711.

*Ræsel. inf. app.* 1. p. 130. t. 21. f. 6, 7.

*Schæff. elem.* t. 107.

*Habitat in Europa.*

*Pupa huius currit matri simillima, licet aptera. Caput obcordatum.*

Mantispa. 2. R. pedibus anticis thoraci antice annexis, antennis thorace brevioribus. †

*Poda inf.* 101. t. 1. f. 15. \*

*Scop. carn.* 712.

*Habitat in Styria, tarde progreditur nempe unco. Tibiis complicatis, solis femorum geniculis insistent, quibus explicatis ad adscendendum utitur. Mibi non visa.*

Cornuta. 3. R. maxillis corniformibus porrectis thorace longioribus.

*Syst. nat.* 10. p. 551. n. 14. Hemerobius cornutus.

*Habitat in Carolina, Canada.*

*Magnitudo Libellulae majoris. Caput ferrugineum, subrotundum, depressum, margine utrinque unidentatum. Stemmata 3, convexa. Maxillæ 2, incurvæ, acutæ dentibus 3. Palpi 2, bifidi. Antennæ setaceæ, corpore  $\frac{1}{2}$  breviores, articulis circiter 50, subrotundis. Thorax ferrugineus, semicylindricus, longitudine capitis. Scutellum nudum, bifidum lobo medio accessorio. Alæ 4, deflexæ, pallide, venosoreticulatæ: margine lato venis transversis, medio albis. Pedes 6, lividi. Abdomen nudum absque cauda.*

## V. HYMENOPTERA.

*Alæ quatuor, membranaceæ, plerisque.*  
*Aculeus caudæ, sed nullus in Maribus.*

241. CYNIPS. Os maxillis absque proboscide.  
*Aculeus spiralis, sæpius reconditus.*

Rosæ. 1. *C. nigra*, abdomine ferrugineo postice nigro, pedibus ferrugineis. *Fn. suec.* 1518. \*

*Fn. suec.* 1. n. 938. *Tenthredo* antennis 12-nodiis nigris, abdomine subtus ferrugineo, pedibus flavis, alis im-maculatis.

*Blank. inf.* 2. 16. f. V-Z.

*Reaum. inf.* 3. t. 46. f. 5-8. ♂ t. 47. f. 1-4.

*Habitat in Bedeguar Rosarum hispido.*

Hieracii. 2. *C. Hieracii murorum.* *Fn. suec.* 1519.

*Fn. suec.* 1. n. 950. *It. scan.* 280.

*Barth. act.* 1671. t. 283.

*Chemn. brunsv.* 2. 7.

*Valent. virid.* 2. 328. f. 1.

*Hench. wittenb.* 1. 2. 1.

*Habitat in Hieracii murorum galla caulina birta.*

Glechomæ. 3. *C. Glechomæ hederacæ.* *Fn. suec.* 1520.

*It. wgoth.* 107.

*Blank. inf.* 186.

*Pancow. herb.* 709.

*Elsbol. march.*

*Welsch. becast.* 2. 127. f. 1.

*Reaum. inf.* 3. t. 42. f. 1-5.

*Geoffr. paris.* 2. p. 303. *Cynips* totus fuscus, tho-race villoso.

*Habitat in Glechomæ hederacæ gallis foliarum gla-bosis scabris.*

Quercus baccarum. 4. *C. nigra*, basi antennarum pedibusque flavescens.

*Fn. suec.* 1522.

*Uddm. diss.* 81. t. 1. f. 14.

*Reaum. inf.* 3. t. 192. t. 42. f. 8.

N h n

Geoffr.

*Cynipis Larvæ pæneque intra Gallas plantarum, quas causantur, latent.*

Geoffr. inf. 2. p. 300. n. 9.

Habitat in Gallis foliorum *Quercus pellucidis subglobosis*, paginae inferiori insertis, magnitudine *Pisi*, exiens media aestate.

*Quercus* 5. *C. nigra*, thorace lineato, pedibus griseis, femoribus folii. subtus nigris. *Fn. suec.* 1521. \*

*Rhed. inf.* 157.

*Frisch. inf.* 2. t. 3. f. 5.

*Salz. inf.* 1. 18. f. 108.

*Reaum. inf.* 3. t. 39. f. 14-17.

*Blank. inf.* 1. 16. f. A-H.

*Rœf. inf. app.* 1. 52, 53. f. 10, 11.

*Leuwenb. nat.* 217.

Habitat in Gallis foliorum *Quercus globosis*, paginae inferiori, avellanae magnitudine. *Amœn. acad.* 3. p. 324.

*Quercus* 6. *C. atra*, antennis pedibusque pallidis. inferus.

Habitat in Gallis foliorum *Quercus globosis*, opacis, rubris, paginae inferiori innatus, magnitudine *Avellanae*; in *Suecia vulgaris*.

Magnitudo *Pulicis*, ater. Antennae pallidae uti *Pedes*, fereque subtestaceae. Alae hyalinae totae, neque venis neque puncto obscuriore.

*Quercus* 7. *C. nigra*, pedibus albidis, femoribus fuscis. *Fn. suec.* petioli. 1523. \*

*Rœf. inf. app.* 1. 35, 36.

*Geoffr. parif.* 2. p. 301. n. 11.

Habitat in *Quercus petiolo* f. ramulo, *Galla cava* utrinque convexa.

*Quercus* 8. *C. grisea*, alis cruce lineari. *Fn. suec.* 1524.

pedunculi. *Reaum. inf.* 3. t. 40. f. 1-6.

Habitat in *Quercus floribus masculis*, Gallis granulatis in catenas nodorum. *Amœn. acad.* 3. p. 324.

*Quercus* 9. *C. corticis* *Quercus Roboris*. *Fn. suec.* 1526.

corticis. Habitat in *Galla cyathiformi* f. *Peziza* facie: disco convexo, cincto punctis ultra 20 concavis, cortici *Quercus* immersa. T. Bergman.

*Quercus* 10. *C. pallidus*, abdomine oculisque nigris. *Fn. suec.* 1527. \*

ramuli. Habitat in Gallis lanatis albis ramulorum *Quercus*.

*Solander.*

II. C.



- Quercus gemmæ.** 11. *C. gemmæ Quercus Roboris.* *Fn. suec.* 1525. \*  
*Fn. suec.* 948. *Tenthredo gallæ imbricatæ.*  
*Reaum. inf.* 3. t. 43. f. omnes.  
*Friseh. inf.* 12. t. 2. f. 2.  
*Geoffr. paris.* 2. p. 299. n. 8. *Cynips nigro-æneus.*  
*pedibus fuscis.*  
*Habitat in Quercus gemma terminali, in gallam im-*  
*bricatam tumescente.*
- Fagi.** 12. *C. Fagi sylvaticæ.* *Fn. suec.* 1528. \*  
*Fn. suec.* 1. n. 946. *Tenthredo gallæ foliorum Fagi.*  
*Friseh. inf.* 2. t. 5.  
*Habitat in Fagi sylvaticæ foliis.*
- Viminalis.** 13. *C. flava, thorace nigro.* *Fn. suec.* 1529. \*  
*Raf. inf.* 2. *Vesp.* 2. 10. f. 5, 6, 7.  
*Habitat in Salicis viminalis foliis, sub costa.*
- Caprææ.** 14. *C. viridis nitida, pedibus pallidis.* *Fn. suec.* 1531.  
*Friseh. germ.* 4. p. 39. t. 22.  
*Habitat in Salicis Gallis ferrugineis, bordeiformibus,*  
*foliorum medio innatis, nec non in aliis excrescentiis*  
*ramorum.*
- Salicis strobili.** 15. *C. atra, thoracis tergo virescente.* *Fn. suec.* 1532. \*  
*Habitat in Salicis glabræ apicibus ramulorum strobili-*  
*formibus e foliis.*
- Amerinæ.** 16. *C. nigra, pedibus pallidis.* *Fn. suec.* 1530.  
*Habitat in Salicis pentandræ Gallis inæqualibus, ra-*  
*mos terminantibus.*
- Pfenes.** 17. *C. Ficus Caricæ.* *Hasselqv. iter.* 424. n. 111, 112.  
*Amæn. acad.* 1. p. 41.  
*Ponted. anth.* 2. 11. f. 12, 13, 14.  
*Habitat in grossis Ficus Caricæ orientalis.*
- Sycomor.** 18. *C. Ficus Sycomori.* *Hasselqv. iter.* 426. n. 113.  
*M. L. U.* 404. \*  
*Habitat in Ægypti Ficus Sycomori grossis. Hasselqv.*  
*Fuscus aculeo longitudine corporis exserto, sed debili,*  
*laxo, ut vix videatur Cynips esse. Corpus laeve,*  
*glabrum, nigrum; thorax longitudine abdominis. An-*  
*tennæ thorace breviores, subulatæ, basi crasso-conicæ.*

inanita. 19. C? niger, abdomine uniarticulato antice utrinque macula fenestrata, pedibus ferrugineis.

*Habitat* Upsalix. C. G. Kakeritz.

Corpus magnitudine formicæ rufæ, toto cælo a reliquis diversum. Antennæ setacæ, corpore breviores. Thorax scabriusculus. Abdomen oblongum, obtusissimum, opacum, absque ulla incisura, teretiusculum, subtus concavum, ac si visceribus destitutum: Macula diaphana, albida, utrinque versus basin. Aculeus exsertus, rigidus, recurvatus, vix abdomine longior. Pedes ferruginei exceptis tibiis nigris. Palpi filiformes.

242. TENTHREDO. Os maxillis absque proboscide.

*Alæ* planæ, tumidæ.

*Aculeus* laminis duabus, serratis, vix prominentibus.

*Scutellum* granis duobus impositis distantibus.

\* *Antennis clavatis.*

femorata. 1. T. antennis clavatis luteis, corpore atro, femoribus posterioribus maximis. *Fn. suec.* 1533. \*

*Alb. inf.* 1. 69.

*Geoffr. paris.* 2. p. 263. t. 14. f. 4. Crabro niger, segmento primo margine inciso lunula flava.

*Habitat* in Alnetis.

marginata. 2. T. antennis clavatis apice lutescentibus, corpore nigro, abdominis segmentis posterioribus margine albidis.

*Habitat* in Germania. P. *Forskåhl.*

Corpus magnitudine *Apis*, nigrum, thorace capiteque villis albis canescentibus. Abdominis segmentum 2 macula marginali albida; 3 margine albido, medio interrupto; 4, 5, 6, 7. margine toto albido. Pedes nigri. Tibiæ lutescentes.

3. T.

---

*Tenthredinis* Larvæ pleraque folia plantarum exedunt, polypodæ, seu pedibus plus quam XVI communiter instructæ, tarsi sæpius in spiram planam contorquentur; prioris itaque antennæ capitatis genere naturali non differunt.

- lutea. 3. T. antennis clavatis luteis, abdominis segmentis plerisque flavis. *Fn. suec.* 1534. \*  
*Scop. carn.* 719.  
*Gæd. inf.* 1. t. 64.  
*List. gæd. f.* 77. a.  
*Frisch. inf.* 4. t. 25.  
*Ræf. vesp.* t. 13.  
*Habitat in* Salice, Alno, Betula.  
*Larva glabra viridis pedibus 28, linea dorsali nigra, utrinque flava.*
- Amerinæ. 4. T. antennis clavatis, corpore cinereo, ano rufo, labio albo. *Fn. suec.* 1536. \*  
*Scop. carn.* 720.  
*Ræf. inf.* 2. vesp. t. 1.  
*Habitat in* Salice.
- Vitellinæ. 5. T. antennis clavatis, ore elabiato, abdomine rufo, dorso nigro, femoribus posticis dentatis. *Fn. suec.* 1535. \*  
*Ström. fündm.* 171. t. 10. f. 11.  
*Habitat in* Salice. *T. Bergman.*; in Betula. *Ström.*
- lucorum. 6. T. antennis clavatis nigris, corpore villosa atro. *Fn. suec.* 1537. \*  
*Habitat in* Betula, Alno.
- fasciata. 7. T. antennis clavatis nigris, abdomine glabro atro, alis superioribus fascia fusca. *Fn. suec.* 1538.  
*Habitat in* Europa.  
*Abdominis segmentum punctum alaque, excepta fascia, alba.*
- sericea. 8. T. antennis clavatis luteis, thorace atro, abdomine æneo. †  
*Schæff. elem.* t. 51.  
*Habitat* Lipsiæ.  
*Caput aneum, Oculis nigris. Thorax laevis, niger, immaculatus. Abdomen rotundatum, aneum, segmentorum anticorum basi carulescente. Pedes testacei Femoribus nigris. Alarum margo crassior testaceus. J. C. Fabricius.*
- americana. 9. T. antennis subclavatis, thorace luteo, abdomine cæruleo, alis nigris.  
*Habitat in* America. *Rolander.*

*Pedes lutei, at Tibiæ posticæ nigrae. Basis alarum cærulea.*

nitens, 10. T. antennis clavatis luteis, abdomine viridi-cæruleo nitente. *Fr. suec. 1539. \**

*Scop. carn. 721.*

*Sultz. inf. 2. 18. f. 109.*

*Habitat in Europa.*

*In abdominis dorso macula oblonga nigra per 4 segmenta postica extensa. Pedes lutei.*

\* \* *Antennis non articulatis.*

enodis, 11. T. antennis clavato-filiformibus exarticulatis lævibus, corpore atro-cæruleo nitente,

*Habitat in Europa.*

*Corpus magnitudine T. Pini, totum, etiam alis, atro-cæruleo nitente. Antennæ subfiliformes, minime articulatæ.*

ciliatis, 12. T. antennis filiformibus exarticulatis subtus ciliatis, tibiis posticis albis.

*Habitat in Germania.*

*Corpus magnitudine T. enodis, sed totum, exceptis tibiis posticis, nigrum. Antennæ subtus pilis brevissimis ciliatæ.*

ustulata, 13. T. antennis subfiliformibus exarticulatis, corpore nigro, abdomine cæruleo nitente, tibiis pallidis. *Fr. suec. 1542.*

*Sultz. inf. 2. 18. f. 3.*

*Habitat in Europa.*

*Ala subferruginea macula fusca. (Antennæ exarticulatæ mihi, quæ absque geniculis continuæ sunt).*

\* \* \* *Antennis pectinatis.*

Pini. 14. T. antennis pennatis lanceolatis, thorace subvillosa, *Fr. suec. 1540. \**

*Uddm. diss. 90. f. 13.*

*Habitat in Pini foliis.*

*Mas niger tibiis femoribusque fulvis. Femina duplo major grisea, antennis serratis, marti dissimilis.*

*Larva cærulea extremitatibus fulvis.*

Juniperi. 15. *T. antennis pennatis obtusis, thorace glabro.* *Faun. suec.* 1541. \*

*Uddm. diss.* 91. f. 12.

*Sultz. inf.* 2. 18. f. 110. *Tenthredo pterophorus.*

*Habitat in Junipero.*

*Maris tibiae & femora fulva. Femina antennis serratis, facie a mare diversissima.*

*Larva viridis, adpersa punctis nigris.*

\* \* \* \* *Antennis subclavatis, articulatis.*

rustica. 16. *T. antennis subclavatis, abdomine nigro: cingulis tribus flavis: posticis duobus interruptis.* *Faun. suec.* 1543.

*Geoffr. parisi.* 2. p. 276. n. 11. t. 14. f. 5.

*Habitat in Europa.*

*Os albicans. Thorax scutello & humeris singulis macula lutea. Fasciæ in abdominis segmento 2, 5, 6, utrinque. Pedes flavi. Genua postica nigra.*

\* \* \* \* *Antennis filiformibus, articulis 7 l. 8 excepta basi.*

Scrophulariz. 17. *T. antennis septemnodiiis luteis, abdomine cingulis quinque flavis: primo remotiore.* *Fa. suec.* 1545. \*

*Reaum. inf.* 5. t. 13. f. 12-23.

*Blackw. herb.* t. 87. f. 10.

*Geoffr. parisi.* 2. p. 277. n. 13.

*Habitat in Scrophularia varia.*

*Maris femora postica linea flava longitudinali subtus notata.*

*Larva nivea, nigro punctata, pedibus 22.*

Abietis. 18. *T. antennis septempodiis, corpore nigro, abdominis segmentis quatuor ferrugineis.* *Faun. suec.* 1545. \*

*Frisch. inf.* 2. t. 1. f. 21-24.

*Syst. nat.* 10. n. 13, 27.

*Habitat in Pino, Abiete.*

Padi. 19. *T. antennis septemnodiiis atra, femoribus tibiisque albis.* *Fa. suec.* 1544. \*

*Habitat in Pruni Padi foliis.*

Cerasi. 20. *T. antennis septemnodiiis, corpore nigro, pedibus scutelloque flavis.* *Fa. suec.* 1547. \*

*Scop. carn.* 735.

*Reaum. inf. 5. t. 12. f. 1-5.*

*Habitat in Cerasi foliis, quæ involuit ut mutetur.*

Salicis. 21. T. antennis septemnodiiis, corpore flavo, vertice capitis thoracisque nigro. *Fn. suec. 1548. \**

*Reaum. inf. 5. t. 11. f. 10.*

*Habitat in Salicibus variis.*

mesome- 22. T. antennis septemnodiiis, abdomine subflavo: dorso  
la. nigro arcubus flavescentibus. *Fn. suec. 1549. \**

*Scop. carn. 723.*

*Sultz. inf. 1. 18. f. 112.*

*Habitat in Salice fragili. Kekeritz.*

Punctum 23. T. antennis septemnodiiis, corpore nigro, abdomine  
album. lateribus albo, femoribus posticis rubris.

*Habitat in Europa.*

*Similis T. rufipedi; macula alba ante alas. Abdominis segmenta lateribus alba. Pedes albi: Posteriorum Femora sanguinea, Tibiæ vero luteo-annulatae in quibusdam; macula alba ante femora.*

rufipes. 24. T. antennis septemnodiiis, corpore nigro, abdomine  
cingulis duobus luteis, pedibus rubris. *Faun. suec. 1550. \**

*Habitat in Europa.*

campe- 25. T. antennis septemnodiiis, corpore nigro, abdomine  
stris. cingulo flavo inæquali, antennis tibiisque flavis. *Fn. suec. 1551. \**

*Habitat in Europa.*

*Scutellum flavescentibus, non vero T. Abietis.*

atra. 26. T. antennis septemnodiiis, corpore atro, pedibus rubris. *Faun. suec. 1552. \**

*Scop. carn. 729.*

*Habitat in Europa.*

viridis. 27. T. antennis septemnodiiis, corpore viridi, abdomine  
supra fusco. *Fn. suec. 1554. \**

*Habitat in Betula.*

ovata. 28. T. antennis septemnodiiis, corpore atro, thorace supra rubro. *Fn. suec. 1553. \**

*Habi-*

Tenthredines coloribus variant saepe, secundum sexum. *S. cop.*

*Habitat in Alni foliis Larva lanata, discum folii exedens. T. Bergman.*

Antennæ articulis 8, sub apice pallidiores. Caput & Thorax scabra. Thorax supra antice ruber. Pedes anteriores pallidiores.

Alni. 29. T. antennis septemnodiiis, corpore nigro, thorace capiteque rubris. *Fn. suec. 1571.*

*Reaum. inf. 5. t. 11. f. 1, 2?*

*Habitat in Alni foliis Larva, discum folii exedens, evitans aspectum spectatoris. T. Bergman.*

Corpus simile T. ovatae. Caput & Thorax supra rubra. Pedes antici testacei. Videtur magis quam sexu a precedente diversa.

Rosæ. 30. T. antennis septemnodiiis, corpore flavo, costa alarum superiorum longitudinali nigra. *Faun. suec. 1555.\**

*Scop. carn. 722.*

*Raf. inf. 2. vesp. t. 2.*

*Reaum. inf. 5. t. 14. f. 10-12.*

*Geoffr. paris. 2. p. 272. n. 4.*

*Habitat in Rosa.*

bicineta. 31. T. antennis septemnodiiis, corpore atro, abdominis cingulo, ano, ore tibiisque flavis.

*Habitat in Europa.*

Abdominis cingulum, in medio, e segmentis duobus flavis, sed in posteriore segmento interruptum.

livida. 32. T. antennis septemnodiiis, corpore atro, abdomine cingulo albo. *Fn. suec. 1556.\**

*Habitat in Rosa.*

livida. 33. T. antennis septemnodiiis, corpore atro, abdomine supra infraque livido. *Faun. suec. 1557.\**

*Habitat in Europa.*

Alter sexus antennis annulo albo & puncto albo utrinque ad basin abdominis; alter vero hac albedine caret.

nigra. 34. T. antennis septemnodiiis, corpore toto nigro.

*Habitat Upsaliæ. Fabricius.*

*Magnitudo mediocris.*

- Rapæ. 35. *T. antennis septemnodiiis, corpore atro, ventre pedibus scutelloque albidis.*  
*Habitat in Rapæ foliis.*  
 Corpus *nigrum, minus.* Alarum *margo usque ad stigma niger.* Caput & Thorax *nigra, albo variegata.* Abdomen *nigrum margine segmentorum tenuissime flavo.* Abdomen *subtus maximam partem album.* Pedes *albidi, extus nigri.* Antennæ *nigræ.*
- septen- 36. *T. antennis septemnodiiis, pedibus posticis compressis*  
 trionalis. *dilatatis. Fn. succ. 1558.\**  
*Habitat in Alno. Bergman.*
- carbona- 37. *T. antennis septemnodiiis atra, ore albo, tibiis anticis*  
 ria. *testaceis.*  
*Habitat in Europa australi.*
- nassata. 38. *T. antennis septemnodiiis, corpore luteo, scutello albo,*  
*alis fusco reticulatis.*  
*Habitat in Europa.*  
 Corpus *totum, exceptis oculis & stigmatibus nigris, flavum.* Antennæ *subferrugineæ.* Alæ *stigmatate pallido.*
- 12-pun- 39. *T. antennis septemnodiiis, corpore atro; punctis 12*  
 ctata. *albis. Fn. succ. 1559.\**  
*Habitat in Europa.*
- \* \* \* \* \* *Antennis setaceis: articulis plurimis.*
- erythro- 40. *T. antennis setaceis, corpore cæruleo, capite rubro.*  
 cephalæ. *Fn. succ. 1560.\**  
*Uddm. diff. 89.*  
*Habitat in Pino sylvestri.*  
*Mas totus ater ore tibiisque anticis luteis.*
- sylvatica. 41. *T. antennis setaceis, corpore nigro, pedibus thora-*  
*cisque characteribus flavis. Fn. succ. 1561.\**  
*Habitat in Europa.*
- memora- 42. *T. antennis setaceis, corpore atro, abdominis se-*  
 lis. *gmentis lateribus albis. Fn. succ. 1562.*  
*Habitat in Europa.*
43. *T.*

---

*Puncta 2 elevata, tamquam petiolorum rudimenta, in plerisque Tenthredinibus, pone scutellum produunt.*



- Cynos-  
bati. 43. *T. antennis setaceis, corpore atro, pedibus ferrugineis: posticis albo nigroque annulatis. Fn. suec. 1563.\**  
*Reaum. inf. 5. t. 15. f. 1-6.*  
*Geoffr. parif. 2. p. 287. n. 36.*  
*Habitat in Rosa.*
- Populi, 44. *T. antennis setaceis atro-cærulescens; ore palpis tibisque anticis flavis.*  
*Habitat in Populo. T. Bergman.*  
*Corpus mediocre. Antennæ multis articulis. Alæ fuscescentes. Thorax niger, pectore utrinque colore luteo contaminato, marginibus flavis. Abdomen luteum: dorso maculis atris, transversis, opacis.*
- Vafra, 45. *T. antennis setaceis, capite nigro albo-variegato, pedibus testaceis.*  
*Habitat in Svecia. T. Bergman.*  
*Simillima T. reticulata, sed paulo minor. Caput simillimum, sed scutellum lateribus flavum. Alæ fuscescentes, nec maculata. Pedes testacei, nec nigri.*
- reticulata. 46. *T. antennis setaceis, alis pallido fuscoque variis; venis elevatis albis reticulatis. Fn. suec. 1564.\**  
*Habitat in Finlandia. T. Holm.*
- Betula, 47. *T. antennis setaceis, corpore rubro, thorace ano oculis nigris, alis postice fuscis. Fn. suec. 1565.\**  
*Habitat in Betulis. D. C. Solander.*
- saluum, 48. *T. antennis setaceis, corpore nigro, abdomine luteo.*  
*Fn. suec. 1566.*  
*Habitat in Svecia.*
- flava, 49. *T. flava, macula alarum ferruginea. Fn. suec. 1567.\**  
*Reaum. inf. 5. t. 10. f. 6, 7.*  
*Habitat in Europa.*
- intercus. 50. *T. nigra, pedibus flavis, antennis subclavatis. Fn. suec. 1568.\**  
*Habitat in foliis Arctii, Atropæ, Chenopadii Vulvaræ subcutaneus.*  
*Corpus statura & magnitudine Ichneumonis globati s. glomerati atrum totum, Abdomen exacte ovatum, tæni-*

*acutiusculum, non longum. Pedes toti albi. Antennæ subclavatæ, breviores, profunde articulatæ, hyalina. Sequentium metamorphosin non vidi.*

Rumicis. 51. T. Rumicis Lapathi. *Fn. suec. 1569.*

*Reaum. inf. 5. t. 10. f. 13, 14.*

*Habitat in Rumicibus Lapathis dictis.*

Ulmi. 52. T. Ulmi campestris. *Fn. suec. 1570.*

*Reaum. inf. 5. t. 10. f. 16.*

*Habitat in Ulmi campestris foliis.*

Pruni. 53. T. Pruni.

*Reaum. inf. 5. t. 12. f. 16.*

*Habitat in Pruno.*

Lonicerae. 54. T. Lonicerae.

*Reaum. inf. 5. t. 13. f. 8. 10.*

*Habitat in Lonicera.*

Caprae. 55. T. Salicis. *Fn. suec. 1572.*

*List. gard. 125. f. 49.*

*Goed. inf. 1. t. 19.*

*Alb. inf. 59. f. g. b.*

*Frisch. inf. 6. t. 4.*

*Reaum. inf. 5. t. 11. f. 5, 6.*

*1. t. 1. f. 18.*

*Geoffr. parisi. 2. p. 281. Tenthredo novemnodia flava, capite thoraceque supra nigro.*

*Habitat in Salicibus: fragili, caprea.*

*Larva cyanea, segmentis tribus primis ultimisque corporis fulvis, maculis nigris ordinibus 9. Pedes 20; ad metamorphosin absolutum perducere hanc non potui.*

243. SIREX. Os Maxillis 2 validis. Palpi 2, truncati.

*Antennæ filiformes: articulis ultra 24.*

*Aculeus exsertus, rigens, ferratus.*

*Abdomen sessile, mucronatum.*

*Alæ lanceolatæ, planæ omnibus.*

gigas. 1. S. abdomine ferrugineo: segmentis 3, 4, 5, 6 nigris, thorace villoso. *Fn. suec. 1573.\**

*Scop.*

---

*Ichneumonis Larvæ plerumque intra alia insecta, & imprimis intra Larvas Lepidopterorum aliorumque vivunt, quas intus consumunt; Sirex vero rodens & perforant ligna, suntque hexapodæ tantum.*

*Scop. carn.* 739.

*Linw. act. Stockh.* 1739. t. 3. f. 7.

*Reaum. inf.* 6. t. 31. f. 1, 2.

*De Geer inf.* 1. t. 36. f. 1, 2.

*Raf. inf.* 2. vesp. t. 8, 9.

*Sultzi inf.* t. 18. f. 114.

*Poda inf.* t. 1. f. 6.

*Geoffr. parif.* 2. p. 265. t. 14. f. 3. *Uroceros*.

*Schaff. elem.* t. 1. f. 2. & t. 13. f. 7. & 132.

*Habitat in arboribus coniferis.*

**Columba.** 2. *S.* abdomine nigro: fasciis testaceis. *Amæn. acad.* 6. p. 412. n. 88.

*Habitat in America.*

**Spectrum.** 3. *S.* abdomine atro, thorace villoso litura ante alas lutea. *Fn. svec.* 1574. \*

*Scop. carn.* 740.

*Amæn. acad.* 3. p. 325.

*De Geer inf.* 1. t. 36. f. 6.

*Habitat in Lignis putridis antiquis Pini & Abietis.*

**Juvenus.** 4. *S.* abdomine atro-cærulefcente, thorace unicolore villoso. *Fn. svec.* 1575. \*

*Scop. carn.* 741.

*De Geer inf.* 1. t. 36. f. 7.

*Habitat in Sylvis.*

*Similis S. spectro, sed caret litura ante alas lutea; aculeoque abdomine longe brevior instruitur.*

**Camelus.** 5. *S.* abdomine atro lateribus albo maculato, thorace lavi. *Fn. svec.* 1576. \*

*Scop. carn.* 742.

*Uddm. diff.* 82.

*Habitat in Ligno putrido.*

*Antennæ nigrae; præcedentium 1, 2, 3 flava.*

**Mariscus.** 6. *S.* abdomine testaceo: segmentis duobus ultimis nigris, thorace villoso. *Fn. svec.* 1577. \*

*Habitat in Europa.*

**Pygmeus.** 7. *S.* abdomine nigro punctis duobus fasciisque tribus luteis: media interrupta.

*Habitat in Svecia.*

*Corpus nigrum, magnitudine Culicis. Abdomen apice ac-*

*acutum*: segmento 1 punctis duobus paribus; 2 fascia integra; 3 fascia interrupta; 4 immaculata; 6 macula una, luteis. Alæ margo exterior ad medium nigricans.

244. ICHNEUMON. Os maxillis absque lingua.  
*Antennæ* articulis ultra 30.  
*Abdomen* petiolatum plerisque.  
*Aculeus* exsertus Vagina cylindrica, bivalvi.

\* *Scutello albido; Antennis fascia albida annulatis.*

sagittatorius. 1. I. scutello flavicante, thorace immaculato, abdomine atro: segmentis tribus utrinque puncto albo. *Fann. suec.* 1578. \*

*Habitat in Europa.*

*Pedes nigri. Abdominis segmenta tria prima utrinque unico puncto albo.*

factorius. 2. I. scutello flavicante, thorace immaculato, abdominis segmento secundo tertioque luteis, reliquis apice albis. *Fn. suec.* 1579. \*

*Habitat in Europa.*

*Thorax immaculatus vel collo tantum ad basim alæ. Femora posteriora 4 nigra.*

sarcitorius. 3. I. scutello flavicante, thorace immaculato, abdominis segmento tertio posterius secundoque ferrugineis, sexto flavo. *Fn. suec.* 1580. \*

*Sultz. inf. t. 18. f. 15.*

*Habitat in Europa.*

extensorius. 4. I. scutello flavicante, thorace immaculato, abdominis segmento secundo tertioque ferrugineis, ultimis apice albidis. *Fn. suec.* 1581. \*

*Habitat in Europa.*

questorius. 5. I. scutello flavicante, thorace maculato, abdominis tribus ultimis segmentis dorsalibus macula flava. *Fn. suec.* 1582. \*

*Habitat in Europa.*

*Simillimus I. fessorio.*

- culpatorius. 6. I. scutello flavicante, thorace maculato, abdominis segmento secundo tertioque ferrugineis, reliquis nigris. *Fn. suec.* 1583. \*  
*Habitat in Europa.*
- infractorius. 7. I. scutello flavo, thorace maculato, abdominis segmentis omnibus margine albis, pedibus ferrugineis. *Fn. suec.* 1584. \*  
*Habitat in Europa.*
- constrictorius. 8. I. scutello flavicante, thorace bidentato submaculato, abdominis segmento secundo ferrugineo. *Faun. suec.* 1585. \*  
*Habitat in Europa.*
- saturatorius. 9. I. scutello flavicante, thorace immaculato, abdominis nigri segmento ultimo albido. *Fn. suec.* 1586. \*  
*De Geer inf. 1. 23. f. 16.*  
*Habitat in Europa.*
- molitorius. 10. I. scutello albo, thorace immaculato, abdominis apice tibiarumque basi albis. *Fn. suec.* 1587. \*  
*Habitat in Europa.*
- erispatorius. 11. I. scutello flavicante, thorace submaculato, abdomine toto luteo-ferrugineo: apice subfuscescente. *Faun. suec.* 1588. \*  
*Habitat in Europa.*
- Pisforius. 12. I. scutello flavicante, thorace maculato, abdomine toto luteo. *Fn. suec.* 1589. \*  
*Faun. suec.* 966, 968.  
*Schaff. ic. t. 6. f. 12. & elem. t. 12. f. 1.*  
*Habitat in Larva Phalænæ Pisi.*  
*Petiolus abdominis niger est. Variat abdomine toto, antennis femoribusque ferrugineis.*
- \* \* Scutello albido; Antennis nigris totis.
- luctatorius. 13. I. scutello flavicante, thorace maculato, abdominis segmento secundo tertioque luteis. *Fn. suec.* 1590. \*  
*Geoffr. parif. 2. p. 347. n. 59.*  
*Habitat in Europa.*

volutato-14. I. scutello flavicante, thorace variegato, abdominis  
rius. segmentis omnibus dorso flavis. *Fn. suec. 1591.\**  
*Habitat in Europa.*  
*Pedes rufi.*

vaginato-15. I. scutello flavicante, thorace maculato, abdominis  
rius. segmentis margine flavis: primo quintoque unico-  
lore. *Fn. suec. 1592.*  
*Habitat in Europa.*  
*Pedes rubri: postici nigro fasciati.*  
*Varia! abdominis segmento etiam puncto quarto nigro.*

pervaso-16. I. scutello albo, thorace maculato, abdomine atro:  
rius. segmentis omnibus utrinque punctis duobus albis.  
*Fn. suec. 1593.\**  
*De Geer inf. 1. t. 36. f. 8.*  
*Habitat in Europa.*

*Niger. Labium album. Lineola alba ante & pone  
oculos. Thorax utrinque lituris 3 albis. Scutellum  
punctis 2 albis: anteriore majore. Abdomen cylin-  
dricum, sessile incisura 1 alba; 2 alba interrupta,  
reliqua punctis 4 albis. Pedes ferruginei. Tibiæ  
posticæ nigrae.*  
*Statura I. manifestatoris.*

liturato-17. I. scutello flavicante, thorace maculato, abdomine  
rius. nigro: segmentis quatuor medio flavis, pedibus fer-  
rugineis. *Fn. suec. 1594.\**  
*Habitat in Europa.*

designato-18. I. scutello flavicante, thorace maculato, abdomine  
rius. atro: segmentis primis quatuor utrinque puncto albo.  
*Fn. suec. 1595.\**  
*Habitat in Europa.*  
*Pedes postici nigri.*

edictorius.19. I. scutello flavicante, thorace maculato: punctis u-  
trinque duobus abdomineque toto atro. *Fann. suec.*  
*1596.\**  
*Habitat in Europa.*

dellrato-20. I. scutello flavicante, thorace maculato: punctis u-  
trinque tribus, abdomine toto atro, tibiis albis. *Fn.*  
*suec. 1597.\**  
*Habitat in Europa.*

fuscus. 21. I. scutello flavicante, thorace maculato, abdomine luteo: petiolo nigro. *Fn. suec. 1598.\**  
*Habitat in Europa.*

fossorius. 22. I. scutello flavicante, thorace immaculato, abdomine toto atro, pedibus rufis. *Fn. suec. 1599.\**  
*Habitat in Europa.*

\* \* \* Scutello thorace concolore; Antennis fascia annulatis.

ariolator. 23. I. thorace ferrugineo bispinoso, alis fasciis binis fuscis, abdomine fasciis quatuor albis.  
*Habitat in America. Mus. De Geer.*

*Parvus. Linea alba inter utrumque oculum & Caput. Antennae nigrae annulo albo. Thorax a tergo postice dentibus duobus albis. Alae primores albae macula fusca in medio & apice: secundaria tota alba. Abdomen nigrum incisuris 4 albis.*

cornitor. 24. I. ater totus, antennis fascia alba. *Fn. suec. 1600.\**  
*Reaum. inf. 6. t. 29. f. 1-4.*  
*De Geer inf. t. 24. f. 10.*  
*Geoffr. inf. 2. p. 338.*  
*Habitat in Europa. D. C. Solander.*

peregrinator. 25. I. niger, pedibus subclavatis abdomineque ferrugineis: segmentis duobus ultimis nigris, ano albido. *Fann. suec. 1601.\**  
*Geoffr. parif. 2. p. 343.*  
*Habitat in Europa.*  
*Pediculo duplo major.*

incubitor. 26. I. niger, abdomine ferrugineo; apice nigro macula alba, alis hyalinis, antennis fasciatis. *Fn. suec. 1602.\**  
*Scop. carn. 745.*  
*Geoffr. parif. 2 p. 341. t. 16. f. 1.*  
*Habitat in Europa.*

reluctator. 27. I. niger, abdomine medio piceo, tibiis anticis clavatis. *Fn. suec. 1603.*  
*Habitat in Europa.*  
*Aculens longitudine fere corporis, ruber.*

# INSECTA HYMENOPTERA. Ichneumon.

\* \* \* \* \* *Scutello thorace consolare; Antennis nigris setaceis.*

- denigra- 28. I. corpore atro, alis nigris lunula hyalina, abdomine  
tor. testaceo subseffili. *Fn. suec. 1604.\**  
*Habitat in Europa. G. T. Holm. M. D.*
- defector. 29. I. corpore luteo, alis fuscis: fasciis duabus albis. *Fn.*  
*suec. 1605.\**  
*Habitat in Europa.*
- rutilator. 30. I. corpore nigro immaculato, antennis subtus, abdo-  
mine pedibusque quatuor anterioribus ferrugineis.  
*Fn. suec. 1607.\**  
*Habitat in Europa.*
- corrusca- 31. I. corpore artubusque atris, alis fusco-hyalinis. *Fn.*  
tor. *suec. 1606.\**  
*Habitat in Europa.*
- manife- 32. I. corpore atro immaculato, abdomine seffili cylin-  
stator. drico, pedibus rufis. *Fn. suec. 1608.\**  
*Scop. carn. 751.*  
*Raj. inf. 256. n. 18. b.*  
*Reaum. inf. 6. t. 29. f. 16.*  
*Geoffr. paris. 2. p. 323. n. 5.*  
*De Geer inf. 1. t. 36. f. 9.*  
*Habitat in locis glaucosis: In fasciculo foliorum Salicis*  
*foramen dentibus rodebat; antennis insertis recogno-*  
*scebat latentem larvam. Rolander.*  
*Aculeus corpore saepe duplo longior.*
- compun- 33. I. corpore atro immaculato, abdomine subpetiolato  
tor. longo, pedibus rufis, palpis setaceis. *Fn. suec. 1609.\**  
*Habitat in Pupis Papilionum.*  
*Tibiae posticae apice nigrae.*
- delusor. 34. I. corpore nigro, abdomine ferrugineo basi apiceque  
nigro, femorum posticorum patellis solis nigris. *Fn.*  
*suec. 1609.*  
*Habitat in Europa.*
- titillator. 35. I. corpore nigro, abdomine ferrugineo basi apiceque  
nigro, pedibus posticis nigris: plantis albis. *Fn. suec. 1611.\**  
*Habitat in Europa.*

36. I.



# INSECTA HYMENOPTERA. Ichneumon.

venator. 36. I. corpore atro immaculato, abdominis basi subtus incarnata, pedibus rufis, aculeo retractili. *Fn. succ.* 1612.

*Habitat in Europa.*

extensor. 37. I. corpore nigro immaculato, abdomine cylindrico: pedibus rufis, palpis setaceis. *Fn. succ.* 1613. \*

*Habitat in Europa.*

punctator. 38. I. flavus punctis nigris, abdomine sessili.

*Habitat in Indiis.*

*Corpus flavum, magnitudine vespe minoris, sed angustius. Thorax supra nigro maculatus. Scutellum punctis 2, nigris. Abdomen sessile, cylindricum, punctis parium 6 nigris, seu in singulo segmento binis. Aculeus exsertus, abdomine brevior. Antennae nigrae. Pedes lutei puncto 1 s. 2 nigro.*

exarator. 39. I. corpore piceo immaculato, abdomine femoribusque clavatis, palpis setaceis, alis macula nigra albaque. *Fn. succ.* 1614.

*Habitat in Europa.*

*Parvus, angustus longiusculis pedibus, aculeo corpore longiore.*

Turionell. 40. I. niger, abdomine cylindrico, macula alarum fusca albæ inserta, tibiis posterioribus albo annulatis. *Fn. succ.* 1615. \*

*Habitat in Larvis Phalænæ Turionellæ.*

*Antennae longitudine corporis; aculeus abdomine brevior; Pedes ferruginei; quatuor posteriores tibiae fuscae annulo albo; sed Mas hac nota destituitur.*

Strobilel. 41. I. niger, aculeo corpore duplo longiore, pedibus lutescentibus: postica tibia digitoque nigris albo annulatis. *Fn. succ.* 1616. \*

*Habitat in Larva Phalænæ Strobilellæ & Turionellæ.*

Modera- 42. I. niger, abdomine petiolato compresso, ore palpatore. pedibusque pallidis, aculeo corpore subbreuiore. *Fn. succ.* 1617. \*

*Habitat in Larva Ichneumonis Strobilellæ, qua consumpta folliculum cranio superstiti inædificat. Rolander.*

- Refinella. 43. *I. niger*, pedibus flavis, abdomine subcylindrico sessili, antennis basi luteis. *Fn. suec.* 1618. \*  
*Habitat in Phalænæ Refinellæ Larva. Rolander.*  
*Angustus, oblongus, immaculatus. Antennæ corpore longiores; basis antennarum flava.*
- prærogator. 44. *I. niger*, pedibus flavis, abdomine oblongo obtuso. *Fn. suec.* 1619.  
*Habitat in Larva Phalænæ Salicis.*  
*Antennæ vix corporis longitudine, nec basi flava.*
- mandator. 45. *I. niger*, abdominis segmento secundo tertioque ferrugineis: apice supra albo, antennis unicoloribus. *Fn. suec.* 1620.  
*Habitat in Europa.*
- fomentator. 46. *I. niger*, abdomine falcato: segmentis tertio quartoque basi flavescentibus, pedibus testaceis.  
*Habitat in prædio meo Sæltja.*  
*Corpus vix Pediculo majus. Antennæ corpore breviores. Abdomen clavatum, falcatum, basi angustum. Os quasi tomentosum.*
- enervator. 47. *I. niger*, abdominis tribus primis segmentis rufis: apice supra albo, antennis albo fasciatis. *Fn. suec.* 1621. \*  
*Habitat in Europa.*
- gravidator. 48. *I. niger*, abdominis primo segmento ferrugineo abdomen dimidium obtegente. *Fn. suec.* 1622.  
*Habitat in Europa.*
- inculcator. 49. *I. niger*, abdomine falcato toto ferrugineo. *Faun. suec.* 1623. \*  
*Reann. inf.* 6. t. 30. f. 9.  
*Geoffr. paris.* 2. p. 357. n. 80.  
*Habitat in Europa.*
- pugillator. 50. *I. niger*, abdomine falcato: segmentis secundo tertio quartoque rufis, pedibus tenuibus ferrugineis. *Fn. suec.* 1624. \*  
*De Geer. inf.* 1. t. 6. f. 12.  
*Raj. inf.* 255. n. 17.  
*Geoffr. paris.* 2. p. 332. n. 24.  
*Habitat in Phalænæ Ziczac larva.*  
*Frons albida est.*

ruspator. 51. *I. niger*, abdomine subcylindrico, pedibus ferrugineis, femoribus clavatis: pollicis dentatis. *Faun. suec.* 1625. \*

*Geoffr. parif.* 2. p. 326. n. 12.

*Habitat in Europa.*

jaculator. 52. *I. niger*, abdomine falcato: segmento secundo tertio quartoque rufis, tibiis posticis clavatis. *Fa. suec.* 1626. \*  
*Monff. inf. t.* 121.

*De Geer inf.* 1. t. 36. f. 10.

*Geoffr. parif.* 2. p. 328. n. 16.

*Reaum. inf.* 4. t. 10. f. 14.

*Habitat in Apis truncorum, florifomniæ, Sphegisque figuli larvis. Bergman. Antennis perquirat, ubi Sphex figulus in pariete habitat, observato eo, avolat, reditque & ovum ei imponit.*

affectator. 53. *I. niger*, abdomine falcato: segmento secundo tertio quartoque latere rufis, tibiis posticis clavatis. *Faun. suec.* 1627. \*

*Scop. carn.* 756.

*Habitat in Europa.*

*Similis antecedenti, at dimidio minor, aculeo brevissimo, nec corpus aequante.*

agricola- 54. *I. niger*, capite ferrugineo, abdomine sessili.  
tor. *Habitat in Secale.*

*Corpus magnitudine Calicis, totum nigrum. Caput rufo-ferrugineum oculis nigris. Pedes picei. Femora antica clavata. Aculeus longitudine abdominis.*

\* \* \* \* \* *Antennis luteis setaceis.*

luteus. 55. *I. luteus*, thorace striato, abdomine falcato. *Faun. suec.* 1628. \*

*Raj. inf.* 253. n. 6.

*Schaff. inf. t.* 1. f. 12.

*Gæd. inf.* 2. t. 37.

*List. gæd. t.* 20. f. C.

*Habitat in Larvis Phalenarum, larva larvæ adherente.*

ramidulus. 56. *I. luteus*, abdomine falcato: apice nigro. *Fa. suec.* 1629. \*

*Raj. inf.* 253. n. 7.

O o o 3

Aldr.

*Aldr. inf. t. 7. f. e.*

*Geoffr. paris. 2. p. 331. n. 23.*

*Habitat in Europa.*

- glaucop- 57. *I. luteus*, pectore nigro, abdomine falcato: ano ni-  
pterus. gro. *Fn. succ. 1630. \**  
*Habitat in Europa.*

- bicolorus. 58. *I. ferrugineus*, abdominis apice pectore alarumque  
primorum apicibus nigris.

*Habitat in Africa.*

*Corpus magnitudine fere ♀ lutei. Caput ferrugineum, oculis atris. Thorax supra ferrugineus, immaculatus, subtus totus aterrimus: Alæ hyalinae: primorius apice nigris. Abdomen petiolatum, subcylindricum, rectum, ferrugineum, articulis 3 ultimis nigris. Pedes ferruginei. Femora postrema atra.*

- circum- 59. *I. niger*, abdomine falcato: antico luteo, pedibus po-  
flexus. sticis nigro geniculatis, scutello flavo. *Fann. succ. 1631. \**

*Habitat in Europa.*

- cinctus. 60. *I. ater*, antennis pedibusque ferrugineis, alis albis:  
fasciis duabus nigris. *Fn. succ. 1632. \**

*Geoffr. paris. 2. p. 359. n. 85.*

*Habitat in Europa.*

- formica- 61. *I. niger*, antennis pedibusque ferrugineis, alis hyali-  
tus. nis stigmatibus nigro.

*Habitat in Hammarby meo. J. C. Fabricius.*

*Corpus nigrum totum, formica minus. Antennæ ferrugineae, vix corporis longitudine. Abdomen clavatum: aculeo ferrugineo, longitudine corporis. Alæ puncto marginali nigro. Pedes ferruginei: Femoribus posticis nigris.*

\* \* \* \* \* *Minuti Antennis filiformibus. Abdomine ovato sessili.*

- Musca- 62. *I. auratus*, pedibus flavis saltatoris. *Fn. succ. 1636.*  
rum. *De Geer inf. 1. t. 32. f. 19, 20.*

*Habitat in Larvis Muscarum aphidivorarum.*

- Bedeguaris.** 63. *I. auratus*, thorace viridi, abdomine aureo. *Fn. svec.* 1634. \*  
*Roesl. inf. app. 1. 53. f. F. H.*  
*Blanck. inf. 188. n. 12.*  
*Geoffr. paris. 2. p. 296. n. 1. Cynips setis ani corpore longioribus.*  
*Habitat in Gallis Rosæ, Quercus.*  
*Aculeus longitudine corporis.*
- Gallarum.** 64. *I. fusco-æneus*, abdomine nigro, tibiis albidis. *Fn. svec.* 1638. \*  
*Habitat in Cynipidis Quercus ramliu larvis.*
- Juniperi.** 65. *I. auratus viridis*, antennis nigris, puncto alarum rubro. *Fn. svec.* 1635. \*  
*Habitat in Tipulæ juniperi Larva.*
- Puparum.** 66. *I. auratus cæruleus*, abdomine viridi nitido, pedibus pallidis. *Fann. svec.* 1636.  
*Scop. carn. 765. Ichneumon Anthiopæ.*  
*De Geer inf. 1. t. 30. f. 18.*  
*Ros. inf. 2. vesp. t. 3.*  
*Geoffr. paris. 2. p. 305. n. 24.*  
*Habitat in Pupis Papilionum & Muscarum.*
- Larvarum.** 67. *I. auratus viridis*, abdomine nigro: macula dorsali purpurascente, pedibus flavis, antennis septemnodiiis. *Fn. svec.* 1637.  
*De Geer Act. Upsal, mss.*  
*Habitat in Larvis Phalænarum variarum.*
- Cynipidis.** 68. *I. auratus viridis*, abdomine fusco: basi cingulo pallido, pedibus flavescens. *Fn. svec.* 1639. \*  
*Habitat in Larvis cynipidis gallarum Salicis pentandree intus concameratarum, nec non in Pupis Phalænarum.*  
*Antennis reliquisque parum differt a precedenti.*
- Cocco-rum.** 69. *I. nigro-æneus*, abdomine cærulescente, pedibus lividis. *Fn. svec.* 1640.  
*De Geer inf. 1. t. 35. f. 17.*  
*Habitat in Coccis.*
- Secalis.** 70. *I. niger*, capite rufo, oculis viridibus. *Fn. svec.* 1641. \*  
*Habitat in Larvis spicarum Secalis.*

subcuta- 71. *I. niger*, alis hirsutis: macula lunari nigra, antennis  
geus. subfiliformibus. *Fn. succ.* 1642.  
*De Geer inf.* 1. t. 30. f. 21.  
*Habitat in Larvis subcutaneis.*

Aphidum. 72. *I. niger*, abdomine basi pedibusque anticis genubus-  
que posticis flavis. *Faun. succ.* 1643.\*  
*It. gotl.* 307.  
*Frisch. inf.* 11. t. 19.  
*Geoffr. paris.* 2. p. 322. n. 4.  
*Habitat in Aphidibus.*

Ovulo- 73. *I. niger*, pedibus rufis, antennis filiformibus longis.  
rum. *Faun. succ.* 1644.  
*De Geer inf.* 1. t. 35. f. 11, 12, 13.  
*Habitat in ovis Lepidopterorum.*

globatus. 74. *I. niger*, pedibus ferrugineis. *Faun. succ.* 1645.  
*Scop. carn.* 766.  
*Mer. eur.* t. 22.  
*Frisch. inf.* 6. t. 10.  
*Raj. inf.* 255. n. 13.  
*Reaum. inf.* 2. t. 35. f. 5, 6.  
*Derham theol.* 1. 8. c. 6. n. 21.  
*Geoffr. paris.* 320. n. 1.  
*Habitat in Culmis intra Folliculum communem, bom-  
bycinum, subrotundum, album.*

glomerata- 75. *I. niger*, pedibus flavis. *Fn. succ.* 1646.\*  
tus. *Scop. carn.* 767.  
*Goed. inf.* 1. p. 59. n. 11.  
*List. goed.* 17. n. 7.  
*Reaum. inf.* 2. t. 33. f. 2, 7, 8.  
*Merian. eur.* t. 48.  
*De Geer inf.* 1. t. 16. f. 6.  
*Raj. inf.* 260. 254. n. 12. *Cant.* 35.  
*Raf. inf.* 2. vesp. 4. t. 3.  
*Geoffr. paris.* p. 321. n. 2.  
*Habitat in Larvis Papilionum: exeuntes proprios folli-  
culos flavos nectunt, intra quos excluduntur; obser-  
vant Papilionis pupam, nuper exuta larva, in quam  
ova immittant.*

76. *I.*

Muti plerumque Antennis articulis 10 tantum; primo longo; Abdomine sessili; Cor-  
pore sericeo differunt & ad Tenthriones propius accedunt, imprimis qui sub  
tenuis plantarum larva prodeunt, affines Tenthradini intercuti.

atomus. 76. *I. pallido fuscoque varius.*

*Habitat Upsaliæ.*

*Minor Acaro Sirene, & adeo parvus ut vix oculis manifestus, nisi motu, adeoque inter minima insecta alata numerandus.*

pectini- 77. *I. ater, antennis ramosis. Fn. suec. 1647.*

cornis. *De Geer inf. 1. t. 16. f. 6.*

*De Geer Act. Stockb. 1740. p. 464. t. 1. f. 4-6.*

*Geoffr. parif. 2. p. 313. t. 15. f. 3. Ecclophus.*

*Habitat in Larvis subcutaneis Quercus.*

245. SPHEX. *Os maxillis absque lingua.*

*Antennæ articulis 10.*

*Alæ plano-incumbentes (nec plicatæ),  
in omni sexu.*

*Aculeus punctorius reconditus.*

\* *Abdomine petiolato: petiolo elongato,*

fabulosa. 1. *S. nigra hirta, abdominis petiolo biarticulato: segmen-  
to secundo tertioque ferrugineis. Fn. suec. 1648. \**

*Scop. carn. 770.*

*Frisch. inf. 2. t. 1. f. 6, 7.*

*Sultz. inf. t. 19. f. 120.*

*Habitat in terra fabulosa Europæ, ubi Canis instar pe-  
dibus anterioribus cuniculum fodit larvamque Pha-  
lænæ vel Araneam semimortuam in eo sepelit, cui  
ovulum concedit; quo facto orificium terra claudit.  
Alæ abdomine dimidio breviores. Rostrum retractile  
bivalve linguam continens. Abdominis articuli 2 a 3  
lutei in femina, sed simul a tergo nigri in mari.*

cærulea. 2. *S. cærulea, alis fuscis. Amoen. acad. 6. p. 412. n. 90. \**  
*Catesb. car. 3. p. 5. t. 5? sed punctum nullum in ala-  
rum apice.*

*Habitat in America septentrionali.*

pensylva- 3. *S. nigra, abdomine petiolato atro, alis subviolaceis.*

nica. *Amoen. acad. 6. p. 412. n. 89.*

*Habitat in Pennsylvania.*

O o o s

4. S.

*Sphegis Larvæ consumunt occisa Insecta, ad quæ mater ova sepeliit. Sphegis an-  
tennæ communiter articulis 10; Ichneumonis vero pluribus.*

- capensis. 4. *S. nigra* lævis, antennis, tibiis alisque testaceis: his apice nigris. *M. L. U.* 407.\*  
*Habitat ad Cap. b. spei. Tulbagh.*
- asiatica. 5. *S. ferruginea*, thorace variegato, abdominis petiolo macula utrinque ad basin flava, thorace variegato. *M. L. U.* 405.\*  
*Habitat in Indiis.*
- fervens. 6. *S. nigra*, abdomine petiolato ferrugineo, alis cærulescentibus. *M. L. U.* 406.\*  
*Habitat in Indiis.*
- indostana. 7. *S. atra*, abdomine petiolato, alis nigro-cærulescentibus, margine tenuiore hyalino. *M. L. U.* 407.\*  
*Habitat in Indiis.*  
*Facie cum antecedenti convenit.*
- clavipes. 8. *S. nigra*, abdominis petiolo ferrugineo uniarticulato clavato, pedibus clavatis. *Fn. svec.* 1649.\*  
*Habitat in Europa.*  
*Parva est. Abdomen ferrugineum excepto petiolo. Femora & tibiae pesticae clavatae.*
- Spirifex. 9. *S. atra*, thorace hirto, petiolo uniarticulato flavo longitudine abdominis.  
*Reaum. inf.* 6. t. 28. f. 5.  
*Habitat in Europa australi; in cylindris spiralibus terreis sub tellis.*  
*Longitudo Crabronis: petiolus filiformis, flavus. Pedes 1, 2, 3, 4 flavi, basi femorum nigri. Pedes 5, 6 flavi, sed apicibus femorum & tibiarum nigris. Antennae filiformes 10 articulis, longitudine thoracis.*
- egyptia. 10. *S. nigra*, petiolo abdominis pedumque articulis dimidiatis flavis. *M. L. U.* 406.\*  
*Habitat in Ægypto. Hasselqvist.*
- sigulus. 11. *S. atra*, abdomine subpetiolato: marginibus segmentorum lucidis. *Fn. svec.* 1650.\*  
*Habitat Upsalæ in parietum ligneorum foraminibus, ab aliorum insectorum larvis factis relictisque, que primo purgat circumroditque, deinde fundum argilla obducit, cui Araneam imponit, eique ovulum concedit, quo facto nidum argilla claudit. Larva apoda.*



*poda*, pallida, larvisque *Apum* similis, consumpta *Aranea* membranam luteo-fuscam & teneræ pupæ aptissimam net. Una mater per plurimos nidos construit & plerumque non ultra biduum in quovis adorando consumit. T. Bergman.

*Alæ* abdomine breviores. Abdomen petiolatam, atrum marginibus segmentorum lucidis, si quis eos a capite oblique intueatur.

**Appendigaster.** 12. *S. atra*, abdomine petiolato brevissimo, pedibus posticis longissimis.

*Reaum. inf.* 6. t. 31. f. 13.

*Brown. jam.* t. 44. f. 6.

*Habitat* in Hispania. D. Z. Hallman; in Jamaica.

Corpus atrum, certo respectu albicans, punctis cavis adpersum. Thorax postice retusus. Abdomen ovatum, compressum, glaberrimum, minimum, petiolo dorso Thoracis annexum. Antennæ filiformes articulis 10. Pedes subfiliformes, nigri. Alæ hyaline, deflexæ, breves.

**Aspes.** 13. *S. atra*, abdomine petiolato brevissimo, tibiis posticis clavatis denticulatis rufis. *Fn. suec.* 1657.\*

*Habitat* in Europa.

Abdomen brevissimum, ut in *Ichn. Appendigastro*, Tibiæ magnitudine abdominis.

**bidens.** 14. *S. atra*, capite antennisque ferrugineis, abdomine maculis quatuor luteis, thorace bispinoso.

*Habitat* in Mauritania. E. Brander.

Corpus atrum, magnitudine *Crabronis*. Caput rufum ore nigro. Antennæ vix capite longiores, rufæ: primo articulo nigro. Thorax ad latera postice utrinque dente notatus. Abdominis segmento 2 & 3 macule binæ, flavæ, subrotundæ. Alæ antice subserrugineæ, postice, ubi magis hyalinæ, carulescentes. Femora supra gibbosiora.

\* \* Abdomine subseffili.

**viatica.** 15. *S. nigra* pubescens, alis fuscis, abdomine antice ferrugineo: cingulis nigris. *Fn. suec.* 1651.

*Scop. carn.* 780.

*Amæn. acad.* 3. p. 330.

*Raj. inf.* 254. n. 9. & *jun.* 22. *Vespa* miraculosa.

*Frisch.*

*Frisch. inf. 2. t. 1. f. 13.*

*Geoffr. parif. 2. p. 354. n. 34.*

*Habitat in Europa: fodit cuniculum, occidit larvam Phalanæ, attrahit, sepelit, imposito ovo obturat.*

fusca. 16. *S. atra lævis, abdominis segmentis tribus primis subferrugineis. Fn. suec. 1652.\**  
*Habitat in Europa.*

pectinipes. 17. *S. nigra glabra, abdomine anteriore ferrugineo, pedibus primariis ciliatis. Fn. suec. 1654.\**  
*Habitat in Europa.*

variegata. 18. *S. nigra tota, alis albo maculatis. Fn. suec. 1655.\**  
*Habitat in Europa.*

antarctica. 19. *S. nigra, antennis pedibusque ferrugineis.*  
*Habitat ad Cap. b. Spei.*  
*Magnitudo Vespa vulgaris. Corpus atrum. Abdomen, excepto segmento primo, nigrum, nec atrum. Antennæ luteæ. Pedes, exceptis femoribus, lutei.*

palmipes. 20. *S. nigra, thorace basi puncto uno apiceque duobus luteis, pedibus anticis palmatis.*  
*Habitat in Svecia. T. Bergman.*  
*Corpus oblongum, glabrum, atrum, formicæ nigre magnitudine. Thorax punctis 2, transversis, ad basin; 2 ad apicem, altero pone alterum. Pedes flavi, hinc nigri: antici manibus palmatis, dilatatis, apice armatis quasi 3 s. 4 digitis.*

mylæcea. 21. *S. nigra, scutello flavo, abdominis segmentis tribus margine flavis: primo interrupto, tibiis ferrugineis.*  
*Fn. suec. 1653.\**  
*Habitat in Europa.*

ephippia. 22. *S. atra, fronte cærulefcente, abdomine fascia ferruginea duplicata.*  
*Habitat in Svecia.*  
*Magnitudo Culicis. Antennæ thorace breviores. Frons pilosa, ex alb omicans. Thorax immaculatus. Abdomen glabrum: segmento 2, 3 ferrugineis, unde fascia una lata, sed lineola distincta. Pedes nigri. Tibiæ antice pallidæ.*

cribraria. 23. *S. nigra*, abdomine fasciis flavis, tibiis anticis clypeis concavis cribriformibus.

*Faun. suec.* 1675. *Vespa nigra*, abdomine fasciis sex flavis: intermediis tribus interruptis.

*Roland. alt. stockb.* 1751. p. 56. t. 3. f. 1.

*Uddm. diss.* 94. *Apis* tibiis anticis lamella cribriformi.

*Raj. inf.* 255. *Vespa Ichneumon* pedibus anterioribus subclypeatis.

*Habitat in Europa.*

clypeata. 24. *S. nigra*, abdomine punctis flavis, pedibus anticis concavo-clypeatis.

*Schreber inf.* 11. t. 1. f. 8. *Apis nigra*, abdomine fasciis sex flavis: primis 2 interruptis, tibiis anticis lamellis integris.

*Habitat Halæ.*

*Statura Vespe minoris.* Caput Thoraxque nigra. Abdomen nigrum utrinque maculis 3 luteis & demum transversis lineolis 2 luteis. Pedes flavi: antici, ut cribraria, clypeati lamella concava.

Stigma. 25. *S. alis* angulatis fusco-cinereis subtus rufescentibus, stigmatibus albis.

*Habitat ad Cap. b. Spei.*

*Corpus minus.* Abdomen cinerascens, subtus rufescens stigmatibus albis. Antennæ supra ferrugineæ; subtus albæ. Alæ erosæ, subtus ferrugineæ undulatæ; margine albo interrupto. Superiores supra puncto nigro ad angulum an.

indica. 26. *S. atra*, pedibus antennisque ferrugineis, alis atro-caeruleis. *M. L. U.* 408. \*

*Habitat in Indiis.*

tropica. 27. *S. nigra*, oculis albis, abdominis segmento secundo latiore ferrugineo. *M. L. U.* 408. \*

*Habitat in Indiis.*

Colon. 28. *S. nigra*, pedibus antennisque rufis, thorace viridi, alis maculis duabus nigris. *Fn. suec.* 1656. \*

*Habitat in Svecia.*

rufipes. 29. *S. atra*, abdominis segmentis utrinque macula alba, alis apice fuscis, pedibus posticis rubris. *Fn. suec.* 1659. \*

*Habitat in Europa.*

30. *S.*

- mauritanica. 30. *S. nigra* capite antennis pedibusque ferrugineis, alis limbo nigro.  
*Habitat in Mauritania. E. Brander.*  
 Corpus magnum. Caput ferrugineum aut nigrum. Antennæ ferrugineæ 10 articulis. Os leviter subulatum, pone maxillas prominens: palpis 4. Lingua bifida. Thorax niger aut antice ferrugineus, postice niger. Alæ ferrugineæ, cinctæ limbo nigro, excepto margine anteriore. Abdomen nigrum, laeve, ano ferrugineo. Pedes ferruginei.
- arenaria. 31. *S. abdominis* fasciis quatuor flavis: primo segmento duobus punctis flavis. *Fn. suec. 1660. \**  
*Habitat gregaria in arena, cuniculos fodiens.*
- fossoria. 32. *S. thorace* immaculato, ore argenteo, abdomine maculis utrinque quinque lutescentibus. *Fann. suec. 1662. \**  
*Habitat in Europæ montibus sabulosis.*  
*Caput grande, antice truncatum, ore argenteo.*
- gibba. 33. *S. nigra*, abdomine ferrugineo apice fusco, alis primoribus apice nigricantibus. *Fn. suec. 1658. \**  
*Scop. carn. 57Q.*  
*Habitat in Europa.*
- collaris. 34. *S. nigra*, alis fuscis fascia media terminalique albis, antennis pedibusque testaceis.  
*Habitat in Hispania.*  
*Magnitudo minoris formicæ. Collum flavum.*
- semiaurata. 35. *S. viridis*, nitida, abdomine ferrugineo apice nigro.  
*Fn. suec. 1661. \**  
*Habitat in Europa.*
- leucostoma. 36. *S. atra* glabra, labio argenteo, palmis fuscis. *Fn. suec. 1663. \**  
*Habitat in Europa.*
- vaga. 37. *S. thorace* bipunctato, abdominis fasciis 3 flavis: primis interruptis, tibiis flavis. *Fn. suec. 166. \**  
*Scop. carn. 785.*  
*Habitat in Europa.*

- caerulea.** 38. *S. caerulea*, alis ferrugineis basi nigris. *Mus. De Geer.*  
*Habitat in America meridionali.*  
 Magnitudo *Crabronis*. Alæ ferruginea, basi nigra,  
 apice albicantes. Antennæ basi nigra, apice ferru-  
 ginea.

**246. CHRYSIS.** Os maxillis absque proboscide.  
*Antennæ* filiformes: articulo I  
 longiore, reliquis XI brevibus.  
*Abdomen* subtus fornicatum, ut-  
 rinque squama laterali.  
*Anus* dentatus aculeo subexserto.  
*Alæ* planæ.  
*Corpus* auratum.

- ignita.** 1. *C. glabra nitida*, thorace viridi, abdomine aureo: api-  
 ce quadridentato. *Fn. suec. 1665.\**  
*Frisch. inf. 9. t. 10. f. 1.*  
*Sultz. inf. t. 19. f. 121.*  
*Geoffr. parif. 2. p. 382. n. 24.*  
*Scop. carn. 791.*  
*Schaff. elem. t. 40.*  
*Habitat in muris Europæ.*

- bidentata.** 2. *C. glabra nitens cyanea*, thorace bidentato abdominis-  
 que segmentis duobus primis aureis.  
*Habitat in Suecia.*  
*Parva, tota viridi-caerulea. Thorax supra aureus, po-*  
*stice caeruleus cum mucrone utrinque. Abdominis*  
*segmentum 1 supra aureum basi caerulea; 2 supra to-*  
*tum aureum.*

- fulvicincta.** 3. *C. glabra nitens viridis*, thorace fascia coccinea, ab-  
 domine aureo subtridentato.  
*Habitat in Pradio meo Hammarby. Adam Kuhn,*  
*Americanus.*  
*Corpus parvum, viridi-sericeum. Abdomen ignito-*  
*auratum. Thorax dorso fascia coccineo-aurea, uti*  
*etiam ipsa basis thoracis parum coccinea. Nigra sunt*  
*Antennæ, Oculi, Palmæ.*

4. *C.*

*Chrysidæ nitida, aurata, glabra, nidificant in parietibus factis foraminibus.*

- aurata. 4. *C. glabra nitens*, thorace viridi, abdomine aureo, ano bidentato. *Fn. suec. 1666.\**  
*Habitat in muris Europæ.*
- cyanea. 5. *C. glabra nitens*, thorace abdomineque cæruleo: apice tridentato. *Fn. suec. 1667.\**  
*Scop. carn. 697.*  
*Habitat in muris Europæ.*
- viridula. 6. *C. glabra nitens viridis*, thorace abdominisque segmentis duobus primoribus tergo aureis, ano quadridentato. *Fn. suec. 1668.\**  
*Habitat in Europæ parietibus.*
- fulgida. 7. *C. glabra nitens*, thorace abdominisque primo segmento cæruleis, reliquis aureis, ano quadridentato. *Fn. suec. 1669.\**  
*Habitat in Europa.*

247. VESPA. Os maxillis absque proboscide.  
*Alæ superiores plicatæ, in omni sexu.*  
*Aculeus punctorius reconditus.*  
*Oculi lunares. De Geer.*  
*Corpus glabrum. Geoffr.*

- carolina. 1. *V. thorace lineolis nigris tribus, corpore ferrugineo, alis superioribus nigricantibus.*  
*Habitat in Carolina. D. Garden.*  
*Magnitudo Crabronis. Frons flava. Thorax ferrugineus lineis 3 nigris longitudinalibus. Abdomen sessile, ferrugineum segmento 2 longiore. Pedes subferruginei. Alæ superiores nigricantes; inferiores hyalinae.*
- maculata. 2. *V. nigra, thorace albo-maculato, scutello quadrimaculato, abdomine postice albo maculato. Amoen. acad. 6. p. 412. n. 91.\**  
*Habitat in America septentrionali.*  
*Magnitudo Crabronis.*
- Crabro. 3. *V. thorace nigro antice rufo immaculato, abdominis incisuris puncto nigro duplici contiguo. Fn. suec. 1670.\**  
*Scop.*

*Scop. carn.* 824.

*Mouff. inf.* 50.

*Raj. inf.* 250.

*Aldr. inf.* 225.

*Frisch. inf.* 9. t. 11. f. 1.

*Swam. bibl. t.* 26. f. 9.

*Reaum. inf.* 6. t. 18. f. 1.

4. t. 10. f. 9.

*Habitat in Europæ arboribus cavis s. sub earum radicibus; Accipiter Apum.*

vulgaris. 4. V. thorace utrinque lineola interrupta, scutello quadrimaculato, abdominis incisuris punctis nigris distinctis. *Fn. suec.* 1671. \*

*Scop. carn.* 825.

*Mouff. inf.* 52.

*Raj. inf.* 250.

*Aldr. inf.* 198.

*Reaum. inf.* 6. t. 17. f. 7, 8.

*Frisch. inf.* 9. t. 12. f. 2.

*Swamm. bibl. t.* 26. f. 8.

*Schæff. elem. t.* 130.

*Habitat in Europa sub tellis frequens; pradatur Muscas, furatur mel Apum.*

rufa. 5. V. thorace utrinque lineola, scutello bipunctato, abdomine flavo antice ferrugineo. *Fn. suec.* 1672. \*

*Reaum. inf.* 6. t. 14?

*Habitat in Europa.*

parietum. 6. V. nigra, thorace lineola punctisque duobus, scutello bipunctato, abdomine fasciis quinque: prima remotissima. *Fn. suec.* 1673. & 1679. \*

*Raf. vesp. t.* 7. f. 8.

*Frisch. inf.* 9. t. 12. f. 1.

*Habitat in foraminibus paritium ligneorum.*

*Fasciæ abdominis flavæ.*

gallica. 7. V. thorace utrinque lineola: dorso sexmaculato, abdominis incisuris flavis: secunda binaculata.

*Habitat in Europa australi.*

Corpus simillimum *V. vulgari*, sed paulo minus. Frons

Pedes, segmentorum abdominis margines flavæ. Antennæ

flavæ. Thorax margine antico, linea ante

alas, puncto ante & sub alis, flavo. Regio scutelli

P p p

macu-

*maculis luteis 3 parium, ultimo oblongiore. Abdominis segmentum 2 utroque latere macula ovata flava.*

muraria. 8. *V. nigra*, thorace maculis duabus ferrugineis, abdominis fasciis quatuor flavis: prima remotissima. *Fn. suec. 1674.\**

*Scop. carn. 828.*

*Frisch. inf. 9. p. 24. t. 12. f. 8, 9.*

*Habitat in muris.*

*Scutellum immaculatum. Tibiæ subflavae.*

annularis. 9. *V. fusca*, genubus, antennarum apicibus, margineque primi segmenti abdominis flavis. *Amoen. acad. 6. p. 413. n. 93.\**

*Habitat in America septentrionali.*

spinipes. 10. *V. nigra*, abdomine fasciis quinque flavis, femoribus intermediis denticulatis, labio flavo maculato. *Fn. suec. 1682.\**

*Habitat in Svecia. T. Bergman.*

*Sexus alter dentibus femorum caret. Thorax immaculatus.*

coarctata. 11. *V. abdominis primo articulo infundibuliformi, secundo campanulato maximo bipunctato. Fn. suec. 1676.\**

*Scop. carn. 830.*

*Frisch. inf. 9. t. 9.*

*Geoffr. paris. 2. p. 377. t. 16. f. 2.*

*Habitat in Europa.*

arvensis. 12. *V. abdominis fasciis quatuor flavis: tertia interrupta. Fn. suec. 1678.\**

*Habitat in Europa.*

campestris. 13. *V. nigra*, thorace lituris quatuor, abdominisque fasciis quatuor flavis: prima interrupta. *Fn. suec. 1677.\**

*Habitat in Europa.*

bifasciata. 14. *V. nigra*, thorace immaculato, abdomine fasciis duabus flavis. *Fn. suec. 1683.\**

*Habitat in Europa.*



- quadri- 15. *V. atra*, thorace quadridentato, scutello primoque  
dens. segmento abdominis niveis. *Amœn. acad. 6. p. 413.*  
*n. 92. \**  
*Habitat in America septentrionali.*
- bidens. 16. *V. nigra*, thorace bispinoso, abdominis segmentis tri-  
bus margine luteis.  
*Habitat in Svecia.*  
*Paulo major Formica rubra.*
- biglumis. 17. *V. scutello bispinoso*, abdominis segmentis margine  
albis: secundo punctis duobus albis. *Fann. svec. 1680. \**  
*β. Vespa rupestris. Syst. nat. 10. p. 573. n. 8.*  
*Habitat in Europa; trahit occisas Muscas se sæpe tri-  
plo majores; ad latera australia lapidum conficit ni-  
dum e fistulis aggregatis. Rolander.*
- uniglu- 18. *V. scutello mucronato*, abdominis segmentis tribus  
mis. punctis duobus albis sublateralibus. *Fn. svec. 1681. \**  
*Habitat in Europa.*  
*Thorax immaculatus.*
- ruspatrix. 19. *V. nigra*, abdomine ovato luteo: segmentis dorso  
unimaculatis.  
*Habitat in Africa.*  
*Corpus fuscum, magnitudine Apis domesticæ. Frons  
flava, lunata; pone oculos luna ferruginea. Thorax  
niger. Punctum luteum ante alas. Scutellum glau-  
cum. Abdomen ovatum, sessile, luteum (imprimis  
2 prima segmenta flava) cum macula nigra conica  
ad basin singuli segmenti in dorso. Pedes flavi, sed  
primi parvis magis fulvi, extus ciliati.*
- cornuta. 20. *V. rostro corneo subulato*, abdomine atro: segmenti-  
to secundo majore. *M. L. U. 409. \**  
*Habitat in Indiis.*  
*Thorax latere dentatus. Rostrum bivalve. Alæ ni-  
græ. Mas cornubus duobus capite duplo longioribus.*
- caffa. 21. *V. rostro corneo subulato*, corpore luteo nigroque,  
antennis medio croceis.  
*Habitat ad Cap. b. spei.*  
*Corpus inter majores. Caput nigrum fronte flava.*  
*Thorax luteus dorso saturis & lateribus nigro-pictis.*  
*P p p 2* *Scu-*

*Vespe vivunt in Societate gynæocratica, sævæ struunt, insecta hymenoptera devastant.*

- Scutellum *fascia nigra*. Pedunculus abdominis *arcuatus, clavatus, notatus utrinque punctis 2 luteis*. Abdomen *luteum linea dorsali nigra & fasciis 2 nigris, quarum prior latior*. Pedes *lutei, subtus rubicundi*. Antennæ *clavata, nigrae: medio circulo lato croceo s. ferrugineo*.
- capensis*. 22. V. rostro corneo subulato, abdomine petiolato, apicē subtus lutescente.  
*Habitat ad Cap. b. spei.*  
 Corpus *nigrum, longitudine V. Crabronis, glabrum*. Rostrum *bidentatum, subulatum*. Antennæ *clavatae*. Petiolus abdominis *arcuatus, clavatus*. Abdomen *ovatum, acuminatum, subtus ad apicem ferrugineum*. Alæ *plicatae*.
- surinama*. 23. V. nigra, abdomine petiolato subviolaceo atro.  
*Habitat Surinami.*  
 Corpus *totum nigrum, magnitudine Crabronis*. Abdomen *subcaeruleescens, ovatum, acuminatum petiolo subclavato*. Alæ *nigrae, plicatae, caeruleescentes*.
- signata*. 24. V. thorace supra nigro lineis quatuor fasciisque duabus flavis. *M. L. U. 410. \**  
*Habitat in America.*
- canaden-* 25. V. thorace squamis duabus, abdominis ferruginei seg-  
*sis.* gmento primo obconico. *M. L. U. 411. \**  
*Sultz. inf. t. 19. f. A.*  
*Habitat in America septentrionali. P. Kalm.*
- emargina-* 26. V. scutello emarginato, abdominis nigri petiolo in-  
*ta.* curvo utrinque unidentato. *M. L. U. 412. \**  
*Habitat in America.*
- calida*. 27. V. nigra, abdominis apice antennisque fulvis.  
*Habitat in Indiis.*
- minuta*. 28. V. atra, geniculis pedum luteis, femoribus posticis ovatis subtus muricatis.  
*Habitat in Europa australi.*  
 Corpus *totum atrum, vix Pediculo duplo majus, adeoque minimum*. Abdomen *ovatum*. Genua & Plantæ *flavae*. Squamula ante alas *flava*. Antennæ *cylindrica, nigra, deflexa*.

248. APIS. Os maxillis atque proboscide inflexa  
vaginis duabus bivalvibus.

*Alæ* planæ, in omni sexu.

*Aculeus* Feminis & Neutris puncto-  
rius reconditus.

longicor- 1. A. antennis filiformibus longitudine corporis hirsuti  
nis. fulvique. *Fn. suec.* 1684.\*

*Scop. carn.* 794.

*Swamm. bibl.* 1. 26. f. 6.

*Habitat in Europa.*

tumulo- 2. A. antennis filiformibus longitudine corporis nigri,  
rum. pedibus maxillisque flavescens. *Fn. suec.* 1685.\*

*It. gold.* 336.

*Habitat in Wisingoræ Tumulis sepulchralibus.*

clavicor- 3. A. antennis clavatis longitudine corporis nigri, abdo-  
nis. minis fasciis duabus flavis interruptis. *Faun. suec.*  
1686.\*

*Habitat in Europa.*

centen- 4. A. nigra, ventre lana fulva. *Fn. suec.* 1687.\*  
cularis. *Scop. carn.* 799.

*Raj. inf.* 242. Apis sylvestris, corpore longo angusto.

*Reaum. inf.* 6. 1. 10. f. 3, 4.

*Frisch. inf.* 11. 1. 2?

*Geoffr. parif.* 2. p. 410. n. 5.

*Habitat in Europa, intra terram plures nidos cylindri-  
cos ex foliis Rosæ formans, tamquam centunculos.*

*Amæn. acad.* 3. p. 320.

cineraria. 5. A. nigra, thorace hirsuto albicante; fascia nigra, ab-  
domine cærulecente. *Fn. suec.* 1688.\*

*Habitat in Europa.*

*Alæ fuscae sunt.*

mexicana. 6. A. atra, alis atro-cærulecentibus, abdominis petiolo  
obovato.

*Habitat in America. Rolander.*

*Magna, facie Sphegis, sed lingua instructa.*

P P P 3

7. A.

Apes vivunt in Societate gynæcocratica, favos strunt cereos, & mel e nektare flo-  
ram hauriunt.

- carbonaria. 7. *A. atra*, alis cærulefcenti-fuscis.  
*Habitat in Africa*  
 Corpus magnitudine *A. mellifica*, levissime pubescens.  
 Thorax postice retusus. Rostrum sub maxillis breve,  
 conicum, cui pone apicem Palpi 2 ferruginei quin-  
 que-articulati, & in apice Palpi 2 triarticulati.
- retusa. 8. *A. nigra* subhirta, abdominis basi retusa, tibiis posticis  
 extus lanatis. *En. suec. 1689.* \*  
*Habitat in Europa.*
- rufa. 9. *A. fusca*, abdomine rufescente, fronte alba. *Faun. suec.*  
*1690.* \*  
*Raj. inf. 242.* *Apis sylvestris parva*, abdomine bre-  
 viore  
*Habitat in Europa.*
- bicornis. 10. *A. fronte bicorni*, capite nigro, abdomine hirsuto,  
*En. suec. 1691.* \*  
*Habitat in Europa.*  
*An prioris femina? copula connexas vidit P. Ferskål.*
- maxillofa. 11. *A. maxillis prominentibus*, antennis thorace breviori-  
 bus, abdomine cylindrico; subtus luteo-hirsuto.  
*Habitat in Europa.*  
 Corpus totum nigrum, supra nudum, simile *A. trun-*  
*corum*. Abdomen supra segmentis margine albidis;  
 subtus hirsutum, flavum. Antennæ subulavata, Tho-  
 race breviores, vix manifeste articulata. Maxillæ  
 exsertæ, longitudine capitis.
- truncorum. 12. *A. nigra* glabra, fronte albida pubescente, abdomine  
 segmentis margine albidis, subtus flavicante. *Faun.*  
*suec. 1692.* \*  
*Habitat in Europa.*
- florisomnis. 13. *A. nigra*, abdomine subcylindrico incurvo, ano biden-  
 tato, tibiis posticis apice spinosis. *Faun. suec. 1704.* \*  
*Scop. carn. 796.*  
*Habitat in Europa, pernoctans in floribus.*
- dentata. 14. *A. nitida* viridis, alis nigris, femoribus posticis den-  
 tatis. *M. L. U. 413.* \*  
*Habitat in America.*  
 Corpus leve. Lingua longitudine fere corporis.

- cordata. 15. *A. nitida viridis, alis hyalinis, abdomine cordato, tibiis posticis dilatatis. M. L. U. 414.\**  
*Habitat in Indiis.*
- helvola. 16. *A. rufa villosa oblonga subtus albida. Faun. suec. 1693.\**  
*Habitat in Europa.*
- Fabriciana. 17. *A. nigra, abdomine glabro ferrugineo: maculis duabus flavis.*  
*Habitat Upsaliæ. Fabricius.*  
*Corpus minus A. helvola; villi frontis thoracisque albi. Alæ fusæ: lunula pallida versus postica.*
- succincta. 18. *A. thorace flavescente subvillosa, abdomine nigro: cingulis quatuor albis. Fn. suec. 1694.*  
*Geoffr. parif. 2. p. 413. n. 11.*  
*Habitat in Terris australibus.*  
*Rostrum subulatum, corneum, bivalve.*
- zonata. 19. *A. subpubescens fusca, abdomine cingulis quatuor cæruleis. M. L. U. 415.\**  
*Habitat in Indiis.*
- ænea. 20. *A. ænea grifescente-pubescens. Fn. suec. 1695.\**  
*Habitat in Europa.*
- cærule-scens. 21. *A. fusca subvillosa, abdomine cærulecente: incisurarum marginibus albicantibus. Fn. suec 1696.\**  
*Habitat in Europa.*
- mellifica. 22. *A. pubescens, thorace subgriseo, abdomine fusco, tibiis posticis ciliatis: intus transverse striatis. Faun. suec. 1697.*  
*Scop. carn. 811.*  
*Mouff. inf. 2.*  
*Aldr. inf. 20.*  
*Fonst. inf. 1. t. 2.*  
*Raj. inf. 240.*  
*Swamm. quart. bibl. t. 17. f. 1. operaria.*  
*f. 3. femina.*  
*f. 4. mas.*  
*Reaum. inf. 5. t. 21. 23. t. 22. f. 1. operaria.*  
*f. 2. mas.*  
*f. 4. femina.*

Sultz. inf. t. 19. f. 123.

Geoffr. parisi. 2. p. 407. n. 1

Habitat in Europæ arboribus cavis, frequentius culta hospitatur.

**REGINA** (Femina) unica, altior, oblongior, aculeata, antennis articulis 10. **FUCI** (Mares) ad 1600, inermes, antennis 11-articulatis. **OPERARIÆ** (Spadones) ad 20000, antennis 15-articulatis, ventriculis 2: mellis ceræque, aculeata; Ense retrorsum serrato, venenato, latente intra vaginam cuspidatam.

**RESPUBLICA** Alvearii gynæcocratica est, dum Femina imperans semper inclusa, operariorum custodum satellitio assidue stipata, antennis obvium Marem salutat, insiliendoque comprimit cum illius vitæ dispendio; parit dein ova ad 40000 sæpe quotannis, in adaptatis favi cellis: primum neutra, dein mascula, demum nonnulla feminina; his exclusis gradu 2:do supra calorem æstatis ordinaria, adolescenti Larvæ sextiduo, nent ad parietes cellæ, operiuntur usque dum adultæ evolvant, alteroque die mellificant. Harum Femina junior, per triduum, omni horæ quadrante, stridorem edit, eoque admonet emigraturum in examina gregem. Mares, ignavum pecus, incurii apricantur serenis diebus, gule dediti. Spadones operarii, neutri, indefessi, mel e neclare, cera e polline florum scâulo legunt  $\frac{1}{2}$  milliaris spatio, quoties per cælum licet, redeunt, favos cereos struunt sexangulari-prismaticos, eosque melle replent, feminam mares pullosque nutriunt, cellas inhabitatas repurgant, mira munditia impura auferunt, vigiliis & stationes ad portas institunt, hostes arcent aculei ictu venenato sibi ipsis licet lethali, maresque demum transactis nuptiis occidunt, expellunt. Examinant emittendo colonias femina duce ad novas quarendas sedes superato solstitio æstivo, Speculatoribus fronte notatis palpis duobus luteis. Hostes imprimis sunt Motacilla alba. Merops Apiaſter, Falco apivorus, Picus viridis, Aranea calycina, Hirundines, Pavones, Bufones, Mures, Crabrones, Vespe, Pediculi, Apes fures, Mellonella, cereane Fumus &c. Tulipæ flores captivant. Flores melliferi, non omnes, præcipui sunt Echium, Borago, Verbascum, Serpyllum, alii; imprimis Erica Suecica, Fagopyrum Scania, Tilia Polonia, Rosmarinus Narbonensis, Thymus Atticus, Arbutus Corsicis, Absinthium

*thium Sardinis, Aconitum Ponticis &c. hinc pretium varium mellis. Pan Apum hodie vestitur a D. D. J. O. Hagström; Historiam Apum dederunt Reaumur, Aubenton aliisque.*

*- - - ipsæ Regem parvosque Quirites Sufficiunt, aulasque & cerea Regna refingunt. Virg.*

**cunicularia.** 23. *A. pubescens, thorace ferrugineo, abdomine fusco, pedibus undique villosis. Fn. suec. 1698. \**

*Habitat in Terra sabulosa sicciore, quam foraminibus pluribus parum remotis penetrant & distincte adificiant plures.*

*Simillima A. mellificæ.*

**variegata.** 24. *A. thorace abdomineque albo variegato, tibiis ferrugineis. Fn. suec. 1699. \**

*Habitat in Europa. Pernoctat in Geranii phæi rostris mordicus apprehensis.*

*Abdominis segmento 1, 2 maculis duabus; 3, 4, 5, 6 vero quatuor albis.*

**rostrata.** 25. *A. labio superiore conico inflexo, abdominis fasciis glaucis repandis. Fn. suec. 1700. \**

*Fn. suec. 1. n. 999. Apis pedibus maxillisque flavis apice nigris, incisuris abdominis glabris margine nigris.*

*It. goth. 336.*

*Habitat in Europæ monticulis arenosis; in singulis nidis unico pullo.*

**argillosa.** 26. *A. rostro inflexo unico, ferruginea, abdominis petiolo clavato curvato.*

*Syst. nat. 10. p. 569. Sphex ferruginea, abdominis petiolo uniarticulato curvato, antennis clavatis, maxillis porrectis.*

*Habitat Surinami. Larva intra globos argillaceos. Ro-lander.*

*Antennæ 10-12 articulis. Maxillæ subulatae, prominentes, edentulae, Rostrum bivalve amplexantes. Forte proprii generis cum Ape rostrata & violacea. Abdominis segmentum primum campanulatum, fuscum.*

**lagopoda.** 27. *A. grisea, pedibus anticis dilatato-ciliatis, tibiis posticis clavatis, ano emarginato. Fn. suec. 1702. \**

*Habitat in Europa.*

P P P 5

28. A.

- manicata. 28. *A. nigra*, pedibus anticis hirsutissimis, abdomine maculis flavis lateralibus, ano tridentato. *Fann. suec.* 1701. \*  
*Swamm. bibl. t. 26. f. 4.*  
*Geoffr. parif. 2. p. 408. n. 3.*  
*Habitat in Europa.*
- 4-dentata. 29. *A. fusca*, abdominis cingulis quinque albidis, ano quadridentato: intermediis bifidis. *Fn. suec.* 1703. \*  
*Swamm. bibl. t. 26. f. 4.*  
*Habitat in Europa.*
- fasciata. 30. *A. supra lutea*, fascia bascos alarum atra.  
*Habitat ad Cap. b. spei.*  
*Facies A. manicatae. Corpus supra luteo-ferrugineam. Pectus subtus albidum. Abdominis segmenta 2 prima atra; latera alba, subtus nigra. Tibiæ valde hirsutæ, atræ, sed antice pallidæ, minus hirsutæ. Antennæ nigrae.*
- barbara. 31. *A. nigra*, thoracis ambitu rufø.  
*Habitat in Barbaria.*  
*Magnitudo Formicae majoris, tota nigra. Thorax basi, lateribus & inter alas ruber. Abdomen ovato-subulatum, nigrum, ad incisuras villis pallidis pubescens: segmentum primum minimum; secundum maximum. Antennæ filiformes.*
- conica. 32. *A. fusca*, abdomine conico acutissimo: segmentorum marginibus albis. *Fn. suec.* 1705. \*  
*Raj. inf. 252. n. ult.*  
*Reaum. inf. 6. t. 11. f. 2, 3, 4.*  
*Habitat in Terræ cavitatibus.*
- annulata. 33. *A. nigra*, fronte annulisque pedum nigris. *Fn. suec.* 1706. \*  
*Habitat in Europa.*
- ruficornis. 34. *A. antennis pedibus duobus punctisque thoracis ferrugineis*, abdomine luteo variegato. *Fn. suec.* 1707.  
*Habitat in Europa.*
- ferruginea. 35. *A. nigra glabra*, abdomine antennis ore pedibusque ferrugineis.  
*Habitat in Europa: Suecia.*



*Parva.* Caput & Thorax nigra: puncto flavo, elevato, utrinque thoracis. Abdomen ovatum, glabrum. Femorum basis nigra. Hæc & ruficornis media inter Apes & Vespas sunt.

ichneu-  
monea,

36. A. rostro corneo recto, abdomine petiolato, thoracis futuris aureo-nitentibus.

*Habitat in America. Rolander.*

*Similis Ichneumoni, A. mellifera major. Lingvæ vagina recta, nec reflexa, apice bifida. Antennæ nigrae. Thorax nigricans futuris aureis nitentibus. Abdomen nigrum, segmentis tribus primis ferrugineis.*

cariofa.

37. A. fusca subvillosa, fronte pedibusque flavis. *Faun. succ. 1708.\**

*Habitat in Europæ ligno carioso.*

\* *Bombinatrices hirsutissimæ.*

violacea.

38. A. hirsuta atra, alis cærulescentibus. *M. L. U. 415.\**

*Scop. carn. 812.*

*Pet. gaz. t. 12. f. 5. Bombylius lusitanicus e nigro cærulescens.*

*Reaum. inf. 6. t. 5. f. 1, 2.*

*Geoffr. paris. 2. p. 416. n. 19.*

*Habitat in Truncis exsecatis Europæ australis, quos perforat, longitudinaliter excavat, ibique plures nidos a fundo incipiens polline herbarum melle mixto replet & unicuique ovum concredit. Nidi distinguuntur 4 l. 5 annulis ligneis. Nymphæ caput deorsum spectat ut in fundo exitum quærat Apis perfecta.*

castra.

39. A. hirsuta atra, thorace postice abdomineque antice luteis.

*Habitat ad Cap. b. spei.*

*Magnitudo A. violacæ, tota atra, sed fascia lutea cingit simul & postica thoracis & antica abdominis.*

carolina.

40. A. hirsuta atra, abdomine supra flavescente.

*Habitat in Carolina. D. Garden.*

*Statura A. lapidariæ, sed abdomen supra testum pilis pallidis s. flavescentibus.*

terrestris. 41. *A. hirsuta nigra*, thoracis cingulo flavo, ano albo.

*Fn. suec.* 2709.\*

*Scop. carn.* 815.

*Monff. inf.* 52.

*Gæd. inf.* 2. t. 46.

*List. gæd. f.* 105.

*Reaum. inf.* 6. t. 3. f. 1.

*Bradl. natur. t.* 26. f. 1. D.

*Raj. inf.* 247. n. 5.

*Frisch. inf.* 9. t. 13. f. 1.

*Sultz. inf. t.* 19. f. 124.

*Schæff. elem. t.* 20. f. 6.

*Habitat in Europæ terra, sub qua profunde nidum ponit.*

hortorum. 42. *A. hirsuta nigra*, thorace abdomineque antice flavo, ano albo. *Fn. suec.* 1710.\*

*Habitat in Europa.*

pratorum. 43. *A. hirsuta nigra*, thorace antice flavo, ano rubro.

*Fn. suec.* 1711.\*

*Habitat in Europa.*

lapidaria. 44. *A. hirsuta atra*, ano fulvo. *Fn. suec.* 1702.\*

*Scop. carn.* 813.

*Frisch. inf.* 9. p. 25. n. 2.

*Reaum. inf.* 6. t. 1. f. 1-4.

*Habitat in acervis Lapidum.*

sylvarum 45. *A. hirsuta pallida*, thoracis fascia nigra, ano rubro.

*Fn. suec.* 1713.\*

*Scop. carn.* 822.

*Habitat in Europa.*

Musco- 46. *A. hirsuta fulva*, abdomine flavo. *Fn. suec.* 1714.\*

rum.

*Frisch. inf.* 9. p. 26. n. 8.

*Reaum. inf.* 6. t. 2. f. 3-4.

*Habitat sub Musco terrestri.*

Hypno- 47. *A. hirsuta fulva*, abdominis fascia nigra, ano albo.

rum.

*Fn. suec.* 1715.\*

*Scop. carn.* 820.

*Reaum. inf.* 6. t. 4. f. 1.

*Habitat sub Muscis.*

lucorum. 48. *A. hirsuta* flava, ano albido. *Fn. suec.* 1716.\*  
*Habitat in Europa.*

brasiliانو-49. *A. hirsuta* helvola, femoribus basi nigris.  
 rum. *Habitat in America. L. Spengler.*

*Corpus maximum magnitudine A. violacea, undique vellera testaceo vestitum. Oculi atrii. Antennæ supra fusca, subtus testacea. Femora testacea, glabra, compressa, basi nigra. Tibiæ Plantæque testaceo-pilosæ. Maxillæ nigrae, bidentatae, amplexantes. Rostrum conico-subulatum, bivalve.*

acervo- 50. *A. hirsuta* atra. *Fn. suec.* 1717.\*  
 rum. *Habitat sub terra.*

subterra- 51. *A. hirsuta* atra, ano fusco. *Fn. suec.* 1718.\*  
 nea. *Raj. inf.* 246. n. 1.  
*Geoffr. paris.* 2. p. 416. n. 20.  
*Habitat sub terra.*

surina- 52. *A. hirsuta* nigra, abdomine, excepto primo segmen-  
 menfis. to, flavo.  
*Habitat Surinami. Rolander.*

æstuans. 53. *A. hirsuta* nigra, thorace flavo. *M. L. U.* 416.\*  
*Habitat in calidis regionibus.*

tropica. 54. *A. hirsuta* nigra, abdomine postice flavo. *M. L. U.*  
 416.\*  
*Habitat in calidis regionibus.*

alpina. 55. *A. hirsuta*, thorace nigro, abdomine luteo. *Fann.*  
*suec.* 1719.\*  
*Habitat in Lapponiæ alpinis.*

249. FORMICA. *Squamula* erecta thoraci abdomi-  
nique interjecta.*Aculeus* Feminis & Neutris re-  
conditus.*Alæ* Maribus & Feminis; sed  
Neutris nullæ.herculea- 1. *F. nigra*, abdomine ovato, femoribus ferrugineis.  
na. *Fn. suec.* 1720. \**Scop. carn.* 832.*Fn. suec.* 1. n. 1019. Formica magna.*It gotl.* 232. Formica magna. Hippomyrmex.*Raj. inf.* 68. Formica maxima.*Habitat in Europæ truncis putridis vagabunda; in  
America septentrionali. Kalm.*barbara. 2. *F. atra*, capite antennis plantisque ferrugineis.*Habitat in Barbaria. E. Brauder.*Corpus nigrum, magnitudine *F. heracleana*: Caput  
magnum, nigro-ferrugineum absque *stemma*tibus.

Antennæ ferrugineæ, excepto articulo maiore infimo.

Petiolus abdominis articulis 2, subnodosis, absque

*squama*. Abdomen segmentis tribus. Plantæ ferru-  
gineæ.rufa. 3. *F. thorace compresso* toto ferrugineo, capite abdomi-  
neque nigris. *Fn. suec.* 1721. \**Scop. carn.* 836.*Fn. suec.* 1. n. 1020. Formica rufa.*Schæff. inf.* 1. 5. f. 3. & *elem.* 1. 64.*Raj. inf.* 69. Formica media rubra.*Habitat in Europæ acervis acerosis sylvaticis, pungens;  
in America septentrionali. Kalm. Magna Formica  
laboris ore trahit quodcumque potest, atque addit a-  
cervo. Horat. Angustum formica terens iter. (Virg.)  
Adscendit arborem, ut Aphides illius vaccas malgeat,  
nec occidat.*4. *F.*

---

Formicæ vivunt in societate, indefessa corradunt quisquiliis & in acerum Societa-  
tis congerunt; at plebecula hæc spadonum sub nuptiis inservit novis nuptis, &  
peractis puerperis expellit parentes, retentis libris pro conservatione familiae.  
Pelluntur rejectancis piscium, retibusque his immersis circumligatis arborum  
truncis.

- fusca. 4. *F. cinereo-fusca*, tibiis pallidis. *Fn. suec.* 1722. \*  
*Fn. suec.* 1. n. 1021. Formica fusca.  
*Raj. inf.* 69. Formica média, nigro colore splendens.  
*Habitat in Europæ terra sabulosa.*
- nigra. 5. *F. tota nigra nitida*, tibiis cinerascens. *Fn. suec.* 1723.  
*Scop. carn.* 834.  
*Fn. suec.* 1. n. 1023.  
*Raj. inf.* 69. Formica minor e fusco nigricans.  
*Habitat in Europæ terra.*
- obsoleta. 6. *F. supra nigra*, subtus testaceo-rufa, abdomine subglobofo. *Fn. suec.* 1724. \*  
*Habitat in Europæ terra.*
- rubra. 7. *F. testacea*, oculis punctoque sub abdomine nigris. *Fn. suec.* 1725. \*  
*Fn. suec.* 1. n. 1022. Formica rubra.  
*Raj. inf.* 69. Formica minima rubra.  
*Habitat in Europa tuberibus graminosis; pessime nostratum pungit.*
- Pharao- 8. *F. rufa*, abdomine magis fusco. *M. L. U.* 418. \*  
 nis. *Habitat in Ægypto; minima.*
- Salomo- 9. *F. rubra*, abdomine nigro subvilloso. *M. L. U.* 418. \*  
 nis. *Habitat in Ægypto, Arabia, Palæstina.*
- sacchari- 10. *F. nigra*, pedibus antennis maxillisque rufis.  
 vora. *Brown. jam.* 440. Formica minima saccharivora.  
*Habitat in America intra culmos Sacchari nidificans eosque destruens.*  
*Corpus adpersum pilis albidis. Squama petioli crassa integra. Magnitudo F. caspitem.*
- caspitem. 11. *F. abdominis petiolo binodi: priore subtus, thorace- que supra bidentato.*  
*Fn. suec.* 1726. \* Formica petiolo nodis duobus alternis: posteriore majore.  
*Amoen. acad.* 6. p. 413. n. 94. \* Formica binodis nigra, abdomine glaberrimo, segmentis duobus primis subglobofis.  
*Scop. carn.* 837.  
*Act. Berol. vol.* 5.

Hamb.

*Hamb Magaz. v. 5. p. 393.*

*Habitat in terra sub muscis, in pratis siccioribus Europæ; Mares femineque examinant medio Augusti, meridie calido, more Phryganearum in aëre choreas agentes turma volatili, deploentes per paria juncta.*

*Corpus ferrugineo-fuscum, magnitudine F. nigræ. Scutelli loco dentes 2 distantes. Abdomen ovatum petiolo articulis 2 subrotundis: priore subtus dentibus 2. Pedes testacei. Alæ hyalinae absque stigmate; non pungi.*

omnivo- 12. *F. thorace punctis elevatis, petiolo binodoso, cor-*  
12. *pore testaceo, abdomine minuto.*

*Brown. jam. 440. Formica domestica omnivora.*

*Habitat in America meridionali, consumens & dilacerans omnia cibaria.*

*Thorax levis, adpersus punctis vix conspicuis elevatis. Abdomen fuscum pilis albis, vix manifestis. Petiolus nodis duobus teretiusculis. Corpus testaceum, minutissimum. (Specimen missum an genuinum?)*

bidens. 13. *F. thoracis gibbere bidentato, capite ovato, antennis*  
*ferrugineis: articulo infimo nigro.*

*Habitat in America meridionali. Rolander.*

*Caput ovatum. Antennæ articulo primo longo nigro, reliquis brevissimis ferrugineis. Thorax in medio spinis 2 obtusiusculis, brevissimis, approximatis, s. gibbere bidentato notatus.*

sexdens. 14. *F. thorace sexspinoso, capite didymo, utrinque postice*  
*mucronato.*

*Habitat in America meridionali. Rolander.*

*Caput pone bilobum s. didymum, utrinque postice terminatum spina solitaria. Thorax a tergo spinarum tribus paribus armatum: quarum 2 priores antrorsum prominentes; mediæ 2 minimæ sunt; posteriores 2 erectæ. Petiolus Abdominis articulis duobus nodosus.*

cephalo- 15. *F. thorace quadrispinoso, capite didymo magno utrin-*  
tes. *que postice mucronato.*

*Merian. surin. t. 18. f. majores.*

*Marcgr. bras. 252. Formica magna.*

*Habitat in America meridionali.*

Corpus

---

*Formicæ Indiæ summa calamitas; consumuntur a Myrmecophilis.*

Corpus totum ferrugineo-pubescent. Caput crassissimum, rotundatum; postice didymum cum spina utrinque brevi. Thorax antice spinis 2 erectis, distantibus; postice spinis 2 erectis, approximatis. Petiolus abdominis tuberculis duobus, uno post alterum, notatus.

atrata. 16. F. thorace quadrispinoso, capite depresso marginato utrinque bispinoso.

Marcgr. bras. 252. Tapiia.

Habitat in America meridionali. Rolander.

Caput obtusum, depressum, utroque latere elevato-marginatum, postice utrinque bispinosum, s. duplici aculeo mucronatum. Maxillæ brevissimæ. Corpus atrum. Thorax spinis 4, omnino ut in precedenti. Petiolus abdominis tuberculis 2, uno post alterum, loco squamæ.

hæmato- 17. F. squama petiolari conica, capite subdidymo, ma-  
da. xillis porrectis rubris.

Habitat in America meridionali. Rolander.

Caput oblongum, depressiusculum, postice bilobum absque punctis. Maxillæ 2, rectæ, parallelæ, prominentes, exsertæ, rubræ, edentulæ. Thorax inermis. Abdomen nigricans: Petiolo Squama conica, acuta. Pedes flavi. Alæ hyalinæ. Corpus nigrum.

foetida. 18. F. gibbere petiolari transverse compresso, abdominis primo segmento contractiore, maxillis porrectis.

Habitat in America meridionali. Rolander.

Caput nigrum, supra punctis 3 elevatis, quod non in precedentibus americanis. Maxillæ exsertæ, longiusculæ, rectæ, parallelæ. Thorax inermis. Abdomen, uti Pedes, pilis vagis adpersum: articulo primo contractiore. Petiolus unico articulo, supra tuberculo gibbo, antice posticeque compresso & postice transversim striato. Alæ hyalinæ.

250. MUTILLA. *Alæ nullæ in plerisque.**Corpus pubescens, Thorax postice retusus.**Aculeus reconditus, punctorius.*occiden- 1. *M. coccinea*, abdomine cingulo nigro.  
alis. *Pet. mus. 404. gaz. t. 13. f. 10.**Filic. 404. t. 11. f. 4.**Catesb. car. 3. p. 15. t. 15.**Sultz. inf. t. 19. f. 9.**Habitat in America septentrionali.**Caput helvolum antennis nigris. Thorax niger, supra helvulus. Pedes nigri. Abdominis segmentum 1 maximum, helvolum, basi margineque postico nigrum; 2 nigrum; 3 helvolum; 4 helvolum margine nigro nudo; 5 helvolum apice nigro nudo. Aculeus filiformis, longus. Abdomen subtus atrum. Oculi globosi, nigri.*america- 2. *M. nigra*, abdomine maculis rufis quatuor lineisque  
na. tribus albis.*Habitat in America australi.**Antennæ subulata, nigrae. Thorax ater, utrinque macula alba in medio, etiam macula alba utrinque in posteriore parte thoracis. Abdominis primum segmentum magnitudinis, maculis 4 rufis, quarum 2 priores minores; reliqua segmenta maculis 3 magnis albis, unde abdomen postice lineis tribus albis longitudinalibus.*indica. 3. *M. nigra*, abdomine fascia lutea lineaque alba. *M. L. U. 419.\***Habitat in Indiis.*europæa. 4. *M. nigra*, abdomine fasciis duabus albis, thorace antice rufo. *Fn. succ. 1727.\***Uddm. diff. 98. t. 17. Apis aptera.**Habitat in Europa.*atram. 5. *M. atra*, abdomine fascia alba, thorace immaculato.  
*Habitat in Africa.*

Statu-

---

*Mutilla species vagæ occurrunt & plerumque aptera; nec ultra tria specimina alata nobis visa; harum domicilia & vivendi modus etiamnum latet.*



Statura omnino *M. maura*, sed Abdomen unico cingulo albo, in medio, nec ulla linea bifido, uti in *maura*; neque Thorax supra ruber. Alæ omnino nigrae, nec fusca.

Alacum individuum misit D. Schreber. Corpus nigrum, hirtum, facie apis. Thorax supra rufus, uti & Scutellum. Abdominis primum segmentum margine albo, fasciam albidam ad basin constituyente; secundi margo cum tertio toto segmento fasciam albam mediam abdominis efficit. Alæ fusca.

*maura*. 6. *M. nigra*, abdomine maculis quatuor albis, thorace rufo.

*Habitat in Mauritania. E. Brander. in Germania D. Schreber.*

*Præcedenti minor, tota nigra, sed macula supra abdomen albæ; una parva ad basin; una ad apicem; duæ paulo majores ad latera in medio abdominis paria.*

*barbara*. 7. *M. nigra*, abdomine punctis triternatis albis, thorace rufo.

*Habitat in Barbaria. E. Brander.*

*Macula supra abdomen albæ, triplici serie tres, simul novem.*

*helvola*. 8. *M. helvola*, abdomine cylindrico apice pubescente, femoribus compressis.

*Vespa helvola. M. L. U. 412. \**

*Habitat ad Cap. b. spei. D. Tulbagh.*

*Singularis species; forte hujus generis. Corpus magnitudine Vespa vulgaris, totum helvolam. Caput parvum, hirtum: Stemmatis rufis, glabris. Maxillæ acuminatæ, longitudine capitis. Antennæ setacæ, thorace breviores. Oculi globosi, atrii. Thorax hirtus, suturis distinctus: Scutello magno, gibbo. Abdomen longum, subcylindricum, nudum: segmentis 7, ultimo pubescente, quarum quatuor prima utrinque spiraculo perforata, at segmentum primum profunde & omnimode divisum & distinctum a reliquis. Femora valide compressa, articulo bascos extus canaliculato. Alæ hyaline venis s. nervis ferrugineis, abdomine dimidio breviores.*

- Acaro- 9. *M. glabra rufa, capite abdomineque postico nigris.*  
rum. *Fn. svec. 1729. \**

*Habitat inter Acaros, quibus visitat.*

*Hac differt a reliquis quod glabra nec tomentosa sit,  
& videtur potius Sphex aptera esse; segmentum 1 &  
2 abdominis rufa, reliqua nigra.*

- formica- 10. *M. glabra rufa, capite abdomineque pubescente ni-*  
ria. *gris. Fn. svec. 1728.*

*Habitat in Europa. D. C. Solander.*

*Præcedenti duplo major. Abdomen totum nigrum &  
parum villosum. Ichneumon apterus potius dicenda?*

## VI. DIPTERA.

Alæ duæ.

Halteres clavati, solitarii pone singulam alam,  
sub squamula propria.

251. OESTRUS. Os nullum punctis tribus, absque proboscide aut rostro exserto.

Bovis. 1. OE. alis maculatis, thorace flavo, fascia fusca, abdomine flavo apice nigro. *Fn. suec. 1730. Is. Wgot. 202.*

*Raj. inf. 271.*

*Derham theolog. l. 8. c. 6. n. 11.*

*Vallisn. nat. 1. t. 28.*

*Reaum. inf. 4. t. 36. - 38.*

*Frisch. inf. 5. p. 25. t. 7.*

*Sulz. inf. 2. 20. f. 127.*

*Geoffr. paris. inf. 2. p. 456. n. 3.*

*Schæff. elem. t. 91.*

*Habitat intra Boum dorsum; in ventriculo Equorum sepe ipsis lethalis.*

*Hoc illud insectum, cui nomen Asilo.*

*Romanum est, Oestrum graji vertere vocantes,*

*Asper, acerba sonans, quo toto exterrita silvis.*

*Diffugiunt armenta.*

*Virg.*

Tarandi. 2. OE. alis immaculatis, thorace flavo fascia nigra, abdomine fulvo apice flavo. *Fn. suec. 1731.\**

*Flor. lapp. 360. n. 517.*

*Linn. Act. Stockh. 1739. t. 3. f. 5, 6.*

*Act. Upsal. 17.*

*Habitat intra Cervi Tarandi dorsum.*

*Hujus causa Lappones quotannis cum grege migrant e Lapponia sylvatica in Alpes lapponicas.*

mafalis. 3. OE. alis immaculatis, thorace ferrugineo, abdomine nigro pilis flavis. *Fn. suec. 1722.\**

*Habitat in Equorum fauce, per nares intrans.*

Q q q 3

Cor-

Oestri Larvæ latent intra Pecorum corpus, ubi per totam hyemem nutritur; fonticuli vices gerunt; extrahuntur a Buphago.

*Corpus nigrum, sed Caput, Thorax, Abdomen testis pilis helvolis s. luteo-ferrugineis, verum primum segmentum abdominis testum pilis albis.*

hemor- 4. OE. alis immaculatis, thorace nigro: scutello palli-  
rhoidalis, do, abdomine nigro; basi albo apiceque fulvo. *Fn.*  
*svec. 1733. \**

*Reaum. inf. 4. t. 3-5 f. 3-5.*

*Geoffr. paris 2. p. 455. n. 1.*

*Habitat in Equorum intestino recto, mire per anum intrans.*

Ovis, 5. OE alis subpunctatis, abdomine albo nigroque versicolore. *Fn. svec. 1734.*

*Schreber inf. 15. n. 12.*

*Vallish. nat. 1. p. 224. t. 27.*

*Reaum. inf. 4. t. 35. f. 21-24.*

*Geoffr. paris. 2. p. 456. n. 2. t. 17. f. 1.*

*Habitat in Ovium sinu frontis.*

*Corpus reliquis minus, tomentosum nec villosum. Oculi ferruginei. Alæ venosæ, versus basin punctatæ. Abdomen ovatum, albido-cinereum, colore nigro maculatum, fugax. Vertex capitis punctis numerosis excavatis.*

352. TIPULA. Os capitis elongati Maxilla superiore fornicata; Palpi duo incurvi capite longiores. Proboscis recurvata brevissima.

\* *Alis patentibus.*

pectini- 1. T. antennis pectinatis, alis macula nigra, thorace flavescente. *Fn. svec. 1735. \**

*Scop. carn. 839.*

*Raj. inf. 73. n. 12.*

*Schaff. elem. t. 13. f. 8. & t. 129. f. 3.*

*Habitat in Suecia.*

*Antennæ pectinata radiis oppositis, sed in altero sexu intra singulum par radiorum mucro capitatus solitarius, in altero geminus.*

2. T.

*Tipula Larva communiter sub radicibus vegetabilium degunt & radices exedunt, quod medicant Cornices, ne prata nimis destruant,*

- nivosa.** 2. *T. alis hyalinis: rivulis fuscis maculaque nivea.* *Faun. suec.* 1738. \*  
*Scop. carn.* 846.  
*Alt. Stork.* 1739. t. 9. f. 8.  
*Sulz. inf.* 1. 20. f. 128.  
*Raj. inf.* 72. n. 1.  
*Geoffr. parisi.* 554. n. 2.  
*Habitat in Europa.*
- quadrimaculata.** 3. *T. alis fusco-venosis: margine maculisque 4 fuscis,*  
*abdomine supra flavo.* *Fn. suec.* 1736. \*  
 β. *T. calmariensis alis fusco-venosis maculis 4 marginalibus fuscis, abdomine lutescente, segmento primo nigro.* *Fn. suec.* 1737. \*  
*Habitat in Europa.*
- erocata.** 4. *T. alis macula fusca, abdomine atro fasciis fulvis.*  
*Fn. suec.* 1739. \*  
*Scop. carn.* 845.  
*Raj. inf.* 72. n. 4.  
*Reaum. inf.* 5. t. 1. f. 14, 15, 16.  
*Geoffr. parisi.* 553. n. 1. t. 19. f. 1.  
*Habitat in Europa.*
- oleracea.** 5. *T. alis hyalinis costa marginali fusca.* *Faun. suec.* 1740. \*  
*Scop. carn.* 854.  
*Gæd. inf.* 2. t. 44.  
*List. gæd. f.* 139.  
*Leuwenh. nat.* 1693. f. 4, 5.  
 1704. f. 4.  
*Bradl. nat.* 1. 25. f. 3.  
*Frisch. inf.* 4. t. 12.  
*Geoffr. parisi.* 555. n. 3.  
*Habitat in Europa ad radices plantarum, oleribus & plantis cultis infesta.*
- hortorum.** 6. *T. alis hyalinis: maculis sparsis albis obsoletis.* *Faun. suec.* 1725. \*  
*Raj. inf.* 72. n. 6.  
*Alb. inf.* 1. 61.  
*Habitat in Europa.*
- variogata.** 7. *T. alis hyalinis: macula pallida obsoleta, corpore nigro luteoque variegato.* *Fn. suec.* 1742. \*  
*Habitat in Europa.* Q q q 4 8. *T.*

- contami- 8. T. alis nigro maculatis, corpore nigro. *Faun. succ.*  
nata. 1743. \*  
*Geoffr. paris. 558. n. 6.*  
*Habitat in Europa.*
- lunata. 9. T. alis cinerascens: lunula marginali alba. *Faun.*  
*succ. 1744. \**  
*Scop. carn. 847.*  
*Geoffr. paris. 555. n. 4.*  
*Raf. inf. 73. n. 10.*  
*Reaum. inf. 5. t. 2. f. 11.*  
*Habitat in Europa.*
- pratensis. 10. T. alis subcineris: vasis fuscis punctoque marginali  
obscuro, fronte fulva. *Fn. succ. 1745. \**  
*Scop. carn. 848.*  
*Frisch. inf. 4. t. 12.*  
*Habitat in Europa.*
- reiffi 11. T. alis hyalinis puncto marginali fusco, abdominis  
dorso cinereo. *Fn. succ. 1746.*  
*Frisch. inf. 7. t. 22.*  
*Habitat in Europa.*
- cornici- 12. T. alis hyalinis puncto marginali fusco, abdomine  
na. flavo lineis tribus fuscis. *Fn. succ. 1747. \**  
*Raf. inf. 2. musc. t. 1.*  
*Geoffr. paris. 556. n. 5.*  
*Habitat in Europa.*
- nigra. 13. T. alis fuscis, corpore atro. *Fn. succ. 1748. \**  
*Habitat in Europa.*
- atrata. 14. T. alis glaucis puncto marginali corporeque atro,  
abdominis segmento primo pedibusque rufis. *Faun.*  
*succ. 1749. \**  
*Habitat in Larvis P. Vinulæ? Clerck.*  
*Femina Abdomen subulatum.*
- blmacula- 15. T. alis hyalinis: maculis duabus fuscis, abdominis me-  
ta. dio maculato-ferrugineo, antennis plumosis. *Faun.*  
*succ. 1750. \**  
*Habitat in Europa.*

- annulata.** 16. *T. alis fusco variegatis, femoribus annulo albo.* *Fn. suec. 1752. \**  
*Scop. carn. 849.*  
*Reaum. inf. 5. t. 4. f. 1, 2.*  
*Habitat in Europa.*
- ocellaris.** 17. *T. alis albidis: maculis ocellaribus nigricantibus plurimis.* *Fn. suec. 1751. \**  
*Gadd. satag. 87.*  
*Habitat in Europa.*
- fasciata.** 18. *T. alis albidis: fasciis quatuor cinereis flexuosis, abdomine pedibusque flavescantibus.*  
*Habitat in Europa. Fabricius.*  
*Magnitudo Culicis. Alarum fasciæ inæquales, marginæ magis fusæ.*
- flavescens.** 19. *T. alis immaculatis, corpore flavo, dorso fusco.* *Fn. suec. 1753. \**  
*Habitat in Europa.*
- enfuscor-nis.** 20. *T. antennis lanceolatis ferrulatis, alis venis maculæque nigra.*  
*Habitat in Svecia: in Prædio meo Hammarby.*  
*Corpus lividum, Culice pipiente paulo majus. Antennæ nigrae, lanceolatae, compressæ, articulatae, ferrulatae, erectæ, longitudine thoracis. Thorax lineæ nigrae antice bifida & divaricata. Alæ venis nigris: macula marginis exterioris oblonga nigra. Abdomen ad singuli segmenti latus macula nigra.*
- regulatio-nis.** 21. *T. alis hyalinis nitentibus, corpore cinereo fusco.* *Fn. suec. 1754. \**  
*Habitat in Europæ terrestribus, primo vere frequens, choreas in aëre agens.*
- replicata.** 22. *T. alis hyalinis margine tenuiore recurvato, corpore fusco, antennis simplicibus.* *De Geer Act. Upsal. Fn. suec. 1755.*  
*Habitat in Europa.*
- monoptera.** 23. *T. nigra, pedibus palpisque pallidis.* *Fn. suec. 1756. \**  
*Habitat in Europa.*  
*Similis Tipulis alis patentibus, sed alam alteram alteri imponit, quasi unica esset & Culice minor.*
- Q 9 9 5
24. *T.*

arundine- 24. *T. albida*, antennis villosis, oculis atris. *Fn. suec.* 1757.\*  
ti. *Habitat in Arundinetis, ubi choreas agit.*

barbicor- 25. *T. nigra*, antennis plumosis apice simplicioribus.  
nis. *Habitat passim per Europam.*  
*Antennarum barba non patens, sed apicem versus coar-*  
*ctata; magnitudo pulicis.*

\* \* *Alis incumbentibus. Caliciformes.*

plumosa. 26. *T. thorace virescente, alis hyalinis puncto nigro*  
*Fn. suec.* 1758.  
*Scop. carn.* 841.  
*It. æland.* 40, 41, 86, 160.  
*Gœd. inf.* 3. t. X.  
*List. gœd. f.* 140.  
*Reaum. inf.* 5. t. 5. f. 10.  
4. t. 14. f. 12.  
*Frisch. inf.* t. 11. f. 12.  
*Geoffr. parif.* 560. n. 16.  
*Habitat in Europa, imprimis in maritimis.*

littoralis. 27. *T. virescens, alis immaculatis, pedibus anticis lon-*  
*gissimis. Fn. suec.* 1759.\*  
*Geoffr. parif.* 561. n. 17.  
*Reaum. inf.* 5. t. 6. f. 12, 13, 14.  
*Habitat in Europæ maritimis.*

annulata. 28. *T. livida, alis maculis tribus marginalibus nigris, ab*  
*domine nigro albo-annulato.*  
*Habitat in Svecia: Lecta in mco Hammarby.*  
*Statura T. plumosæ f. littoralis. Caput parvum. An-*  
*tennæ simplices, thorace fere breviores. Thorax li-*  
*vidus lineis 2 approximatis nigris & totidem exte-*  
*rioribus latioribus posterioribus. Alæ hyalinæ, mar-*  
*gine exteriori maculis 3 nigris, quarum secunda*  
*fere in fasciam diducitur; complicatæ alæ videntur*  
*fasciis tribus constare. Abdomen nigrum, segmentis*  
*omnibus basi albidis, unde 5 f. 7 annuli albi. To-*  
*tum corpus subtile, uti pedes, lividum.*

motitatrix. 29. *T. pedibus anticis maximis motoriiis annulo albo.*  
*Fn. suec.* 1760.\*  
*Frisch. inf.* 11. t. 13.  
*Geoffr. parif.* 562. n. 18.  
*Habitat in Europa.*

30. *T.*



- vibratoria.** 30. *T. pedibus anticis maximis motatoriis apice albis.*  
*Fn. suec. 1761. \**  
*It. æl. 160.*  
*Habitat in Europa.*
- tremula.** 31. *T. pedibus anticis longissimis motatoriis nigris annu-*  
*lis albis, Fn. suec. 1762. \**  
*Habitat Upsaliæ. T. Bergman.*
- flexilis.** 32. *T. pedibus anticis motatoriis, omnibus pallidis, alis*  
*fascia fuscescente.*  
*Habitat in Europa.*  
*Corpus minimum, nigricans. Antennæ plumosæ.*
- monilis.** 33. *T. pedibus albis annulis novem nigris, alis albo oi-*  
*nereoque variis. Fn. suec. 1763. \**  
*Geoffr. parif. 564. n. 20.*  
*Habitat in Europa.*
- virens.** 34. *T. viridis, alis immaculatis, plantis fascis.*  
*Habitat in Svecia. Henr. Gahn.*  
*Similis facie T. plumosæ, sed minor.*
- viridula.** 35. *T. viridis, oculis fuscis, antennis verticulato-pilosis,*  
*pedibus pallidis.*  
*Habitat in Svecia.*  
*Corpus magnitudine pulicis, immaculatum. Antennæ*  
*thorace breviores. Abdomen angustatum.*
- macrocephala.** 36. *T. virescens, oculis thoracisque tergo nigris. Fn*  
*suec. 1764. \**  
*Habitat in littoribus humidis, agilissima.*  
*Antennæ breves, pilosæ, excepto ultimo articulo oblon-*  
*go. Pedes longi, articulati annulis nigris, qui arti-*  
*culos terminant. Corpus pubescens, pediculo minus.*  
*Abdomen incisuris 4, albis, lateralibus.*
- pufilla.** 37. *T. viridis, thoracis tergo maculis tribus nigris, an-*  
*tennis maris plumosis.*  
*Habitat ad fossulas, choreas agens, passim.*  
*Corpus viride, longitudine Pediculi. Abdomen fili-*  
*forme. Thorax dorso maculis tribus nigris, quarum*  
*media s. anterior bipartita. Pectus inter pedes gibbum*  
*nigrum. Antennæ fusæ, plumosæ.*

- Marci. 38. *T. nigra* glabra, alis nigricantibus, femoribus anticis introrsum fulcatis. *Fn. suec.* 1765. \*  
*Reaum. inf. 5. t. 7. f. 17, 18.*  
*Habitat in fimetis & Terra pragnante, primo vere.*
- Thomæ. 39. *T. atra* glabra, alis nigris, abdominis lateribus linea crocea.  
*Habitat in Europa. Upsalæ J. C. Fabricius.*  
*Simillima T. Marci. Antennæ longitudine thoracis.*  
*Distinctissima linea abdominis utrinque crocea.*
- ferruginea. 40. *T. atra* glabra, alis fuscis, abdomine fusco-ferrugineo.  
*ta. Habitat in Europa australi.*  
*Corpus structura T. Marci, sed minus. Abdomen obscure ferrugineum.*
- Johannis. 41. *T. atra* glabra, alis puncto nigro, tibiis pallidis: posticis clavatis.  
*Habitat in Europa.*  
*Corpus Culice pipiente minus, atrum. Antennæ moniliformes, brevissimæ. Thorax gibbus, immaculatus. Alæ hyaline stigmatæ punctum fuscum mentientes. Femora nigra. Tibiæ pallide flavescentes, sed postici parvis elongatæ, clavatæ, compressæ.*
- brevicornis. 42. *T. nigra* glabra, alis margine nigricantibus, tibiisque anticis spina terminatis. *Fn. suec.* 1766. \*  
*Habitat in Europæ umbrosis.*
- putris. 43. *T. fusca*, alarum basi cinerea. *Fn. suec.* 1767. \*  
*Frisch. inf. 4. t. 22.*  
*Habitat in Terra pragnante, primo vere.*
- febrilis. 44. *T. atra* oblonga hirta, alis nigricantibus. *Fn. suec.* 1768. \*  
*Gæd. inf. 1. t. 6.*  
*List. gæd. f. 108.*  
*Pet. gaz. t. 14. f. 4.*  
*Geoffr. parif. 570. Bibio. 2.*  
*Habitat in locis suffocatis.*
- horilega. 45. *T. atra* holosericea. *Fn. suec.* 1769. \*  
*Reaum. inf. 5. t. 7. f. 7-10.*  
*Geoffr. parif. 571. Bibio. 3.*

Habi

*Habitat in Pomonæ floribus, quos destruit. Musca florilega nigra infesta florenti veri; hortos camposque suo flore spoliens, spem anni exstinguens, hortis Belgii frequens. Suammerd.*

**Hortula-** 46. *T. alis albis margine exteriore nigro, thorace abdomineque rubro. Fn. suec. 1770.\**

*Reaum. inf. 5. t. 7. f. 7-10.*

*Geoffr. parif. 2. p. 571. Bibio. 3.*

*Habitat in Asparago & Pomonæ floribus, quorum pestis est.*

**phalænoi-** 47. *T. alis deflexis cinereis ovato-lanceolatis ciliatis. des. Fn. suec. 1771.\**

*Scop. carn. 864.*

*Leuw. epist. 1692. jan. 24. f. 2, 3.*

*Friscb. inf. 11. t. 11.*

*Geoffr. parif. 572. Bibio. 4.*

*Habitat in Parietibus ad sterquilinā.*

**hirta.** 48. *T. hirsuta, alis deflexis ovatis ciliatis albo nigroque tessellatis. Fn. suec. 1772.\**

*Habitat in Arctio Lappa.*

*Figura T. Phalanoidis, sed alæ dense tomentosæ, ut in Phalanis.*

**Persicaria-** 49. *T. atra, alis incumben- tibus subciliatis. rias. Habitat sub Persicariæ amphibæ foliis revolutis rubris. Petr. Hernquist.*

*Corpus paulo majus pulice, totum cum alis incumben- tibus pellucidis atratum. Alæ subciliatæ. Antennæ corpore triplo breviores, moniliformes. Pedes longi- tudine corporis.*

**notata.** 50. *T. atra, alis albis, abdomine lateribus antice macu- la alba. Fn. suec. 1773.\**

*Habitat in Europa.*

**Juniperi-** 51. *T. alis incumben- tibus glaucis: margine tenuiore vil- na. loso. Fn. suec. 1774.\**

*Habitat in Juniperi triglochide, quam canssat; quæ in gallis rubris pisiformibus petiolorum Populi tremulæ vix differt.*

52. *T.*

culiciformis. 52. *T. cinerea*, pedibus pallidis, alijs maculis duabus nigricantibus.

*Habitat in Svecia: Upsalia.*

Simillima *Culici pipientis*, sed dimidio minor. Thorax gibbus. Alæ hyalinæ macula antica nigra; postica fusca. Pedes pallide ferruginei.

incarnata. 53. *T. incarnata*, antennis mediocribus.

*Habitat in Europa: Upsalia.*

Corpus exceptis oculis nigris incarnatum. Alæ incumbentes. Antennæ articulis 12, corporis longitudine. Pedes longi.

palustris. 54. *T. atra*, abdomine rufescente. *Fn. suec. 1775.*

*Habitat in Europæ paludosis.*

longicornis, 55. *T. antennis corpore incarnato longioribus. Fn. suec. 1776. \**

*Habitat in Europa.*

rufipes. 56. *T. atra*, pedibus rufis, alis medio nigris basi flavescens. *Fn. suec. 1778. \**

*Habitat in Europa.*

bipunctata. 57. *T. fusca*, alis cinereis puncto marginali albo.

*Habitat in Europa: in meo Saxia; salit ut Ichneumon minutus in gyros obvolitans.*

Corpus pulice minus, fuscescens. Alæ cineræ, incumbentes: punctum ad medium marginis exterioris niveum basisque alarum albida. Halteres albi. Thorax lavis, ater. Abdomen ovatum.

sericea. 58. *T. nigra*, dorso atro, thoracis lateribus calvis, halteribus flavis.

*Habitat in Europa: Svecia. Choreas agit in aëre volatu flexuoso rapidoque.*

Statura Muscæ, Pediculo paulo major. Corpus nigrum. Dorsum Thoracis & Abdominis atra, quasi holosericea. Thorax lateribus lunula calva & apice calvo. Abdomen utrinque punctis duobus calvis; omnis calvitie, certo respectu, licet nigra, adparet alba. Antennæ filiformes, vix capite longiores. Oculi ænei. Alarum costa antica nigricans. Halteres lucide flavi. Tibiæ posticæ longiores, clavatæ, quasi saltatoriæ.

59. *T.*

- minutissi-** 59. *T. flava*, oculis vertice concurrentibus nigris.  
**ma.** *Habitat ad Sveciæ fossas.*  
 Corpus dimidio *Pulice* minus, totum flavum. Alæ &  
 Pedes hyalini. Antennæ moniliformes, corpore bre-  
 viores, fuscescentes. Halteres flavi. Oculi nigri,  
 vertice concurrentes nigredine.
- pulicaris.** 60. *T. nigra*, thoracis lateribus scutello abdomineque flavis.  
*Habitat ad fossas Europæ.*  
 Corpus *Pulice* dimidio minus. Antennæ corpore bre-  
 viores nigrae. Thorax subglobosus lateribus utrinque  
 linea flava. Abdomen ovatum, flavum. Halteres  
 flavi; reliqua nigra.
- pennicor-** 58. *T. antennis bipectinatis*, corpore atro, halteribus al-  
**nis.** bis. *Fn. suec. 1777.\**  
*Habitat in Svecia.*  
*Pulice minor, angusta. Thorax aterrimus.*

## 253. MUSCA. Os Proboscide carnosâ: labiis 2 la- teralibus: Palpi nulli.

\* *Filata*: Antennis simplicibus absque filo laterali.

- plebeja.** 1. *M. antennis filatis subulatis*, corpore cinereo hirtio,  
 abdominis incisuris margine albidis. *Fn. suec. 1779.\**  
*Habitat in Europa.*  
 Variat Thorace flavescente Abdomineque ferrugineo.
- illucens.** 2. *M. antennis filatis clavatis*, alis cæruleis, corpore ni-  
 gro, abdominis segmento secundo lateribus pellucido.  
*Habitat in America australi. Mus. De Geer.*  
*Antennæ longæ, nigrae. Abdominis segmentum secun-*  
*dum glaucum, lateribus pellucidum.*
- chame-** 3. *M. antennis filatis clavatis*, scutello bidentato luteo,  
**leon.** abdomine nigro: fasciis lateralibus luteis. *Fn. suec.*  
*1780.\** *It.*

Musca distinguntur antennis inermibus l. armatis

*Filatae* antennae absque seta aut pluma laterali.

*Armatae* antennae cum seta aut pluma laterali.

- *Tomentosae* corpore pubescentes, saepe vix manifeste.
- *Plumatis* antennae pectinatae.
- *Setariis* antennae simplici seta.
- *Pilosae* raris setis, imprimis in thorace conspicuae.
- *Plumatis* antennae.
- *Setariis* antennae.

*It. wgoth.* 84.

*Gæd. inf.* 1. t. 70.

*Swamm. metam.* t. 4.

*bibl.* t. 42. f. 2.

*Frisch. inf.* 5. t. 10.

*Rcaum. inf.* 4. t. 25.

*Rœf. inf. musc.* 2. t. 5.

*Sultz. inf.* t. 20. f. 130. *Musca fellata.*

*Geoffr. paris.* 2. p. 479. t. 17. f. 4. *Stratiomys.* 1.

*Schæff. elem.* t. 121.

*Habitat Larva in Aquis dulcibus.*

*Musca supra aquam obambulare solet.*

- micro-  
leon. 4. *M. antennis filatis clavatis, scutello bidentato nigro, abdomine atro: strigis lateralibus albis. Fann. succ.* 1781. \*

*Habitat in Europa.*

- hydro-  
leon. 5. *M. antennis filatis clavatis, scutello bidentato nigro, abdomine viridi: medio nigro angulato, Fn. succ.* 1782. \*

*Geoffr. paris.* 2. p. 481. *Stratiomys* 4.

*Habitat in Europa.*

- trilineata. 6. *M. antennis filatis clavatis, scutello bidentato, corpore viridi, thorace lineis abdomineque fasciis nigris.*

*Habitat in Svecia. Henric. Gabn.*

*Corpus viride, magnitudine vix M. domestica. Antennæ testaceæ. Oculi fusci fascia testacea. Thorax lineis 3 atris, apice connexis. Abdomen ovatum fasciis 4 nigris, extrorsum angustioribus. Pedes pallidi.*

- hypoleon. 7. *M. antennis filatis acuminato-setaceis, thorace bidentato margine striisque duabus flavis.*

*Habitat in Germania. D. Schreber.*

*Antennæ obovatæ, pallidæ, in setam terminatæ. Thorax nigricans margine scutelloque luteo & striis 2 luteis. Abdomen flavum fasciis abbreviatis, 2, curvis, fere connexis. Pedes flavi.*

- panthe-  
rina. 8. *M. antennis filatis, corpore atro, abdominis dorso maculis tribus, marginibus totidem connatis albis. Fn. succ.* 1783.

*Habitat in Svecia.*

*Ami.*

*Similis M. Hydroleoni, sed scutellum integrum. Antennae clavatae, breves. Corpus nudum. Abdomen depressum, marginatum; incisuris 3 margine medio albis & margine laterali; incisurae 2 ultimae margine albo. Punctum album utrinque ad basin thoracis.*

Morio. 9. *M. antennis filatis subulatis, corpore hirto atro, alis dimidiato-nigris. Fn. succ. 1784.\**

*Reaum. inf. 6. t. 27. f. 13.*

*Alar. inf. t. 2. f. 13.*

*Geoffr. parif. 2. p. 493. Musca 2.*

*Scop. carn. 971. Anthorax Morio,*

*Habitat in Europa.*

denigrata. 10. *M. antennis filatis subulatis, corpore hirto atro, thorace utrinque linea alba, alis nigro variis, Habitat in Europa.*

Maura. 11. *M. antennis filatis subulatis, corpore hirto atro albo fasciato, alis nigro variis. Fn. succ. 1785.\**  
*Habitat in Europa.*

clavipes. 12. *M. antennis filatis subulatis, corpore laevi atro, abdomine testaceo, plantis posticis clavatis, Habitat in Europa. Fabricius.*

*Magnitudo Formicae. Alae nigrae. Pedes testacei, sed postici elongati plantis nigris clavatis. Thorax ad scutellum aculeato-ciliatus.*

Hottentotta. 13. *M. antennis filatis subulatis, corpore hirto lutescente, alis colla fuscis. Fn. succ. 1787.\**  
*Habitat in Europa.*

fenestralis. 14. *M. antennis filatis glabra atra, abdomine supra rugoso strigis albis, pedibus ferrugineis. Fn. succ. 1845.\**  
*Habitat in Europa, valde tarda noctu; calido die choreas agit.*

*Incisurae dorsales abdominis. 3 s. 4, dum abdomen extenditur, niveae, latera tamen non attingentes. Alae incumbentes.*

♂. *Simillima, duplo triplove major, atra, tarda. Corpus laeve. Abdomen supra magis rugosum singulis incisuris ruga transversa. Pedes nigri,*

- tarda. 15. *M. antennis filatis subulatis lævis atra, thorace subæneo, pedibus subteltaceis. Fn. suec. 1786. \**  
*Habitat in Europa, valde tarda ob alas incumbentes, ac si nullæ essent.*
- scolopacea. 16. *M. antennis filatis apice setigeris, abdomine flavescente trifariam nigro-punctato, alis nebulosis. Faun. suec. 1788. \**  
*Reaum. inf. 4. t. 10. f. 5, 6.*  
*Habitat in Europa.*
- Vermileo. 17. *M. antennis filatis apice setigeris, abdomine trifariam nigro punctato, thorace maculato, alis immaculatis. De Geer act. Stockh. 1752. p. 180, 260. t. 5.*  
*Habitat in Galliæ arena mobili.*
- tringaria. 18. *M. antennis filatis apice setigeris, abdomine trifariam nigro-punctato, thorace unicolore, alis immaculatis. Fn. suec. 1789. \**  
*Habitat in Svecia.*  
*Similis priori, a qua differt thorace cano, nec duobus callis fuscis longitudinalibus notato.*
- diadema. 19. *M. antennis filatis apice setigeris, cinerea, alis immaculatis, pedibus subferrugineis. Habitat in Europa. Fabricius.*  
*Magnitudo Formicæ. Pedes elongati.*
- anilis. 20. *M. antennis filatis hirtis muticis, corpore villoso albocanescente. Fn. suec. 1791. \**  
*Habitat in Europa.*  
*Abdomen conicum.*
- Conopsoidea. 21. *M. antennis clavatis mucronatis basi coadunatis, corpore atro, abdominis cingulis tribus flavis. Fn. suec. 1790. \**  
*Reaum. inf. 4. t. 33. f. 12, 13.*  
*Habitat in Europa.*  
*Simillima Conopfi macrocephalæ.*

22. M.

---

Ordo Dipteriorum ex ore potissimum in genera subdividitur cum antennæ in Muscis & Conopsibus diversæ; alioquin e prima sectione Muscarum prodirent 4 genera, affinia Chamæleoni, Morioni, Scolopacæ, Conopsoidi, & Genus Conops excluderetur, distributum inter prædictas.



uliginosa. 22. *M. antennis clavatis mucronatis, abdominis dorso albo: segmentis duobus penultimis striga alba.*

*Habitat in Europa, frequens ubi Triglochin crestat.*

Corpus *M. domestica*  $\frac{1}{2}$  minus. Caput nigrum fronte flava. Antennæ nigrae. Thorax niger, nitidus: lateribus utrinque punctis 2 oblongis albis. Abdomen subrotundum, depressiusculum: dorso album s. luteum, basi media fuscum; segmenta duo fere ultima, linea transversa nigra lata. Abdomen subtus nigrum marginibus segmentorum albis. Genua alba. Tibiæ pallide.

leucopa. 23. *M. antennis subclavatis nigra, plantis albis.*

*Habitat in America. L. Spengler.*

Corpus magnitudine *Vespe domestica*, atrum. Antennæ filiformes, subclavatae (ut in *Conop. macrocephala*), muticae, capite duplo longiores. Thorax niger, Abdomen oblongum, nigrum, segmentorum marginibus versus latera certo respectu lucis albidomacantibus, Pedes nigri, sed plantæ filiformes, albæ. Ventris primum segmentum subtus rubrum.

nectarea. 24. *M. antennis cylindricis perfoliatis nigra, alis albis.*

*Habitat in floribus arborum pomonæ nectar hauriens e fundo calycis, ibique tota die hospitatur.*

Magnitudo pulicis, oblongiuscula, nigra etiam halteribus. Alæ solæ albæ. Antennæ cylindricæ, confertim perfoliatae. Pedes longiusculi.

\* \* *Tomentosa plumata.*

bombylans. 25. *M. antennis plumatis tomentosa nigra, abdomine hirsuto postice rufo. Fn. suec. 1792.\**

*Habitat in Europa.*

mystacea. 26. *M. antennis plumatis tomentosa nigra, thorace abdominis apice alarumque basi fulvis. Fn. suec. 1793.\**

*Sultz. inf. t. 20. f. 131.*

*Schæff. elem. t. 131.*

*Habitat in Europa.*

Jappona. 27. *M. antennis plumatis subtomentosa nigra, scutello ferrugineo, abdomine cingulis tribus albidis interruptis,*

*Fn. suec. 1794.\**

*Habitat in Svecia. D. C. Solander.*

\* \* \* *Tomentosa setariae.*

- pendula. 28. *M. antennis setariis tomentosa, thorace lineis quatuor, abdomine fasciis tribus interruptis flavis. Fn. suec. 1795.\**  
*Frisch. inf. 4. t. 13.*  
*Reaum. inf. 4. t. 31. f. 9-11.*  
*Habitat in aquis stagnantibus; Larva tubo filiformi respiratorio suspendenda.*
- florea. 29. *M. antennis setariis tomentosa, thorace fasciis duabus inæqualibus nigris, abdomine quatuor luteis subabruptis. Fn. suec. 1796.\**  
*Alb. inf. t. 17. f. 1.*  
*Scop. carn. 959. Cynops florens.*  
*Habitat in Europa.*
- nemorum. 30. *M. antennis setariis tomentosa, abdomine cingulisque tribus albis, segmento primo lateribus luteo. Fn. suec. 1797.\**  
*Reaum. inf. 3. t. 31. f. 8.*  
*Mer. eur. t. 2.*  
*Alb. inf. t. 3. f. M. L.*  
*Geoffr. parif. 2. p. 511. n. 36.*  
*Habitat in Europa.*
- arbutorum. 31. *M. antennis setariis tomentosa, thorace griseo, abdomine subfusco: segmento primo secundoque latere ferrugineis. Fn. suec. 1798.\**  
*Habitat in Europa, simillima insequenti.*
- tenax. 32. *M. antennis setariis tomentosa, thorace griseo, abdomine subfusco unicolore, tibiis posticis compresso-gibbis. Fn. suec. 1799.\**  
*Swamm. bibl. t. 38. f. 9.*  
*Reaum. inf. 4. t. 20. f. 7.*  
*Blank. inf. t. 10. f. F.*  
*Goed. inf. 1. t. 2.*  
*List. goed. t. 126.*  
*Raj. inf. 272.*  
*Alb. inf. t. 63. f. e, f, g.*  
*Geoffr. parif. 2. p. 520. n. 52.*  
*Habitat in fimetis, cloacis, aquis putrescentibus, vix prelo destruenda larva.*

- intricaria. 33. *M. antennis setariis tomentosa lutescens, abdominis apice albido, genubus albis. Fn. succ. 1800.\**  
*Habitat in Europa.*  
*Similis Muscæ astracea.*
- æstracea. 34. *M. antennis setariis tomentosa nigra, scutello albido, abdominis apice lutescente. Fn. succ. 1801.\**  
*Habitat in Europa.*
- fallax. 35. *M. antennis setariis fusca, fronte flava, abdominis apice tomentoso fulvo, squama halterum lactea. Fn. succ. 1802.*  
*Habitat in Europa.*  
*Similis externa facie antecedenti.*
- lucorum. 36. *M. antennis setariis subtomentosa, thorace subgriseo, abdomine nigro: segmento primo toto flavo. Fn. succ. 1803.\**  
*Habitat in Europa.*
- sylvarum. 37. *M. antennis setariis tomentosa nigra, abdominis ultimo segmento tomentoso flavo. Fn. succ. 1804.\**  
*Habitat in Europa.*
- bicincta. 38. *M. antennis setariis elongatis nigra, thorace lateribus punctis, abdomineque cingulis duobus flavis. Fn. succ. 1805.\**  
*Habitat in Europa.*  
*Abdomen glabrum ut sequentis; fascia prior interrupta.*
- arcuata. 39. *M. antennis setariis elongatis nigra, thorace lateribus maculis abdomineque cingulis quatuor arcuatis flavis. Fn. succ. 1806.\**  
*Habitat in Europa.*  
*Scutellum flavum macula nigra; Abdomen glabrum. Thorax nudiusculus, subtomentosus. Antennæ capite longiores.*
- mutabilis. 40. *M. antennis setariis elongatis tomentosa, abdomine nigro griseoque mutabili, scutello ferrugineo, thorace immaculato. Fn. succ. 1807.\**  
*Habitat in Europa.*
- devia. 41. *M. antennis setariis elongatis subtomentosa, thorace cæruleo, abdomine violaceo. Fn. succ. 1808.\**  
*Habitat in Europa.*

- ichneu- 42. *M. antennis setariis elongatis cylindricis, thorace pe-*  
monca. *disque longiusculis ferrugineis, abdomine cinereo.*  
*Fn. suec. 1809. \**  
*Habitat in Europa, simillima Ichneumoni.*
- diophthal- 43. *M. antennis setariis nuda, thorace maculis, abdomi-*  
ma. *ne cingulis sex flavis, femoribus posticis dentatis.*  
*Fn. suec. 1810. \**  
*Habitat in Europa.*  
*Nigra. Oculi glaucescentes punctis sparsis & fascia*  
*perpendiculari fuscis. Puncta 5 flava ante alas; an-*  
*te scutellum lineola flavae 2, ad angulum rectum*  
*conniventes. Scutelli margo sanguineus. Abdominis*  
*segmenta 3 & 5 interrupta.*
- vespifor- 44. *M. antennis setariis nuda, thorace maculis, abdomi-*  
mis. *ne cingulis sex flavis, pedibus anticis nigris. Faun.*  
*suec. 1811. \**  
*Habitat in Europa.*  
*Abdominis fascia postice per paria dorso uniuntur. Pe-*  
*des ferruginei femoribus muticis. Scutellum nigrum.*
- festiva. 45. *M. antennis setariis nuda, thorace lineis lateralibus,*  
200- *abdomine cingulis quatuor flavis interruptis. Fn. suec.*  
1812. *\**  
*Scop. carn. 964. Conops festivus.*  
*Habitat in Europa.*  
*Pedes flavi.*
- erratica. 46. *M. antennis setariis nudiuscula, thorace immaculato,*  
*scutello ferrugineo, abdomine cingulis tribus albidis.*  
*Habitat in Europa.*
- glauca. 47. *M. antennis setariis subtomentosa, thorace immacu-*  
*lato, scutello glauco, abdomine cingulis tribus albi-*  
*dis interruptis. Fn. suec. 1813. \**  
β. *Musca erratica. Syst. nat. 10. p. 593. n. 34.*  
*Scop. carn. 966. Cynops glaucius.*  
*Habitat in Europa.*  
*Corpus nigrum; fascia prima abdominis baseos latior*  
*est & fere pellucida.*
- noctiluca. 48. *M. antennis setariis subtomentosa atra, abdominis pri-*  
*mo segmento maculis duabus pellucidis. Fn. suec.*  
*1814. \**  
*Habitat in Europa.*

- gibbosa.** 49. *M. antennis setariis subtomentosa nigra; abdomine subgloboso cingulis quatuor albis, squamis halterum buccatis. Fn. suec. 1815. \**  
*Habitat in Suecia.*
- Ribesii.** 50. *M. antennis setariis nigra nudiuscula, thorace immaculato, abdomine cingulis quatuor flavis: primo interrupto. Fn. suec. 1816. \**  
*Gæd. inf. 1. t. 41.*  
*List. gæd. t. 133.*  
*Habitat inter Aphides Ribecos.*
- Pyrastrii.** 51. *M. antennis setariis nigra nudiuscula, thorace immaculato, abdomine bis tribus lunulis flavis recurvatis. Fn. suec. 1817. \**  
*Scop. carn. 931.*  
*Frisch. inf. 11. t. 22. f. 1.*  
*Reaum. inf. 3. t. 31. f. 9.*  
*Alb. inf. t. 66.*  
*Gæd. inf. 1. t. 47. larva.*  
*List. gæd. t. 134.*  
*Blank. inf. t. 10. f. P.*  
*Sultz. inf. t. 20. f. 132.*  
*Geoffr. paris. 2. p. 517. n. 46.*  
*Habitat inter Aphides Pyri.*
- transfuga.** 52. *M. antennis setariis nigra, abdomine cylindrico tomentoso lunulis bis tribus albidis recurvis. Fn. suec. 1818. \**  
*Habitat in Suecia rarior; olim lecta, nec dein a me in Suecia reperta.*
- Mentha-** 53. *M. antennis setariis nigra nuda, thorace maculato, stri. abdomine cingulis quatuor scutelloque flavis. Faun. suec. 1819. \**  
*Geoffr. paris. 2. p. 514. n. 41.*  
*Habitat inter Aphides, at Musca in Menthae floribus mellifuga.*
- scripta.** 54. *M. antennis setariis nudiuscula, thorace lineis, scutello abdomineque lineari fasciis flavis. Faun. suec. 1820. \**

R r r 4

Reaum.

Aphidivora Musca sunt, quarum Larvæ foliis impostæ Aphidibus visitant, vix e loco moventur, & solo rostro, tanquam totum corpus proboscide constaret, aphides inquirunt, legunt, consumunt.

*Reaum. inf. 4. t. 10. f. 2, 3.*

*Ros. inf. 2. musc. t. 6.*

*Habitat inter Aphides, at Musca in floribus.*

**mellina.** 55. *M. antennis setariis nuda, thorace subæneo fuscescente immaculato, abdomine maculis 8 lutescentibus. Fn. suec. 1821. \**

*Scop. carn. 934.*

*Habitat inter Aphides, quibus vicat.*

*Variat abdominis dorso 4, 3, & 2 paribus macularum ferruginearum: iisque l. tetragonis, l. trigonis, l. rotundis.*

**pipiens.** 56. *M. antennis setariis glabra nigra, abdomine utrinque albo maculato, femoribus posticis clavatis dentatis. Fn. suec. 1822. \**

*Geoffr. paris. 2. p. 519. n. 49.*

*Scop. carn. 969. Conops pipiens.*

*Habitat in Europa, volitat frequens ad flores Menthae aliosque.*

**segnis.** 57. *M. antennis setariis glabra, thorace subæneo, abdomine ferrugineo: apice nigro, femoribus posticis clavatis. Fn. suec. 1823. \**

*Habitat in Europa.*

**femorata.** 58. *M. antennis setariis glabra atra oblonga, femoribus posticis clavatis, pedibusque anticis rubris. Fn. suec. 1824. \**

*Habitat in Europa.*

**grossipes.** 59. *M. antennis setariis glabra nigra, oculis pallidis, pedibus piceis: posticis grandioribus.*

*Habitat in Europa.*

*Corpus nigrum, vix Pediculo majus. Alæ hyalinae, incumbentes. Femora postica longitudine & crassitie insignia.*

**saltatrix.** 60. *M. antennis setariis nuda flava, abdomine supra, thoraceque lineis tribus fuscis. Fn. suec. 2319. \**

*Habitat in Europæ pratis, supra terram: saltans ut Cicada. Thorax linea longitudinali, latiuscula, nigra; macula oblonga nigra; extimo utrinque lineola nigra. Scutellum flavum. Halteres albi.*

• • • • •

\* \* \* \* *Pilosa plumata.*

- inanis.** 61. *M. antennis plumatis pilosa flavescens, abdomine pellucido cingulis duobus nigris. Fn. suec. 1825.\**  
*Geoffr. paris. 2. p. 543. t. 18. f. 4. Nemoletus 1.*  
*Habitat in Europa.*  
*Simillima sequenti, sed Thorax maris villosus - flavus. Abdomen pellucidum, flavum, cinctum fasciis duabus nigris & ano nigro. Rostrum utrinque cornutum glabrum. Alae absque fascia.*
- pellucens.** 62. *M. antennis plumatis pilosa nigra, abdominis segmento primo albo pellucido. Fn. suec. 1826.\**  
*Rav. inf. 271. n. 1.*  
*Saltz. inf. t. 20. f. 133.*  
*Geoffr. paris. 2. p. 540. t. 18. f. 3. Volucella. 1.*  
*Habitat in Europa.*
- meridiana.** 63. *M. antennis plumatis pilosa nigra, fronte aurata, alis basi luteis. Fn. suec. 1827.\**  
*Scop. carn. 867.*  
*Habitat in Europa.*
- Caesar.** 64. *M. antennis plumatis pilosa viridi-nitens, pedibus nigris. Fn. suec. 1828.\**  
*Scop. carn. 871.*  
*Monff. inf. t. 49.*  
*Raj. inf. 272.*  
*Merian. eur. 1. t. 49.*  
*Geoffr. paris. 2. p. 522. n. 53.*  
*Reaum. inf. 4. t. 8. f. 1. & t. 19. f. 8.*  
*Habitat in Cadaveribus.*
- cadaverina.** 65. *M. antennis plumatis pilosa æneo-nitens: thorace cæruleo, abdomine viridi. Fn. suec. 1829.\**  
*Gæd. inf. 1. t. 54.*  
*List. gæd. f. 123.*  
*Geoffr. paris. 2. p. 524. n. 57.*  
*Habitat in Cadaveribus.*
- inmortuorum.** 66. *M. antennis plumatis pilosa thorace nigro, abdomine viridi. Fn. suec. 1830.\**  
*Habitat in Cadaveribus.*
- Vomitaria.** 67. *M. antennis plumatis pilosa, thorace nigro, abdomine cæruleo nitente. Fn. suec. 1831.\**  
*R r r f* *Scop.*

*Scop. carn.* 868. *Musca carnaria*.

*Gœd. inf.* 1. t. 53.

*List. gœd. f.* 122.

*Raj. inf.* 27.

*Reaum. inf.* 4. t. 19. f. 8.

t. 24. f. 13, 15.

*Geoffr. parif.* 2. p. 524. n. 59.

*Lyonet. leff.* t. 1. f. 23, 27.

*Habitat in Cadaveribus; etiam Americæ. Kalm. Tres Muscæ consumunt cadaver Equi, æque cito ac Leo.*

**carnaria.** 68. *M. antennis plumatis pilosa nigra, thorace lineis pallidioribus, abdomine nitidulo tessellato, oculis rubris. Fn. suec.* 1832.\*

*Scop. carn.* 869. (*subvariegata*).

*Aldr. inf.* 348. t. 2. f. 16.

*Fonst. inf.* t. 8. O. 2. f. 16.

*Raj. inf.* 270.

*Frisch. inf.* 7. t. 14.

*Reaum. inf.* 4. t. 29. f. 4-6.

*Raj. inf.* 2. *musc.* t. 9 s 10.

*Geoffr. parif.* 2. p. 527. n. 65.

*Habitat in Cadaveribus Europæ, etiam Americæ. Kalm. Ano fulvo a domestica differt. Geoffr.*

**domestica.** 69. *M. antennis plumatis pilosa nigra, thorace lineis obsoletis, abdomine nitidulo tessellato: oculis fuscis.*

*Fn. suec.* 1833.\*

*Scop. carn.* 872.

*Aldr. inf.* t. 2, f. 23.

*Joblot. micr.* 1. pp. t. 5.

*Raj. inf.* 270,

*Habitat in Europæ domibus, etiam America.*

*Larvæ in fimo Equino. Pupæ parallele, cubantes.*

*Vulva hujus pro pene perperam vulgo habetur.*

**maculata.** 70. *M. antennis plumatis pilosa nigra, thorace nigro-lineato; abdomine atro maculato, ano bipunctato.*

*Scop. carn.* 870.

*Habitat in Floribus Europæ: Sueciæ.*

*Similis M. domestica, sed pallidior, magisque glauca.*

*Vertex lineis 2, nigris, approximatis. Thorax lineis nigris, interruptis. Abdomen maculis difformibus, in singulis segmentis; ad extremum anum, maculæ 2 ovales; omnes atrae.*

71. *M.*



- albifrons. 71. *M. antennis plumatis pilosa nigra, fronte alba.* *Fn. succ. 1834.\**  
*Reaum. inf. 4. t. 26. f. 5.*  
*Habitat in Europa.*
- fusta. 72. *M. antennis plumatis pilosa nigra, alis deflexis fuscis margine laterali albis.*  
*Habitat Uplaliæ, sub foliis Herbarum. C. P. Thunberg.*  
*Corpus atrum, pilis adpersum, magnitudine Pediculi. Alæ nigrae, semper deflexæ, imprimis posteriora versus. Pedes albi. Singularis admodum Antennis testaceis, subrotundis, sed una cum proboscide retractis intra cranium, nec cranio insident antennæ.*
- sepulchralis. 73. *M. antennis plumatis pilosa nigra, abdomine atro nitido: supra glaberrimo.* *Fn. succ. 1835.\**  
*Habitat in Europa.*  
*Statura Musca domestica, sed tota atra; alter sexus seta non pilosa.*
- \*\*\*\* *Pilosa setariae.*
- fera. 74. *M. antennis setariis pilosa nigra, abdominis lateribus testaceis diaphanis.* *Fn. succ. 1836.\**  
*Habitat in Europa.*
- grossa. 75. *M. antennis setariis pilosa nigra, alis basi ferrugineis.* *Fn. succ. 1837.\**  
*Reaum. inj. 4. t. 26. f. 10.*  
*Habitat in Stercore bovino.*  
*Similis M. meridiana, sed major omnibus nostris muscis.*
- rotundata. 76. *M. antennis setariis pilosa, thorace sublineato, abdomine subrotundo flavo: maculis longitudinalibus fuscis confertis.* *Fn. succ. 1838.\**  
*Scop. carn. 883.*  
*Habitat in Europa.*  
*Maculae 5 dorsales, in altero sexu distantes, in altero contiguæ.*
- tremula. 77. *M. antennis setariis pilosa atra nitens, alarum basi, squama halteribusque ferrugineis.*  
*Scop. carn. 885.*  
*Habitat in Europa: Svecia.*

Magni-

# INSECTA DIPTERA. Musca.

*Magnitudo M. domestica, magis oblonga. Abdomen secundum lineam longitudinalem & lateribus setis longis hirta, versus anum pluribus.*

**Larva-** 78. *M. antennis setariis pilosa nigricans, scutelli apice sum.* subtestaceo, abdomine pallidius tessellato. *Fn. succ.* 1839.\*

*Scop. carn.* 888.

*De Geer inf.* 1. t. 11. f. 23.

*Ammiral.* t. 6.

*Habitat in Larvis Lepidopterorum; mihi visa in radicibus Brassicæ oleraceæ, unde radix strumosa & inde capita laxa.*

*Similis M. domestica, sed major, canescens. Thorax nigro-lineatus, sed scutelli apex pallens.*

**Radicum.** 79. *M. antennis setariis pilosa, abdomine cinereo: linea dorsali cingulisque quatuor nigris. Fn. succ.* 1839.\*

*Habitat in radicibus Raphani. Ferskål. Frequenter cum*

*M. caniculari choreas agit, mixta illius turbæ; an itaque tantum sexu diversa? quamvis colore aliena.*

*Similis M. domestica, sed dimidio minor, angustior.*

**canicu-** 80. *M. antennis setariis pilosa nigricans; abdominis se-  
**laris.** gmento secundo tertioque lateribus diaphano. *Fn.*  
*succ.* 1841.*

*Habitat in Europa, sub canicula, meridie & vespere, ventis pacatis choreas agens sub arborum coma.*

*Simillima M. domestica, sed dimidio minor. Frons argentea nigro ciliata.*

**æstivatio-** 81. *M. antennis setariis pilosa nigra, alis punctis albis  
**nis.** transversis. *Fn. succ.* 1843.\**

*Habitat in Europa.*

**Coemite-** 82. *M. antennis setariis pilosa nigra, abdomine supra gla-  
**riorum.** bro. *Fn. succ.* 1842.\**

*Habitat in Europa.*

*Similis M. sepulchrali, sed paulo minor.*

**pluvialis.** 83. *M. antennis setariis pilosa cinerea, thorace maculis*  
*quinque nigris, abdomine maculis tridentatis obsole-*  
*tis. Fn. succ.* 1844.\*

*Scop. carn.* 891.

*Habitat in Europa.*

84. *M.*

- subful- 84. *M. antennis setariis pilosa tota atra, alis hyalinis, fe-*  
tans. moribus posticis saltatoriis.  
*Habitat in Svecia, volitat saliendo cadendoque femori-*  
*bis quasi dependentibus; quiescens tetrata salit ut*  
*Pulex.*  
*Magnitudo Pulicis absque ulla albedine.*
- roralis. 85. *M. antennis setariis pilosa aterrima. Fn. suec. 1846.\**  
*Scop. carn. 890.*  
*Habitat in Europa.*
- ferrata. 86. *M. antennis setariis pilosa fusca, alarum costa pilis*  
brevissimis ferrata, abdomine pedibusque ferrugineis.  
*Fn. suec. 1847.\**  
*Habitat in Europa.*
- cellaris. 87. *M. antennis setariis pilosa nigra, alis nervosis, ocu-*  
lis ferrugineis. *Fn. suec. 1848.\**  
*Scop. carn. 905. Musca ænopota.*  
*E. N. C. 12. obs. 58.*  
*Raj. inf. 261.*  
*Reaum. inf. 5. t. 8. f. 7, 11, 12.*  
*Geoffr. paris. 2. p. 536. n. 85.*  
*Habitat in cellis vinariis aliisque.*
- meteori- 88. *M. antennis setariis pilosa nigra, abdomine subcine-*  
ca. reo, alis basi subflavis, oculis brunneis. *Fn. suec.*  
*1849.\**  
*It. wgoth. 37.*  
*Habitat in Europa, nebulae instar, ingruente imprimis*  
*pluvia, ora Equorum obvolitantis. Amæn. acad. 3.*  
*p. 358. Sub aestivatione citissime obvolitans.*  
*Similis M. domesticæ, sed ½ minor. Abdomen omnino*  
*ovatum, nec depressum. Antennæ seta vix pubescente.*
- putris.\* 89. *M. antennis setariis subpilosa atra, alarum costa ni-*  
gra, oculis fetrugineis. *Fn. suec. 1850.\**  
*Scop. carn. 904.*  
*α. Fn. suec. 1. n. 1110.*  
*β. Fn. suec. 1. n. 1109.*  
*Gæd. inf. 1. t. 73.*  
*List. gæd. t. 132.*  
*Mer. eur. t. 43. f. 83.*  
*Frisch. inf. 1. t. 7.*  
*Habitat α in Fimeticis, β in Caseo, larva saliente.*

*Ha tres species adeo affines, ut difficulter distinguantur.*

- Frit. 90. *M. antennis setariis pilosa nigra, halteribus plantis posticis abdomineque virescenti-pallidis. Fn. suec. 1851. \**

*Linn. adf. Stockb. 1750. p. 128.*

*Habitat in glumis Hordei, decimum quodque granum Hordeaceum apud nos destruens, dispendio annuo ultra 100,000 ducatorum aureorum.*

- Lepræ. 91. *M. antennis setariis atra nitens, antennis pedibusque albis, oculis rufo inauratis.*

*Habitat in Elephantiali Nigritarum America. Rolander. Corpus pediculo minus. Abdomen subtus & basi album. Denticulus utrinque ad basin proboscidis.*

- cupraria. 92. *M. antennis setariis glauca ænea, thorace viridi, abdomine cupreo oblongo, halteribus nudis. Fn. suec. 1853. \**

*Scop. carn. 911.*

*Reaum. inf. 4. t. 22. f. 7, 8.*

*Geoffr. parif. 2. p. 525. n. 61.*

*Habitat in Europa.*

- polita. 93. *M. antennis setariis glabra ænea, capite viridi, thorace abdomineque cæruleis, halteribus nudis. Faun. suec. 1854. \**

*Habitat in Europa.*

*Variat colore viridi & cæruleo.*

- viduata. 94. *M. antennis setariis glabra nuda æneo-nigra, abdomine æneo: dorso atro, squamis halterum ciliatis. Fn. suec. 1852. \**

*Habitat in Europa.*

- pubera. 95. *M. antennis setaceis pilosa nigra, abdominis ultimo segmento incurvato: pube utrinque reflexa. Fn. suec. 1855. \**

*Habitat in Europa.*

- Petronel- 96. *M. antennis setariis pilosa glabra livida, fronte rubra, la. cauda incurvata, pedibus elongatis testaceis. Faun. suec. 1856. \**

*It. wgoth. 55.*

*Habitat ad aquas, cursitans musca supra aquas quietas. 97. M.*

ungulata. 97. *M. antennis setariis pilosa glabra æneo-viridis, cauda uncinata, pedibus elongatis lividis. Fn. svec. 1858.\**

*Fn. svec. 1053.*

*Habitat in Europa.*

*Pedes antici palmati sunt.*

nobilitata. 98. *M. antennis setariis pilosa glabra æneo-viridis, cauda uncinata, alis macula nigra apice alba.*

*Habitat in Europa.*

*Simillima M. unguata, sed distinctissima alis macula magna nigra apiceque albo.*

arrogans. 99. *M. antennis setariis nigra, alis fuscis: fasciis tribus albis. Fn. svec. 1857.\**

*Habitat in Europa.*

corrigio- 100. *M. antennis setariis nigra, pedibus elongatis luteis, lata. femoribus nigro annulo.*

*Habitat in Europa australiore.*

*Statura M. Petronella, sed dimidio minor. Pedes elongati Tipula, sed Femora lutea cingulo nigro. Corpus angustum.*

æquino- 101. *M. antennis setariis glabra nigra, capite testaceo, cialis. oculis brunneis, pedibus elongatis.*

*Habitat in America meridionali. Mus. De Geer.*

cibaria. 102. *M. antennis setariis lævis, stigmatibus elevatis, abdomine cinereo adunco, pedibus elongatis. Fn. svec. 1859.\**

*Habitat in Culinis & in cibariis antiquis.*

cucularia. 103. *M. antennis setariis pilosa, thorace plumbeo, oculis abdomineque ferrugineis, pedibus pallidis.*

*Habitat in Svecia, adveniens cum Cuculo.*

*Statura M. scybalaria, sed dimidio minor, oblonga.*

*Thorax cinereo-plumbeus, pilosus. Abdomen leve, oblongum, apice attenuatum, ferrugineum. Antennæ ferrugineæ, obscuriores. Alæ hyalinae, anastomosi transversa, versus marginem tenuiorem, in medio brevior, ad abdominis finem latior; ad basin alæ obscuriore macula fuscescens, cæterum alæ abdomine duplo longiores, ut in Scybalaria.*

scybalaria. 104. *M. antennis setariis pilosa rufo-ferruginea hirta, alis puncto obscuriore. Fn. suec. 1860.\**

*Scop. carn. 896.*

*Habitat in stercore.*

*Similis M. stercoraria, sed duplo major, & saturatius colorata.*

stercoraria. 105. *M. antennis setariis pilosa grisea hirta, alis puncto obscuro. Fn. suec. 1861.\**

*Reaum. inf. 4. t. 27. f. 1-3.*

*Geoffr. parif. 2. p. 530. n. 69.*

*Habitat in Stercore.*

finetaria. 106. *M. antennis subplumatis pilosa livens glabrata, alis puncto obscuriore. Fn. suec. 1862.\**

*Scop. carn. 897. Musca rufa.*

*Habitat in Europa.*

parietina. 107. *M. antennis setariis, alis fuscis albo punctatis maculatisque, fronte testacea, Fn. suec. 1863.\**

*Habitat in Europa.*

umbrarum. 108. *M. antennis setariis, alis fuscis albo maculatis, fronte nivca. Fn. suec. 1864.\**

*Habitat in Europa.*

grossifica-tionis. 109. *M. antennis setariis, alis nigris apice albis. Fann. suec. 1865.\**

*Geoffr. parif. 2. p. 493. n. 1.*

*Habitat in Europa, rarius.*

terrestris. 110. *M. antennis setariis pilosa fusca, thorace extra lineas puncto atro, abdomine subtus striato.*

*Habitat in Svecia, pabulatur in ipsa terra.*

*Statura M. domesticæ, magis fusca. Thorax, extra lineas utrinque, puncto nigro juxta caput. Abdomen subtus lateribus longitudinaliter striatum.*

saltuum. 111. *M. antennis setariis, alis albis costa punctoque terminali fuscis, corpore flavo, occipite nigricante. Fn. suec. 1866.\**

*Habitat in Europa.*

vibrans. 112. *M. antennis setariis pilosa, alis hyalinis apice nigro, capite rubro. Fn. suec. 1867.\**

*Scop. carn. 939.*

*Geoffr.*

*Geoffr. parif. 2. p. 494. n. 4.*

*Habitat in Europa, ubique vibrans alas.*

**cynipsea.** 113. *M. antennis setariis, alis apice puncto nigro, abdominis primo articulo obovato. Fn. suec. 1868. \**

*Scop. carn. 947.*

*Habitat in Europa.*

*Femora antica subius denticulata sunt.*

**combina- 114. *M. antennis setariis pilosa cinerea, abdomine nigro,***  
**ta.** *alis margine tenuiore puncto nigro.*

*Habitat in Svecia.*

*Magnitudo dupla Pediculi. Thorax cinereus. Abdomen nigrum. Alæ complicatae fasciis duabus: priore obsoletiore; posteriore magis atra, quæ oritur a puncto majusculo nigro, ad marginem tenuiorem utriusque alæ, versus posteriora.*

**flava.** 115. *M. antennis setariis flava nuda, oculis viridissimis, Fn. suec. 1869. \**

*Geoffr. parif. 2. p. 537. n. 86.*

*Habitat in Europa; vix Pediculo major.*

**quadri- 116. *M. antennis setariis flava nuda, abdomine punctis***  
**punctata.** *nigris quatuor.*

*Habitat in Svecia rarius.*

*Magnitudo *M. flavae*. Abdomen ad latera postice punctis utrinque duobus nigris remotis.*

**æstuans.** 117. *M. antennis setariis, alis unguiculatis albis puncto centrali nigricante. Fn. suec. 1870. \**

*Habitat in Europa.*

**Serratulæ.** 118. *M. antennis setariis, alis albis, thorace virescente, abdomine cinereo lineis quatuor punctorum nigrorum. Fn. suec. 1871. \**

*Habitat in Cardui affinium floribus.*

**Arnicae.** 119. *M. antennis setariis, alis unguiculatis griseis nigro maculatis. Fn. suec. 1872. \**

*Scop. carn. 941.*

*Aldr. inf. 346. t. 1. f. 5.*

*Habitat in discis florum radiatorum, imprimis Arnicae montanae.*

- Hyofey-ami. 120. *M. antennis setariis, alis unguiculatis albis fusco maculatis. Fn. suec. 1873. \**  
*Habitat in Hyofeyamis, Cardui & Serratulæ arvensis capitulis.*  
*Alæ albæ: singulæ maculis 2 nigris: anteriore trans-versa parva; posteriore orbiculata majore; radiatis anastomosibus.*
- Sonchi. 121. *M. antennis setariis, alis hyalinis macula marginali nigra, oculis viridibus.*  
*Habitat in Sonchi arvensis receptaculis.*  
 Major Pediculo. Oculi virides. Thorax fuscus, immaculatus. Scutellum pallidius. Abdomen ovatum, nigrum incisurarum marginibus albidis. Anus mucrone obtuso. Venter virens. Alæ hyalinæ, nervis duabusque anastomosibus fuscis; margo exterior nigricans; ad medium marginis exterioris macula oblongifuscula nigra. Pedes testacei. Proboscis, dum exsertitur, longiuscula, filiformis, pallida.
- germinationis. 122. *M. antennis setariis, alis albis margine maculisque nigris. Fn. suec. 1874. \**  
*Scop. carn. 940.*  
*Habitat in Foliis arborum, frequens primo vere.*
- Urticæ. 123. *M. antennis setariis, alis albis puncto terminali fasciisque tribus fuscis distinctis. Fn. suec. 1875. \**  
*Habitat in Urtica.*
- Cerasi. 124. *M. antennis setariis, alis albis: fasciis fuscis inæqualibus: posticis exterius connexis. Fn. suec. 1878. \**  
*Blank. inf. t. 16. f. L.*  
*Red. vivent. 264.*  
*Reaum. inf. 2. t. 38. f. 22, 23.*  
*Habitat in Cerasorum nucleis.*
- Heraclii. 125. *M. antennis setariis, alis albis: fasciis fuscis repandis, oculis viridibus. Fn. suec. 1877. \**  
*Habitat in foliis Heraclii; subcutanea.*
- Cardui. 126. *M. antennis setariis, alis albis: linea geminata fusca S. literæ figura, oculis viridibus. Fn. suec. 1876. \**  
*Reaum. inf. 3. t. 45. f. 12-14.*  
*Blank. inf. 2. t. 16. f. Q.*  
*Gæd. inf. 1. t. 50.*

List.



*List. gæd. t. 129.*

*Habitat in Cardui crispæ, Serratulæ arvensis Gallis.*

solstitia- 127. *M. antennis setariis, alis albis unguiculatis: fasciis*  
lis. quatuor fuscis, scutello flavo. *Fn. succ. 1879. \**

*Geoffr. parif. 2. p. 499. n. 14.*

*Habitat in Carduis, aliisque,*

florescen- 128. *M. antennis setariis, alis pallidis venis nigricanti-*  
tiz. bus: strigis duabus undatis apiceque fuscis, *Fn. succ.*  
1880. \*

*Habitat in Europa.*

fronde- 129. *M. antennis setariis, alis nigris: fasciis duabus pun-*  
scentiæ. ctisque duobus albis, corpore nigro. *Faun. succ.*  
1881.

*Habitat in Europa.*

254. TABANUS. Os Proboscide carnosâ, termi-  
nata labiis duobus.

*Rostro Palpis duobus, subulatis,*  
*proboscidi lateralibus, pa-*  
*rallelis.*

rostratus. 1. *T. oculis fuscescentibus, rostro longitudine corporis.*  
*M. L. U. 421. \**

*Habitat ad Cap. b. spei. Tulbagh.*

barbatus. 2. *T. oculis nigris, rostro corpore dimidio brevior.* *M.*  
*L. U. 422. \**

*Habitat ad Cap. b. spei. Tulbagh.*

maurita- 3. *T. oculis nigricantibus, abdominis secundo segmento*  
nus. macula nigra, rostro corpus æquante.

*Habitat in Barbaria. E. Brander.*

*Corpus mediæ magnitudinis. Rostrum porrectum, lon-*  
*gitudine fere corporis. Oculi unicolores, nigre-sub-*  
*ceruleoscentes. Antennæ ferrugineæ. Thorax niger*  
*pilis testaceis. Abdominis segmentum: a minimum*  
*nigrum; b ferrugineum macula in medio nigra;*

S s s 2

c-h

Tabani Larvæ sub pratis degunt. *De Geer aët. holmenf. 1760. p. 276.*

c-h nigrum margine postico testaceo. Alæ hyaline maculis variis fuscis. Pedes ferruginei.

- bovinus. 4. T. oculis virescentibus, abdominis dorso maculis albis trigonis longitudinalibus. *Fn. succ.* 1882. \*  
*Scop. carn.* 1006.  
*Jonst. inf. t.* 8. o. 2. f. 22.  
*Reaum. inf.* 4. t. 17. f. 8.  
*Geoffr. parif.* 2. p. 459. n. 1.  
*Sebaß. elem. t.* 122.  
*Habitat in Europa, Equis infestus.*
- autumnalis. 5. T. alis hyalinis, abdomine fusco ordine triplici albido maculoso. *Fn. succ.* 1883.  
*Scop. carn.* 1007.  
*Habitat in Europa.*
- calens. 6. T. oculis viridibus, abdominis dorso linea alba, antennis rubris.  
*Habitat in America. Mus. De Geer.*
- Tarandinus. 7. T. oculis viridibus? abdominis segmentis margine luteis, pedibus rufis. *Fn. succ.* 1884. \*  
*Habitat in Lapponia, Norvegia. Tarandorum tenella cornua pungens, vulnerans, deformans.*
- exultans. 8. T. oculis viridibus, abdominis segmentis margine albis, tibiis candidis.  
*Habitat in America meridionali. Rolander.*
- fervens. 9. T. oculis viridibus, abdomine antennisque luteis, capite thoraceque fusco.  
*Habitat in America australiore.*
- mexicanus. 10. T. oculis . . . : corpore livido, antennis viridibus, alis virescentibus punctis anathomosantibus.  
*Habitat in America meridionali. Rolander.*
- rusticus. 11. T. oculis glaucis, corpore cinereo pubescente.  
*Habitat in Europa: in Suecia.*  
*Corpus mediæ magnitudinis, totum villosum s. hirsutum, quo a Bromio differt. Abdominis latera vix manifeste flavescunt. Alæ immaculatæ. Oculi immaculati. Plantæ pedum nigricantes. Antennæ testaceæ. Frons punctis 2 nigris: altero superiore.*  
 12. T.

- Bromius. 12. T. oculis fascia purpurascente, corpore cinerascente  
læviore *Fn. svec.* 1885. \*  
*Scop. carn.* 1011.  
*Habitat in Europa.*
- occiden- 13. T. oculis fasciis binis fuscis, corpore fusco, abdo-  
talis. mine lineis tribus fulvis.  
*Habitat in America meridionali. Læfving.*
- tropicus. 14. T. oculis fasciis ternis fuscis, abdominis lateribus  
ferrugineis. *Fn. svec.* 1886. \*  
*Scop. carn.* 1008.  
*Habitat in Europa, Equis instante pluvia molestus.*
- antar- 15. T. oculis fasciis quaternis fuscis, scutello macula  
cticus. nigra, tibiis anticis albis.  
*Habitat in America calidiore. Rolander.*  
*Dorsum abdominis notatum maculis albis.*
- pluvialis. 16. T. oculis fasciis quaternis undatis, alis fusco pun-  
ctatis. *Fn. svec.* 1887. \*  
*Scop. carn.* 1012.  
*Reaum. inf.* 4. t. 18. f. 1.  
*Geoffr. parif.* 2. p. 461. n. 5.  
*Habitat in Europa.*
- cæutiens. 17. T. oculis nigro-punctatis, alis maculatis. *Faun.*  
*svec.* 1888. \*  
*Scop. carn.* 1014.  
*Geoffr. parif.* 2. p. 463. n. 8.  
*Habitat in Europa.*
- lugubris. 18. T. oculis corporeque nigro, alis fuscis macula alba.  
*Fn. svec.* 1889. \*  
*Habitat in Europa.*
- morio. 19. T. oculis corporeque toto atro, alis hyalinis.  
*Habitat in Barbaria.*  
*Corpus magnitudine fere T. bovini, exceptis alis, to-  
tum atrum.*

# 255. CULEX. Os aculeis setaceis intra vaginam flexilem.

pipiens. 1. *C. cinereus*, abdomine annulis fuscis octo. *Faun.*

*Svec.* 1890. \*

*Scop. carn.* 1017.

*Fl. lapp.* 363. 364.

*Blank. inf.* t. 15. f. A-D.

*Reaum. inf.* 4. t. 43, 44.

*Swamm. quart.* t. 23.

*bibl.* t. 31. f. 4-8. t. 32. f. 1-5.

*Sultz. inf.* t. 21. f. a.

*Raf. add.* t. 15.

*Schæff. elem.* t. 54.

*Ledem. micr.* t. 79, 85.

*Joblot. micr.* 1. pp. 2. t. 13. f. A. B. C. D. E. H. I. L.

*Geoffr. paris.* 2. p. 579. t. 19. f. 4.

β. *Kalm. itin.* 2. p. 268. *Musquetoës.*

*Habitat in Europæ aquosis; copiosissima in Lapponia; etiam in America obvia. Kalm. Pellitur Fumo, maxime ex Inula Helenio & Cannabe.*

*Mas antennæ palpisque barbatis, vix pungit aut sugit sanguinem.*

*Larva in Aquis; Pupa bicornis reversa; Insectum pipiens, pungens: in Indiis magis venenata. Anates allicit, pullos Tetraorum nutrit, Lapponum calamitas felicissima.*

ciliaris. 2. *C. fusco-testacea*, alis ciliatis.

*Habitat in Europa: Suecia, rarior.*

*Simillimus C. pipienti, sed dimidio minor. Thorax testaceus s. ferrugineus. Abdomen subfuscum. Pedes longi, lividi toti. Alæ obscurius hyalinae margine (etiam venis) tenuiore ciliatæ. Antennæ nigrae, pilis vix conspicuis verticillatæ.*

bifurcatus. 3. *C. fuscus*, rostro bifurco. *Fn. Svec.* 1891. \*

*Raj. inf.* 74. n. 4.

*Reaum. inf.* 4. t. 40. f. 1, 2.

*Sultz. inf.* t. 21. f. 136.

*Habitat in Europa.*

4. *C.*

*Culicis Larvæ plerumque in aqua degunt & Pupa moventur agiles, piscantur ab Anatibus, decavata vero a pullis Tetraonum Passeribusque. Feminae non parvæ, mares vero vix; uti Tabani.*

- pulicaris. 4. *C. alis hyalinis: maculis tribus obscuris.* *Faun. suec.* 1892. \*  
*Fl. lapp.* 365.  
*Derh. phys.-th. l. i. c. ii. f. 5, 6.*  
*Habitat in Europa; in America.* *Kalm,*  
*Cursitat, mordet, relinquit punctum fuscum.* *Amœn.*  
*acad. 3. p. 343.*
- reptans. 5. *C. niger, alis hyalinis, pedibus nigris annulo albo.* *Fn. suec.* 1893. \*  
*Habitat in Europa, reptatu molestus tempore vespertino.*
- equinus. 6. *C. ater, abdomine fusco, fronte alba.* *Faun. suec.* 1894. \*  
*Fl. lapp.* 359.  
*Habitat circum Equos, quorum sanguinem haurit, inter crines eorum cursitans.*
- stercoreus. 7. *C. testaceus, alis reticulatis, linea thoracis, tribusque abdominis nigricantibus.*  
*Habitat in stercoreibus.*

## 256. EMPIS. Os Rostro corneo, inflexo, bivalvi, thorace longiore: valvulis horizontalibus.

- borealis. 1. *E. antennis filatis nigra, alis subrotundis fusco-ferrugineis.* *Fn. suec.* 1895. \*  
*Habitat in Norlandia, choreas aëreas circa vespertas instituens.*
- pennipes. 2. *E. antennis filatis nigra, pedibus posticis longis: alterius sexus pennatis.* *Fn. suec.* 1896. \*  
*Scop. carn.* 994. *Astilus pennipes.*  
*Sultz. inf. t. 21. f. 137.*  
*Habitat in Europa, frequens in floribus Geranii sylvatici, & Cardamines pratensis.*
- livida. 3. *E. antennis filatis livida, thorace lineis tribus nigris.* *Fn. suec.* 1897. \*  
*Habitat in Europa.*

- Corpus lividum. Thorax linea dorsali lateralibusque nigris. Abdomen supra magis fuscum. Ala oblongæ venis fuscis.*

forcipata. 4. E. antennis filatis cinerea, alis oblongis, cauda appendiculata. *Fn. suec. 1898. \**

*Habitat in Europa.*

*Corpus cinereum. Femora antica livida. Oculi testaceo-lutei.*

stercorea. 5. E. antennis filatis testacea, alis reticulatis, linea dorsali nigra. *Fn. suec. 1899. \**

*Habitat in Europa.*

*Color Muscæ stercorariæ.*

## 257. CONOPS. Os Rostro porrecto, geniculato.

rostrata. 1. C. antennis setariis nigra, abdomine ovato flavo lævi, rostro conico.

*Habitat in Germania. P. Forskål.*

*Statura Muscæ domesticæ. Rostrum corneum, porrectum, conicum, capite longius, versus basin reliquis omnibus multo crassius. Tibiæ flavescences. Alæ pallidæ.*

calcitrans. 2. C. antennis subplumatis cinerea glabra ovata. *Faun. suec. 1900. \**

*Scop. carn. 1001. Empis cacitrans.*

*Sulz. inf. t. 21. f. 138.*

*Geoffr. parif. 2. p. 539. t. 18. f. 2. Stromoxys 1.*

*Habitat ad Boum pedes, unde eorum continuus calcitratus. Amæn. acad. 3. p. 343. intrando domos pedesque ibi pungens prælagit tempestatem pluviolosam.*

*Simillima Muscæ domesticæ, ut vix distinguatur ab inexercitatis, nisi solo rostro subulato simplici acuto.*

*Abdominis segmenta punctis s. maculis 2 nigris.*

irritans. 3. C. antennis setariis cinerea subpilosa ovata. *Fn. suec. 1901. \**

*Habitat cum Pecoribus, quorum dorso copiose insidet, ut continuo sint in motu cauda verberando, pedibus calcitrando, ne copiosius pasti Boves indigestis perirent.*

*Simillimus precedenti, sed dimidio minor.*

4. C.

- vesicula- 4. *C. antennis clavatis mucronatis subferrugineis subcon-*  
ris. nexis, occipite vesiculari, abdomine glauco-flavescente. *Fn. suec. 1903.\**  
*Habitat in Europa.*
- macroce- 5. *C. antennis clavatis mucronatis luteis, abdomine sub-*  
phala. cylindrico glabro: segmentis quatuor margine flavescentibus. *Fn. suec. 1902.\**  
*Uldm. diff. 100.*  
*Geoffr. parif. 2. p. 471. Afibus 12.*  
*Habitat in Europa.*  
*Simillima Muscæ conopsoidi, sed antennæ basi distinctæ.*
- aculeata. 6. *C. antennis clavatis setariis nigricans, abdominis inci-*  
feris scutello thoracisque punctis duobus anticis flavis. *Fn. suec. 1906.\**  
*Habitat in Europa.*
- flavipes. 7. *C. antennis clavatis mucronatis nigris, abdomine sub-*  
cylindrico glabro: segmentis tribus margine flavis. *Fn. suec. 1904.\**  
*Habitat in Europa.*  
*Simillima Muscæ conopsoidi, nigra. Puncta 2 lutea ad basin abdominis. Pedes flavi (nec, ut præcedentis, ferruginei) fasciis nigris.*
- ferrugi- 8. *C. antennis setariis ferruginea, abdomine cylindrico,*  
nea. fronte lutescente. *Fn. suec. 1907.*  
*Habitat in Europa.*
- petiolata. 9. *C. antennis clavatis nigris clava rubra, capite flavo,*  
abdomine petiolato. †  
*Habitat in Sibiria. Er. Laxman.*  
*Antennæ basi geniculatæ. Rostrum nigrum. Truncus abdominis niger. Ad angulum anteriorem thoracis macula albo-rufescens. Pedunculus teres, tenuis, ruber. Abdomen apice rotundatum albumque. Alæ fuscæ, margine tenuiore apiceque hyalinæ. Pedes rufescentes. Halterum clavæ flavæ.*
- atomaria. 10. *C. antennis setariis, abdomine ovato grisea, alis fuscis*  
albo confertissime punctatis.  
*Habitat in Europa.*  
*Corpus griseum. Abdomen ovatum. Alæ ovales, rotundatæ, punctis tamquam atomis albidis punctatæ: ad marginem crassiorem puncta 3 majora alba.*
11. *C.*

testacea. 11. *C. antennis setariis testacea, abdomine subovato hamoso, facie vesiculari alba, alis hyalinis.*

*Scop. carn. 1004. Sicus ferrugineus.*

*Schæff. elem. t. 120. Stomoxoides.*

*Habitat in Europa australi. Ascanius.*

*Corpus ferrugineum. Abdomen non cylindricum, inflexum. Alæ hyalinæ venis ferrugineis. Statura C. buccatæ.*

buccata. 12. *C. antennis setariis, abdomine hamoso griseo, facie vesiculari alba, alis nebulosis. Fr. succ. 1905. \**

*Scop. carn. 1005. Sicus buccatus.*

*Habitat in Europa.*

subcoleo- 13. *C. antennis setariis, abdomine subferrugineo, alis præ-*  
 ptrata. *mortis externe crassioribus.*

*Habitat Upsaliæ. Carol. Cbristiernin, p. m. juvenis.*

*Refert insectum coleoptratum. Antenna setaria, uti Caput, Thorax, Pedes muscæ domesticæ. Abdomen magis rotundatum, ferrugineum apice nigro. Alæ erectæ, abdomine vix longiores, quasi præmorsæ, latissima, crassiores quam in aliis, quasi ustulatæ ex fusco & albo; unde peregrina facies.*

## 258. ASILUS. Os Rostro corneo, porrecto, recto, bivalvi.

maurus. 1. *A. subferrugineus, pectoris lateribus punctis thoracisque dorso lineis tribus nigris.*

*Habitat in Mauritania. E. Brander.*

*Magnitudo Asili crabroniformis. Antennæ ferrugineæ.*

*Abdominis segmenta margine fusca.*

algius. 2. *A. corpore toto ferrugineo.*

*Habitat in Barbaria. E. Brander.*

*Corpus magnitudinis Crabronis, totum ferrugineum, subpilosum pilis pallidis, non tomentosum. Oculi nigri. Alæ hyalinæ, reticulatæ. Abdominis incisuræ margine lucidiores s. magis ferrugineæ; ceterum abdomen subcylindricum, postice magis attenuatum, nudum.*

3. *A.*

---

*Asili capiunt insecta diptera iisque visitant.*



- barbarus. 3. A. fronte, thorace pedibusque ferrugineis, alis flavis apice margineque tenuiore nigris.  
*Habitat in Maoritania. E. Brander.*  
*Major congeneribus. Squamula alba ad latera thoracis. Frons ciliata. Femora & Tibiæ spinis sparsis tenuissimis.*
- crabroniformis. 4. A. abdomine tomentoso antice segmentis tribus nigris, postice flavo inflexo. *Fn. suec. 1908.\**  
*Raj. inf. 267.*  
*Frisch. inf. 3. t. 8.*  
*Mouff. inf. 46.*  
*Fonst. inf. t. 10. f. 2.*  
*Reaum. inf. 4. t. 8. f. 3.*  
*Geoffr. paris. 2. p. 468. n. 3. t. 17. f. 3.*  
*Scop. carn. 974. Erax crabroniformis.*  
*Schæff. elem. t. 13.*  
*Habitat intra Terram Larva*
- æstuans. 5. A. cinereus, abdominis ultimis tribus segmentis albis.  
*Amoen. acad. 6. p. 413. n. 95.\**  
*Habitat in Pennsylvania.*
- gibbosus. 6. A. hirsutus niger, abdomine postice albo. *Fn. suec. 1909.\**  
*It. scanic. 414.*  
*Habitat in Europa.*
- ater. 7. A. hirsutus totus niger, barba albida. *Fann. suec. 1910.\**  
*Scop. carn. 973. Erax prostratus.*  
*Habitat in Germania. Bergh Isacson.*  
*Similis præcedenti sed brevior, totus hirsutus. Barba sub capite & ungulæ albæ. Antenna subclavata. Sedens pectori incumbit expansis pedibus. S.*
- flavus. 8. A. niger hirsutus, thorace postice flavo, abdomine supra fulvo, plantis ferrugineis. *Fn. suec. 1911.\**  
*It. goth. 327.*  
*Habitat in Europa.*
- gilvus. 9. A. abdomine pubescente nigro: supra rufo. *Fn. suec. 1912.\**  
*Geoffr. paris. 2. p. 468. n. 4.*  
*Habitat in Europa.*

- margina- 10. *A. halteribus abdominisque incisuris flavis, femoribus*  
tus. *nigris. Fn. suec. 1913. \**  
*Habitat in Svecia. T. Bergman.*  
*Abdomen nigrum, pilis fulvis tomentosum: imprimis*  
*ad incisuras. Thorax niger.*
- teutonus. 11. *A. niger, thorace fugaci-aureo maculato, abdomine*  
utrinque maculis quinque albis.  
*Habitat in Germania. D. Schreber.*  
*Corpus medium. Antennæ luteæ. Frons flava. Tho-*  
*rax niger varie maculis villosis, certo respectu auri-*  
*coloribus. Abdomen glabrum, nigrum, segmentis*  
*singulis margine laterali albis. Pedes ferruginei,*  
*geniculis & plantis nigris.*
- germani- 12. *A. hirtus subcinereus, femoribus nigris, tibiis rubris,*  
cus. *alis fuscis basi albis.*  
*Habitat in Germania. P. Forskål, Bergh Isacson.*  
*Sequenti similis, etiam antennis, sed duplo major.*
- forcipatus. 13. *A. hirtus subcinereus, lateribus flavis. Faun. suec.*  
*1914. \**  
*Frisch. inf. 3. p. 35. t. 17.*  
*Geoffr. parif. 2. p. 473. n. 16.*  
*Scop. carn. 975. Erax-forcipatus.*  
*Habitat intra Terram Europæ; in Java triplo major.*  
*Maris cauda forcipata; Feminae acuta. Varietas ma-*  
*ior Tibiis ferrugineis.*
- Tipuloi- 14. *A. cinereus nudus, thoracis lineis dorfalibus tribus*  
des. *nigris. Fn. suec. 1915. \**  
*Geoffr. parif. 2. p. 474. n. 17.*  
*Habitat in Europa.*
- œlandi- 15. *A. ater nudus, alis nigris, pedibus halteribusque fer-*  
cus. *rugineis. Fn. suec. 1916. \**  
*It. œland. 155.*  
*Geoffr. parif. 2. p. 470. n. 8.*  
*Habitat in Europa.*
- Morio. 16. *A. hirtus niger, alis albo nigroque variis. Fn. suec.*  
*1917. \**  
*Habitat Upsaliæ usque in Cap. b. spei.*  
*Simillimus Muscæ Morioni; connectit Afilus & Bom-*  
*bylios.*

Iusitani- 17. *A. nigricans*, alis albo maculatis, abdomine flavo  
cus. trifariam nigro maculato.

*Habitat in Italia.*

Corpus magnitudine & statura *Musca vulgaris*. Rostrum brevissimum, obtusum, nigrum. Alæ fuscae, albo plurimum maculatae. Caput & Thorax nigra, pubescentia. Abdomen luteum, subconicum, depressusculum: segmento singulo in medio & lateribus margine macula nigra transversa.

259. BOMBYLIUS. Os Rostro porrecto, setacco, longissimo, bivalvi: valvulis horizontalibus intra quas aculei setacei.

major. 1. *B. alis dimidiato-nigris*. *Fn. suec.* 1918. \*

*Scop. carn.* 1018.

*Montf. inf.* 64. f. 5.

*Aldr. inf.* 350. f. 10.

*Raj. inf.* 273.

*Schæff. elem. t.* 27. f. 1.

*Hoeffn. inf. t.* 8. f. 1.

*Geoffr. paris.* 466. *Afilus* 1.

*Habitat in Europa.*

medius. 2. *B. alis fusco punctatis*, corpore flavescente postice albo. *Fn. suec.* 1919. \*

*Scop. carn.* 1019.

*Pet. gaz. t.* 36. f. 5.

*Habitat in Europa.*

capensis. 3. *B. alis nigro maculatis*, corpore cinerascente: postice nigro. *M. L. U.* 423. \*

*Habitat ad Cap. b. spei. Tulbagh.*

minor. 4. *B. alis immaculatis*. *It. scan.* 164. *Fn. suec.* 1920. \*

*Scop. carn.* 1020.

*Pet. gaz. t.* 42. f. 9.

*Reaum. inf. 4. t.* 8. f. 11-13.

*Habitat in Europa.*

s. B.

ater. 5. B. alis basi feminigris atra, abdomine albo maculato.  
*Scop. carn.* 1021. *Bombylius ater*.

*Habitat in Germania.*

*Frons pilosa. Antennæ cylindricæ. Caput puncto parvo niveo utrinque ante oculos. Thorax pilosus, ater, immaculatus. Abdomen marginibus hirsutis: Dorso minus piloso atro, puncto niveo majori utrinque ad basin & altero ad apicem; in medio puncta 4 minoræ, longitudinaliter digesta. Pedes nigri. J. C. Fabricius.*

260. HIPPOBOSCA. Os Rostro bivalvi, cylindrico, obtuso, nutante.

*Pedes unguibus pluribus.*

Equina. 1. H. alis obtusis, thorace albo variegato, pedibus tetradactylis. *Fn. suec.* 1921. \*

*Scop. carn.* 1022.

*Maxff. inf.* 59.

*Frisch. inf.* 5. t. 20?

*Reaum. inf.* 6. t. 48.

*Sultz. inf.* t. 21. f. 141.

*Geoffr. parif.* 2. p. 547. n. 1. 2. 547.

*Habitat in Europa & America septentrionali, Equis & Bobus infesta, vitæ tenacissima, pupipara.*

*Ala cruciato-complicata.*

avicularia. 2. H. alis obtusis, thorace unicolore. *Fn. suec.* 1922. \*

*Habitat in Avibus. D. C. Solander.*

*Præcedenti dimidio minor. Ala corpore sesquialongiores vasis lateralibus atris. Abdomen postice retusum, punctatum. Ungues bini duplicati.*

Hirundi- 3. H. alis subulatis, pedibus hexadactylis. *Faun. suec.* 1923.

*Scop. carn.* 1023.

*Reaum. inf.* 4. t. 11. f. 1-5.

*Geoffr.*

---

Hippobosca ovum facile matre majus, potius Pupa excludenda in volatilis.

*Geoffr. paris. 2. p. 547.* H. pedibus hexadactylis,  
alis divaricatis.

*Schæff. elem. 2. 70.*

*Habitat in Hirundinibus.*

Ovina. 4. H. alis nullis. *It. wgoth. 59. \* Fw. svec. 1924.*

*Frisch. inf. 5. 2. 18.*

*Habitat inter Ovium lanam.*

Corpus testaceum. Rostrum filiforme: Lingua setacea,  
exseranda. Pedes birti: Ungues gemini duplicati.

Abdomen distentum, pallidum, obtusum, utrinque  
linea undulata geminata albida; macula rubra in me-  
dio dorfi.

## VII. APTERA.

*Alæ nullæ, in omni sexu.*

261. LEPISMA. *Pedes VI cursorii.*

*Os Palpis 2 setaceis & 2 capitatis.*

*Cauda setosa: setis extensis.*

*Corpus squamis imbricatum.*

facchari- 1. *L. squamosa, cauda triplici. Fn. suec. 1925. \**

na. *Brown. jam. 425. Setoua subargentea, cauda setosa setis hirsutis.*

*Aldr. inf. 570. t. 2. f. 5. Forbicina.*

*Geoffr. parisi. 2. p. 613. t. 20. f. 3. Forbicina.*

*Sultz. inf. t. 22. f. 142.*

*Schæff. elem. t. 75.*

*Adam. microgr. t. 28. f. 147.*

*Habitat in America inter jaccharum & utensilia domestica, inde per Europam vulgaris, hodie in Svecia incepit, edit etiam libros vestesque laneas.*

*Corpus levissimum, cerulescens. Antennæ albidae, longitudine corporis. Palpi 2 setacei & 2 capitati. Thoracem excipiunt scuta 2 majora. Abdomen segmentis 10 minoribus. Cauda setis 3, distantibus, longis, at subius paria 2 setarum minimarum versus anum.*

polypoda. 2. *L. scutata, cauda triplici.*

*Habitat in Dania. D. Braunniche.*

*Corpus fuscescens, minus præcedente, latum. Antennæ longitudine corporis; Antennæ succenturiatæ inferius proximæque, prioribus triplo breviores, articulis 5, incurvatæ. Palpi 2, capitati, ad os. Pedes anteriores juxta os locati. Scuta tegunt corpus. Caudæ 3, longitudine corporis. Abdominis singula segmenta subius ad marginem spina armata, pedis instar.*

terrestris. 3. *L. nuda, cauda triplici. Fn. suec. 1926. \**

*Habitat in Europa.*

*Similis Podura, sed major, corpore toto albo cylindrico. Antennæ corporis dimidii longitudine, obtusæ ut in Podura.*

262. PODURA. *Pedes* VI. cursorii.*Oculi* II. compositi ex octonis.*Cauda* bifurca, saltatrix, inflexa.*Antennæ* setaceæ elongatæ.viridis. 1. *P. subglobosa viridis. Fn. suec. 1927. \***Geoffr. paris. 2. p. 607. Podura viridis, capite flavescente, antennis in medio fractis.**Habitat in Europæ plantis frequens in Polygoni Fagopyri foliis primordialibus.*polypoda. 2. *P. subglobosa atra, antennis longitudine corporis apice albis. Fn. suec. 1928. \***Habitat in Europæ plantis.*atra. 3. *P. globosa fusca nitida, antennis longis: articulis plurimis. Fn. suec. 1929.**Ad. Stockb. 1743. p. 296. t. 7.**Habitat in Europæ terrestribus.*plumbea. 4. *P. teres fusco-cærulea nitida. Fn. suec. 1930.**Sultz. inf. t. 22. f. 143**Geoffr. paris. 2. p. 610. n. 9.**Habitat in Europæ arbusis.*minuta. 5. *P. ovata flava, dorso maculis duabus ferrugineis.**Habitat in Svecia.**Corpus omnium minimum. Oculi, Humeri s. anterior pars abdominis, ut & postica pars supra dorsum versus caudam; fusco-ferruginea.*nivalis. 6. *P. oblonga cinerea signaturis nigris. Fn. suec. 1931. \***E. N. C. dec. 2. ann. 3. obs. 197. Pulex nivis.**De Geer Ad. Ups. 1740. p. 54. t. 2.**Habitat in Europæ nemoribus, Lignis; hyeme frequens supra nives in vestigiis hominum & mammalium.*vaga. 7. *P. oblonga nigra, abdomine antennisque fascia alba.**Habitat in Svecia.**Nigra, sed bases antennarum & furca alba; fascia abdominis dorsalis albida. Pedes nigri.*

- arbores. 8. *P. oblonga nigra*, pedibus furcaque albis. *Fn. succ.* 1177. 1932. \*  
*Scop. carn.* 1030.  
*De Geer act. Ups.* 1740. p. 49. t. 1.  
*act. Stockb.* 1740. p. 272. t. 1.  
*Habitat in Europæ sylvis.*
- villosa. 9. *P. oblonga villosa fusco nigroque variegata.*  
*Geoffr. parif.* 608. t. 20. f. 2.  
*Habitat in Gallia, reliquis plerisque major.*
- cincta. 10. *P. cylindrica grisea*, cingulo atro antice albo. *Faun. succ.* 1933.  
*Habitat in sylvis Europæ.*
- pufilla. 11. *P. cylindrica ænea*, furca alba.  
*Habitat in Europa, passim curfsat, egregie exsultat.*  
*Corpus omnium minimum, attente observandum ne o-*  
*culos fugiat, totum aneum, oblongum & fere cylin-*  
*dricum.*
- aquatica. 12. *P. nigra aquatica.* *Fn. succ.* 1934. \*  
*Scop. carn.* 1027.  
*Geoffr. parif.* 610. n. 8.  
*De Geer act. Ups.* 1740. p. 57. t. 3.  
*Stockb.* 1740. p. 279. t. 3, 4.  
*Lederm. epist.* 15. t. 7.  
*Habitat in Aquosis Europæ, horis matutinis per pha-*  
*langes decorticat aquas stagnantes.*
- armetaria. 13. *P. terrestris alba.* *Fn. succ.* 1935.  
*Scop. carn.* 1029.  
*Habitat in terra prægnante Europæ, frequens primo*  
*vere, imprimis exit humo aqua irrorata, Cauda ob-*  
*tusa mutica; non salit.*
- ambulans. 14. *P. alba*, cauda bifida extensa obtusa. *Faun. succ.* 1936.  
*Habitat in Montibus, sub Muscis.*  
*Corpus cylindricum, reliquis longius, album, molle.*  
*Punctum fuscum supra anum. Cauda setis 2 ex-*  
*tensis, longitudine  $\frac{1}{2}$  corporis. Non salit.*



263. TERMES. *Pedes* VI, cursorii.

Oculi II.

*Antennæ* teraceæ.

Os maxillis duabus.

fatale.

1. *T. luteum*; alterius maxillis longitudine antennarum. *Habitat in Indiæ utriusque umbrosis, aperto atri inuisum, fornices cylindricos progrediendo inædificans, maxillis longis altissime resiliens; Nidos e sabulo, sinibus dadaleis in tophum struens. Destruit utensilia omnia, utriusque Indiæ calamitas summa: domos, naves, cibaria, vestimenta, ex animalibus & vegetabilibus singula quæque, relicta sola superficie integra; calce viva coercendum, de quo Rolander & peregrinatores plurima.*

*Alteri (Femina forte) Corpus magnitudine T. pulsatorii. Caput corneum, laeve, oblongo-subtetragonum, luteum. Antennæ vix thorace longiores. Maxillæ corneæ, laeves, nigrae, subulatae, subarcuatae, porrectæ, longitudine antennarum. Abdomen oblongum, subcylindricum, albicans. Caput. Ekenberg.*

*Alterum (sexu tantum diversum, Rolander) simile præcedenti, sed absque maxillis magnis porrectis. Caput suborbiculatum, flavescent. Maxillæ brevissimæ. Antennæ filiformes, corpore dimidio breviores. Abdomen ovatum; albidum. Ekenberg.*

pulsatorium.

2. *T. abdomine oblongo, ore rubro, oculis luteis. Fw. Suec. 1937. \**

*Scop. carn. 1032.*

*Derb. theol. 119.*

*Bradl. nat. t. 27. f. 3.*

*Raj. inf. 8.*

*Act. angl. n. 270. p. 231. & n. 291. p. 1586. & n. 245. p. 376.*

*Roland. act. Stockh. 1754. p. 152.*

*Sultz. inf. t. 22. f. 144.*

*Geoffr. parif. 2. p. 601. Pediculus 12.*

*Schaff. elem. t. 126.*

*Habitat in Europa & America, frequent in domibus, inuisum vestibus, Herbariis, Insectorum muscis. Femina borelogii instar pulsatoria in ligneis fessulis.*

fatidicum. 3. T. abdomine ovato, ore pallido, oculis fuscis. *Fn. succ.* 1938. \*

*Frisch. inf.* 11. p. 2. t. 10.

*Habitat in Europa australiore, nobis primum visum in plantis ficis a Læssingio transmissis.*

*Simile præcedenti, sed duplo majus.*

## 264. PÉDICULUS. *Pedes* VI, ambulatorii.

*Oculi* II.

*Os* aculeo exferendo.

*Antennæ* longitudine thoracis.

*Abdomen* depressum, sublobatum.

*Humanus*. I. *P. humanus.* *Fn. succ.* 1939.

*Mouff. inf.* 259.

*Red. exp. t.* 18.

*Swamm. quart. t.* 7.

*bibl. t. 1. f.* 3-6.

*Alb. aran. t.* 42.

*Bonan. micr. f.* 55.

*Foblot. micr. 1. pp. 1. t. 1.*

*Baker. micr. t. 13. f. 4.*

*Schæff. elem. t.* 95.

*Sultz. inf. t. 22. f.* 145.

*Lederm. micr. 45. t. 21.*

*Habitat in capite & vestimentis humanis; occiditur Seminibus Veratri, Staphisagrie, Menispermis, Ruta, Apii, Angelicæ, Lauri; Croco, Pipere, Ledo, Lycopodio, Pingnicula, Hydrargyro, Gelu, Æstu. Rodendo caput exciat Achores apud puerulos voraces incarceratos indeque strumosos, sicque præservat a Coryza, Tussi, Cæcitate, Epilepsia &c. instante pluvia descendit ad latera capitis.*

*Varietas Capitis durior, coloratior; Vestimentorum laxior, magis cinerea,*

*Problema qui solvat, cur aliæ ejusdem speciei familiæ mordicus Capiti inhereant; aliæ corporis vestimentis, is facile plurium morborum contagiosorum naturam intelligat.*

2. P.

---

*Pediculi Mammalium Aviumque multo plures etiamnum non observati, minus descripti, multo minus differentia determinati exstant.*

Pubis. 2. P. pubis. *Fn. suec.* 1940.

*Mouff. inf.* 200.

*Raj. inf.* 8.

*Schenk. obs.* 676.

*Red. exp. t.* 19. f. 1.

*Pet. gaz. t.* 67. f. 9.

*Hospitatur in Hominis immundi pube, rarius in superciliis; pellitur oleo Tabaci.*

*Antennæ articulis 5. Abdomen postice emarginatum, pilosumque. Pedes 2 ♂ 3 habent calcar & digitum cheliformem, quibus arte adhaeret.*

ricinoides. 3. P. abdomine orbiculato linea alba, scutello trilobo, rostro albo.

*Habitat in America, pedes obambulantium intrans, sanguinem hauriens, in iis ova deponens, ulcera caecothica causans. Rolander.*

*Acarus esset, nisi pedes rufescentes tantum 6. Rostrium longum cylindricum subtus hamulis. Corpus rufescens.*

Suis. 4. P. Suis Scrofæ. *Fn. suec.* 1942.

*Habitat in Suibus. β.*

Porcelli. 5. P. Muris Porcelli. *Fn. suec.* 1943.

*Habitat in Mure Potcello.*

Cameli. 6. P. Cameli. †

*Red. exp. t.* 22,

*Habitat in Camelo Dromedario, Baṭriano.*

Cervi. 7. P. Cervi. *Fn. suec.* 1944.

*Frisch. inf.* 12. p. 15. t. 5.

*Red. exp. t.* 5.

*Habitat in Cervo Elapho, Dama, Capreolo.*

Ovis. 8. P. Ovis Arietis. *Fn. suec.* 1945.

*Red. exp. t.* 22. f. 1?

*Habitat in Ovibus.*

Bovis. 9. P. Bovis Tauri, abdomine lineis transversis oſſo ferrugineis. *Fn. suec.* 1946. \*

*Habitat in Bobus; pellitur decocto Ledi & Sedi acris.*

- Vituli. 10. *P. Bovis Tauri*, *abdomine plumbeo*. *Faun. suec.*  
1947. \*  
*Habitat in Bobus cum precedenti.*
- Equi. 11. *P. Equi Caballi*. *Fn. suec.* 1948.  
*Habitat in Equis.*
- Afini. 12. *P. Equi Afini*. †  
*Red. exp. t. 22. f. 1.*  
*Habitat in Afinis.*
- Tinnunculi. 13. *P. Falconis Tinnunculi*. *Fn. suec.* 1949. \*  
*Red. exp. t. 13.*  
*Frisch. inf. 11. p. 24. t. 24.*  
*Habitat in Falconibus Tinnunculis, Milvis.*  
*Conferantur alie species in Falconibus. Red. exp. t. 1.*
- Corvi. 14. *P. Corvi Coracis*. *Fn. suec.* 1950. \*  
*Red. exp. t. 16. f. 2.*  
*Habitat in Corvis.*
- inausti. 15. *P. Corvi inaufsti*. *Fn. suec.* 1951. \*  
*Habitat in Corvo inaufsto.*
- Picæ. 16. *P. Corvi Picæ*. †  
*Red. exp. t. 5.*  
*Habitat in Corvo Pica.*
- Cygni. 17. *P. Anatis Cygni*. †  
*Red. exper. t. 8.*  
*Habitat in Cygno.*  
*Conferatur Red. exp. t. 9. f. 3.*
- Anseris. 18. *P. Anatis Anseris*. *Fn. suec.* 1952.  
*Red. exper. t. 10.*  
*Habitat in Anseribus feris & mansuetis.*
- moschatæ. 19. *P. Anatis moschatæ*. †  
*Red. exper. t. 9. f. 1.*  
*Habitat in Anate moschata.*
- Querquedula. 20. *P. Anatis Querquedula*. †  
*Red. exper. t. 12.*  
*Habitat in Querquedulis.*

- Sternæ. 21. P. Sternæ Hirundinis. *Fn. succ.* 1953.\*  
*Red. exper. t. 9. f. 2.*  
*Habitat in Sternis, Laris.*
- Plataleæ. 22. P. Plataleæ Leucorodiæ. †  
*Red. exper. t. 4.*  
*Habitat in Leucorodiis.*
- Ardeæ. 23. P. Ardeæ cinereæ. †  
*Red. exper. t. 6.*  
*Habitat in Ardeis.*
- Gruis. 24. P. Ardeæ Gruis. *Fn. succ.* 1954.  
*Red. exper. t. 3.*  
*Frisch. inf. 5. p. 15. t. 4.*  
*Habitat in Gruibus.*
- Ciconiæ. 25. P. Ardeæ Ciconiæ. *Fn. succ.* 1955.  
*Frisch. inf. 8. p. 9. t. 6.*  
*Habitat in Ciconiis.*
- Charadrii. 26. P. Charadrii Pluvialis. †  
*Red. exper. t. 9.*  
*Habitat in Pluvialibus.*
- Fulicæ. 27. P. Fulicæ atræ. †  
*Red. exper. t. 4.*  
*Habitat in Fulicis.*
- Recurvi- 28. P. Recurvirostræ Avosettæ. *It. æl. 90. \* Fn. succ.*  
 rostræ. 1956.\*  
*Habitat in Recurvirostris.*
- Hæmato- 29. P. Hæmatopi Ostralegi. *Fn. succ.* 1957.\*  
 pi. *Habitat in Hæmatopis.*
- Pavonis. 30. P. Pavonis cristati. †  
*Red. exper. t. 15.*  
*Frisch. inf. 12. t. 3. f. 6.*  
*Habitat in Pavonibus.*
- Meleagri- 31. P. Meleagridis Gallo-pavonis. *Fn. succ.* 1958.\*  
 dis. *Red. exper. t. 22?*

T t t 4

Frisch.

(†) Signo Crucis ubique notavimus animalia nobis nec viva, nec in museis observata visa, ut Naturæ consulti ad ea attentius examinanda incitentur.

*Frisch, inf. 8. t. 4.*

*Habitat in Gallo-pavonibus.*

Gallinæ. 32. *P. Phasiani Galli thorace capiteque utrinque mucronato. Fn. suec. 1959.\**

*Habitat in Gallinis domesticis; expellitur Pipere.*

Caponis. 33. *P. Phasiani Galli abdominis margine nigro. Fawn. suec. 1960.\**

*Frisch, inf. 11. t. 24. Red. exper. t. 16. f. 1.*

*Habitat in Gallinis domesticis.*

Tetraonis. 34. *P. Tetraonis Tetricis. Fn. suec. 1961.\**

*Red. exper. t. 14. Pulex pavonis?*

*Habitat in Tetraonibus.*

*Abdomen postice pilosum.*

Lagopi. 35. *P. Tetraonis Lagopi. Fn. suec. 1962.\**

*Habitat in Lagopis.*

Columbæ. 36. *Columbæ Oenatis. †*

*Red. exper. t. 2 f. 1.*

*Habitat in Columbæ.*

Pari. 37. *P. Pari majoris, cauda quadriseta. †*

*Frisch, inf. 8. p. 9. t. 1. f. 5.*

*Habitat in Paris.*

Hirundinis. 38. *P. Hirundinis apodæ pallescens, abdomine obovato albo nigroque contaminata lateribus fetosis: setis posticis majoribus. Fn. suec. 1963.\**

*Habitat in Hirundine apode.*

Farionis. 39. *P. Salmonis Farionis. Fn. suec. 1964.\**

*Habitat in Salmone Farione Maris Norvegici.*

*Monoculi piscini videtur affinis ob corpora 2 cylindrica supra caudam.*

Apis. 40. *P. Apis. †*

*Frisch, inf. 8. t. 16.*

*Habitat in Apibus ad squamulam halterum.*

265. PULEX. *Pedes* VI, saltatorii.*Oculi* II.*Antennæ* filiformes.*Os* rostro inflexo, setaceo, aculeum recondente.*Abdomen* compressum.irritans. 1. *P. proboscide corpore brevior.* *Fn. suec.* 1695. \**Scop. carn.* 1055.*Raj. inf.* 7.*Alb. man. t.* 41.*Bonan. micr. f.* 56.*Anon. angl. p.* 204. *f.* 12.*Hook. microgr.**Joblot. micr. 1. pp. 1. t.* 3.*Frisch. inf. 11. p.* 8.*Vallisn. oper. 1. t.* 25. *f.* 1.*Leuwenh. epist. 76. f.* 1-20.*Raf. inf. 2. musc. t.* 2, 3, 4.*Baker. micr. t.* 13. *f.* 6.*Lederm. micr. 4. t.* 20.*Sultz. inf. t.* 22. *f.* 146.*Schaff. elem. t.* 105.

*Habitat ubique in Europa, in America. Kalm. Pel-*  
*litur Satureja, Pulegio, Persicaria, Cotula, Alno.*  
*Oves eo destituuntur; Lepores maxime obnoxii, ideo-*  
*que ramento vestimenti leporini capitur & averti-*  
*tur a Dalekarlis.*

*Larva apoda, cauda bifurca, net. Pupa pedata, im-*  
*mobilis. Mas sub femina jungitur, affinis Hemi-*  
*pteris.*

penetrans. 2. *P. proboscide corporis longitudine. †**Marcgr. bras. 249. Tunga.**Sloan. jam. 2. p.* 191. *introd.* 125.*Catesb. car. 3. p.* 10. *t.* 10. *f.* 3. *Pulex* cutem pe-

netrans.  
*Brown. jam. 418. Acarus fuscus sub cute nidulans*  
*proboscide acutiori.*

*Habitat in America: Pedes hominum intrans, ova de-*  
*ponens, unde cacoëthes, saepe mors.*

Corpus fusco rufescens, compressum. Abdomen subtus albidum.

An *Catesbei* Pulex, *Brownii* Acarus, *Rolandri* Pediculus ricinoides vere specie differant? an Acarus, Pediculus, Pulex? *Catesbeus* suum delineat cum furca *Poduræ*. *Brown* sui adscribit Pedes 8 *Acar*i. *Rolander* vero Pedes tantum sex Pulicis saltatorios, ut in vero pulice, sed Phalangium cancrroides nostras etiam corpus eodem modo intrat & dolorificum inhabitat; dijudicent itaque *Americani* cujus sit generis & utrum una aut plures species.

## 266. ACARUS. Pedes VIII.

Oculi II, ad latera capitis.

Tentacula duo, articulata, pediformia.

elephantinus. 1. A. orbicularis depressus: macula bascos ovata.  
Habitat in India.

Magnitudo seminis *Lupini albi*, depressus, lividus, margine crasso, subtus utrinque 3 sulcis. Macula bascos nigra, ovata, trifida.

ægyptius. 2. A. obovatus fuscus margine albo. M. L. U. 425. \*  
Habitat in Oriente.

Reduvius. 3. A. obovatus planus: macula bascos obovata.  
Faun. suec. 1966. It. æland. 62. 126.  
Raj. inf. 9.  
Habitat in *Bobus*, *Canibus*, in sylvis.

indus. 4. A. ovalis ferrugineus: macula bascos ovata atra.  
Habitat in Indiis frequens, *Reduvio longiq.*

americanus. 5. A. obovatus rubicundus, scutello geniculisque pedum albidis.  
Kalm. æst. Stockh. 1754.  
Habitat in *Americæ Bobus*, devoratur a *Crotophaga*.

sanguisugus. 6. A. abdomine postice crenato, scutello ovato subfulvo, rostro tripartito.  
Marcgr. bras. 245. Jatebucu.  
Habitat in *America*. *Rolander*.

Pedes



*Pedes antici ad exortum spinis brevibus. Sanguinem in tibiis obambulantium haurit vix extrahendus.*

- Ricinus. 7. A. globofo-ovatus: macula bascos rotunda, antennis clavatis. *Fn. suec.* 1967. \*  
*Scop. carn.* 1057.  
*Aldr. inf.* 550.  
*Raj. inf.* 10.  
*Frisch. inf.* 5. t. 19.  
*Habitat in* Bobus, Canibus.
- crassipes. 8. A. pedibus secundariis crassissimis. *Fn. suec.* 1969. \*  
*Habitat in* Europa.
- vespertilionis. 9. A. thorace abgulato-cruciato, pedibus unguiculatis corpore longioribus. *Fn. suec.* 1951. sub Pediculo.  
*Scop. carn.* 1058. Acarus Vespertilionis.  
*Frisch. inf.* 7. t. 7.  
*Habitat in* Vespertilione murino, insolita figura, Phalangio simile, in plano non procedere valens, haud a sequenti diversus.
- passerinus. 10. A. femoribus tertiis crassissimis. *Fn. suec.* 1970. \*  
*De Geer Act. Stockh.* 1740. p. 351. t. 1. f. 2.  
*Red. viv. t.* 2. f. 4.  
*Geoffr. parif.* 2. p. 627. Acarus vespertilionis,  
*Baker. micr. t.* 15. Pediculus vespertilionis.  
*Habitat in* Passeribus variis.  
*Conf. Acarum vespertilionis.*
- motatorius. 11. A. pedibus primis longissimis motatoriis. *Fn. suec.* 1971. \*  
*Habitat in* Umbrosis.
- Aphidiodes. 12. A. pedibus primis longioribus cursoriis, abdomine postice bicorni. *Fn. suec.* 1972. \*  
*Habitat in* Europa.
- colleo-  
ptratus. 13. A. ater, lateribus nigro-subcoleopratis. *Fn. suec.* 1975. \*  
*Habitat in* Europa.
- telarius. 14. A. rubicundo hyalinus, abdomine utrinque macula fusca. *Fn. suec.* 1212. 1196.  
*Scop. carn.* 1075.

*Geoffr.*

Geoffr. parif. 2. p. 626. *Acarus fuscus autumnalis* textor.

*Habitat in Europæ plantis, minus ventis expositis, caldario inclusis, tela ducens filis parallelis, quibus plantas suffocat hybernaculorum; in Tilix foliis a- versis autumnno frequens.*

- Siro. 15. *A. lateribus sublobatis, pedibus quatuor posticis longissimis, femoribus capiteque ferrugineis, abdomine fetoso. Fn. suec. 1975.*

*Farinae.*

*Scabiei.*

- |                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Blank. inf. t. 14. f. A. B.</i>        | <i>Schenck. obs. 676.</i>       |
| <i>Lederm. micr. 68. t. 33. f. 2.</i>     | <i>Bonan. micr. f. 113.</i>     |
| <i>Bonan. micr. f. 112.</i>               | <i>Allen. comp. XI: 8.</i>      |
| <i>Leww. epist. 77. t. 370. f. 9, 10.</i> | <i>Att. angl. n. 283.</i>       |
| <i>Rivin. prurit. 18. f. D-L.</i>         | <i>Riv. prur. 18. f. A. B.</i>  |
| <i>E.N.C. dec. 2. ann. 10. app. 34.</i>   | <i>Att. lips. 1682. p. 319.</i> |
- Habitat in Casco Farinae Europæ, Americæ, Inter Sirones Farinae, Scabiei, Phthiriseos, Hemitritzei vix etiamnum reperi alias differentias, quam a loco petitas. Amæn. acad. 3. p. 333.*

- lactis. 16. *A. abdomine ovato obtuso postice setis quatuor longitudine corporis declinatis.*

*Habitat in Lactis cremore antiquo & in Lactis vasis. Corpus hyalinum, postice valde obtusum, setis 4, quæ sub incessu repunt. Rostrum pedesque subtestacea.*

- Dysente-  
riæ. 17. *A. pedibus setis duabus, abdominis ovati postica setis quatuor longitudine corporis horizontalibus.*

*Habitat in doliis cerevisia acida infectis; imprimis in stillicidio siphonis vasis; sæpe in Cantharis ligneis ad rimas æstate, obambulans ab hora 10 noctis in diei 10 supra cerevisiam, ceterum latitans sub cerevisia in rimis. Amæn. acad. 57. p. 97.*

*Corpus hyalinum. Pedes singuli postice armati duabus pilis altero in medio, altero ad plantam. Abdomen ovatum, glabrum, terminatum setis 4, corpore fere longioribus, distantibus: 2 superioribus, 2 inferioribus.*

- exulce-  
rans. 18. *A. pedibus longissimis setaceis: anticis duobus brevibus. Fn. suec. 1976.*

*Habitat in Scabie ferina.*

19. *A.*

genicula- 19. *A. niger*, femorum geniculis subglobosis. *Fn. suec.*  
rus. 1977.

*Habitat in arborum ramis emortuis.*

tinctorius. 20. *A.* abdomine rubro depressiusculo hirsuto: postice ob-  
tuso, tibiis anterioribus pallidioribus.

*Habitat in Guinea. Fabricius. Pro arte tinctoria ad-  
duci nuper incepit.*

Corpus magnitudine *A. Ricini*, statura & colore *A.*  
*holosericeus*, undique perfecte hirsutissimus. Os un-  
guibus 2 rubris. Pedes anteriores quatuor, antror-  
sum versi, tibiis paulo pallidioribus.

aquaticus. 21. *A.* abdomine sanguineo depresso tomentoso postice  
obtusio; aquaticus. *Fn. suec.* 1978. \*

*Geoffr. paris. 2. p. 625. n. 8.*

*Frisch. inf. 8. t. 3.*

*Rœf. suppl. 1. t. 25. \**

*Sultz. inf. t. 22. f. 147.*

*Habitat in Europæ aquis dulcibus, velociter natans,  
ova rubra in Nepis ponens.*

holoseri- 22. *A.* abdomine sanguineo depresso tomentoso postice  
æus. retuso; terrestis. *Fn. suec.* 1979. \*

*Scop. carn. 1068.*

*Geoffr. paris. 2. p. 624. n. 7.*

*It. æl. 84.*

*List. aran. f. 38.*

*Rœf. inf. 41. n. 38.*

*Blank. inf. t. 14. f. 7.*

*Habitat in Europæ & Americæ siccis.*

*Simillimus præcedenti.*

baccarum. 23. *A.* abdomine distento rubro: lateribus obscurioribus.  
*Fn. suec.* 1980. \*

*Scop. carn. 1074.*

*Habitat in Baccis Ribis aliisque, frequenter cursitans.*

Musco- 24. *A.* abdomine rufo, pedibus posticis longissimis fili-  
rum. formibus. *Fn. suec.* 1981.

*Geoffr.*

---

*Acarum minimi insectorum, fertilitate immensa ubique obuti, plurimum calamita-  
tum causæ sunt.*

*M. A. C. D. gallus Systeme d'un Medicin anglois. Paris. 1726 8. mala sa-  
pientis effinxit integram centuriam Acarorum, videns contagia, posteris ipse vi-  
dendur.*

*Geoffr. paris. 2. p. 624. n. 6.*

*Habitat in Muscis.*

Batatas. 25. *A. sanguineus scabriusculus*, pedibus anterioribus longitudine corporis. *Rolander.*

*Habitat in Batatas Surinami.*

gymno- 26. *A. abdomine rubro*, lateribus punctis binis coccineis.  
pteriorum. *Fn. suec. 1208.*

*Reaum. inf. 5. t. 38. f. 1. - 3.*

*Habitat in Apibus aliisque.*

coleoptra- 27. *A. rufus*, ano albicante. *Fn. suec. 1973. \**  
torum. *Scop. carn. 1064.*

*Geoffr. paris. 2. p. 623. n. 4.*

*Blank. inf. t. 14. f. H.*

*Frisch. inf. 4. t. 10.*

*Reaum. inf. 6. t. 4. f. 13, 14.*

*Raf. inf. 4. p. 20. t. 1. 10-15.*

*Habitat in Scarabæis.*

rupestris. 28. *A. fuscus*: linea dorsali bicolore. *Fn. suec. 1984. \**  
*Habitat in Europa.*

longicor- 29. *A. ruber*, antennis bifidis rostro longioribus. *Faun.*  
nis. *suec. 1985. \**

*Geoffr. paris. 2. p. 618. t. 20. f. 5. Chelifer totus ruber, antennis extremo bifetis.*

*Habitat in Europæ rupibus, in capite humano valde irritans.*

littoralis. 30. *A. fusco - rufus*, pedibus sanguineis. *Faun. suec. 1986. \**

*It. øland. 96.*

*Habitat in Europæ littoribus.*

Fungo- 31. *A. fusco - rufescens*, abdomine subgloboso glabro.  
rum. *Fn. suec. 1987. \**

*Habitat in Fungis gregaris, tardus.*

Tremellæ. 32. *A. subglobosus atro - cærulescens nitidus.* *Fn. suec. 1991.*

*Habitat in Tremella juniperina.*

33. *A.*

- scaber. 33. *A. cinereus depressus*: lateribus scabris. *Faun. suec.* 1988. \*  
*Habitat in Terra primo vere.*
- Salicinus. 34. *A. ruber*: linea dorsali duplici fusca: antice bifurca.  
*Fn. suec.* 1989. \*  
*Habitat in Salicibus frequens, velox.*
- croceus. 35. *A. fulvus*: thoracis lateribus puncto rufo. *Fn. suec.* 1990 \*  
*Habitat in Salicis rosa monstrosa.*

267. PHALANGIUM. *Pedes VIII.*

*Oculi* verticis duo contigui,  
 duo laterales.

*Frons* antennis pediformi-  
 bus.

*Abdomen* rotundatum.

- grossipes. 1. *P. corpore* minuto cylindrico humeris tuberculato,  
 pedibus longissimis. †

*Ström. söndm.* 208. t. 1. f. 16. *Phalangium marinum.*

*Habitat in Mari Norvegico: tardissimum, Mytilorum*  
*testasque penetrat & exhaurit. J. G. König.*

*Corpus cylindricum, minutum, articulatam, articularis*  
*antice supra tuberculo notatum. Antennæ capitis,*  
*2, setaceæ. Os Palpis 2, biarticulatis, chelatis.*  
*Pedes 8, setacei, longissimi, ut in Ph. opilione.*  
*Tentacula pectoris, 2, filiformia, corpori parallela,*  
*pone annum patentia, in medio chelata (unde Can-*  
*cris affinis videtur). Cauda linearis, angusta. Mi-*  
*rum tam parvum corpus regere tam magnos pedes.*

- Opilio. 2. *P. abdomine* ovato: subtus albo. *Fn. suec.* 1992.

*Scop. carn.* 1122.

*Mouff. inf.* 234. f. 4.

*Aldr. inf.* 602. f. 4.

*Gæd. inf.* 2. t. 49.

*List. gæd. f.* 143.

*angl. t. 1. f.* 35.

*Hæffn. inf.* 2. t. 9.

*Raj. inf.* 39. n. 35.

*Bradl.*

*Bradl. nat. t. 24. f. 2.*

*Clerck. aran. t. 6. f. 10: 3.*

*Sultz. inf. t. 22. f. 140.*

*Geoffr. paris. 2. p. 629. t. 20. f. 6.*

*Habitat in Europa, America, nocte vagatur.. Oculi 2. Antennæ angulosæ. Tentacula 2 longa.*

cornu-  
tum.

3. *P. abdomine depresso, rostro bicorni, palpis pediformibus.*

*Schaff. elem. 13. f. 9.*

*Habitat in Germania. D. Schreber.*

*Corpus depressum. Pedes longissimi ut in Pb. opilio-  
ne. Rostrium cornibus 2 subulatis parallelis. Palpi  
pedibus similes, paulo breviores.*

Cancroi-  
des.

4. *P. abdomine obovato depresso, chelis lævibus: digi-  
tis pilosis. Fn. suec. 1968. Acarus cancroides.*

*Scop. carn. 1067.*

*It. æl. 84.*

*Seb. mus. 1. t. 70. f. 11.*

*Frisch. inf. 8. t. 1.*

*Raf. suppl. t. 64.*

*Schaff. elem. t. 38.*

*Clerck. aran. t. 6. f. 10: 1, 2.*

*Geoffr. paris. 2. p. 618. Chelifer abdomine lineis  
transversis.*

*Habitat in umbrasis suffocatis: cistis, cellulis mephiti-  
cis, visitat Termetibus, Acaris; retrogradus. In-  
trans cutim, inde papula magnitudine pisi dolore  
summo. Pedes 8, præter antennis cheliferas.*

Acaroi-  
des.

5. *P. abdomine cylindrico, chelis lævibus, capite appen-  
diculato.*

*Syst. nat. 10. p. 616. n. 8.*

*Habitat in America calidiore, morsu venenatus.*

*Simillimus P. cancroidi, sed Chelæ ovate. Corpus  
flavescent, duplo majus. Abdomen cylindricum.*

Balæna-  
rum.

6. *P. abdomine dilatato muricato, rostro subulato.*

*Mart. spitz. 85. t. Q. f. d. Pediculus Ceti.*

*Bæster. subf. v. 2. t. 3. p. 146. t. 12. f. 3. Pedicu-  
lus ceti.*

*Ström. sondm. 209. t. 1. f. 17. Phalangium litorale.*

*Brunnich. inf. t. 1. f. 17. . . . Pycnogonum.*

*Habitat in Oceano Norvegico sub lapidibus. König.  
Simil-*

*Simillimus Onisco Ceti, sed Pedes omnes pluribus articulis, omnes perfecti, nec plures quam octo. Dorsum rubrum pluribus segmentis: singulis 3 mucronibus. Cauda cylindrica, brevissima, truncata. Rostrum membranaceum, subsubulatum, longitudine pedum. Genus dubium, facie Onisci ceti, rostro a reliquis diversum. Cum solo rostro absque maxillis sit, forte aptius Acaris aut proprio generi subjiendum.*

tricarinatum. 7. P. abdomine elliptico depresso tricarinato, femoribus anticis suberistratis.

*Habitat* Dresdæ Saxonum. *D. Heise.*

Corpus ovale, fuscum, depressum, tricarinatum, incisuris quinque obsoletis: carina una media longitudinalis; una utrinque supra marginem lateralem. Pedes corpore duplo langiores. Femora primi parii sursum dilatata: carina subcrenata.

caudatum. 8. P. chelis ramosis, ano fetifero. *M. L. U. 426.\**

*Gron. zooph. 952. Scorpio.\**

*Seb. mus. 1. t. 70. f. 7, 8.*

*Habitat in India orientali: Iava.*

*Chela brachiis dentatis. Seta ani longitudine corporis.*

reniforme. 9. P. brachiis dentatis, pedibus primis longissimis setaceis, thorace reniformi. *M. L. U. 427.\**

*Gron. zooph. 935. Phalangium palpis longissimis crassis.\**

*Brown. jam. 409, t. 11. f. 3. Tarantula fusca major, pedibus anterioribus crassioribus aculeatis & unguiculatis fere cheliformibus, proximis longissimis & tenuissimis.*

*Pet. pteriog. t. 20. f. 12. Cancellus araneoides.*

*Habitat in America: Jamaica, Carolina.*

268. ARANEA. *Pedes* VIII.*Oculi* VIII.*Os* unguibus f. retinaculis duobus.*Palpi* duo articulati: masculis genitalibus capitata.*Anus* papillis textoriis.diadema. 1. *A.* abdomine subglobofo rubro-fusco: cruce albo-pun-*ctata. Fn. suec. 1993. \***Scop. carn. 1077. Aranea Linnæi.**Mouff. inf. 233. f. 1.**Aldr. inf. 608. f. 9.**Fonst. inf. t. 18. f. 17, 19, 20.**Raj. inf. 18. n. 2.**List. aran. f. 2.**Frisch. inf. 7. t. 4.**Clerck. aran. 25. t. 1. f. 4, 3.**Schæff. elem. t. 21. f. 2.**Habitat in Betulis.*reticulata. 2. *A.* abdomine globofo reticulato: supra purpurascente  
fusco-nebuloso. *Fn. suec. 1994. \***Habitat in Hortis.*cucurbiti- 3. *A.* abdomine subglobofo flavo: punctis quibusdam ni-  
na. gris. *Fn. suec. 1995. \***Raj. inf. 20. n. 8.**List. aran. f. 5.**Clerck. aran. 44. t. 2. f. 4.**Habitat in Arboribus foliatis, adsidens reti laxo ova  
obvolvendi.*calycina. 4. *A.* abdomine globofo pallido flavescente. *Fn. suec.*  
1996. \**Scop. carn. 1099. Aranea Kleynii.**Habitat in Calycibus florum, a corolla decidua vacuis,  
Apes Muscasque mel collecturas jugulans.*octopun- 5. *A.* abdomine subrotundo flavo: stigmatibus utrinque  
ctata. quatuor nigris, ano rufo.*Habi-*

---

*Araneæ insectis pascuntur rapinaque vivunt; propriam in speciem etiam faciunt; a  
Sphegibus & Ichneumonibus plectuntur; senectam exiunt; aethera scandunt.*



*Habitat in Svecia rete horizontali geometrico.*  
*Corpus pallidum excepto abdomine.*

bipuncta- 6. A. abdomine globoso atro: punctis duobus excavatis.  
 ta. *Fn. suec. 1997. \**

*Habitat in fenestris, Rete disperso.*

arundina- 7. A. abdomine subgloboso albo: maculis dilute fuscis.  
 cea. *Fn. suec. 1998. \**

*Habitat in Arundinum paniculis.*

angulata. 8. A. abdomine ovato: antice lateribus angulato-acuto.  
*Fn. suec. 1999. \**

*It. gotl. 216.*

*Clerck. aran. 22. t. 1. f. 1.*

*Habitat in Arboribus Rete perpendiculari.*

domesti- 9. A. abdomine ovato fusco: maculis nigris quinque sub-  
 ca. contiguis: anterioribus majoribus. *Fn. suec. 2000. \**

*Scop. carn. 1104. Aranea Derhamii.*

*Raj. inf. 27. n. 17.*

*List. aran. 59. f. 17.*

*Clerck. aran. 76. t. 2. f. 9.*

*Habitat in fenestris frequens.*

*In foribus laxos suspendit Aranea casseis. Virg.*

3-lineata. 10. A. abdomine ovato albido: lineis tribus longitudina-  
 libus punctorum nigricantium. *Fn. suec. 2001. \**

*Habitat in Nemoribus.*

riparia. 11. A. abdomine ovato nigro-æneo, ano subluteo bicor-  
 ni. *Fn. suec. 2002.*

*It. æl. 145.*

*Habitat in littoribus sabulosis, Rete horizontali.*

labyrin- 12. A. abdomine ovato fusco: linea exalbida pinnata,  
 thica. ano bifurco. *Fn. suec. 2003. \**

*It. æl. 251.*

*Raj. inf. 27. n. 18.*

*List. aran. 60. f. 18.*

*Clerck. aran. 79. t. 2. f. 8.*

U u u 2

Habi-

*Penes in palpis, vulvæ ad axillas: ancipitia conjugia, ubi repulsa ♂ peracta,  
 cum periculo vitæ sunt. Palpis clavatis mares sunt, adeoque sexus, nec species  
 differentiæ.*

*Habitat super Terram, Tele horizontali cum puteo cylindrico.*

- 4-lineata. 13. A. abdomine subrotundo flavo: punctis quatuor lineaque utrinque purpurascens.

*Habitat in Suecia.*

Magnitudo media. Corpus hyalinum. Frons s. area oculorum lutea. Abdomen pallide flavissimum; in medio punctis 4, in quadrangulum dispositis, purpurascens; ad latera utrinque plaga s. linea ferrugineo-purpurea, abdomine brevior.

- redimita. 14. A. abdomine oblongo-ovato flavo: annulo dorsali rubro. *Fn. suec. 2004. \**

*Raj. inf. 24. f. 12.*

*List. aran. 51. f. 12.*

*Frisch. inf. 10. t. 4.*

*Clerck. aran. t. 3. f. 9.*

*Habitat in Hortis.*

- corollata. 15. A. abdomine ovato nigro: annulo dorsali ovali albo. *Fn. suec. 2005. \**

*It. æl. 126.*

*Clerck. aran. 124. t. 5. f. 18?*

*Habitat in Plantis.*

- fumigata. 16. A. abdomine ovato fusco: basi punctis duobus albis. *Fn. suec. 2006. \**

*Clerck. aran. 104. t. 5. f. 6.*

*Habitat in campis; ante nidum larvarum incubans, ad exitum capit unam post alteram, exsugit, rejicit, aliam prehendit. &c.*

- montana. 17. A. abdomine ovato albo maculis cinereis. *Fn. suec. 2007. \**

*List. aran. 36. f. 6?*

*Habitat in Arboribus.*

- fanguino-18. A. abdomine ovato coccineo: linea longitudinali atra. lenta. *Habitat in Hispania. Fr. Logie.*

Cor-

Species Araneorum variant ætate sæpe & sexu; senectam exuunt; difficillime perfectæ in museis aservantur; plures itaque videndæ apud Litterum, Albinum, Clerckium (Aranei Suecici Holm. 1757. quart) qui ultra 60 habet. Videas quomodo nulli mortalium imitabilis sit illa Aranea textura? quanti operis fila disponere; alia in rectum immissa firamenti loco; alia in orbem currentia! Nascitur autem ista, non discitur. Senec.

Corpus *mediocre, nigrum*. Palpi *antice cinerei*. Oculi 4 *anteriores albi*. Abdomen *totum saturatissime coccineum, excepta linea longitudinali & ano nigris*.

notata. 19. A. abdomine ovato fusco: lineis albis transversis arcuatis. *Fn. suec. 2008.\**  
*Habitat in Europa.*

rufipes. 20. A. abdomine fusco, pedibus rufis. *Fn. suec. 2009.*  
*Habitat frequentius in Urticis.*

nocturna. 21. A. abdomine nigro: punctis duobus albis, basique lunula alba. *Fn. suec. 2010.\**  
*Habitat in Europa.*

extensa. 22. A. abdomine longo argenteo-virescente, pedibus longitudinaliter extensis. *Fn. suec. 2011.\**  
*Geoffr. parif. 642. n. 3.*  
*Raj. inf. 19. n. 3.*  
*List. aran. f. 3.*  
*Habitat in uliginosis, pedibus ad ramos arcte & longitudinaliter extensis.*

fimbriata. 23. A. abdomine oblongo nigro: linea utrinque laterali alba, pedibus fuscis. *Fn. suec. 2012.\**  
*Clerck. aran. 102. t. 5. f. 9.*  
*Habitat in Aquis, super aquas currens.*

sempunctata. 24. A. abdomine oblongo: punctorum excavatorum paribus tribus. *Fn. suec. 2013.\**  
*Habitat in Sylvis acerosis.*

flavissima. 25. A. abdomine oblongo flavissimo laevi. *M. L. U. 428.\**  
*Habitat in Aegypto. Hasselquist.*  
*Thorax fulvus. Pedes glabri.*

bimaculata. 26. A. abdomine subrotundo castaneo: punctis duobus albis.  
*Habitat in Europa.*

Corpus *Paliceminus, totum castaneum s. obscure testaceum*. Abdomen *ovatum, depressiusculum, inaequale, maculis 2 albis: anteriore majore ex binis punctis albis connatis; posteriore fere minore, etiam e binis punctis albis conflat.*

U u u 3

27. A.

clavipes. 27. A. abdomine oblongo, tibiis, excepto tertio pari, clavatis villosis.

*Brown. jam.* 419. t. 44. f. 4. Aranea oblonga luteo-variegata, pedibus longissimis, articulis inferioribus tumidis hirsutis.

*Habitat in America.*

quadri- 28. A. abdomine oblongo nigro: punctis quatuor exca-  
punctata. vatis. *Fn. succ.* 2014. \*

*It. æl.* 34.

*Habitat in fenestris.*

holoferi- 29. A. abdomine ovato-oblongo holosericeo: basi subtrus  
cea, punctis duobus flavis. *Fn. succ.* 2015. \*

*Raj. inf.* 31. n. 23.

*Lift. aran.* 71. f. 23.

*Habitat in Europa, intra-folia convoluta plantarum.*

fenocula- 30. A. oculis tantum senis. *Fn. succ.* 2016.

ta.

*Lift. aran.* 74. f. 24.

*Raj. inf.* 32. n. 24.

*Habitat in Europa.*

☆ ☆

avicularia. 31. A. thorace orbiculato convexo: centro transverse excavato. *Amœn. acad.* 1. p. 323. *M. L. U.* 428. \*

*Gron. zooph.* 937. \*

*Marcgr. bras.* 248.

*Laet. amer. t.* 570.

*Worm. mxf. t.* 244.

*Clus. postb.* 47.

*Seb. mus. 1. t.* 69. f. 2, 3.

*Olear. mus. t.* 17. f. 3.

*Merian. sur. t.* 18.

*Rœs. add. t.* 11.

*Habitat in America, insidiatur Aviculis, Insectis,*

*Morsu diro serpentina minatur.*

spini- 32. A. crurum spinis mobilibus nigris. *D. Shane.*

lis,

*Alb. aran. f.* 169.

*Habitat Surinami.*

*Magnitudo A. avicularia. Thorax subovatus, postice latior, superne convexus, nudus. Abdomen subro-*

*tum-*

---

Aranea Fila sunt, plurima vetia, diversa diversis, nec simplicia, quibus piscantur insecta, imprimis teneriora; at ultima \*\* Fila ducent tantum prout incedunt per integram vitam,

tundum; subtus ordines 4 ex punctis nigricantibus. Pedes mutici. Crura spinis rectis, nigris, nitidis, mobilibus. Color Thoracis Crurumque ferrugineus; Abdominis fusco-flavesceus.

venatoria. 33. A. subhirsuta, thorace orbiculato convexo, abdomine ovato magnitudine thoracis.

Gron. zooph. 2. p. 217. \*

Merian. surin. 13. t. 18. fig. superior.

Sloan. jam. 2. p. 181. t. 235. f. 1, 2.

Brown. jam. 420. t. 44. f. 2.

Habitat in America calidiore.

ocellata. 34. A. femoribus ocellis tribus geminatis.

Habitat in China. De Geer.

Corpus pallidum, magnitudine Tarantulae. Abdomen nebulosum pallidum annulo nigro. Thoracis discus macula gemina magna nigra. Oculorum regio nigra. Maculae ocellis geminis albidis: in singulo femore tres, in tibiis pauciores.

Tarantula. 35. A. subtus atra, pedibus subtus atro fasciatis.

la. Bagliv. Tarantula (monographia)

Bocc. mus. 1. p. 101. t. 2. Tarantola.

Bradl. natur. t. 24. f. 10.

Olear. mus. 21. t. 12. f. 4.

Habitat in Italia; imprimis in Apulia, Barbaria, Oriente.

Corpus cinerascens. Oculi 8: horum 2 majores, rubri, frontis; 4 ordine transverso sub prioribus versus os. 2 remotiores in tergo. Thorax cinereus, divisum in areas nigras, ad centrum concurrentes. Maxilla, Pectus, Femorum basis ventrisque anterior pars subtus atra. Tibiae omnes cinerea, subtus nigro fasciatae. Abdomen belvolum, supra nigro fasciatum.

Rabida subcunicula morsu excitat famosum Tarantismum Musica medendum.

Species hujus plures fiunt Anthores; quae accuratius inquirendae & distinguendae, cum colore diversae forte etiam specie differant.

scenica. 36. A. saliens nigra: lineis semicircularibus tribus albis transversis. Fn. suec. 2017. \*

List. aran f. 31.

U u u 4

Raj.

*Raj. inf.* 37. n. 31.  
*Bradl. nat.* t. 24. f. 5.  
*Clerck. araz.* 117. t. 5. f. 13.  
*Geoffr. parif.* 2. p. 650. n. 16.  
*Habitat in parietibus.*

truncorum. 37. *A. saliens nigra*: dorso punctis albis. *Faun. suec.* 2018.  
*Habitat in parietibus, truncis.*

rupestris. 38. *A. saliens*: abdominis macula nigra margine rubra medio alba. *Fn. suec.* 2019. \*  
*Habitat in parietibus, lignis.*

aquatica. 39. *A. livida*, abdomine ovato: linea transversa punctisque duobus excavatis. *Fn. suec.* 2020. \*  
*Clerck. aran.* 143. t. 6. f. 8.  
*Geoffr. parif.* 2. p. 645. n. 7.  
*Habitat in Aquis Europæ dulcibus, vinatoria. Hybernât in vacuis Cochleis, quas rete artificioso claudit.*

saccata. 40. *A.* abdomine ovato ferrugineo fusco. *Faun. suec.* 2021.  
*List. aran* 82. f. 28.  
*Frisch. inf.* 8. t. 2.  
*Habitat in terra, circumferens ubique secum saccum suum ovorum.*

palustris. 41. *A.* abdomine oblongo nebuloso: lineis lateralibus albis. *Fn. suec.* 2023. \*  
*Habitat in paludibus cæspitosis exsiccatis; affinis A. saccatæ.*

virescens. 42. *A.* abdomine oblongo flavo-viridi: lineis lateralibus albis. *Fn. suec.* 2022. \*  
*Jonst. inf.* t. 18. f. 42.  
*Habitat in Hortis.*

viatica. 43. *A.* abdomine subrotundo plano obtuso, pedibus quatuor posticis brevissimis. *Fn. suec.* 2027. \*  
*Raj. inf.* 35. n. 29.  
*Frisch. inf.* 7. t. 5.  
*Clerck. aran.* 128. t. 6. f. 5.  
*List. aran.* f. 29.  
*Geoffr. parif.* 2. p. 641. n. 1.  
*Habitat in arboribus, lignis, ovis incubans.*

44. *A.*

**lævipes.** 44. A. abdomine rhombeo depresso, pedibus transversaliter extensis variegatis. *Fn. suec. 2025.\**

*Frisch. inf. 10. t. 14.*

*Habitat in truncis, parietibus.*

**tetracantha.** 45. A. abdomine lunato: ambitu quadridentato.

*Habitat in Insula s. Thomæ. Laur. Sprengler.*

*Simillima A. cancriformi, ferruginea. Caput rufum.*

*Oculi verticis 4 conferti, & laterales solitarii, nec plures quam 6 observo. Pedes sanguinei. Abdomen sublunatum, ferrugineum, supra planum punctis nigris impressis, margine cinctum spinis 4, quatum duæ laterales opposita majores; duæ vero postica minores.*

**cancriformis.** 45. A. abdomine semiorbiculato: ambitu sexdentato.

*Sloan. iam. 2. p. 197. t. 235. f. 4. Araneus cancriformis campetris, reticulum spirale nec tens.*

*Brown. jam. 419. t. 44. f. 5. Aranea nigra cancriformis.*

*Habitat in America.*

**spinosa.** 47. A. spinis dorsalibus octonis: posticis duabus patentibus, abdomine subtus conico.

*Habitat in America.*

269. SCORPIO. *Pedes VIII: insuper Chelæ 2 frontales.*

*Oculi VIII: horum 3 ad latus utrumque thoracis; 2 in tergo.*

*Palpi II, cheliformes.*

*Cauda elongata, articulata, terminata Mucrone arcuato.*

*Pectines duo subtus, inter pectus & abdomen.*

**maurus.** 1. S. pectinibus 8-dentatis, manibus subcordatis punctatis.

*Habitat in Africa.*

U ũ u 5

2. S.

---

*Scorpionum arma foraminibus 3 scatent.  
Genere hoc unico Svecia feliciter caret.*

- carpathi- 2. *S. pectinibus* 6-dentatis, manibus subcordatis glabris. †  
cus. *Habitat in Montibus Carpathicis. Schaller.*
- aser. 3. *S. pectinibus* 13-dentatis, manibus subcordatis pilosis.  
*M. L. U. 429. \**  
*Swamm. bibl. t. 3. f. 3.*  
*quart. t. 6.*  
*Seb. mus. 1. t. 70. f. 4.*  
*Pet. gaz. t. 13. f. 2.*  
*Rœf. inf. 3. p. 390. t. 65.*  
*Habitat in India.*
- americus. 4. *S. pectinibus* 14-dentatis, manibus subciliatis: digitis  
filiformibus.  
*Rœf. inf. 3. p. 382. t. 66. f. 5.*  
*Habitat in America.*
- europæus. 5. *S. pectinibus* 18-dentatis, manibus angulatis. *M. L.*  
*U. 429. \**  
*Mouff. inf. 204.*  
*Aldr. inf. 577.*  
*Raj. inf. 9.*  
*Rœf. inf. suppl. 66. f. 1, 2.*  
*Schæff. elem. t. 113.*  
*Sultz. inf. t. 23. f. 150.*  
*Habitat in Europa, maxime australi.*  
*Cauda sub aculeo mucronata est.*
- australis. 6. *S. pectinibus* 32-dentatis, manibus lævibus.  
*Habitat in Africa, forte etiam America.*

270. **CANCER.** *Pedes VIII.* (10 f. 6 raro) insuper  
Manus 2 chelatae.  
*Oculi II*, distantes, plerisque pe-  
dunculati; elongati, mobiles.  
*Palpi II*, cheliferi.  
*Cauda* articulata, inermis.

\* 2 \* **BRACHYURI** *Thorace lævi lateribus integerrimo.*

Cursor. 1. *C. brachyurus*, thorace lævi integerrimo: lateribus po-  
stice marginato, antennis fissilibus, cauda reflexa. †  
*Haf-*



*Hasselqv. iter. 433. n. 128. Cancer anomalus.*

*Habitat in Mari Mediterraneo, Indico, sole occiduo  
e mari exiens in littora sabulosa, velocissimeque dis-  
currens.*

- raninus. 2. *C. brachyurus*, thorace lævi integerrimo oblongo ob-  
ovato: antice truncato-dentato. *M. L. U. 430. \**  
*Rumph. mus. 13. t. 7. f. T. U.*  
*Habitat in M. Indico.*
- mutus. 3. *C. brachyurus*, thorace lævi integerrimo: margine an-  
tico transverso brunneo.  
*Habitat in M. Mediterraneo?*  
*Testa lævis, antice truncata, margine brunneo, postice  
complanato-truncata; lateribus integra. Chelæ læ-  
ves, Carpis unidentatis, Brachiis subius denticulatis.*
- cordatus. 4. *C. brachyurus*, thorace lævi undato integerrimo, che-  
lis subtus muricatis. *Amæn. acad. 6. p. 414. n. 97. \**  
*Habitat Surinami.*  
*Chelæ subtus muricatæ.*
- Pinno- 5. *C. brachyurus*, thorace orbiculato inæquali ciliato,  
phylax. pedibus dorsalis quatuor. *Amæn. acad. 6. p. 415.  
n. 93. \**  
*Rumph. mus. 25. Pinnotheres.*  
*Habitat in America intra Chamam Lazarum, D. Iac-  
quin, cujus Pinnotheres & custos est.*
- Pisum. 6. *C. brachyurus*, thorace orbiculato lævi integerrimo  
obtusio, cauda corporis amplitudine.  
*Habitat in Barbaria. E. Brander.*  
*Corpus magnitudine Pisi, undique læve, convexum;  
Rostrum nullum nullaque crenatura. Cauda obtu-  
sissima, ad os usque tegit totum abdomen. Chelæ  
oblongiuscula digitis æqualibus. Pedes inermes, læ-  
ves, ungue acuto.*
- hexapus. 7. *C. brachyurus*, thorace orbiculato lævi integro, pe-  
dibus senis, antennis corpore longioribus.  
*Baster. subf. 2. p. 26. t. 4. f. 3. Cancer thorace læ-  
vi orbiculato subdepresso, chelis validioribus, anten-  
nis longissimis, pedibus posticis minutioribus.*  
*Habitat in Oceano Europæo.*

Tho-

Thorax convexiusculus, antice inter oculos 3-fidus medio emarginato. Chelæ læves. Pedes præter chelæ tantum jex.

- minutus. 8. *C. brachyurus*, thorace lævi integerrimo subquadrato: margine acutiusculo, antennis brevissimis. *Mus. Ad.*  
Fr. 1. p. 8.

*It. wgoth.* 137. t. 3. f. 1.

*Sloan. jam.* 2. t. 245. f. 1.

*Gron. zooph.* 962.

*Kalm. iter.* 2. p. 143.

*Osbeck. iter.* 307.

*Baster. subs.* 2. p. 26. t. 4. f. 12. Cancer thorace lævi orbiculato, pedibus hirsutis.

*Scop. carn.* 1133. Cancer nutritrix.

*Habitat in O. Europæo, & Pelagi Fuco natante, super aquam sæpe cursitans.*

- Pinnothe-9. *C. brachyurus glaberrimus*, thorace lævi lateribus antice planato, caudæ medio noduloso-carinato. *Foršk. lit. ægypt.*

*Jonst. exsang.* t. 20. f. 3.

*Habitat in M. Mediterraneo, Asiatico; intra testas Pinnæ. Hasselq. & Forskåhl visa.*

*Concha pascens, luminibus orbum pandens corpus, obnoxia Sepiæ Octopodiæ, non sine custode est, qui Pinnophylax Aristot. II: 24. & V: 15 f. Pinnotheres Plin. IX: 42, 31, neque enim vita Concha fortasse servari posset, nisi opera Cancræ. Bellon. aquat. 401. Hasselq. it. 450.*

- longicor-10. *C. brachiurus*, thorace orbiculato lævi chelis minoribus, antennis longissimis.

*Gron. zooph.* 968. *Ad. helv.* 5. p. 363. t. 5. f. 447.

*Baster. subs.* 2. p. 26. t. 4. f. 3.

*Seb. mus.* 3. p. 42. t. 17. f. 1-4.

*Habitat in Zeelandia.*

- ruricola. 11. *C. brachyurus*, thorace lævi integerrimo: antice retuso, pedum articulis ultimis penultimisque undique spinosis.

*Sloan. jam.* 1. t. 2.

*Fewill. peruv.* 3. p. 237.

*Seb. mus.* 3. t. 20. f. 4. 5.

*Catesb. car.* 2. p. 32. t. 32.

*Brown. jam.* 423.

*Habi-*

*Habitat in America, sylvas vastissimis agminibus quotannis deferens, littora maris petiturus, deponendo ova; in sylvis latitans, dum capitur, prehendit digitos, aufugitque confestim relicta adhaerente chela, quæ tamen per minutum arctissime digitum comprimit. Vide Brown. In sylvis cuniculos fodit. Delectatur fructibus Mancinellæ; & inde sæpe venenatus fertur.*

floridus. 12. *C. brachyurus*, thorace lævi mutico maculato margine crenulato, manibus cristatis. *Amoen. acad.* 6. p. 414. n. 98. \*

*Rumph. mus. t. 8. f. 5.*

*Habitat in Carolina, D. Garden; in Asia.*

*Diversa species a C. maculato.*

Vca. 13. *C. brachyurus*, thorace lævi cordato litera H impresso, pedibus subtus barbatis, brachiis muricatis.

*Marcgr. bras.* 184. Vca una.

*Habitat in Americæ paludibus.*

*Testa cordata, lævis, obtusa, integra, medio depresso signo H. Oculi valde elongati. Pedes 10, subtus barbati, sed Brachia & Chelæ eorum subtus muricata.*

*Affinis C. ruricola.*

vocans. 14. *C. brachyurus*, thorace quadrato inermi, chela altera magna. *Amoen. acad.* 6. p. 414. n. 96.

*Marcgr. bras.* 184. Maroccani.

*Pis. bras.* 77. t. 78.

*Seb. mus.* 3. t. 18. f. 8.

*Gron. zooph.* 965. \*

*Pet. gaz.* t. 78. f. 5.

*Rumph. mus.* t. 10. f. E.

*Catesb. car.* 2. t. 25. Cancer arenarius.

*Habitat in Indiis, latitans sub saxis, prehensens digitos occurrentes cum dolore. Variat chela majore manuum.*

cranibola- 15. *C. brachyurus*, thorace lævi integerrimo ovato glaberrimo, manibus ancipitibus lævibus. *M. L. U.* 431. \*

*Rumph. mus.* t. 10. f. A. B.

*Pet. amb.* t. 9. f. 3.

*Seb. mus.* 3. t. 19. f. 4, 10.

*Habitat in Asia.*

16. *C.*

Canceri pevenner, quotannis deponunt crustam senectutisque exuvie laboriose. Resuspinata femina coeunt genitali duplici. Branchias sub thorace elevando fovunt, uti Monoculi. Ova sub canda adherentia racemati gerunt. Vilitant plantas, cadaveribus, vivisque animalibus.

philargus. 16. *C. brachyurus*, thorace lævi integerrimo convexo: postice quindecim-dentato. *M. L. U.* 462. \*  
*Habitat in Asia.*

\* b \* *Brachyuri. thorace lævi lateribus inciso.*

rhomboides. 17. *C. brachyurus*, thorace lævi lateribus antice unispinosus, fronte truncata.  
*Barrel. rar. t. 1287. f. 1.*  
*t. 1286. f. 1, 2.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*

maculatus. 18. *C. brachyurus*, thorace lævi maculis fanguineis rotundis: lateribus unidentatis. *M. L. U.* 433. \*  
*Rumph. mus. t. 10. f. 1.*  
*Pet. amb. t. 1. f. 8.*  
*Seb. mus. 3. t. 19. f. 12.*  
*Gron. zooph. 971. \**  
*Habitat in Asia.*

pelagicus. 19. *C. brachyurus*, thorace lævi utrinque unispinoso, fronte sex-dentata, manibus multangulo-prismaticis.  
*M. L. U.* 434. \*  
*Osborn. iter. 307. C. manuum articulis omnibus dentatis: extimo heptagono.*  
*Gron. zooph. 956. \**  
*Rumph. mus. t. 7. f. R.*  
*Brown. jam. 421. t. 41. f. 2.*  
*Seb. mus. 3. t. 20. f. 9.*  
*Habitat in Pelagi universi orbis Fuco natante.*

Nucleus. 20. *C. brachyurus*, thorace lævi globoso: antice utrinque unidentato, postice rostroque bidentato.  
*Habitat in M. Mediterraneo ad littora Barbariae. E. Brander.*  
*Statura C. craniolaris, magnitudo glandis, color flavus. Thorax rostro bidentato, & ad postica thoracis margo obsolete bidentatus, at supra pedes posticos dens validior conicus. Cauda glaberrima. Brachia antica punctis eminentibus adspersa. Ungues acuti. Cauda subrotunda, glaberrima. Manus laeves digitis longis, filiformibus, aequalibus, ciliatis.*

latus. 21. *C. brachyurus*, thorace lævi utrinque serrato-quadrilobo, manibus ovatis lævibus. *M. L. U.* 435. \*  
*Habitat in Indiis.* 22. *C.*

- Mænas.** 22. *C. brachyurus*, thorace læviusculo utrinque quinquedentato, carpis unidentatis, pedibus ciliatis: posticis subulatis. *M. L. U.* 436. \* *Fn. suec.* 2026.

*Scop. carn.* 1123.

*It. wgoth.* 173.

*Rumph. mus.* t. 6. f. 0.

*Pet. amb.* t. 1. f. 5.

*Baster. subf.* 2. p. 19. t. 2.

*Gron. zooph.* 955. \*

*Habitat in Oceano Europæo, Asiatico.*

- Depurator.** 23. *C. brachyurus*, thorace lævi utrinque subquinquedentato, manibus apice compressis, pedibus posticis ovatis.

*Mus. Ad. Fred.* 1. p. 85. *Cancer caninus.* \*

*Scop. carn.* 1124.

*Gron. zooph.* 954.

*Barr. ic.* 1287. f. 2. *Cancer ramipes.*

*Rond. pisc.* 565. *Cancer latipes.*

*Planc. conch.* 34. t. 3. f. 7.

*Seb. mus.* 3. t. 18. f. 9.

*Habitat in Oceano Europæo.*

*Frons inter oculos dentibus tribus. Digitus fixus chelarum valde compressus. Apex digitorum posticorum ovatus, membranaceus.*

- Dormia.** 24. *C. brachyurus hirsutus*, thorace utrinque dentato, pedibus posticis unguibus geminis. *Amæn. acad.* 6. p. 413. n. 96. \*

*Rumph. mus.* t. 11. f. 1. *Cancer lanosus.*

*Seb. mus.* 3. t. 18. f. 1, 3.

*Habitat in Indiæ orientalis profundo; venenatus.*

*Corpus nigrum, villosum; manuum digiti albi, læves.*

- feriatus.** 25. *C. brachyurus*, thorace lævi utrinque quinquedentato, manibus multangulis ovatis, carpis unidentatis.

*M. L. U.* 437. \*

*Rumph. mus.* t. 6. f. P.

*Pet. amb.* t. 1. f. 6.

*Habitat in M. Indico.*

- granulatus.** 26. *C. brachyurus*, thorace lævi crenulato angulis posticis dilatato-quinquedentatis posticeque subtrunc. t.), manibus cristatis.

*Seb. mus.* 3. t. 19. f. 13.

*Catesb.*

*Catesb. car.* 2. p. 36. t. 36. C. chelis crassissimis.  
*Habitat in America. Mus. De Geer. ex Algeria mibi.*  
*Testa convexa, subtuberculata margine postico laterali*  
*dilatato-quinquedentato, reliquo crenulato. Rostrum*  
*bilobum, obtusum. Chelæ truncatæ, cristatæ, ad*  
*basin spina armatæ.*

*Pagurus.* 27. C. brachyurus, thorace utrinque obtuse novem-phicato, manibus apice atris. *Fn. suec.* 2028.

*Fn. suec.* 1. n. 1244.

*It. wgoth.* 173.

*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 85.

*Scop. carn.* 1125.

*Gron, zooph.* 967. \*

*Bell. aquat.* 368.

*Rond. pisc.* 560.

*Gesn. aquat.* 155.

*Aldr. exsangu.* 186.

*Fonst. exsangu.* t. 5. f. 2.

*Bradl. nat.* t. 3. f. 4.

*Rumph. mus.* t. 11. f. 4.

*Habitat in Oceano Europæo, Asiatico.*

\* c \* *Brachyuri Thorace supra hirsuto aut spinoso.*

*Chabrus.* 28. C. brachyurus, thorace hirsuto suborbiculato mutico, manibus ovatis muricatis. *M. L. U.* 438. \*

*Habitat in Oceano Indico.*

*lanatus.* 29. C. brachyurus, thorace hirsuto rugoso utriusque unidentato, rostro bidentato.

*Planc. conch.* 36. t. 5. f. 1.

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa depressa, inequalis, lacunosa, antice truncata cum dentibus 2 inter oculos, 1 extra oculos, in medio lateris utriusque dens prominens. Chelæ læves.*

*Brachia ciliata. Pedes 2, 3 longi; 4, 5 dorsales, breves, apice adunco.*

*Araneus.* 30. C. brachyurus, thorace hirsuto ovato tuberculato, rostro bifido, manibus ovatis. *Fn. suec.* 2030. *M. L. U.* 439. \*

*Iter. scanic.* 312.

*Fonst. exsangu.* t. 5. f. 13.

*Habitat in Oceano Europæo.*

*Affinis C. rostrato, lanato, tribulo.*

31. C.

- rostratus.** 31. *C. brachyurus*, thorace pubescente obcordato: dorso spinis duabus erectis, manibus oblongis compressis, *Fn. succ.* 2027. \*  
*Habitat in O. Europæo.*
- hirtellus.** 32. *C. brachyurus*, thorace hirsuto utrinque quinquedentato, manibus extus muricatis. *Fn. succ.* 2029. \*  
*Habitat in Oceano arctico.*
- Cuphæus.** 33. *C. brachyurus*, thorace villosa ovato antice obtuso: pollice tridentato. *M. L. U.* 440. \*  
*Rumph. mus. t. 10. f. D?*  
*Habitat in Asia.*
- muscosus.** 34. *C. brachyurus*, thorace villosa utrinque tridentato, rostro bidentato: lateribus unidentato.  
*Habitat in M. Mediterraneo. E. Brander.*  
*Magnitudo glandis. Testa obovata, villis mollissimis incurvis hirsuta, ad utrumque latus spinis 3 subulatis. Rostrum spinis 2 subulatis parallelis cum dente compresso ad utrumque latus rostri. Ungues pedum subulati, curvi, introrsum dentati. Chelæ laeves, lineares, carpo utrinque dente obtuso retrorsum spectante.*
- tribulus.** 35. *C. brachyurus*, thorace spinis octo, pedibus filiformibus, rostro bifido.  
*Habitat Gades. F. Logie.*  
*Testa cordata, convexa gibbositatibus 4, quarum 2 laterales; 1 inter laterales, minor; 1 antérie versus dorsum; harum singula spinâ erectâ armatur; adsunt insuper postice spinæ 2; etiâ spinæ 2 versus rostrum. Rostrum bifidum, connivens. Pedes filiformes, longi, inermes.*
- punctatus.** 36. *C. brachyurus*, thorace ovato punctato: postice tridentato.  
*Rumph. mus. t. 10. f. C?.*  
*Brown. jam. t. 42. f. 3.*  
*Habitat in Asia, America: Carolina, Jamaica.*  
*Testa subovata, convexa, æqualis, adpersa punctis eminentibus; margo undique ciliatus punctis majoribus; postice spinæ 3: intermedia altiore. Rostrum emarginatum; spinæ, versus antica, obsoleta, utrinque. Chelæ oblongæ, rubro punctatæ; subtus laeves. Pedes pubescentes.*

X x x

37. C.

persona- 37. *C. brachyurus*, thorace hirtō inæquali utrinque quin-  
tus. quedentato, rostro quadridentato.

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa magnitudine pomi, rubra, uti totum corpus hirta. Rostrum bipartitum subulatum hirtum cum dente ad utrumque latus antico ciliato, breviorē. Seta utrinque ad basin caudæ. Pedes duo postici quasi supra reliquos collocati. Thorax ovatus margine aculeis 5; disco tuberculis variis. Manūs læves, retro bidentes.*

\* d \* *Brachyuri thorace supra spinoso.*

dodecos. 38. *C. brachyurus*, thorace pubescente, spinis duodecim,  
rostrō bifido.

*Habitat in Hispania.*

*Thorax rotundatus, obovatus, acuminatus, parum pubescens, magnitudine Grylli domestici. Spina 1 erecta, ad basin. Spina 1 erecta in medio; Spinae 4 obsoletæ ad utrumque latus; Spina 1 brevis ad marginem. Rostrum attenuatum, bifidum, subconnivens. Oculi exserti. Cauda ovata, obtusa, hirsuta. Chelæ ovato-oblongæ, utrinque carina ciliatæ. Differt a *C. Aranco* corpore non obcordato depresso, sed obovato convexo.*

hastatus. 39. *C. brachyurus*, thorace rugoso nudo, margine utrinque  
octodentato: postico maximo, palmis posticis ovatis.

*Habitat in M. Adriatico. D. Wilke.*

*Palmae antice bidentatæ. Chelæ angulatæ.*

puber. 40. *C. brachyurus*, thorace rugoso villosō utrinque quin-  
quedentato, palmis posticis ovatis.

*Habitat in M. Adriatico. D. Wilke.*

Maja. 41. *C. brachyurus*, thorace aculeato, manibus ventricosis spinosis: digitis penicillato-hirsutis. *Fann. succ.*  
2031. \*

*Scop. carn.* 1126.

*Iter. scanic.* 327.

*Matth. diofc.* 229. Maja.

*Fonst. exsang. t.* 5. f. 5.

*Gesn. aqu.* 152. Maja femina.

*Aldr. crust.* 184. Mæa alia.

*Gron. zooph.* 973. \*



- longimanus. 42. *C. brachyurus*, thorace aculeato; manibus corpore longioribus: digito parulo; pollice curvato. *M. L. U.* 441.\*  
*Rumph. mus. t. 8. f. 2.*  
*Pet. amb. t. 2. f. 15.*  
*Seb. mus. 3. t. 20. f. 12.*  
*Habitat in Oceano Asiatico.*
- horridus. 43. *C. brachyurus*, thorace obtuse aculeato, manibus ovatis, cauda cariosa. *M. L. U.* 442.\*  
*Rumph. mus. t. 9. f. 1.*  
*Pet. amb. t. 1. f. 7.*  
*Seb. mus. 3. t. 18. f. 10. & t. 22. f. 1. 2, 3.*  
*Gron. zooph. 976.\**  
*Habitat in Oceano Asiatico.*  
*Pedes 8 tantum cum manibus.*
- cristatus. 44. *C. brachyurus*, thorace aculeato: rostro bifido cristato, manibus teretibus. *M. L. U.* 443.\*  
*Rumph. mus. t. 8. f. 1.*  
*Pet. amb. t. 5. f. 11.*  
*Gron. zooph. 975.\**  
*Habitat in Oceano Asiatico.*
- superciliolus. 45. *C. brachyurus*, thorace aculeato: spinis ocularibus ramofo-trifidis, manibus teretibus. *M. L. U.* 444.\*  
*Habitat in Oceano Indico.*
- cornutus. 46. *C. brachyurus*, thorace aculeato: rostro spinis corniformibus barbatis, manibus teretibus. *M. L. U.* 445.\*  
*Habitat in Oceano Indico.*
- longipes. 47. *C. brachyurus*, thorace aculeato, manibus ovatis scabris, pedibus posterioribus longissimis. *M. L. U.* 446.\*  
*Rumph. mus. t. 8. f. 4.*  
*Habitat in Oceano Indico.*
- spinifer. 48. *C. brachyurus*, thorace postice uni-aculeato inaequali, pedibus secundi paris longissimis. *M. L. U.* 447.\*  
*Rumph. mus. t. 8. f. 3?*  
*Habitat in Asia.*
- Germanus. 49. *C. brachyurus*, thorace inaequali, spina altera frontis, altera supra caudam. †  
X x x 2 *Habi-*

*Habitat ad Maris Germanici insulam Fanee. D. Brunniche.*

Corpus vix pediculo majus, glabrum. Frons inter oculos prominens, lamina dilatata, ovata, concava, terminata spina porrecta, valida. Antennæ spina frontali paulo longiores. Thorax inæqualis, e cujus medio spina valida, horizontalis, supracaudam extensa. Cauda teres articulis 5, globosis. Chelæ manuum ovatae, leves.

\* e \* *Brachyuri thorace inæquali.*

cruentatus. 50. *C. brachyurus*, thorace tuberculoso sanguineo, rostro lineari truncato.

*Scop. carn. 1134. \**

*Habitat in M. Mediterraneo. E. Brander.*

*Testa statura & magnitudine C. Aranei, supra admodum nodosa tuberculis inæqualibus: apice maculis albis. Rostrum lineare, truncatum, cum dente utrinque juxta basin. Chelæ oblongæ, leves, ad corpus retrorsum bidentes. Pedes omnes varicoso-tuberculati.*

hepaticus. 51. *C. brachyurus*, thorace verrucoso gibbo semiorbiculato: margine ferrato. *M. L. U. 448. \**

*Habitat in Indiis.*

Calappa. 52. *C. brachyurus*, thorace strigis subimbricato gibbo antice trilobo. *M. L. U. 449. \**

*Pet. gaz. t. 75. f. 11.*

*Rumph. mus. t. 11. f. 2, 3.*

*Seb. mus. 3. t. 20. f. 7, 8.*

*Habitat in Asia.*

Grapsus. 53. *C. brachyurus*, thorace strigis lateralibus, fronte retusa. *Amæn. acad. 4. p. 1252. t. 3. f. 10. \**

*Catesb. car. 2. t. 36. f. 1. Pagurus maculatus.*

*Seb. mus. 3. t. 18. f. 5.*

*Gron. zoonph. 966. \**

*Habitat in America, Insula Adscensionis.*

æneus. 54. *C. brachyurus*, thorace rugosissimo obtuso utrinque quadrilobo. *M. L. U. 451. \**

*Habitat in India.*

55. *C.*

*scuposus*. 55. *C. brachyurus*, thorace tuberculato planiusculo margine aculeato, chelis margine inferiore cristatis. *M. L. U.* 450.

*Habitat in India Orientali.*

\* f \* PARASITICI, cauda apbylla.

*Latro*. 56. *C. submacrourus*, thorace futuris quadrifido, cauda simplici subtus ventricosa.

*Rumph. mus. t. 7. f. 4.* Cancer crumenatus.

*Rochef. antill. t. c. 21.* Bourfires.

*Seb. mus. 3. t. 25. f. 1, 2.*

*Habitat in Amboinæ Antillarumque cryptis rupium, terrestria, nocturnus, visitans præprimis nucibus Cocos, quas adscendens dejicit, dein manibus aperit violenter; esculentus demtis intestinis; caret domuncula mobili, ideoque latet intra cavernas rupium.*

*Bernhardus*. 57. *C. macrourus parasiticus*, chelis cordatis muricatis: dextra majore. *M. L. U.* 454. *Fn. suec.* 2032. \*

*Scop. carn.* 1130.

*Mutth. diosc.* 230.

*Rond. pisc. t. p. 553.*

*Bellon. aquat.* 362.

*Gesn. aquat.* 161.

*Aldr. exsangu.* 218.

*Jonst. exsangu. t. 7. f. 6-12.*

*Swammerd. bibl. t. 11. f. 1, 2.*

*Baster. subf. 2. p. 71. t. 10. f. 3, 4.*

*Gron. zooph.* 982. \*

*Habitat in Oceano Europæo, intra varias testas Cochlearum, quas vacuas intrat trahitque, mutatas prout adolescit.*

*Chelæ margine anteriore versus basin barbatae.*

*Diogenes*. 58. *C. macrourus parasiticus*, chelis lævibus pubescentibus: sinistra majore.

*Gron. zooph.* 983. \*

*Rumph. mus. t. 5. f. K. L.*

*Catesb. car. 2. t. 33. f. 1, 2.*

*Kempf. jap. t. 13. f. 7.*

*Habitat in Oceano Asiatico, Americano, intra testas varias Cochlearum.*

*Eremita*. 59. *C. macrourus parasiticus*, chelis scabris subæqualibus: anterioribus sex-pollicatis.

X x x 3

*Habi-*

*Habitat in M. Italico intra tophum suberosum, subrotundum apertura transversa ovali, in cujus centro cochlea latitat. D. Vandelli.*

*Similis Bernbardo f. Diogeni, sed minor. Chelæ æquales, scabræ & præterea Pedes utrinque 2 alii, porrecti extra tophum.*

tubularis. 60. *C. macrourus parasiticus subcylindricus, testa punctis excavatis.*

*Habitat intra Serpulæ glomeratæ testam Maris Mediterranei.*

*Magnitudo & facies Scolopendræ forficatæ. Testa brevis, subovata, punctis excavatis, antice utrinque retusa. Pedes 4 utrinque primi chelati; par 5: tum muticum, reliqua tantum rudimenta. Cauda longa mollis.*

Caput mortuum. 61. *C. brachyurus tomentosus obtectus pileo hemisphærico suberoso.*

*Habitat Algeriæ. E. Brander. Singularis adspectuque horridus referens caput humanum, diu sepultum.*

*Corpus magnitudine castaneæ, griseum s. sordidum, totum tomentosum pilis brevissimis confertissimis, exceptis solis digitorum apicibus. Rostrum obsoletum, vix emarginatum. Manuum digiti æquales. Pedes unguibus acutis. Testa semiglobosa, inermis. Pileus hemisphæricus, quasi ex argilla vel corio antiquo confectus, distinctus a corpore, tegit totum corpus ad oculos usque, enatus e Pedibus postremi paris supra dorsum reflexis & in pileum dictum terminatis.*

\* g \* *Macrouri thorace lævi.*

Gamma. 62. *C. macrourus, thorace lævi, rostro lateribus dentatus: basi supra dente duplici. Fn. suec. 2033. \**

*Scop. carn. 1127.*

*It. westrogoth. 174.*

*Mus. Ad. Fr. 87.*

*Matth. disc. 227.*

*Rond. pisc. 1. p. 538.*

*Gesn. aquat. 91.*

*Jonst. exsang. 112.*

*Aldr. exsang. t. 71.*

*Bast. subf. 2. p. 6. t. 1.*

*Habi-*

*Habitat in Oceano imprimis Norvegico: in America septentrionali. Kalm. mutans secundum anni tempus loca.*

**Astacus.** 63. *C. macrourus*, thorace lævi, rostro lateribus dentato: basi utrinque dente unico. *Fn. suec.* 2034.

*Scop. carn.* 1128.

*Schaff. elem.* 1. 32.

*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 87.

*Gron. zooph.* 977. \*

*Rœs. inf. app.* 1. t. 54, 55.

*Matth. diosc.* 228.

*Rond. pisc.* 2. p. 210.

*Rellon. aquat.* 355.

*Gesn. aquat.* 104.

*Aldr. exsangu.* 129.

*Jonst. exsangu.* 1. 4. f. 1.

*Sultz. inf.* 1. 23. f. 151.

*Geoffr. parif.* 2. p. 667. n. 1.

*Habitat in Europæ lacubus, fluviis. Nutritur in domibus hepate Bovis; Urticæ foliis conservatur diutius vivus Aceto adperso. S.*

**Carcinus.** 64. *C. macrourus*, thorace lævi, manibus teretiusculis: brachiis hispido-aculeatis.

*Sloan. jam.* 2. p. 271. t. 245. f. 2. *Astacus fluviatilis major, chelis aculeatis.*

*Seb. mus.* 3. t. 21. f. 4.

*Rumph. mus.* 1. 1. f. B.

*Habitat in Americæ fluviis.*

*Varietatem Squilla facit Gronovius.*

**pennace-** 65. *C. macrourus*, thorace lævi cylindrico, rostro ensiformi: margine superiore serrato.

*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 87.

*Habitat in Calidioribus regionibus.*

**Squilla.** 66. *C. macrourus*, thorace lævi, rostro supra serrato subtus tridentato, manuum digitis æqualibus *Faun. suec.* 2037. \*

*Scop. carn.* 1129.

*Matth. diosc.* 229.

*Klein. dub.* 35. f. A.

*Rond. pitc.* 549.

*Seb. mus.* 3. 21. f. 9, 10.

X x x 4

Baster.

*Bast. subsf. 2. p. 30. f. 5. Squilla fusca.*

*Gron. zooph. 986.\**

*Habitat in M. Balthico, Oceano Europæo.*

**Crangon. 67.** *C. macrourus*, thorace laevi, rostro integerrimo, manuum pollice longiore. *Fn. suec. 2038.\**

*Bast. subsf. 2. p. 27. t. 3. f. 1-4. Squilla marina batava.*

*Gron. zooph. 985.*

*Seb. mus. 3. t. 21. f. 8.*

*Raf. inf. 3. t. 63. f. 1, 2.*

*Habitat in M. Balthico.*

\* h \* *Macrouri thorace inaequali.*

**Carabus. 68.** *C. macrourus*, thorace strigis imbricatis oblongiusculo antice ciliato, rostro bidentato mobili.

*Habitat in M. Mediterraneo. E. Brander.*

*Testa magnitudine extimi pollicis, supra laevis sed rugis antrorsum imbricatis, margine antice denticulis ciliata. Rostrum dentibus 2 parallelis mobilibus depressis. Antennæ corpore longiores villis ciliata. Chela latissima compressa cordata antice truncata pilis ciliata. Pedes unguibus falcatis. Cauda articularis 3 latis, dein 3 angustis: extremo articulo orato parvo, basi utrinque pedibus 2 parvis & pestice setis aliquot longissimis.*

**strigosus. 69.** *C. macrourus*, thorace antrorsum rugoso spinis ciliato, rostro acuto septemdentato. *Fn. suec. 2036.*

*Cancer macrourus thorace chelisque angulatis hispidis.*

*Mus. Ad. Fr. 87.\**

*Column. aqu. 8. t. 6. Astacus marinus.*

*Jonst. exsang. t. 2. f. 7. Astacus similis pediculo marino.*

*Gron. ad. helv. 4. p. 23. t. 2. f. 1, 2. & Zooph. 980.*

*Barrel. rar. t. 1288. f. 1.*

*Seb. mus. 3. t. 19. f. 19, 20.*

*Habitat in Oceano Atlantico, Mediterraneo.*

*Affines inter se sunt strigosus, Carabus, Symnista & dorsipes ob thoracem antrorsum imbricatum.*

*Rostrum 7-dentatum, acutissimum. Thorax obovatus, antice transverse imbricatus strigis ciliatis, antrorsum spectantibus. Sutura arcuata anteriora thoracis dis-*  
*sim-*

---

*Chela didactylæ Gammaro, Astaco, norvegico, pennacen.*

*stinguit. Brachia introrsum aculeata. Chelæ oblongæ, margine aculeatæ, latere superiore antrorsum imbricatæ scabritiæ ciliari. Pedes præterea 3 utrinque; quartum par minutum, apice mucosum, villosum.*

**fymnista.** 70. *C. submacrourus*, thorace subcylindrico cillato-ferrato, chelis cordatis, antennis ciliato-pilosis. *M. L. U.* 453.\*  
*Habitat in Asia.*

**dorsipes.** 71. *C. subbrachyurus*, thorace rugoso ovali antice ferrato-ciliato, pedibus posticis dorsalibus. *M. L. U.* 452.\*  
*Rumph. mus. t. 10. f. 3.*  
*Pet. amb. t. 6. f. 2.*  
*Habitat in Asia.*

**Cancha-** 72. *C. macrourus*, thorace rugoso ovali, manibus **rns.** compressis margine spinosis. *M. L. U.* 455.\*  
*Habitat in Indiis.*

\* i \* *Macrouri thorace aculeato.*

**norvegi-** 73. *C. macrourus*, thorace antrorsum aculeato, manibus **cus.** prismaticis: angulis spinosis. *Fn. succ.* 2039. *M. L. U.* 456.\*  
*It. scanic. 307.*  
*Mus. Ad. Fr. 1. p. 88.*  
*Gron. zooph. 979.*  
*Seb. mus. 3. t. 21. f. 3.*  
*Aldr. exsangu. 113. Astacus mediæ magnitudinis prior.*  
*Habitat in Mari Norvegico.*

\* k \* *Macrouri, manibus adaetylis, thorace oblongo.*

**Homarus.** 74. *C. macrourus*, thorace antrorsum aculeato, fronte bicorni, manibus adaetylis. *M. L. U.* 457.\*  
*Gron. zooph. 981.\**  
*Marcgr. bras. 245. t. 246.*  
*Rumph. mus. t. 1. f. A.*  
*Pet. amb. t. 6. f. 1.*  
*Seb. mus. 3. t. 21. f. 5.*  
*Habitat in Mari Asiatico, Americano.*  
*Supra oculos aculei duo recurvati.*

**Arctus.** 75. *C. macrourus*, thorace antrorsum aculeato: fronte diphylla, manibus subadaetylis. *Fn. succ.* 2040.  
*Marcgr. bras. 186. Poliquiquyixe.*  
*Jonst. exsangu. t. 4. f. 4, 8, 12.*  
**X x x 5**

*Barrel.*

Barrel. ic. 1288. f. 2.

Rumph. mus. t. 2. f. C. D.

Brown. jam. t. 41. f. 1.

Seb. mus. 3. t. 20 f. 1.

Habitat in M. Europæ, Asiæ, Africæ, Americæ.

Frons retusa, aculeis inter oculos circiter 10, inæqualibus. Folia frontis 2 duplici articulo: anteriore lato, obtuso, 7-fido, ciliato; posteriore acuminato, 7-dentato, subciliato. Antennæ longitudine foliorum, articulis 4, ultimo bifido; altero obtuso brevior. Thorax oblongus, inæqualis, quinquesariam antrosum aculeatus. Caudæ articuli triplici area: prima levi; secunda rugosa; tertia rugosa postice trifariam emarginata; apex pentaphyllus, obtusus. Manus crassiores, leves, longitudine foliorum frontis pollice terminali, digito brevissimo. Pedes leves unguibus acutis.

\* 1 \* *Macrouri manibus adaetylis, testa thoracis brevissima, nec thoracem totum tegente.*

Mantis. 76. *C. macrourus articularis*, manibus adaetylis compressis falcatis ferrato-dentatis. *Mus. Ad. Fr.* 1. p. 86. *Fn. suec.* 2035.

*Scop. carn.* 1135.

*Rumph. mus. t.* 3. f. E. *C. Arenarius.*

*Marcgr. bras.* 186. t. 187. *Tamaru-guacu.*

*Seb. mus.* 3. t. 20. f. 2, 3.

*Gron. zooph.* 984. \*

Habitat in M. Asiatico, Indico, Mediterraneo.

Thoracis testa membranacea. Pedes utrinque 3. Pollex ferrato-dentatus, terminalis. Dactyli sub abdomine trium parium. Antenna trifida: lamina ovata ad oculos.

Scyllarus. 77. *C. macrourus articularis*, manibus adaetylis ventricosis rectis angulatis introrsum tridentatis. *Mus. Ad. Fr.* 1. p. 86. *C. mirabilis.*

*Rumph. mus. t.* 3. f. F.

*Seb. mus.* 3. t. 20. f. 6.

Habitat in M. Asiatico.

Statura præcedentis. Thoracis testa latere postico emarginata. Macronum par pone pedes.

fetiferus. 78. *C. manibus nullis, pedibus utrinque sex didaetylis, antennis longissimis.* *Seb.*

Species 76-87 ob thoracem Lorica destitutum & singularem structuram corporis adeo a reliquis Canceris recedunt, ut facile genus distinctum constituerent.



*Seb. mus.* 3. t. 17. f. 2.

*Habitat in Indiis.*

*Manus in crassata nullæ. Antennæ corpore duplo longiores.*

**Emeritus.** 79. *C. manibus nullis, pedibus utrinque quinque natatoriis.*

*Gron. zooph.* 1000. t. 17. f. 8, 9. *Emerita.\**

*Pet. pterigr.* t. 20. f. 9.

*Habitat in Mari Indico.*

**grosipes.** 80. *C. macrourus articularis, manibus adauctylis longitudine corporis.†*

*Gron. zooph.* 989. *Astacus muticus, pede antico subulato edentulo longissimo crassissimo.*

*Habitat in Belgii aquis stagnantibus.*

**Pulex.** 81. *C. macrourus articularis, manibus quatuor adauctylis, pedibus decem. It. æl.* 42, 96. *Fn. suec.* 2041.\*

*Frisch. inf.* 7. t. 18.

*Raj. inf.* 44. *Pulex fluviatilis.*

*Ræf.* 3. app. t. 62.

*Baister. subf.* 2. p. 31. t. 3. f. 7. *Pulex marinus.*

*Geoffr. paris.* 2. p. 667. t. 21. f. 6.

*Gron. zooph.* 990.\*

*Habitat ad Maris littora, etiam in fontibus & fossis, dorso innatans; consumitur a Recurvirostra.*

*Antennæ 4. Pedes 7 parium, quorum paria 4 antrosum versa; horum duo paria antica chelifera digito mobili, absque pollice. Paria 3 posteriora retrorsum versa.*

**Locusta.** 82. *C. macrourus articularis, manibus quatuor adauctylis, pedibus quatuordecim. Fn. suec.* 2042.\*

*It. gotl.* 260.

*Ræf. inf.* 3. t. 62.

*Klein. miss.* 5. t. 6. f. A. B. C.

*Sultz. inf.* t. 23. f. 152.

*Habitat in Europæ maritimis.*

*Antennæ 4. Corpus articulis 4. Rostrum obtusum. Manus duorum parium, adauctylæ, breves. Pedes dein 7 parium, angustii. Spuriæ pedes sub cauda 3 parium, apice setaces. Pediculi unius paris caudæ lateribus adstant, bidigitati. Cauda acuta, brevis.*

83. *C.*

- linearis. 83. *C. macrourus articularis*, manibus quatuor monodactylis, pedibus decem.  
*Nartensf. spit. 56. t. P. f. I.*  
*Habitat in Oceano Europæo. König.*  
*Corpus lineare, articulis 6 præter caput. Antennæ duorum parium. Oculi sessiles. Pedes decem chelis ovato oblongis, monodactylis, s. in articulo corporis (excepto capite) primo; secundum par proximum, sub articulo corporis secundo. Paria 3, 4, 5 prope caudam sita, chelis similibus.*
- atomos. 84. *C. macrourus linearis articularis*, manibus adactylis, pedibus undecim. †  
*Baster. subsf. 1. p. 32. t. 4. f. 2.*  
*Habitat in Europæ aquis fluctuantibus dulcibus, nudis oculis vix visibilis, præcedenti affinis.*
- filiformis. 85. *C. macrourus linearis articularis*, pedibus decem; mediis majoribus.  
*Amoen. acad. 6. p. 415. n. 99.*  
*Habitat in Malacca.*  
*Corpus longitudine pollicis, filiforme, debile. Pedes 2 ad caput, 2 in medio chelis majoribus cum brevi denticulo interius, 6 ad caudam.*
- Salinus. 86. *C. macrourus articularis*, manibus adactylis, pedibus patentibus, cauda subulata.  
*Matii. diar. britann. 1756.*  
*Habitat in Angliæ Salinis Limingtonianis. D. Schlofferus.*  
*Corpus pediculo majus, oblongum. Oculi distantes, laterales, pedunculati. Antennæ setaceæ, corpore breviores. Cauda filiformi-subulata, exserta, longitudine corporis. Pedes utrinque 10 patentes & quasi pinnatim digesti.*
- stagnalis. 87. *C. macrourus articularis*, manibus adactylis, pedibus patentibus, cauda cylindrica bifida. *Fw. suec. 2043.\**  
*Schæff. monogr. . . Apus.*  
*Habitat in Europæ aquis dulcibus, in fissuris rupium retentis. (An Larva cujusdam Ephemeræ?)*

271. MONOCULUS. *Pedes* natatorii.  
*Corpus* crusta tectum.  
*Oculi* approximati, testæ in-  
 nati.

Polyphemus. 1. *M. testa plana convexa sutura lunata: postica denta-*  
*ta, cauda subulata longissima. M. L. U. 460. \**

*Gron. zooph. 953. Xiphosura. \**

*Jonst. exsang. t. 7. f. 1, 2.*

*Olear. mus. t. 28. f. 1, 2.*

*Worm. mus. 249. t. 249.*

*Rumph. mus. 21. t. 12.*

*Knorr. delic. t. F. 1.*

*Kämpf. jap. t. 13. f. 8.*

*Laet. ind. 56.*

*Bont. jav. l. 5. c. 31.*

*Schæff. monogr. 1756. t. 7.*

*Seb. mus. 3. t. 17. f. 1.*

*Habitat in India. Insectorum omnium facile maximum*  
*evadens; semper bini simul.*

*Testa anterior lunaris, obtusa, marginata, convexa,*  
*dorso spinis VII: horum 3 longitudinales; 2 utrinque*  
*laterales. Oculi utrinque solitarii, ad basin spinæ*  
*lateralis prioris. Posterior Testa angustior, serraturis*  
*utrinque 6, postice acute bifida, armata spinis VII:*  
*quarum 3 longitudinales, 2 e prima serratura majore,*  
*2 e dentibus emarginatura. Aculei mobiles, sub-*  
*ulati, in singula serratura laterali solitarii. Cauda*  
*rostrata, mobilis, rigida, triquetra, dorso scabra,*  
*longitudine totius. Pedes VI paribus: horum 5 prio-*  
*res chela didactyla; ultimum par apice digitis 4 lan-*  
*ceolatis & pollice longiore setaceo didactylo; præter*  
*Femoris lobum ad basin lanceolatum, obtusum. Po-*  
*stica subius tegunt folia 6 imbricata.*

piscinus. 2. *M. testa cordata plana. Fr. suec. 2045.*

*Læf. act. Ups. 1750. p. 42. t.*

*Baster. subs. 2. p. 137. t. 8. f. 9, 10.*

*Ström. fœndm. t. 1. f. 4, 5, 6.*

*Geoffr. parif. 660. t. 21. f. 3. Binoculus.*

*Habitat in Oceano.*

*Hujus duo distincta sunt individua, sexu an specie di-*  
*versa: Stylatus duabus antennis corpore longioribus;*

Mu-

*Muticus absque exertis antennis. Confer. Cl. Basterum.*

- Apus.** 3. *M. testa subcompressa antice retusa postice truncata, cauda bifida. Fn. suec. 2046.\**  
*Scop. carn. 1138.*  
*Frisch. inf. 10. t. 1.*  
*Aët. angl. 40. p. 150. t. 1. f. 2.*  
*Schaff. monogr. 1756. t. 1-6.*  
*Schaff. elem. t. 29. f. 1.*  
*Sultz. inf. t. 24. f. 153.*  
*Geoffr. paris. 660. n. 1. t. 21. f. 4.*  
*Habitat in Europæ fossis, piscinis.*  
*Oculi 2. Antennæ simplices. Geoffr.*
- Pulex.** 4. *M. antennis dichotomis, cauda inflexa. Faun. suec. 2047.\**  
*Geoffr. paris. 659. n. 1.*  
*Swamm. quart. 66. t. 1.*  
*bibl. t. 31. f. 1, 2, 3.*  
*Schaff. monogr. 1755. t. 1. f. 1-8. & elem. t. 29. f. 4.*  
*Joblot. micr. 1. pp. 2. t. 13. f. P. Q. R.*  
*Lederm. micr. 146. t. 72. f. 2.*  
*Habitat ubique in aquis dulcibus, tanta sæpe in copia, ut aqua appareat sanguinea. Amæn. acad. 3. p. 320.*
- Pediculus.** 5. *M. antennis dichotomis, cauda reflexa. Faun. suec. 2048.*  
*Geoffr. paris. 656. n. 2.*  
*Habitat in Europæ aquis dulcibus.*
- quadri-cornis.** 6. *M. antennis quaternis, cauda recta bifida. Fn. suec. 2049.\**  
*Scop. carn. 1129.*  
*Geoffr. paris. 656. n. 3. t. 21. f. 5.*  
*Baker. micr. t. 9. f. 1, 2.*  
*Blank. inf. 149. t. 13. f. B.*  
*Joblot. micr. 1. pp. 2. t. 14. f. C. D.*  
*De Geer aët. Stockh. 1747. t. 6. f. 2.*  
*Aët. angl. abbrev. 2. p. 258. t. 20. f. 5, 6.*  
*Raf. inf. 3. t. 98. f. 1, 2, 4.*  
*Leuvenb. arc. 142. f. 1.*

*Habi-*

*Monoculi pariunt & ova & vivos foetus; exsiccati æstate reviviscunt affluente aqua.*

*Habitat in Aquis Europæ.*

*Ovaria tamquam uva binæ petiolatæ adhærent.*

- concha- 7. *M. antennis capillaribus multiplicibus, testa bivalvi.*  
ceus. *Fn. suec. 2050. \**

*Geoffr. parif. 657. n. 4.*

*Habitat in aquis dulcibus, ubi volitat uti pullus Conchæ.*

*Curiosis Micrographis examinandum commendo animalculum Monoculo conchaceo simile, sed minus, latitans solitarium intra pellucidos utriculos Utriculæ vulgaris, tantum non omnes, cujus motus extus conspicuus, observatum 1766. Jun. 11. a Car. Linné, filio; Prof. Bot. Ups.*

- lenticula- 8. *M. testa compressa lentiformi. Fn. suec. 2051. \**  
ris. *Habitat in Finlandia. Uddman.*

*Latitudo extimi articuli digiti.*

- Telemus. 9. *M. testa subglobosa postice tridentata, antice labio*  
fimo.

*Habitat Algeriæ. E. Brander.*

*Testam solum vidi, generis etiamnum dubii, figura fere seminis Ciceris; hac subglobosa, pellucida, postice tridentata: dento intermedio acutiore; latus Testæ inferius minus gibbum; antice fissæ est horizontaliter testa ultra medium; pars inferior antice longior in labium concavum, adscendens, obtusum; superior absque labio, antice gibba, transverse striata.*

## 272. ONISCUS. Pedes XIV.

*Antennæ setacæ.*

*Corpus ovale.*

- Afilus. 1. *O. abdomine foliis duobus obtecto, cauda semiovali.*

*Musf. Ad. Fr. 1. p. 88. Fn. suec. 2052.*

*Gron. zooph. 997.*

*Bell. aquat. 443. Afilus f. œstrum.*

*Rond. pisc. 576. Pediculus marinus.*

*Habitat in Oceano, viviparus.*

- œstrum. 2. *O. abdomine foliis sex obtecto, cauda retusa. Musf.*

*Reg 89. Fn. suec. 2053.*

*Marcgr. bras. 155. f. 3, 4. Animalculum crustaceum.*

*Strum.*

*Ström. fœndm.* 165. n. 2. t. 1. f. 2, 3.

*Habitat in Oceano.*

Pfora. 3. O. abdomine subtus nudo, cauda semiovali acuta.

*Fn. suec.* 2054. \*

*Habitat in mari Norvegico. D. C. Solander.*

Physodes. 4. O. abdomine subtus nudo, cauda ovata.

*Habitat in Pelago.*

Corpus, præter caput ♂ caudam ultimam, ex 7 segmentis trunci, ♂ 5 caudæ. Antennæ utrinque 2, breves. Caudæ folium terminale omnino ovatum; ad latera utrinque subtus auctum duobus petiolis diphyllis: foliolis lanceolatis, obtusis, cauda brevioribus: Caudæ articuli subtus obiecti numerosis vesiculis longitudine caudæ.

Entomon. 5. O. abdomine subtus nudo, cauda subulata. *Fn. suec.* 2055. \*

*Raj. inf.* 43. Afellus marinus cornubientis alius.

*Pet. gaz.* t. 1. f. 4.

*Gron. zooph.* 992.

*Baster. subs.* 2. 143. t. 13. f. 2.

*Klein. dub.* 38. f. 1, 2. Entomon pyramidale.

*Habitat in M. Balthico.*

Ceti. 6. O. ovalis: segmentis distinctis, pedibus tertii quartique paris linearibus ovaticis. *Mus. Ad. Fr.* 1. p. 89. *Fn. suec.* 2056. \*

*Habitat in Balænis, distinguendus a Phalangio Balænarum, simili.*

marinus. 7. O. semicylindricus, cauda ovato-oblonga integra.

*Fn. suec.* 2057.

*It. wgoth.* 190.

*Gron. zooph.* 996. t. 17. f. 3?

*Habitat in Oceano Norvegico.*

2 cauda- 8. O. semicylindricus, caudis duabus longitudine corporis.

tus. *Fn. suec.* 2062. \*

*Habitat in O. Norvegico.*

linearis. 9. O. cauda quadridentata. *Amoen. acad.* 6. p. 415. n. 100. \*

*Habitat Surinami.*

*Cauda emarginata, bidentata, cum foliolis lateralibus adnatis, unde quadridentata.*

- scopulo- 10. *O. luteus strigis fuscis.* *Fn. suec.* 2060.  
rum. *It. wgoth.* 190.  
*Ström. söndm.* 166. n. 3.  
*Habitat in Oceano Norvegico.*
- aquaticus. 11. *O. lanceolatus, cauda rotundata, stylis bifurcis.* *Fann.*  
*suec.* 2061. \*  
*Raj. inf.* 43.  
*Frisch. inf.* 10. t. 5.  
*Geoffr. paris.* 672. t. 22. f. 2. *Asellus* 1.  
*Schæff. elem.* t. 22.  
*Habitat in Aquis puris.*  
*Confer: Entomon hieroglyphicum. Klein. dub. f. 5,*  
*sed maximum.*
- oceanicus. 12. *O. ovalis, cauda bifida, stylis bifidis.*  
*Ström. söndm.* 202. s. 1. f. 14, 15. *Oniscus stylis*  
*caudæ utrinque binis.*  
*Baster. subs.* 26. p. 145. t. 13. f. 4.  
*Act. belv.* 5. p. 371. t. 5. f. 463. *O. corpore lato,*  
*pedibus natatoriis, cauda utraque bifida.*  
*Gron. zooph.* 994. t. 17. f. 2.  
*Habitat in Oceano.*  
*Simillimus O. Asello, ut nisi locus diffunderet, facile*  
*idem judicaretur.*
- affimilis. 13. *O. ovalis, cauda obtusa mutica.*  
*Baster. subs.* 2. p. 144. t. 13. f. 3.  
*Habitat in O. Europeo.*  
*Simillimus O. Asello, sed absque stylis.*
- Asellus. 14. *O. ovalis, cauda obtusa, stylis simplicibus.* *Fn. suec.*  
2058.  
*Scop. carn.* 1142.  
*Matth. diosc.* 257.  
*Raj. inf.* 41. n. 1.  
*Aldr. inf.* 632.  
*Mouff. inf.* 202.  
*Schæff. elem.* t. 92.  
*Gron. zooph.* 993.  
*Saltz. inf.* t. 24. f. 154.  
*Geoffr. paris.* 670. t. 22. f. 1. *Oniscus* 2.  
*Habitat in Domibus, Muris, Hybernaculis, lignis putridis.*

Armadil- 15. O. ovalis, cauda obtusa integra. *Fn. suec.* 1059.\*  
10. *It. goth.* 298.

*Scop. carn.* 1144.

*Raj. inf.* 42. A. lividus.

*Geoffr. parif.* 670. Oniscus 1.

*Habitat in Europa sub lapidibus.*

*Pedes plures quam quatuordecim; Segmenta corporis*  
*10, præter caput & caudam.*

273. SCOLOPENDRA. *Pedes* numerosi, totidem  
utrinque quot corporis  
segmenta.

*Antennæ* setaceæ.

*Palpi* duo, articulati.

*Corpus* depressum.

Lagura. 1. S. pedibus utrinque XII, corpore ovali, cauda peni-  
cillo albo. *Fn. suec.* 1063.\*

*Scop. carn.* 1153.

*Geoffr. parif.* 2. p. 677. t. 22. f. 4.

*A&F. parif. miss.* 1. p. 532. t. 17. f. 4-10.

*Habitat in Suecia sub muscis.*

coleoptra-2. S. pedibus utrinque XIV, thorace coleoptrato.

12. *Habitat in Hispania. D. Z. Hallman.*

*Antennæ* flavæ, longitudine corporis. *Corpus* figura S  
forficatæ, sed longius, segmentis 8, singulis testis  
clypeolo semiorbiculato, postice emarginato. *Elytron*  
simplex, tanquam ex duobus coadunatum, postice e-  
marginatum, incipiens ad quartum segmentum corporis,  
tegens unum tantum alterumve segmentum. *Ala* sub  
elytro angustæ, simplices. *Pedes* 14 paribus, ultimis  
longitudine ferme corporis. *Femora* aculeata. *Tibia*  
scabræ. *Digitus* articulis innumeris.

forficata. 3. S. pedibus utrinque XV. *Fn. suec.* 1064.\*

*Scop. carn.* 1146.

*Raj. inf.* 45.

*Mouff. inf.* 199.

*Aldr. inf.* 635.

*Salz.*

---

*Scolopendræ pulli f. Larvæ pedibus paucioribus instructi.*



*Sulz. inf. t. 24. f. 155.*

*Geoffr. paris. 2. p. 674. t. 22. f. 3.*

*Schæff. elem. t. 111. f. 1.*

*Habitat in Europa; in America septentrionali. Kalm.*

*gigantea.* 4. *S. pedibus utrinque XVII.*

*Brown. jam. 426. t. 42. f. 4. Sc. maxima pedibus 36.*

*Gron. zooph. 1004. \**

*Habitat in America.*

*Sequenti multo major, sed simillima.*

*morsitans.* 5. *S. pedibus utrinque XX. Amœn. acad. 1. p. 325, 506.*

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 89.*

*Olear. mus. t. 12. f. 5.*

*Pet. gaz. t. 13. f. 3.*

*Leuwenh. epist. 102.*

*Bradt. nat. t. 25. f. 4.*

*Seb. mus. 1. t. 81. f. 3, 4.*

*2. t. 25. f. 3, 4.*

*Frisch. inf. 11. t. 2. f. 7.*

*Catesb. car. 3. p. 2. t. 2.*

*Gron. zooph. 1002.*

*Marcgr. bras. 253. Japuruca.*

*Habitat in Indiis.*

*Oculi utrinque quaterni. Articuli corporis 22, antennarum 20.*

*ferruginea.* 6. *S. pedibus utrinque XXII.*

*Habitat in Africa.*

*Corpus rufum s. ferrugineum segmentis 20, præter caput. Pedes lutei.*

*Gabrielis.* 7. *S. pedibus utrinque CXLVIII.*

*Habitat in Gallia. Fr. Gabriel Baro, massiliensis Capueinus.*

*Facies S. electricæ, sed quadruplo major. Antennæ breves articulis 14. Cauda semiovalis cum appendiculo & tentaculis 2 vix cauda longioribus.*

*electricæ.* 8. *S. pedibus utrinque LXX. Fn. suec. 1065. \**

*Aldr. inf. 636. f. 8.*

*Frisch. inf. 11. t. 8. f. 1.*

*Raj. inf. 45.*

*Geoffr. paris. 2. p. 676. n. 2.*

Y y 2

*Habi-*

*Habitat in Europæ terrâ, in tenebris manifeste scintillat vel per se lucet.*

*Pedes numeratu difficiles, 46 ad 54. Solander.*

phospho- 9. *S. pedibus utrinque LXXVI.*  
rea.

*Habitat in Asia, noctu instar Lampyridis ignita ex alto cælo decidua in navem, in mari indico & æthiopico, 100 miliaribus a continente. (An alata uti 2?)*

*Car. Gust. Ekeberg vidit, excepit, delineavit.*

*Caput ovatum, flavescens, exaratum lineis 2 & una transversali. Corpus crassitie pennæ passerinæ, filiforme, digito longius, purpurascens, lineis duabus flavis parallelis, constans segmentis 72. Antennæ articulis 14, subulata, ferrugineæ.*

occiden- 10. *S. pedibus utrinque CXXIII.*  
talis.

*List. it. 1699. t. 6.*

*Habitat in America.*

*Corpus semipedale, ferrugineum, convexiusculum. Antennæ articulis 14.*

marina. 11. *S. pedibus utrinque . . . corpore pallido: linea dorsali rufa. It. wgoth. 191.*

*Habitat in Oceano Atlantico.*

*Corpus rubrum (unde Rædaat), Norvegis frequentissimam, Clupearum Harengarum esca, unde abdomen piscium rufescit & corpus brevi pubescit, nisi saltem per biduum relinquantur pisces retibus illaqueati in mari. Strøm.*

274. JULUS. *Pedes numerosi, duplo utrinque plures, quam corporis segmenta.*

*Antennæ moniliformes.*

*Palpi duo, articulati.*

*Corpus semicylindricum.*

ovalis. 1. *J. pedibus utrinque XX. Amæn. acad. 4. p. 253. n. 36. t. 3. f. 4.\**

*Gron. zooph. 995. t. 17. f. 4, 5.\* Oniscus.*

*Habitat in O. Europæo.*

*Segmenta corporis oblongo-ovalis 10, præter thoracis & cauda.*

2. *J.*

- erassus. 2. J. pedibus utrinque LXXX. *Amœn. acad.* 4. p. 253.  
*n.* 35. \*  
*Habitat in Asia; Carolina.*  
*Varietas Carolina segmentis 49 præter caput, & Pedibus 80 ad 88 tantum. Ad latera puncta nigra, in singulo segmento, utrinque singula.*
- terrestris. 3. J. pedibus utrinque C. *Fn. succ.* 2066. \*  
*Scop. carn.* 1152.  
*Mouff. inf.* 30.  
*Raj. inf.* 46. *n.* 4.  
*Aldr. inf.* 636. f. 4.  
*Frisch. inf.* 11. t. 8. f. 3.  
*Fonst. inf.* t. 23.  
*Sulz. inf.* t. 24. f. 156.  
*Geoffr. paris.* 67. f. *n.* 1.  
*Gron. zooph.* 1007.  
*Habitat in Europa sub terra.*
- complanatus. 4. J. pedibus utrinque XXX, compore planiusculo, antennis clavatis. *Fn. succ.* 2068. \*  
*Scop. carn.* 1150. *Scolopendra julacea.*  
*Pod. inf.* 127. *Julus scolopendricus.*  
*Habitat in Europa.*
- fabulosus. 5. J. pedibus utrinque CXX. *Fn. succ.* 2067.  
*It. goth.* 280.  
*Geoffr. paris.* 679. *n.* 2. t. 22. f. 5.  
*Raj. inf.* 47.  
*Schæff. elem.* t. 73.  
*Habitat in Europæ fabulosus.*  
*Corpus segmentis 50, substriatis segmento ultimo acumine prominente.*
- indus. 6. J. pedibus utrinque CXV. *Mus. Ad. Fr.* 1. p. 90.  
*M. L. U.* 462. \*  
*Gron. zooph.* 1008.  
*Amœn. acad.* 1. p. 324. *Scolopendra pedibus 96.*  
*Seb. mus.* 1. t. 81. f. 5. & 2. t. 24. f. 4, 5.  
*Pet. gaz.* t. 74. f. 3.  
*Habitat in Indiis.*  
*Segmenta corporis 57.*
- fuscus. 7. J. pedibus utrinque CXXIV. *Amœn. acad.* 4. p. 253. *n.* 34. \*

*Seb. musf. 2. t. 24. f. 4, 5.*

*Habitat in Indiis.*

*Segmenta corporis 62, præter thoracis & cauda.*

**maximus. 8.** *J. pedibus utriusque CXXXIV.*

*Marcgr. bras. 255. Vermis terrestris.*

*List. it. 1699. t. 5.*

*Habitat in America.*

*Segmenta corporis 67, præter thoracis & cauda.*

*Species tres ultimæ inter se nimis affines.*



## ADDENDA.

**paracensis. 1.** **CHRYSOMELA** cylindrica, elytris flavis: linea punctisque tribus nigris.

*Habitat in Lusitania.*

*Minor. Supra flava tota. Thorax nigro variegatus.*

*Elytra linea nigra; sutura dorsali parallela, elytro brevior; puncta 3 nigra longitudinaliter extra lineam disposita. Pedes testacei: macula nigra in femore.*

**lusitanica. 2.** **CHRYSOMELA** oblongiuscula testacea, capite pedore pedibusque nigris.

*Habitat in Lusitania.*

*Habitus Chr. tridentata.*

**singularis. 3.** **CURCULIO** subbrevisrostris cinereus, elytris striis punctatis: punctis excavatis centro eminentibus.

*Habitat in Lusitania.*

*Mediæ magnitudinis. Corpus cinereum. Elytra levissime striata striis e punctis excavatis, sed singula puncta gerunt in medio punctum elevatum cinereum. Femora clavata.*

**carinatus. 4.** **CURCULIO** subbrevisrostris niger, thorace subcarinato, elytris angulatis tuberculatis.

*Habitat in Lusitania.*

*Similis C. barbaro, sed quadruplo minor. Thorax inæqualiter excavato-punctatus, rotundatus, dorso levissime carinatus, quo distinguitur. Elytra tuberculis copiosissimis & angulis 2. f. 3.*

5. SE-

**lusitanus.** 5. CERAMBYX thorace spinoso, corpore toto testaceo, elytris fascia undulata pallida.

*Habitat in Lusitania.*

Corpus magnitudine *Culicis*, totum testaceum, etiam Pedibus antennisque, subcylindricum. Thorax utrinque spina minutissima. Antennæ ferrugineæ, corpore paulo longiores. Elytra in medio fascia obsoleta, pallida, lineari, repanda.

**balticus.** 6. CERAMBYX thorace spinoso, corpore ferrugineo, abdomine ovato: elytris fascia nigricante.

*Habitat in Lusitania.*

Corpus magnitudine *Culicis*, totum ferrugineum. Antennæ corpore vix longiores. Thorax obscurius ferrugineus spina utrinque minutissima. Abdomen gibbum, ovatum, obtusum. Elytra ferruginea, in medio fascia lata, nigra, margine postico albo repando.

**punctatus.** 7. CERAMBYX thorace mutico subcylindrico, totus viridis punctis nigris, antennis mediocribus.

*Habitat in Lusitania.*

Similis *C. scalaris*, totus viridis. Antennæ nigrae, longitudine corporis. Thorax punctis nigris 8. Elytra singula punctis 6 nigris. Abdomen utrinque punctis nigris.

**massiliensis.** 8. LEPTURA thorace subgloboso nigra, elytris fasciis subtribus albis introrsum fractis.

*Habitat in Lusitania. Massiliæ.*

Corpus facie *Lept. mystica*, sed triplo minus, totum nigrum. Elytra picta fasciis linearibus, tribus, omnibus antrorsum fractis, ut in *Leptura arietis*, sed albis, quarum ultima obsoleta, ad ipsum apicem elytrorum. Sub collo & thorace macula nivea. Abdominis incisura margine laterali alba.

**socialis.** 9. ELATER fuscus, antennis elytrorumque marginibus ferrugineis.

*Habitat in Lusitania.*

Magnitudo *E. pectinicornis*, totus fuscus. Elytra tenuissime striata, margine tam exteriori quam interiori ad suturam longitudinalem rufo s. ferrugineo.

**manca.** 10. BUPRESTIS aurata, thoracis lineis duabus elytrisque fuscis.

*Habitat Monspelii; in Lusitania.*

Y y y 4

Inter

Inter minores numeranda, oblongiuscula, tota sub-  
tus nitidissime aurea. Frons virescens. Thorax  
fulgide aureus, sed lineis 2 latis nigris. Elytra fu-  
sca vix aureo interlucentia. Antennæ nigrae, sub-  
ferratae.

Gouani. 11. MELOE alatus ater, elytris fascia apiceque san-  
guineis.

*Habitat in Gallia.*

Magnitudo *Pediculi*. Antennæ moniliformes. Thorax  
articularis, lateribus deflexus, atro-cærulescens. E-  
lytra atra: fascia lata, rubra, in medio transversa;  
apices elytrorum itidem rubri. Caput inflectit.

Antio- 12. PAPILIO *Heliconius* alis oblongis cærulescenti-atris:  
chus. primoribus fasciis duabus albis.

*Ebret. pict. t. 1.*

*Habitat in Indiis.*

Statura & Magnitudo *P. Ricini*. Alæ concolores. Pri-  
mores supra cærulescenti-atra; subtus nigra. Fa-  
scia utrinque 2 alba: altera in medio; altera ver-  
sus apicem. Sub basi primorum linea flavescentis.  
Posticæ utrinque atra, immaculata, supra cærule-  
scents; subtus basi punctis 2 lineolaque brevi sangui-  
neis; margo omnium tenuissime albus. Figura *Ebre-  
tii* aque hanc ac *P. Ricini* exprimit.

ruffa. 13. PHALÆNA *Attacus* alis albidis: macula dorsali lu-  
nulisque posticis sex fuscis.

*Habitat in Europa australi.*

Corpus magnitudine *Tabani*. Alæ superiores deflexæ,  
latiusculæ, albida: macula communis dorsalis pone  
thoracem fusca, a qua versus latera descendit umbra  
subferruginea, juxta marginem posticum lunula 6,  
obsoleta fusca. Alæ inferiores albae, ad marginem  
posticum fusca. Pedes & Antennæ pectinatae, fusca.

decora. 14. PHALÆNA *Noctua* subspirilinguis, alis superiori-  
bus albo nigroque variegatis: inferioribus rubris mar-  
gine nigro. *M. L. U.* 382. \*

*Pet. mus. t. 58. f. 7. Cape Diana.*

*Habitat ad Cap. b. Spei.*

Alæ superiores rubro albo cærulescente atroque varie-  
gata: maculis aliquot rotundatis rubris & albis:  
margo posticus punctis septem oblongis, albidis. Ma-  
gnitudo media.

CLAS-

# CLASSIS VI.

## VERMES.

*Mibi contuenti sese persuasit rerum Natura  
nihil incredibile existimare de ea.*

Plin. XI: 3.

**TARDIGRADA**, mollia, pandentia, vivacissima, redintegrandā, humidi Animantia, *acephala*, *apoda*, *androgyna*, *Tentaculis* dignoscenda.

**IMPERFECTA** veteribus, nec inepte, dicta animantia, destituntur Capite, Auribus, Naso, Oculis pleraque (a), Pedibus, ab Insectis itaque diversissima; a quibus dudum removi naturæ cryptogamae sunt *Intestina*, *Mollusca*, *Testacea*, *Lithophyta*, *Zoophyta*.

**INTESTINA** terrena quondam dicta, ob summam simplicitatem corporis, terebrant omnia; perforat *Gordius* Argillam, ut aqua tranet; *Lumbricus* Humum, ne situ corrumpatur; *Myxine* Cadavera, ut liquecant; *Teredo* Ligna, ut destruantur; quemadmodum *Pholades*, & *Mytili* lithophagi Petras, ut solvantur.

**MOLLUSCA** nuda, brachiata, vagantur pleraque per maria, cœlo resplendentia, tanquam totidem lucernis tenebricosum illuminant abyssum Phosphorea, ut quod est inferius, sit tanquam superius.

**TESTACEA** mollusca domiporta, calcareaque domuncula nobilitata, calcifica, & ipsa sæpe calcivora, insectis opposita

Y y y 5

specie-

(a) Vermium genus omne oculis caret; Plin. nisi forte *Sepia* ejusque *Cymbium*. *Limaces* videntur etiam oculis instructi, modo veri sint oculi, a nostris certe diversi.

specierum numero, magna Naturæ ludentis varietate (b), multiplicata. TESTAS polydædalas Conchyliorum parium, æque attente legiti summa sapientia, ac care emit erudita luxuria, a quisquiliis (c), ad Ammirales, Scalaresve, Margaritis (d) suis pretiosiores, quas Artificum politura vitando nobilitat, ut pulchrius pateat in Tritonis COCHLEIS vividis ad *Umbilicum* aut *Caridinem*, posticum *Aperitura* rarius *Operculo* clausilis, cum *Labro* exteriori interioreve, sæpe dentato ad *Columellam*, circa quam *Spira* *Anfractus* sinistri, rarius contrarii dextri, *sutura* connexi, rarius *Varice* cincti; læves, sulcati, striati, angulati, nodosi, aculeari, spinosi, frondosi usque in *Mucronem* apicis, rarius decollatum; & ut intueatur in Veneris CONCHIS vividis lectis testarum nativa paria, determinatam figuram, valvulas illarum sinistras & dextras, æquales l. inæquales, æquilateres l. inæquilateres; interius dentatos *Cardines* inter *Nates* infimos *Umbonum* tumentium; inferius *Ani* impressuram, antè *Vulvæ* rimam, *Labiis* *Nymphisque* conniventem, *Hymene* obtectam, *Pube* interdum cinctam; harum *Limbus* exterior circumscribitur *Margine* integerrimo, crenulato s. dentato: *superiore* ante vulvam; *posteriore* pone anum; *exteriore* natibus opposito. Meretur imprimis inquirere in fossilium hodie deperditorum protypa, imprimis *Anomiarum*, abyssi cimelia, cum alia sint *Terræstria*, *Fluvialia*, *Lacustria*, *Littorea*, *Maritima*, *Pelagica* alia.

**LITHOPHYTA** Mollusca, animalcula composita testarum, Testisque innixa. *Corallia* hæc præci plantæ aëris contactu lapidescentes judicabant, sed recentioribus etiam ex suo femine Lapidis germinare, imprimis ob calcaream horum indolem visa, usque dum *Marfiglii* diligentia extraxerat e mari *Corallia* vegetantia floribus octandris octopetalis, a contractu aëris se contrahentibus, inque aqua de novo expandendis; at eadem tempestate (1727) *Peyssonellus* Coral-

- (b) Plin. IX: 33. Tot Colorum differentia, tot Figuræ planis, concavis, longis, lunatis, in orbem circumactis, dimidio orbe casis, in dorsum elatis, lævibus, rugatis, denticulatis, striatis, vertice muricatum indorto, margine in mucronem emisso, foris effuso, intus replicato; jam distinctione virgulata, cincta, crispata; canaliculatum, pectinatum, imbricatum undata; cancellatum reticulata; in obliquum, in rectum expansa, densata, porrecta, sinuata, brevi nodo ligatis, toto latere connexis, ad planum apertis, ad buccinum recurvis: vide Bonanni, Rumphii, Kleinii explicationem.

(c) Speculatiæ - gods vulgo.

- (d) Margaritarum dos in Candore, Magnitudine, Orbe, Lævitate, Pondere, Plin. IX: 35. Pretiosissima Cleopatræ Antonio exposita, ibid.



Corallia ex animulculis fabricar, ultra seculum post eandem apud sapientiores indos ratam sententiam (e), primum vidit vix audiendus, nisi *Tremblans* (1741) Hydras omnium admiratione detexisset, & ad littora curiosos alluisset, quo via per *Ellisi* Sertularias ad Corallia aperta fuit (f).

ZOOPHYTA composita Animalcula, in bivio Animalium Vegetabiliumque constituta, *radicata* (pleraque) *caulescunt* multiplicata vita *ramis*, *gemmis* cæduis, metamorphosique *florum* animantium, sponte sese moventium, in *capsulas* *feminiferas* transeuntium; ac si plantæ essent Zoophyta, sensu motuque destituta; & Zoophyta veræ plantæ, sed systemate nerveo, sensus motus queorgano instructæ (*equidem bis inesse sensum, quæ nec animalium, nec fruticum, sed tertiam ex utroque naturam habent. Plin. (g), adeoque Vegetabilia naturali metamorphosi mutanda in Animalia.*

AUCTORES Vermium pretiosi: INTESTINORUM vix ulli; MOLLUSCORUM præter *Bobadschium* pauci; TESTACEORUM primarii: sobrius *Bonannus* 1681, ditissimus *Listerus* 1685, solidissimus *Rumphius* 1705, curiosissimus *Petiverius* 1702, absolutissimus *Gualtierus* 1742, nitidissimus *Argenville* 1742, omniumque pulcherrimus *Regenfusus* 1758 (h), nec non *Columna*, *Barrelierus*, *Planccus*, *Kleinus*, *Ginannus*, *Adansonus*, infelicique partu *Seba* 3. alii. LITHOPHYTORUM Comes *Marsiglius*, oculatus *Donatus*. ZOOPHYTORUM lynceus *Ellisius*, indefessus *Basternus*.

GENE.

(e) *Rumph. mus.* 152 ad tab. 16. F.

(f) *Amoen. acad.* 5. p. 350.

(g) *Ibid.*

(h) *Regenfusii operis commentatore Cl. Kratzensteinio, S. Sprenglero vidi tantum tabulas XII primas, dum hæc edo, nec quidquam pulchrius.*

# GENERUM Characteres.

## I. INTESTINA Animalia simplicia, nuda, destituta artubus.

\* *Pertusa laterali poro.*

277. LUMERICUS *Corpus teres, annulo carnosio.*  
 279. SIPUNCULUS *Corpus teres, rostro cylindrico angustato.*  
 278. FASCIOLA *Corpus depressum, poro ventrali.*

\* \* *Imperforata poro laterali nullo.*

275. GORDIUS *Corpus filiforme totum.*  
 276. ASCARIS *Corpus teres, extremitatibus subulatum.*  
 280. HIRUDO *Corpus teretiusculum, extremitatibus truncatum.*  
 281. MYXINE *Corpus carinatum, ore cirroso maxilloso.*

## II. MOLLUSCA.

*α* \* *Ore supero, basi se affigens.*

288. ACTINIA *Apertura unica, communi, dilatabili.*  
 287. ASCIDIA *Aperturis duabus: altera humiliore.*

*β* \* *Ore antico; Corpore pertuso laterali foraminulo.*

282. LIMAX *Tentacula 4. Anus communis cum poro laterali.*  
 283. APLYSIA *Tentacula 4. Anus supra postica.*  
 284. DORIS *Tentacula 2. Anus supra postica.*  
 289. TETHIS *Foramina lateralia, sinistra, gemina.*

*γ* \* *Ore antico, Corpore tentaculis antice cincto.*

290. HOLOTHURIA *Tentacula carnosæ.*  
 292. TEREbella *Tentacula capillaria.*

*δ* \* *Ore antico, Corpore brachiato.*

292. TRITON *Brachia bipartita: quibusdam cheliferis.*  
 296. SEPIA *Brachia 8. s. 10: instructa corylis.*  
 295. CLIO *Brachia 2, dilatata.*  
 293. LERNÆA *Brachia 2. s. 3, teretia.*  
 294. SCYLLÆA *Brachia 6: remotis paribus.*

*ε* \* *Ore antico; Corpore pedato.*

285. APHRODITA *Os inerme. Corpus ovale.*  
 286. NEREIS *Os unguiculatum. Corpus elongatum.*

*ζ* \* *Ore*

---

*Vagientem etiamnum in castris Scientiam, a matre lactante longius remotam, ne  
 morientur adultiores.*

2 \* *Ore infero centrali.*

297. MEDUSA      *Corpus gelatinosum, æve.*  
 298. ASTERIA      *Corpus coriaceum, muricatum.*  
 399. ECHINUS      *Corpus crustaceum, aculeatum.*

## III. TESTACEA Mollusca simplicia, oblecta Testa calcarea.

\* *Multivalvia.*

300. CHITON      *Testa multivalvis, longitudinaliter dorsalis.*  
 301. LEPAS      *Testa multivalvis, inæquivalvis, sessilis.*  
 302. PHOLAS      *Testa bivalvis: accessoriis posticis.*

\* \* *Bivalvia: CONCHÆ.*

303. MYA      *Testa Cardines Dente crasso vacuo.*  
 304. SOLEN      *Card. Dent. lateralibus remotis.*  
 305. TELLINA      *Card. Dentibus lateralibus alterius vacuis.*  
 306. CARDIUM      *Card. Dent. lateralibus remotis penetrantibus.*  
 307. MACTRA      *Card. Dent. intermedio complicato.*  
 308. DONAX      *Card. Dent. laterali remoto vacuo.*  
 309. VENUS      *Card. Dent. approximatis divaricatis.*  
 310. SPONDYLUS      *Card. Dent. duobus distinctis foraminulo.*  
 311. CHAMA      *Card. Dent. duobus obliquis obtusis.*  
 312. ARCA      *Card. Dent. numerosis penetrantibus.*  
 313. OSTREA      *Card. Dent. o. scrobiculo ovato.*  
 314. ANOMIA      *Card. Dent. o. scrobiculo lineari marginali.*  
 315. MYTILUS      *Card. Dent. o. scrobiculo subulato distincto.*  
 316. PINNA      *Card. Dent. o. margine altero coalito.*

\* \* \* *Univalvia Spira regulari: COCHLÆ.*

317. ARGONAUTA      *Testa unilocularis: Animal Sepia.*  
 318. NAUTILUS      *Testa multiloculari foramine communicante.*  
 319. CONUS      *T. Apertura effusa, lineari, edentula.*  
 320. CYPRÆA      *T. Apertura effusa, lineari, dentata utrinque.*  
 321. BULLA      *T. Apertura subcoarctata, obliquata.*  
 322. VOLUTA      *T. Apertura effusa, columella plicata.*  
 323. BUCCINUM      *T. Apertura Canaliculo dextro.*  
 324. STROMBUS      *T. Apertura Canaliculo sinistro.*  
 325. MUREX      *T. Apertura Canaliculo recto.*  
 326. TROCHUS      *T. Apertura coarctata, subtetragona.*  
 327. TURBO      *T. Apertura coarctata, orbiculari.*  
 328. HELIX      *T. Apertura coarctata, lunari.*  
 329. NERITA      *T. Apertura coarctata, semiorbiculari.*  
 330. HALIOTIS      *T. Apertura dilatata, pertusa.*

\* \* \* \*

\* \* \* \* *Univalvia absque spira regulari.*

331. PATELLA *T. patenti-conica, quiescens.*  
 332. DENTALIUM *T. libera, subulata, utroque extremo aperta.*  
 333. SERPULA *T. adnata, tubulosa.*  
 334. TEREDO *T. intrusa ligno.*  
 335. SABELLA *T. granis arenaceis confecta.*

### III. LITHOPHYTA. *Animalia composita, inædificantia basin calcaream.*

336. TUBIPORA *Corallium Tubis cylindricis.*  
 337. MADREPORA *Corallium Stellis concavis.*  
 338. MILLEPORA *Corallium Poris subulatis.*  
 339. CELLEPORA *Corallium Cellulis cavis.*

### ZOOPHYTA. *Animalia composita efflorescentia more vegetabilium.*

\* *Fixata.*

340. ISIS *Stirps lapidea.*  
 341. GORGONIA *Stirps subcornea.*  
 342. ALCYONIUM *Stirps suberosa.*  
 343. SPONGIA *Stirps stuposa.*  
 344. FLUSTRA *Stirps porosissima.*  
 345. TUBULARIA *Stirps fistulosa.*  
 346. CORALLINA *Stirps articulis filiformibus, calcareis.*  
 347. SERTULARIA *Stirps articulis filiformibus, fibrosis.*  
 348. VORTICELLA *Stirps articulis fibrosis gelatinosis.*

*Locomotiva.*

349. HYDRA *Os terminale cinctum tentaculis.*  
 350. PENNATULA *Liberum, caulescens, penniforme margine foliolifero.*  
 351. TANIA *Liberum, articulatum, moniliforme.*  
 352. VOLVOX *Liberum, subrotundum, sobole nidulante.*  
 353. FURIA *Liberum, lineare, retrorsum aculeatum.*  
 354. CHAOS *Liberum redivivum, metamorphum in vegetante.*

---

*Admiranda tibi levium spectacula rerum.*

Virg.

---

I. IN.

## I. INTESTINA.

*Animalia simplicia, absque artubus, nuda.*

275. GORDIUS. *Corpus filiforme, æquale, læve.*

aquaticus. 1. G. pallidus extremitatibus nigris. *Fn. suec.* 2068. \*

*It. gussl.* 282. Gordius.

*Gesn. aqu.* 463. Vitulus aquaticus.

*Aldr. inf.* 720. t. 765. Seta f. Vitulus aquaticus.

*Jonst. inst.* t. 25. Meerwijn.

*Habitat cum sequenti in Aquis, & imprimis in Argilla, quam tranat uti piscis aquas, scaturiginum plurimum auctor. Morsuram hujus excitare Paronychiam, rusticorum communi effato, nuper confirmatum autopsia S. Rinmanno.*

argilla- 2. G. flavescens extremitatibus concoloribus. *Fn. suec.*  
ceus. 2069. \*

*Habitat in Argilla, proprio suo elemento, quam ubique tranat, adeoque ubi illa foditur frequens.*

medinen- 3. G. totus pallidus. †

*Sloan. jam.* 2. p. 190. t. 233. f. 1. Vena Medini.

*Kamph. amoen.* 524. Dracunculus persiarum.

*Velsch. monogr.* Vena medinentis.

*Habitat in utraque India, frequens in rore matutino, inde intrans nudipedes obambulantes servos, dolorem febremque excitans, caute extrahendus. Inuso Mercurii sublimati corrosivi Swietenii intra 20 dies, qui alias intra 40, educitur.*

marinus. 4. G. plano-spirali convolutus filiformis.

*Aff. Stockh.* 1760. p. 306. Lepra piscium.

*Ström. fündm.* 194. Queise.

*Habitat in Maris Norvegici &c. piscibus, frequentissime in visceribus Clypeæ Halecis, intra pustulam, unde Lepra Piscatorum Martini, vid. Diff. nostr. de Lepra.*

*Hæret semper in plano spirali, albus, lavis, pollicis  $\frac{1}{2}$  longitudine, apice vix attenuatus.*

5. G.

lacustris. 5. *G. plano-spirali convolutus utrinque attenuatus.*

*Habitat in Hepate Efocis Luci, aqua dulcis.*

*Similis precedenti, albus, levis, in spiram planam convolutus, sed duplo longior & utraque extremitate attenuatus more Ascaridis.*

## 276. ASCARIS. Corpus teres, filiforme, utraque extremitate attenuatum.

vermicularis 1. *A. pollicaris. Fn. suec. 1269.*

*Phelsum. monogr. Leovard. 1762. oct. t. 3. Ascarides.*

*Habitat in Paludibus; in Radicibus plantarum putrescentium; in intestino recto Puerorum, Equorum; vesperi inquietus; extractus salit.*

*Corpus lin. 5, teres, rugis annularibus vix conspicuis, utrinque attenuatum, antice obtusius; postice exquisite attenuatum; pone apicem anteriorem ruga annularis profundior & ad ipsum hujus apicem. Os transversum.*

lumbricoides. 2. *A. spithamea.*

*Habitat in Intestinis humanis, longitudine Lumbrici terrestris, sed annulo elevato destitutus, adeoque a Lumbrico distinctissimus.*

*Corpus teres, utraque extremitate subulatum, cauda tamen subtriquetra.*

## 277. LUMBRICUS. Corpus teres, annulatum, cingulo elevato cinctum, longitudinaliter exasperatum, poro laterali instructum.

terrestris. 1. *L. trifariam retrorsum aculeatus. Fn. suec. 2073.*

*Aldr. inf. 693. Lumbricus terrestris.*

*Rbed. exper. quart. t. 15. f. 1.*

*Sloan. jam. 2. p. 189. Lumbricus terrestris minor rubicundus.*

*Raj. inf. 2, Lumbricus terrestris minor.*

*β. Raj. inf. 1. Lumbricus major.*

*γ. Raj. inf. 2. Lumbricus intestinum teres.*

*Vallis. nat. 1. t. 3. Lumbricus humanus.*

*Ha-*

*Habitat in Humo, quam bibulam reddit; cotyledones plantarum consumit; exit supra terram tempore nocturno pro copula. Pellitur Fuligine, Vino; effoditur a Nasua, Talpa, Erinaceo, Gallina, Grece.*

Major  $\beta$ . a vulgari solo pinguiore variare, nec specie differre creditur.

Intestinalis  $\gamma$ , intra intestina tenuiora puerorum frequens, albus, specie non differre numerus annulorum aculeorum docet; Expellitur Spigelia, Aqua Calcis, Pisseleo, Pice liquida; Sem. Fœnigrac. Saponarie, Hyperici, Scrophulariæ, Cinæ, Nigellæ, Lupini.

Corpus teres, pone anulum carnosum lente planiusculum, segmentis annularibus 100; segmenta 26-30 connata in anulum carnosum. Os subrostratum infra segmentum primum. Aculei utrinque bini, alter supra alterum, sub singulo segmento corporis, excepto annulo, omnes caudam respicientes. Pori 3 utrinque in annulo; 2 ad segmentum duodecimum, & 2 ad decimum quintum: sub copula junguntur pori segmenti 12 cum 25 alterius. Abr. Ar. gil-lander.

marinus. 2. L. papillis dorsalibus geminatis setigeris. *It. wgoth.* 189. t. 3. f. 6. *It. scan.* 315. *Fn. suec.* 2074. \*  
Bell. aqu. 444. Lunbricus marinus.  
*Habitat in M. Europæi fundo, sub arena.*

## 278. FASCIOLA. Corpus planiusculum: poro terminali ventralique.

hepatica. 1. F. ovata. *It. goth.* 182, 250. *Faun. suec.* 2075. *Aman. acad.* 2. p. 86. *Limax ovatus lividus* marginæ acuto, p. 185, 186.

*Ræf. app.* 1. p. 199. t. 32. f. 5.

*Schaff. monogr.* 1753. f. 1-17.

*Habitat in aquis dulcibus, fossis, rivulis ad radices lapidum raro enatans inque Hepate Ovium; muria pellenda.*

Corpus magnitudine seminis Peponis minoris, ovatum, antrorsum acuminatum ore poro eminente; in medio macula albida, oblonga, a qua versus utramque extremitatem linea pallida extenditur; in latere inferiore,

*riore, ubi corpus coarctatur versus os, alter porus est.*

intestina- 2. *F. linearis longa. Fn. suec. 2076.*  
lis. *Syst. nat. 6. p. 70. t. 6. f. 1.*

*Amœn. acad. 2. p. 71.*

*Act. Stockh. 1747. t. 5. f. 6.*

*Plater. prax. 993. Ligula intestinorum.*

*Habitat in Intestinis Piscium, sepius in Bramæ. Hanc in Brama cocta mensa apposita etiamnum vivam vidit Nobiliss. D:s Nic. Rosen, Collega noster Clarissimus. Diversa toto cœlo a Tæniis, nec articulata, nec composita.*

barbata. 3. *F. ore papillis fasciculato. Fn. suec. 2077.*

*Pall. zooph. 415. Tænia hæruca.*

*Habitat in Intestinis Sepiæ Loliginis Norvegiæ. Martin.*

279. SIPUNCULUS. *Corpus teres, elongatum.*  
*Os anticum, attenuatum, cylindricum.*  
*Apertura lateralis corporis, verruciformis.*

nudus. 1. *S. corpore nudo.*

*Gesn. aquat. 1026. Vermis macrorhynchopterus Rondeletii 2.*

*Bohad. mar. 93. t. 7. f. 6, 7. Syrinx.*

*Habitat in Oceano Europæo, sub lapidibus.*

saccatus. 2. *S. corpore tunica laxa induto.*

*Amœn. acad. 4. p. 454. t. 3. f. 5. Nereis sacculo induta.*

*Gesn. aquat. 1026. Vermis macrorhynchopterus 1.*

*Habitat in Oceano indico.*

*Structura resert antecedentem, præter cutim membranaceam laxam, diaphanam, qua animal includitur.*



280. HIRUDO. *Corpus* oblongum, promovens se ore caudaque in orbiculum dilatandis.

- indica. 1. *H. depressa fusca*: striis transversis muricatis centum.  
*Habitat in India Orient. marinis.*  
*Corpus valde depressum. Striae annulares expansae elevatae. Os admodum dilatatum.*
- medicina- 2. *H. depressa nigricans*, supra lineis flavis sex: intermediis nigro arcuatis, subtus cinerea nigro maculata.  
*Fn. suec. 2079.*  
*Bergm. act. Stockh. 1757. p. 308. n. 4. t. 6. f. 1, 2.*  
*Gesn. pisc. 425. t. 425. Hirudo major & varia.*  
*Raj. inf. 3. Hirudo medicinalis.*  
*Habitat in Aquis dulcibus, praestantissimus Phlebotomus, imprimis Hemorrhoidum.*  
*Monographia Dissert. nostra de Hirudine.*
- sanguisuga. 3. *H. depressa fusca*: margine laterali flavo. *Fn. suec. 2078.*  
*Bergm. act. Stockh. 1757. p. t. 6. f. 3, 4.*  
*Raj. inf. 3. Hirudo maxime vulgaris.*  
*Habitat in Aquis dulcibus.*
- oculata. 4. *H. depressa fusca*, punctis octo nigris supra os. *Fn. suec. 2080.*  
*Bergm. act. Stockh. 1756. p. 199. & 1757. t. 6. f. 5-8.*  
*Habitat in Aquis dulcibus.*  
*Ovum patelliforme, ovale, intus compositum, simile Cocco: Fn. suec. 1. n. 727. Coccus aquaticus.*
- stagnalis. 5. *H. depressa nigra*, abdomine subcinereo. *Fn. suec. 2081.*  
*Bergm. act. Stockh. 1757. t. 6. f. 9-11. Hirudo bioculata.*  
*Habitat in Aquis dulcibus.*
- complanata. 6. *H. depressa ovato-oblonga*: interaneis fuscis pinnatis pellucetibus. *Fn. suec. 2082.*  
*Bergm. act. Stockh. 1757. p. 313. t. 6. f. 12-14. Hirudo sexoculata.*  
*Habitat in Aquis dulcibus.*  
*Interanea pulchre pinnata perlucet.*
- Z z z z
7. H.

*Non missura cutim nisi plena cruoris Hirudo, pellitur inspersa muria.*

heterocli- 7. *H. hyalina*, postice lutea. *Fn. suec.* 2085.  
 ta. *Habitat in Europæ lacubus.*  
*Virescens, antice punctis sex nigris.*

geometra. 8. *H. teres*, extremitatibus dilatatis. *Fn. suec.* 2083.  
*Bergm. act. Stockh.* 1757. p. 310. n. 3.  
*Frisch. inf.* 6. p. 25. t. 11. *Hirudo ore caudaque ampla.*  
*Raf. app.* t. 32. f. 1-4.  
*Habitat in Aquis dulcibus.*

muricata. 9. *H. teres*, corpore verrucoso. *Fn. suec.* 2084,  
*Rond. aquat.* 2. p. 111. *Hirudo marina.*  
*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 93. t. 8. f. 3. *Hirudo muricata.*  
*Bafler. subs.* 1. p. 82. t. 10. f. 2. *Hirudo piscium.*  
*Habitat in Oceano Atlantico.*

281. MYXINE. *Corpus teres, subtus carinatum pin-*  
*na adiposa.*  
*Os terminale, cirrosum.*  
*Maxillæ binæ pinnatæ: Dentibus*  
*plurimis acutis in fauce.*  
*Dens superior solitarius, acutus.*  
*Oculi nulli.*

glutinosa. MYXINE. *Fn. suec.* 2086.  
*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 91. t. 8. f. 4. *Myxine.*  
*Kalm. itin.* 1. p. 100.  
*Aff. nidros.* 2. p. 250. t. 3. *Myxine glutinosa.*  
*Will. ich.* 107. *Lampetra cæca, oculis carens.*  
*Raj. pisc.* 36. idem.  
*Habitat in Oceano Europæo, pisces intrat, devorat;*  
*Aquam in gluten vertit.*

## II. MOLLUSCA.

*Animalia simplicia, nuda (absque Testa inhabitata), artubus instructa.*

282. LIMAX. Corpus oblongum, repens; supra clypeo carnosio; *subtus* Disco longitudinali plano.

*Foramen* laterale dextrum pro genitalibus & excrementis.

*Tentacula* quatuor, supra os.

- ater. 1. L. ater. *Fn. suec.* 2088.  
*List. angl.* 131. Limax ater.  
*Gesn. aquat.* 254. Cochlea nuda 3 tota nigra.  
*Aldr. inf.* 702. Limax tota nigra.  
*Habitat in* Nemoribus & Lucis *umbrosis.*
- albus 2. L. albus margine luteo. *Muller. swamp. Hafn.* 1763.  
*p.* 61. †  
*Habitat in* Europa.
- rufus. 3. L. subrufus. *Fn. suec.* 2089.  
*List. angl. app.* 6. t. 2. f. 1. Limax 4 subrufus montanus.  
*Aldr. inf.* 702. Limax magna colore rufo.  
*Habitat ad* Montium *radices.*
- maximus. 4. L. cinereus maculatus. *Fn. suec.* 2090.  
*It. al.* 61.  
*List. angl. app.* 1. t. 2. f. 2. Limax cinereus maximus striatus & maculatus.  
*Habitat in* Sylvis *frondosis, umbrosis.*
- hyalinus. 5. L. hyalinus, tentaculis obsoletis, lineola fusca a tentaculis ad clypeum. †  
*Habitat in* Muscis, *infestus* Phascoli *cotyledonibus, pel-*  
*-lendus cineribus clavellatis.* *D. Scopoli.*  
*Rugæ creberrima & ventrales interruptæ, Foramen*  
*dextrum s. laterale distinctum a foramine ani.* *Scop.*

- agrestis. 6. *L. cinereus immaculatus*.  
*List. angl.* 130 *Limax cinereus parvus immaculatus*  
*pratensis*.  
*Black. inf.* 151 t. 13. f. X.  
*Habitat in Pratis, Agris; autumnno Secale re-*  
*cens satum depascitur; ascendit sepius in Hortis*  
*nocte Helianthum annuum ejusque folia consumit; a*  
*Cornicibus prædatur.*
- flavus. 7. *L. flavus maculatus*. *Fn. succ.* 2092.  
*List. exercit. anat.* 1. t. 1. *Limax succini colore,*  
*albidis maculis insignitus.*  
*Habitat inter Herbas.*
- papillofus. 8. *L. supra tectus papillis: linea dorsali lævi.* *Fann.*  
*succ.* 2093.\*  
*Baßer. subf.* 1. p. 81. t. 10. f. 1. *Doris spinis mol-*  
*libus hirsuta.*  
*Habitat in Oceano Europæo.*  
*Hic submarinus forte potius genere cum Dori conveniat.*

283. **LAPLYSIA.** *Corpus repens, obvelatum mem-*  
*branis reflexis.*  
*Clypeo dorsali, membranaceo,*  
*pulmones obtegente.*  
*Foramen laterale, dextrum, pro*  
*genitalibus.*  
*Anus supra extremitatem dorsi.*  
*Tentacula quatuor, anterieus sita.*

depilans. 1. **LAPLYSIA.**

- Syst. nat.* 10. p. 653. *Tethys limacina.*  
*Rond. pisc.* 1. p. 520. *Lepus marinus.*  
*Gejn. aquat.* 475. *Lepus marinus Rondeletii.*  
*Bohadsf. mar.* 3. t. 1, 2, 3. *Lernea graphice.*  
*Seb. mus.* 3. t. 1. f. 8, 9.  
*Habitat in M. Mediterraneo; sæpe depilans taen.*  
*(B. 51.) sordidissima ad nauseam usque.*

284. DORIS. *Corpus* repens, oblongum, subtus planum.

*Os* antice subtus.

*Anus* postice, supra cinctus ciliis.

*Tentacula* duo, supra corpus antice, intra foramina retractilia.

verrucosa. 1. *D. oblonga*, corpore supra undique tuberculato.

*Rumph. mus.* 38. *Limax marina verrucosa*.

*Seb. mus.* 2. t. 61. f. 5. *Mitella verrucosa*.

*Habitat in Oceano Indico.*

*Corpus oblongum, semicylindricum, convexum, extremitatibus rotundatis, supra verrucosum. Margo lateralis deflexus. Pes ut in Limace, ovalis, oblongus margine plano. Os tentaculis brevissimis circiter octo.*

bilamella- 2. *D. ovata*, corpore supra lamella plana scabra.

*ta. Fn. suec.* 2094. \* *Limax bilamellatus*.

*Habitat in Oceano Norvegici Pleuronectis, sæpius intra earum Hepar; alias frequens ad Lapidés. J. G. König.*

*Corpus ovale, punctis scabrum, convexiusculum. Tentacula 2, supra antica corporis. Anus transversus, supra postica corporis, ciliatus plumis simplicibus.*

lævis. 3. *D. ovalis*, corpore supra planiusculo lævi.

*Habitat in Oceano Norvegico. J. G. König nuperus Historiæ naturalis Islandiæ attentissimus investigator.*

*Similis præcedenti, sed lævis, nec punctata, lactea, Ano tereti, ciliato plumis compositis.*

Argo. 4. *D. ovalis*, corpore lævi, tentaculis duobus ad os, ano ciliato phrygio.

*Bobad. mar.* 65. t. 5. f. 4, 5. *Argo*.

*Column. cephr.* t. 32. *Lepus marinus alter minor*.

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Corpus coccineum. Anus cinctus ramis quasi opere phrygio luceris.*

285. APHRODITA. *Corpus* repens, ovale: *Pedi-*  
formibus utrinque fascicu-  
lis pluribus.

*Os* terminale, cylindricum,  
retractile.

*Tentacula* oris duo, setacea.

aculeata. 1. *A. ovalis* hirsuta aculeata. *Fn. suec.* 2099.

*Gunner. act. nidros.* 3. p. 59.

*Baster. subs.* 2. p. 62. t. 6. f. 12. *Aphrodita aculeata.*

*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 93. *Aphrodita nitens.*

*Swamm. bibl.* 2. 10. f. 8. *Physalus.*

*Barrel. rar.* 131. t. 1284. *Eruca* f. *Scolopendra marina.*

*Column. esphr.* 25. t. 26. *Pudendum regale?*

*Barthol. act.* 3. p. 88. t. 88. *Vermis aureus.*

*Seb. mus.* 3. t. 4. f. 7, 8. *Eruca marina.*

1. t. 90. f. 1.

*Habitat in Oceano Europæo, visitans Conchiliis.*

*Pedes utrinque XXXII.*

scabra. 2. *A. oblonga*, dorso squamato scabro.

*Habitat in Mari Belgico. D. Baster.*

*Corpus* Onisco paulo longius, obtectum squamis XX,  
alternis, scabris. *Pedes utrinque circiter XX.*

squamata. 3. *A. oblonga*, dorso squamato: squamis XXIV.

*Baster. subs.* 2. p. 66. t. 6. f. 5. *Aphrodita squamata.*

*Habitat in Oceano Europæo.*

*Corpus* oblongiusculum, tectum squamis XXIV, ovatis,  
fixis, latere exteriori affixis. *Pedes utrinque XXIV,*  
*unguiculati, brevissimi. Tentacula duo, brevissima,*  
*bipartita. Os foramine involutum. Cauda termina-*  
*ta setis aliquot brevissimis.*

imbricata. 4. *A. oblonga*, dorso squamato: squamis XXXVI.

*Habitat in Oceano septentrionali. J. G. König.*

*Simillina precedenti, sed squamæ magis glabræ, facile*  
*decidue, color varius.*

286. NEREIS. *Corpus* repens, oblongum, lineare.  
*Tentaculis* lateralibus penicillatis.  
*Os* terminale, unguiculatum.  
*Tentaculis* plumosis supra os.

- Noctilu- 1. *N. segmentis* XXIII, corpore vix conspicuo.  
 ca. *Amœn. acad.* 3. p. 203. t. 3. *Noctituca marina*.  
*Grist. venet. quart.* *Scolopendra marina lucida*.  
*Vianelli monogr.* *Luciolella aquæ marinæ*.  
*Habitat in omni facile Mari, aquas quasi ignitas red-*  
*dens noctu, præ parvitate nudos oculos fugiens.*  
*Conf. Baster. subf.* 1. t. 4. f. 3.
- acultris. 2. *N. linearis*, lingua exserta.  
*Trembl. polyp.* t. 6. f. 1.  
*Rœs. inf. polyp.* t. 79. f. 1. & t. 78. f. 16, 17.  
*Schaff. monogr. regensb.* 1755. t. 3. f. 1, 2, 3.  
*Anguilla aquatica minima.*  
*Habitat in Paludibus argillofis sub terra, exserens*  
*continuo motu alteram extremitatem; exempta con-*  
*torquetur; in Suecia frequens.*  
*Corpus magnitudine setæ brevioris porcinae, pelluci-*  
*dum, quasi articulatum & utrinque ad quemvis ar-*  
*ticulum instructum pede setaceo brevi; intus vide-*  
*tur quasi constare articulis ovatis & dorso lineis 2*  
*repandis.*
- cirrosa. 3. *N. tentaculis oris longissimis, capite utrinque cirris* X.  
*Habitat in rupibus submarinis Norvegiæ; evomit ru-*  
*brum liquorem eoque aquam rubram reddit. König.*  
*Corpus rubrum, lumbriciforme; incisuris 65; utrin-*  
*que instructum ordinibus 2 setarum. Ad latera ca-*  
*pitis Fila utrinque 10; oris plurima duplo longiora.*
- seticornis. 4. *N. tentaculis capitis binis longitudine fere corporis.*  
*Baster. subf.* 2. p. 134. t. 12. f. 2.  
*Habitat in Oceano, particulas terrestres formans in*  
*cylindros, supra fundum eminentes, intra quos lates*  
*& e quibus Tentaculis exsertis piscatur animal-*  
*cula.*
- mollis. 5. *N. tentaculis articularum corporis supra tentacula pe-*  
*didformia. Fn. suec.* 2097.  
*Habitat in Mari Norvegico.*  
 Z z z 5

6. N.

- pelagica. 6. *N. segmentis XL, subtus fulcata, Fn. suec. 2096.\**  
*Baster. subs. 2. p. 133. t. 6. f. 6?*  
*Habitat in Oceano Europæo.*  
*Corpus filiforme, subsus sulco longitudinali: Segmen-*  
*tis 44 circiter, cum totidem paribus pediformibus e*  
*tentaculis & setis compositis. Supra Caput Tenta-*  
*cula 2 prominula, inter tubercula. Cirri 2, & ab*  
*utroque latere circi 4. Os unguium pari ad api-*  
*cem. Cl. Basterus suæ segmenta & pedes utrinque*  
*70 adscribit.*
- cærulea. 7. *N. glabra cærulescens segmentis CLXXXIV. A-*  
*mœn. acad. 4. p. 254. n. 38. Fn. suec. 2095.*  
*Mus. Ad. Fr. 1. p. 93. Nereis tentaculorum 184 pa-*  
*ribus.*  
*Brown. jam. 395. t. 39. f. 1. Nereis tentaculis ca-*  
*pitis binis tripartitis, corporis pluribus penicilliformi-*  
*bus duplici serie.*  
*Seb. mus. 1. t. 132. f. 3.*  
*Habitat in Oceano; consumit Serpulas & Teredines.*
- viridis. 8. *N. viridis filiformis segmentis CXXX.*  
*Habitat in Oceano septentrionali, sub lapidibus & in-*  
*tra rimas. J. G. König.*
- maculata. 9. *N. viridis, dorso nigro-punctato, articulis CC.*  
*Habitat in Oceano septentrionali cum precedente. J.*  
*G. König.*  
*Similis precedenti, crassitie fili tenuioris, viridis, dor-*  
*so maculis nigris.*
- gigantea. 10. *N. tentaculorum fasciculis triplici ordine.*  
*Seb. mus. 1. t. 81. f. 7. Millepoda marina amboi-*  
*nensis.*  
*Habitat in M. indico.*
- norvegi- 11. *N. glabra, segmentis CXX annularibus, ore dentato*  
 ca. *dupliciter forcipato.*  
*Gunn. act. nidrosf. 4.*  
*Habitat in Oceano Norvegico.*  
*Animalculum magnitudine Lumbrici terrestris majo-*  
*ris. Dentes subulati, longi, atri.*



287. ASCIDIA. *Corpus fixum, teretiufculum, vaginans,**Aperturæ binæ, ad summmitatem: altera humiliore.*

- papillo- 1. *A. scabra tuberculis coccineis.*  
sum. *Bohadsf. mar. 130. t. 10. f. 1. Tethys coriacea.*  
*Habitat in Mari Adriatico.*
- gelatino- 2. *A. lævis coccinea subdiaphana.*  
sum. *Bohadsf. mar. 131. t. 10. f. 3.*  
*Habitat in Mari Mediterraneo. D. Vandelli; visitat*  
*Monoculis.*
- intestina- 3. *A. lævis alba membranacea.*  
lis. *Bohadsf. mar. 132. t. 10. f. 4.*  
*Baster. subs. 2. p. 84. t. 10. f. 5?*  
*A&E. nidrosf. 3. p. 81. t. 3. f. 3, 4. Tethyum.*  
*Habitat in Oceano Europæo.*
- quadri- 4. *A. lævis flavescenti-alba, aperturis quadridentatis.*  
dentata. *Habitat in Oceano septentrionali. J. G. König.*  
*Corpus subglossum, album, rostris 2 prominentibus.*
- ruflica. 5. *A. scabra ferruginea aperturis incarnatis.*  
*Habitat in Oceano septentrionali.*  
*Corpus oblongum, subcylindricum, brunneum. J. G.*  
*König.*
- echinata. 6. *A. verruosa hispida.*  
*Habitat in Oceano septentrionalis Fuco stopario. J. G.*  
*König.*  
*Corpus hemisphericum, albidum, undique verrucis ad-*  
*spersum. Verruæ omnes adice armatæ stimulis s. acu-*  
*leis divergentibus, subciliatis, ut in Castis. Verrucæ*  
*duæ supremæ majores incarnatæ aperiuntur in oscula*  
*s. aperturas totidem.*

288.

*Ascidie expuunt aquam tamquam e Siphone.*

288. ACTINIA. *Corpus* se affigens basi, oblongum, teres: apice dilatabili intus tentaculato.

*Os* terminale dentibus incurvis;  
*Rostrum* cylindrico radiato.

(Apertura præter os nulla.)

- equina. 1. *A. semiovalis læviuscula.*  
*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 93. *Tethys semiovatus.\**  
*Habitat in O. Europæo, Rupibus adharens.*
- senilis. 2. *A. subcylindrica transverse rugosa.*  
*Fonst. exsangu.* t. 18. f. 2. *Urtica* major; minor.  
*Bast. subf.* 3. p. 122. t. 14. f. 2. t. 13. f. 2. *Actinia* rugis orbicularibus, proboscibus multis tenuibus.  
*Fn. suec.* 2103. *Priapus* senilis.  
*Ström. fœndm.* 204. *Soekuse.*  
*Habitat in M. Atlantico super Ostreas, Rupes.*
- felina. 3. *A. subcylindrica striata lævis, glande muricata.*  
*Bast. subf.* 3. p. 120 t. 13. f. 1. *Actinia* rugis longitudinalibus, proboscibus longis crassis.  
*Habitat in O. Europæo.*
- Judaica. 4. *A. cylindrica lævis truncata, præputio interne undulato lævi.*  
*Planc. conch.* 43. t. 6. *Colum* marinum.  
*Habitat in M. Mediterraneo.*
- effoeta. 5. *A. subcylindrica anguloso-striata.*  
*Bast. subf.* 1. p. 122. t. 14. f. 2.  
*Habitat in Oceano.*  
*Actinix genus quondam sub Priapi nomine proposui.*

289. TETHYS. *Corpus liberum, oblongiusculum, carnosum, apodum.*

*Os proboscide terminali, cylindrica, sub labio explicato.*

*Foramina 2 ad latus colli sinistrum.*

Leporin. 1. T. labro ciliato. †

*Column. aquat.* 27. †. 26. *Lepus marinus major.*

*Rondel. pisc.* 526. *Leporis marini tertia species.*

*Habitat in Mari Mediterraneo.*

Fimbria. 2. T. labro crenulato.

*Bobadl. mar.* 54. t. 5. f. 1, 2. *Fimbria.*

*Habitat in Mari Adriatico.*

*Videtur a precedenti distincta species.*

290. HOLOTHURIA. *Corpus liberum, nudum, gibbum, Ano terminali.*

*Tentacula plura in altera extremitate.*

*Os inter tentacula.*

frondosa. 1. H. tentaculis frondosis, corpore laevi.

*Gunner. Aët. Stockh.* 1767.

*Habitat in Oceano Norvegico. D. Gunnerus.*

*Corpus ovato-oblongum, leviusculum, antice quasi capite instructum, in cuius apice os. Tentacula circum os 10, frondoso-lacera, capite longiora. Foramina pone caput 3 approximata & 1 laterale magis remotum.*

Phantapus. 2. H. tentaculis ramosis, corpore subsquamoso trifariam punctato. †

*Aët. Stockh.* 1765. p. 256. t. 10.

*Habitat in Oceano septentrionali. D. Strussenfeldt.*

*Corpus ovatum, subsquamatum s. scabrum, trifariam punctatum, subtus planum; postice conicum, apice perforato. Os antice. Tentacula circum os 10, ramosa, retractilia. Abdomen subtus planum, trifariam punctis longitudinaliter notatum.*

3. H.

- tremula. 3. *H. tentaculis fasciculatis, corpore papillis hinc subconicis, illinc cylindricis.*

*Gunn. Att. Stockb. 1767.*

*Bohadsf. mar. 75. t. 6. Hydra.*

*Habitat in Oceano Norvegico, se inflans natans, contracta semper contremiscens.*

*Corpus cylindraceum, subius planiusculum, cute crassiuscula, sanguinea; altero extremo capite opposito cylindrico, laevi, glandem denudatam referente. Tentacula in ipso ore non semper conspicua & circum os centrale papilla posita. Tentacula sunt 7 brevia, aequalia, fasciculata, apice planiuscula. Gunn.*

- Physalis. 4. *H. cirrhis difformibus filiformibus pendulis. Aman. acad. 4. p. 254. t. 3. f. 6.*

*Rumph. mus. 49. Holothuria?*

*Sloan. jam. 1. p. 7. t. 4. f. 5. Urtica marina soluta purpurea oblonga, cirrhis longissimis. bene.*

*Brown jam. 386. Arethusa cristata subrubella venosa.*

*Osfb. it. 284. t. 12. f. 1. Physalis pelagica.*

*Habitat in Pelago.*

*Corpus ovatum, subtrigonum, hyalinum: Dorso acuto, obscure viridi, unde nervi excurrentes plurimi; antice rufescens. Rostrum spirale, rufescens, ad extremitatem crassorem. Tentacula sub extremitate crassiore plurima, inequalia: horum breviora teretia, crassiora; media capillaria, apice luteo globoso; reliqua longiora filiformia, quorum intermedium crassius & duplo longius; talis visa mihi.*

*Velica diaphana tentaculis numerosis, figuram referens Ventriculi humani; supra instructa Crista cellulosa; sub altera extremitate Tentacula dependent numerosa, ramosa. Brown.*

- Thalia. 5. *H. cristata compressa lineis lateralibus integris. †*

*Brown. jam. 384. t. 43. f. 3. Thalia oblonga, cristata perpendiculari compressa quadrata; lineis lateralibus integris.*

*Habitat in Pelago Americano.*

- caudata. 6. *H. caudata, cristata compressa: lineis lateralibus interruptis. †*

*Brown. jam. 384. t. 43. f. 4. Thalia oblonga caudata, cristata depresso rotundata: lineis lateralibus interruptis.*

*Habitat in Pelago.*

7. *H.*

denudata. 7. *H. destituta* crista caudaque. †

*Brown. jam.* 384. *Thalia oblonga*, lineis interruptis, cauda & crista destitutis.

*Pis. eras.* 296. Moucicu.

*Habitat in Pelago Americano.*

pentactes. 8. *H. ore cincto* tentaculis denis, corpore quinquefariam verrucoso.

*Habitat in Oceano Norvegico, sorbens exspuensque aquam, prout natet aut demergatur.*

*Animal rubrum, obovatum s. subcylindricum, varias formas assumens. Os cinctum radiis 10 apice hispidis. Corpus longitudinaliter quinquefariam punctatum verrucis geminatis luteis perforatis.*

priapus. 9. *H. ore papillis carnosis*, corpore striis annularibus; glandis longitudinalibus.

*Amœn. acad.* 4. p. 255. *Priapus humanus* cylindricus striis annularibus, glande striis longitudinalibus elevatis.

*Habitat in Oceano Indiæ orientalis & Europæ borealis.*  
Corpus oblongum, teres: pars dimidia cylindrica striis annularibus, numerosissimis; terminatur hæc pars osculo striis tribus rugosis cincto; ex hacce osculo protruditur fasciculus oblongus tentaculorum. Altera pars obovata glandiformibus striis longitudinalibus, 24, parallelis, elevatis, distantibus, ciliato-scabris. Osculum hujus cingitur stria annulari excavata. Osculum est concavum, intus aculeis plurimis recurvatis: exterioribus majoribus. Lingue loco setæ plures, parallelæ. Partis glandis apertura forte verum osculum sit, cum dentatum; alii vero os in altera extremitate statuunt. De Genere etiamnum dubium manet.

291. TEREBELLA. *Corpus* filiforme,  
*Os* anticum, præputio glandem pedunculatam tubulosam exferente.  
*Tentacula* circum os, capillaria, plura.

lapidaria. TEREBELLA.

*Kabl. act. Stockh.* 1754. p. 144. t. 3. f. A - E.  
*Habitat in Mari Mediterranea, intra rupium foramina.*  
*Corpus filiforme. Tentacula octo circiter, circum antica corporis & quatuor ad os. Figura simile Columnæ aquat. t. 22. f. 4. Seb. mnsf. 3. t. 16. f. 7.*

292. TRITON. *Corpus* oblongum.  
*Os* lingua involuta, spirali.  
*Tentacula* XII, bipartita; utrinque sex; posticis cheliferis.

litoreus. TRITON.

*Habitat in foraminibus rupium submarinarum.*  
*Corpus quale in Lepadibus occurrit. Tentacula sex parium, bipartita, articulata, introrsum ciliata, involuta; horum paria tria postica chelata. Lingua inter extrema tentacula. Os ad basin tentaculorum. Figura similis Act. angl. 50. v. 2. p. 847. t. 34. f. A. Lewenh. arcen. 465. f. 7.*

293. LERNÆA. *Corpus* se affigens tentaculis, oblongum, teretiusculum.  
*Ovaria* bina, tamquam totidem caudæ.  
*Tentacula* brachiformia 2. f. 3.

branchialis. 1. L. corpore tereti flexuoso, tentaculis tribus subramosis.  
*Ström. fönndm.* 209. t. 1. f. 18.  
*Habitat in Oceani Norvegici Gadis, ad branchias.*  
*König.*

*Corpus*

Corpus cylindricum, rubrum, arcuatum, longitudine fere minimi digiti, crassitie pennæ gallinacæ. Pars anterior s. dimidia teres, apice subtus Ore rotundato, cincto tentaculis tribus, tridentatis, rigentibus, patentibus. Pars posterior ventricosa, recurvata, striis aliquot nigris picta, terminata processu caudali obtuso. Ovaria, ad posteriora curvatura, bina ex filiis contortuplicatis.

Cyprina- 2. L. corpore obclavato, thorace cylindrico bifurco,  
cca. tentaculis apice lunatis. *Faun. suec. 2100. t. 2. f. 2100. \**

*Fa. suec. 1. n. 1282. f. 1282.* Lernæa tentaculis quatuor: duobus apice lunatis.

*Habitat in Piscinis frequens supra corpus Cyprini Carassii, quod maculis rubris vulnerat.*

Salmo- 3. L. corpore obovato, thorace obcordato, brachiis duo-  
nea. bus linearibus approximatis. *Fa. suec. 2102. \**

*Brander. piscat. cumsens 25. t. 1. f. 1.*

*Aff. Stockh. 1751. p. 185. t. 6. f. 1-5.* Pediculus Salmonis.

*Habitat in Branchiis Salmonum, ergo etiam marina.*  
Thorax obcordatus, apice desinens in Os bitubiatum, acutiusculum, labio superiore emarginato; l. inferiore bifido. Brachia 2 ad basin thoracis, filiformia, longitudine corporis, affixa præda. Ovaria apici abdominis adherentia, cylindrica, granulata, magnitudine totius Animalis.

Asellina. 4. L. corpore lunato, thorace cordato. *Fa. suec. 2101. It. wgoth. 171. t. 3. f. 4* Lernæa cauda duplici tereti.

*Habitat in Gadl branchiis Oceani septentrionalis.*

294. SCYLLÆA. *Corpus* se affigens, compressum, dorso canaliculato.

*Os* foramine edentulo, terminali.

*Tentacula* s. *Brachia* subtus trium parium.

pelagicum. SCYLLÆA.

*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 56. *Lepus pelagicus*.

*Obs. iter.* 306. *Zoopterygius*.

*Seb. mus.* 1. t. 74 f. 1.

*Habitat in Pelagi Fuco natante.*

*Corpus oblongum, compressum, molluscum. Os apicis tenuioris tereii foramine. Dorsum longitudinaliter canaliculatum fossula crenata, qua Fuco affigitur quiescens. Pars postica obtusa, latior. Brachia sub-ius trium parium remotorum: primum par sub ore, minus, rotundius; secundum sub medio corporis, foliaceum, oblongum, repandum, obtusius, intus papillis adpersum; tertium versus posteriora, simile primo pari.*

295. CLIO, *Corpus* natans, oblongum: *Alis* duabus, membranaceis, oppositis.

caudata. 1. *C. vagina compressa caudata.*

*Brown. jam.* 386.

*Habitat in Oceano.*

*Conf. Martens. Spisib. t. P. f. F. qui nullam vaginam in sua delineavit.*

pyramida-2. *C. vagina triquetra pyramidata, ore oblique truncato.*

*Brown. jam.* 386 t. 43. f. 1.

*Habitat in Oceano.*

retusa. 3. *C. vagina triquetra, ore horizontali.*

*Brown. jam.* 386.

*Habitat in Oceano.*



296. SEPIA. *Brachia* octo interius adspersa coty-  
 ledonibus (præter 2 Tentacula lon-  
 giora pedunculata plerisque).  
*Os* inter brachia, terminale, cornu.  
*Oculi?* infra tentacula versus corpus.  
*Corpus* carnosum vagina excipiens pe-  
 ctus. *Tubus* ad basin pectoris.

*Octopodia.* 1. *S.* corpore ecaudato, tentaculis pedunculatis nullis. *M.*

*Ad. Fr.* 1. p. 94. \*

*Hasselqv. act. Ups.* 1750. p. 33. *Octopodia.*

*Act. Petropol.* 7. p. 321. t. 11, 12. *Polypus.*

*Seb. mus.* 3. t. 2. f. 1-6. *Polypus.*

*Bell. aqu.* 330. t. 331.

*Rond. pisc.* 513. *Polypus octopus,*

*Jonst. exsangv.* 5. t. 1. f. 1. *Polypus.*

*Habitat in Mari Mediterraneo.*

*In cibo apponi debet rubens ex suo condimento, quod*

*coctione addito nitro in rubrum vertitur. Lister.*

*Aperto tantus effulsit splendor, ut remota tempore*

*vespertina candela, totum palatium ardere videretur.*

*Barthol. act.* 5. obs. 109.

*officinalis.* 2. *S.* corpore ecaudato marginato, tentaculis duobus. *Mus.*

*Ad. Fr.* 1. p. 93. *Fr. suec.* 2106.

*Amæn. acad.* 1. p. 325. \* *Sepia.*

*Gejn. aqu.* 851.

*Aldr. exsangv.* 44.

*Bell. aquat.* 336.

*Rond. aqu.* 1. p. 498.

*Olear. mus.* 97. t. 97.

*Seb. mus.* 3. t. 3. f. 1-4. *Sepia.*

*Habitat in Oceano, devoratur a Pleuroneſte Limanda.*

*Continet os officinale & atramentum quo se occultat;*

*eo literæ pinguntur. Congros ejus brachia rodere, sed*

*renascei, sicut Lacertis caudam, haud falsum. Plin.*

*IX: 29.*

*media.* 3. *S.* corpore depresso caudato ancipiti.

*Rond. pisc.* 508. *Loligo parva.*

*Habitat in Pelago.*

*Similis Sepiæ officinali, sed latera membrana aucta, quæ*

A a a a 2

mem-

*Membrana affigitur tantum lateribus ad dimidium, ne longitudinalis est.*

**Loligo.** 4. S. corpore subcylindrico subulato, cauda ancipiti-rhombea. *Fn. suec.* 2107.

*Needham. microsc.* 1. t. 12.

*Olear. mus.* 44. t. 26. f. 2.

*Bell. aqu.* 339.

*Rond. pisc.* 506. Loligo.

*Osbeck iter.* 66. Sepia Loligo.

*Ström. fündm.* 173. Loligo.

*Seb. mus.* 3. t. 4. f. 1-4. & t. 3. f. 5, 6.

*Habitat in Pelago. Aqua infuscata effuso atramento absconditur & cauda extra aquam exsilit.*

*Pinna pennacea pellucida pennam referente. Syst. nat.*

10. p. 708. n. 230. Penna marina maxima. *Seb.*

*mus.* 3. p. 40. t. 16. f. 9. *Ex hac specie desumpta, nec propria testa est.*

**Sepiola.** 5. S. corpore postice alis duabus subrotundis. †

*Rond. pisc.* 519.

*Fonst. aquat.* 1. f. 8. Sepiola.

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Parva, ad postica corporis utrinque alam s. auriculam rotundatam habet.*

297. **MEDUSA.** Corpus gelatinosum, orbiculatum, depressum.

Os subtus, centrale.

**Porpita.** 1. M. orbicularis supra plana; subtus convexiuscula, sulcata, villosa. *Amœn. acad.* 4. p. 255. t. 3. f. 7, 8, 9.

*Mus. Tessin.* 96. Medusa parva figura porpitæ.

*Act. angl.* 301. p. 2051. Animalcula ex Yrica maris Mediterranei.

*Habitat in India.*

**Cruciata.** 2. M. orbicularis, cruce alba. *Fn. suec.* 2110. \*

*Bastler. subs.* 2. p. 58. t. 14. f. 4.

*Habitat in Oceano Europæo.*

3. M.

*Medusa noctu vagatur; vis pruritu mordax; contrahit se rigens ac præterhatante pisciculo frondem suam spargit, complectensque devorat; ora ei in radice esse, excrementa per summa reddit, Plin. IX: 45.*

- hyoscel-** 3. *M. orbicularis convexa sedecim-radiata; subtus tenta-*  
**la.** culis quatuor unitis. *Vandelli.*  
*Baster. subs. 2. p. 62. t. 7. f. 5. an?*  
*Habitat in Tago Lusitania.*  
*Orbiculus supra convexus, albescens, pictus radiis 16*  
*instar trianguli hyoscellis, s. versus interiora lanceo-*  
*latis; efformatis e punctis minimis fusco-rufescenti-*  
*buis; subtus orbiculus concavus est. Tentacula, sub-*  
*tus ad centrum, quatuor, orbiculo longiora, lanceo-*  
*lata, laciniis rufescenti-striatis; membrana gelatinosa*  
*longitudinaliter unitentaculata, punctis flavicantibus*  
*respersa.*
- equorea.** 4. *M. orbicularis planiuscula, margine inflexo villoso ten-*  
**ta-** *taculato. Læst. †*  
*Baster. subs. 2. p. 55. t. 5. f. 2, 3.*  
*Habitat in Pelago.*
- aurita.** 5. *M. orbicularis: subtus quatuor cavitatibus. Fn. suec-*  
**2109. \***  
*It. n. 160.*  
*It. wgot. 172. t. 3. f. 2.*  
*Kalm. it. 2. p. 109.*  
*Læst. it. 105.*  
*Baster. subs. 122. t. 14. f. 3, 4.*  
*Habitat in Mari Balthico, Oceano.*
- capillata.** 6. *M. orbicularis convexa, margine sedecies emarginato;*  
**sub-** *tus pilosa. Fn. suec. 2108. \**  
*It. wgot. 172. t. 3. f. 3.*  
*Baster. subs. 2. p. 60. t. 5. f. 1.*  
*Habitat in Oceano septentrionali. Cyprini minuti a*  
*Piscibus agitati sub hac asylum reperiunt. Ström.*  
*fönd. 112.*
- pilcaris.** 7. *M. orbicularis: disco capitato, limbo foraminibus octo;*  
**sub-** *tus forniculato pilosa.*  
*Habitat in Pelago.*
- marcupia-** 8. *M. semiovata, margine tentaculis quatuor.*  
**lis.** *Plane. rar. 41. t. 4. f. 5. Urtica soluta marsupium*  
*referens.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*

hemisphaerica. 9. *M. hemisphaerica*, costis transversalibus quatuor, tentaculis marginalibus plurimis, margine integerrimo.

*Gron. act. belg. 4. p. 38. t. 4. f. 7.*

*Habitat in Oceano Belgico.*

pelagica. 10. *M. hemisphaerico-concava*, margine crenato-incurvato, tentaculis octo. *Læst. it. 105. †*

*Habitat in Oceano Americano.*

*Corpus sub disco quadrilobatum.*

brachiata. 11. *M. orbicularis* margine brachiis novem: apicibus novem, extimo tentaculis novem. †

*Habitat in Pelago.*

Velella. 12. *M. ovalis concentricè striata*, margine ciliato, supra velo membranaceo.

*Læst. it. 104. Medusa Velella f. Galera.*

*Brown. jam 387. t. 48. f. 1. Phyllidoce labris cæruleis.*

*Imperat. nat. 912. t. 912. Velum marinum coloris cærulei.*

*Col. esphr. 20. t. 22. Urtica marina soluta.*

*Habitat in Pelago. Læsting. In Mari Mediterraneo.*

*Brander.*

*Ovalis centro prominula, lineis concentricis, margine ciliato; supra linea oblique transversali; supra etiam membrana, dorsalem secans lineam inferiorem, rigida, latitudine corporis.*

298. ASTERIAS. *Corpus depressum: crusta subcoriacea, tentaculis muricata.*  
*Os centrale, quinquevalve.*

\* *Integra.*

Luna. 1. *A. integra semiorbicularis lunata. Aman. acad. 4. p. 256. t. 3. f. 14.*

*Habitat in India.*

*Corpus absque radiis, magnitudine imperialis, lunatum, compressum, punctis eminentibus undique adpersum.*

\* \* *Stellata.*

papposa. 2. *A. stellata, radiis XIII, undique muricata fasciculis.*

*Link. stell. t. 34. f. 54; t. 32. f. 52. t. 17. f. 28.*

*Clasf.*

*Clas. exot.* 114.

*Seb. mus.* 3. t. 8. f. 5.

*Column. phyt.* t. 38. f. A?

*Habitat in* O. Europæo & Asiatico.

*Similis A. rubenti, sed radii 13; undique muricata aculeis apice pectinatis f. fasciculatis.*

- rubens. 3. *A. stellata*, radiis lanceolatis gibbis, undique aculeata.  
*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 95. *Fn. svec.* 2111. \*  
*Baster. subs.* 3. p. 116. t. 2. f. 1-4.  
*It. Wgot.* 172. *Asterias* radiis quinis latiusculis asperis.  
*Plot. oxf.* 85. n. 16. t. 2. f. 2, 3.  
*Pet mus.* 6. n. 20. *Asteria*.  
*Barr. rar.* 130. t. 1288. *Stella marina* læte rubens, spinosa.  
*Olear. mus.* 55. t. 28. f. 4.  
*Link. stell.* t. 4. f. 5; t. 9. f. 16; t. 10. f. 16; t. 14. f. 23, 25; t. 15. f. 18, 26; t. 34. f. 58; t. 40. f. 70; t. 30. f. 50; t. 36. f. 62. *Stella marina*.  
*Seb. mus.* t. 5. f. 3. ♂ t. 6. f. 3, 4.  
 β *Baster. subs.* 116. t. 12. f. 1-6.  
*Column. aqu.* 5. t. 6. *Stella marina* cometa.  
*Habitat in Oceano frequens.*

- minuta. 4. *A. stellata* obtusa ciliata. *Fn. svec.* 2112. \*  
*Seb. mus.* 3. t. 5. f. 14, 15.  
*Habitat in* M. Norvegico frequens. *Martin.*

- glacialis. 5. *A. stellata*, radiis heptagonis: angulis aculeatis. *Fn. svec.* 2113.  
*Link. stell.* t. 7. f. 9; t. 32. f. 52; t. 35. f. 60; t. 36. f. 61; t. 38. f. 69. *Stella marina*.  
*Seb. mus.* 3. t. 7. f. 4.  
*Habitat in Oceano septentrionali.*

- reticulata. 6. *A. stellata*, radiis reticulato-aculeatis.  
*Mus. Tef.* 114. t. 9. f. 1. *Asterias* radiata, centro dorsali nodis 5 circumvallato.  
*Rond. aqu.* 122. *Stella reticulata*.  
*Rumph. mus.* t. 15. f. D.  
*Link. stell.* t. 41. f. 72; t. 23. f. 36. *Stella marina*.  
*Sloan. jam.* 2. p. 272. *Stella marina* maxima reticulata.  
*Seb. mus.* 3. t. 7. f. 1.  
*Habitat in* M. Indico.

A a a a 4

7. A.

nodosa. 7. *A. stellata*, radiis convexis longitudinaliter elevatis muricatis.

*Mus. Tesson.* 114. t. 9. f. 2.

*Grew. mus.* 123. t. 8. *Stella marina coronalis.*

*Link. stell.* t. 3. f. 3; t. 7. f. 8; t. 26. f. 41; t. 25. f. 40. *Stella marina.*

*Rumph. mus.* 39. t. 15. f. A. *Stella marina quarta.*

*Seb. mus.* 3. t. 5. f. 7, 8. ♂ t. 6. f. 1, 2, 11, 12, ♀ t. 7. f. 3

*Habitat in M. Indico.*

aranciaca. 8. *A. stellata*, disco tentaculis hispida muricato, margine articulo variegato aculeato. *M. L. U.* 719.

*Mus. Tesson.* 114. t. 9. f. 3.

*Barr. icon.* 1281.

*Link. stell.* t. 4. f. 14; t. 5. f. 6; t. 8. f. 12; t. 23. f. 38; t. 27. f. 44; t. 36. f. 63.

*Seb. mus.* 3. t. 6. f. 5, 6, 7, 8.

*Habitat in M. Mediterraneo.*

equestris. 9. *A. stellata*, disco reticulato punctis pertuso, tuberculis 5, margine subarticulato subtus simplici serie tentaculato.

*Barr. icon.* 1285.

*Link. stell.* t. 6. f. 13; t. 12. f. 21; t. 13. f. 22; t. 23. f. 37; t. 24. f. 39; t. 27. f. 45; t. 33. f. 53.

*Seb. mus.* 3. t. 8. f. 6, 8.

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Hæc etiam subtus disco gaudet, non præcedens.*

lævigata. 10. *A. stellata*, radiis semicylindricis obtuse octagonis muricis,

*Rumph. mus.* t. 15. f. E.

*Grew. mus.* t. 8. f. 1, 2.

*Link. stell.* t. 28. f. 47. *Stella marina lævior.*

Radii semicylindrici, costis tuberculis verrucosis obsoletis, laterum vero interstitiis verrucarum adpersis punctis excavatis; subtus radii verrucosi in quinquecunem cum rima longitudinali.

*Habitat in M. Mediterraneo & Indico.*

\* \* \* *Radiata.*

ophiura. 11. *A. radiata* radiis quinque simplicibus, stella orbiculata quinqueloba.

*Seb.*

*Seb. mus.* 3. t. 9. f. 5, 6, 7.

*Planch. conch.* 38. t. 4. f. 4.

*Sloan. jam.* 2. p. 272. t. 244 f. 8, 9. *Stella marina*  
minor echinata purpurea.

*Martens. spitzb. t. P. f. D.*

*Link. stell. t.* 37 f. 65, t. 34. f. 56. *Stella marina.*

*Habitat in Oceano.*

aculeata. 12. *A. radiata* radiis quinque aculeatis.

*Link. stell. t.* 26. f. 42, 43. & t. 37. f. 65. & t.  
40. f. 71.

*Habitat in Oceano. D. Baster.*

*Stellæ corpus muricatum arcis 5 depressis bifidis. Ra-*  
*dii undique (excepto infimo latere) aculeis scabri.*

ciliaris. 13. *A. radiata* imbricata: radiis utrinque ciliatis.

*Barr. rar.* 131. t. 1295. f. 1. *Stella marina* minor  
ophiocnemus f. ophiurus.

*Link. stell. t.* 40. f. 71; t. 37. f. 65; t. 34. f. 56. t. 26. f. 42, 43.

*Habitat in Oceano australiori & indico.*

pectinata. 14. *A. radiata* radiis duplicatis: superioribus pinnatis, in-  
ferioribus filiformibus. *Amæn. acad.* 4. p. 256.

*Barr. rar. t.* 1282. f. 1. *Stella marina* decanemos  
fimbriata.

*Column. phytob.* 109. t. 29. *Stella marina* altera.

*Pet. gaz. t.* 4. f. 6. *Stella chinensis* perelegans du-  
pliciter radiata.

*Link. stell. t.* 37. f. 64, 66. *Stella marina.*

*Seb. mus.* 3. t. 9. f. 3, 4.

*Habitat in M. Indico.*

multira- 15. *A. radiata* radiis palmato-multiplicatis pinnatis: infe-  
diata. rioribus filiformibus.

*Link. stell. t.* 21. f. 33, t. 22. f. 34. *Stella marina,*

*Habitat in M. Indico.*

*Valde affinis A. pectinata, si non sola varietas.*

Caput 16. *A. radiata* radiis dichotomis. *Fx. soc.* 2114.

medusæ. *Mus. Ad. Fr.* 1. p. 95.

*Rumph. mus.* 41. t. 16. *Caput Medusæ.*

*Martens. spitzb. t. P. f. E.*

*Link. stell. t.* 18. f. 29; t. 19. f. 30, 31; t. 20. f.  
32; t. 29. f. 48; t. 30. f. 49.

*Seb. mus.* 3. t. 9. f. 1, 2. & t. 11. f. 1.

*Habitat in omni Oceano, imprimis Pelagico.*

A a a a 5

299.

299. ECHINUS. *Corpus* subrotundum, crusta ossea tectum, spinis mobilibus sæpius aculeatum.

Os quinquevalve subtus.

\* *Regulares ano verticali.*

esculentus 1. E. hemisphærico - globosus; ambulacris denis; arcis obsolete verrucosis. *Fn. suec.* 2116. *M. L. U.* 705. *Fn. suec.* 1289. Echinus subglobosus, vertice plano. *List. angl.* 169. t. 3. f. 13. Echinus marinus aculeorum vestigiis nonnihil eminentibus. *Rumph. mus.* 31. t. 13. f. B. Echinus esculentus. *Klein. echinod.* 16. t. 9. Cidaris miliaris. *Baster. subf.* 3. p. 112. t. 11. f. 2-8. *Habitat in Oceano Europæo & Indico.* Testa punctis callosis obsoletis; apertura subrotunda, nec in fissuris. Spinæ violaceæ apice albæ.

Globulus. 2. E. hemisphærico-subglobosus; ambulacris denis; arcis latere muricatis, medio porosis. *M. L. U.* 706. *Habitat in O. Indico.*

sphæroides. 3. E. hemisphærico-gibbosus; ambulacris denis, undique muricatis, medio porosis. *Habitat in O. Indico.*

Gratilla. 4. E. hemisphærico-gibbosus; ambulacris denis triplicatis; arcis decussatim muricatis. *M. L. U.* 707. *Habitat in O. Indico.*

Lixula. 5. E. hemisphæricus; ambulacris denis; paribus approximatis; arcis transverse punctatis muricatis. *M. L. U.* 707. *Habitat in O. Indico.*

saxatilis. 6. E. hemisphærico-depressus; ambulacris denis; paribus approximatis; arcis longitudinaliter verrucosis. *M. L. U.* 708.

*Rumph. mus.* 31 t. 14. f. A. Echinus saxatilis.

*Klein. echinod.* 17. t. 2. f. A. B.

*Habitat in M. Mediterraneo.*

7. E.

*eam sculpturæ Echinorum distincte formaturus, computationem ejusdem instituat cum Horto in Areas five Pulvillo diviso, Ambulacris distincto.*



- Diadema.** 7. E. hemisphærico-depressus: ambulacris quinque longitudinaliter verrucosis; areis lanceolatis. *M. L. U.* 709.  
*Rumph. mus.* t. 14. f. B.  
*Pes. amb.* t. 8. f. 5. Echinus f. Diadema turearum.  
*Klein. echin.* t. 6. f. C.  
*Habitat in* M. Indico.
- Cidaris.** 8. E. hemisphærico-depressus; ambulacris quinque repandis linearibus; areis alternatim bifariis. *Fw. succ.* 2118.  
*Rumph. mus.* 33. t. 13. f. 3. Echinometra digitata 2 rotunda.  
*Pes. amb.* t. 7. f. 2.  
*Bonan. mus.* f. 17.  
*Gualt. test.* t. 108. f. D. E.  
*Argenv. conch.* t. 28. f. F.  
*Klein. echinod.* 19. t. 4. f. A. Cidaris mamillata mauri.  
*Seb. mus.* 3. t. 13. f. 12, 13.  
*Bafler. misc.* 111. t. 11. f. 1-6. Echinus Cidaris.  
*Habitat in* Oceano.
- mamillatus.** 9. E. hemisphærico-ovalis: ambulacris denique flexuosis; areis muricatis verrucosis; angustioribus abbreviatis. *M. L. U.* 711.  
*Rumph. mus.* 32. t. 13. f. 1. Echinometra digitata 1 oblonga.  
*Gualt. test.* t. 108. f. C.  
*Argenv. conch.* t. 28. f. E.  
*Klein. echinod.* 19. t. 3. f. A. Cidaris mamillata pauli.  
*Habitat* . .
- Lucunter.** 10. E. hemisphærico-ovalis; ambulacris denique flexuosis; areis muricatis; angustioribus longitudinalibus.  
*Gualt. test.* t. 107. f. C.  
*Klein. echin.* t. 2. f. C.  
*Seb. mus.* 3. t. 11. f. 11.  
*Habitat in* O. Indico.
- atratus.** 11. E. hemisphærico-ovalis depressiusculus: spinis truncatis brevissimis obtusissimis: marginalibus clavatis depressis.  
*Rumph. mus.* t. 13. f. 2.  
*Klein. echin.* t. 23.  
*Seb. mus.* 3. t. 13. f. 4.  
*Habitat in* India; e Museo Tessiniano. Spinæ

*Spinæ brevissima, obtusissima, subcontigua tegunt cel-  
lam; sed marginales elongatæ, laeves, depressæ.*

\* \* Irregulares: apertura ani subtus uti os.

spatagus. 12. *E. ovatus gibbus: ambulacris quaternis depressis. Fr.*  
*foec. 2117. M. L. U. 712.*

*Rondel. exsangu. 580. gall. 416.*

*Imper. nat. 910. Echinus gladius.*

*Bonan. recr. 1. t. 16. Echinus spatagus.*

*List. app. 28. Echinus minor angulosus ab utraque  
parte compressus.*

*Rumph. mus. t. 14. f. 1.*

*Sloan. jam. 2. p. 268. t. 242. f. 3, 4, 5. Echinus  
nostras spatagus.*

*Gualt. test. t. 109. f. A.*

*Imperat. nat. 911. 910. Echinus gladius.*

*Klein. echin. t. 28.*

*Ginan. adr. 2. p. 41. t. 29. f. 174. Echinus spatagus.*

*Habitat in Occano omni.*

lacuno- 13. *E. ovatus gibbus; ambulacris quinque depressis. M. L. U. 713.*  
sus.

*Rumph. mus. t. 14. f. 2.*

*Gualt. test. t. 109. f. C.*

*Bröyn. echin. 61. t. 5. f. 1, 2.*

*Klein. echin. t. 14. B. & t. 13. f. C.*

*Habitat in O. Indico.*

rosaceus. 14. *E. planiusculus ovato-subrotundus: ambulacris qui-  
nis ovalibus superficie punctata. M. L. U. 713.*

*Rumph. mus. 36. t. 14. f. E. Echinus planus Zecce-  
len dictus.*

*Pet. amboin. t. 1. f. 10.*

*Bonan. recr. 1. t. 33.*

*Gualt. test. t. 110, f. A. C.*

*Klein. echinod. t. 17. f. 1. & t. 18. f. 1. & t. 19.  
f. A. B.*

*Seb. mus. 3. t. 15. f. 11, 12, 13, 14, 23, 24. &  
t. 11. f. 2, 3.*

*Habitat in O. Asiatico.*

*Subtus lineæ 5 a centro ad marginem radiant.*

reticula- 15. *E. planiusculus ovatus integer: ambulacris quinque o-  
tus. valibus, superficie reticulata.*

*Sloan. jam. 2. p. . t. 242. f. 7-10.*

*Gualt.*

*Gvalt. test. t. 110. f. D.*  
*Habitat in O. Americano.*

**Placenta.** 16. *E. planus orbiculatus: ambulacris quinis bipartitis, ano marginali. M. L. U. 714.*

*Rumph. mus. t. 14. f. G.*

*Pet. amb. t. 11. f. 5.*

*Gvalt. test. t. 110. f. G.*

*Breyn. echin. 64. t. 7. f. 7, 8.*

*Klein. echinod. t. 20. f. A. B.*

*Habitat in Oceano meridionali.*

**Orbiculus.** 17. *E. planus suborbiculatus: ambulacris quinis ovalibus, ano subremoto.*

*α. Foraminibus nullis pervius, lobatus.*

*Gvalt. test. t. 110. f. F. E.*

*Klein. echinod. t. 22. f. E. F.*

*Seb. mus. 3. t. 15. f. 15, 16, 19, 20, 1, 2.*

*β. Foraminibus duobus pervius, lobatus.*

*Gvalt. test. t. 110. f. H. H.*

*Breyn. echin. 64. t. 7. f. 5, 6.*

*Klein. echin. t. 22. f. A. B.*

*γ. Foraminibus quinque pervius, indivisus,*

*Aet. mus. 19. f. 125.*

*Gvalt. test. t. 110. f. E. E.*

*Klein. echin. t. 21. f. C. D.*

*Hugh. barbad. 280. t. 24. f. 3, 4.*

*Seb. mus. 3. t. 15. f. 7, 8, 9, 10.*

*δ. Foraminibus nullis pervius, indivisus.*

*Gvalt. test. t. 110. f. B.*

*Breyn. echin. 64. t. 7. f. 1, 2.*

*Habitat in M. Indico.*

## III. TESTACEA.

*Animalia Mollusca, simplicia, domo, sæpius calcarea, propria obtecta.*

300. CHITON. *Animal Doris.*

*Testæ plures, longitudinaliter digestæ, dorso incumbentes.*

hispidus. 1. *C. testa sexvalvi striata.*

*Habitat . .*

tubercula-2. *C. testa septemvalvi, corpore tuberculato.*

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 96. Chiton oscabrion.*

*Pet. gaz. t. 1. f. 4. Oscabrion.*

*Sloan. jam. 2. p. 233. Patella oblonga articulata.*

*Seb. mus. 3. t. 1. f. 14.*

*Habitat in America.*

*Corpus ovale, testum supra tuberculis calloso-elevatis, in quincuncem positis. Testæ 7, magis transversæ, arcuato-striatæ, vix carinatæ, lateribus angulo distinctæ; harum 1 & 7 adpersæ tuberculis elevatis.*

aculeatus. 3. *C. testa octovalvi striata, corpore subaculeato.*

*Rumph. mus. t. 10. f. 4. Limax marina.*

*Edw. av. t. 286. f. B.*

*Seb. mus. 2. t. 61. f. 4.*

*Habitat in Asia.*

*Corpus facie præcedentis, ovale, supra hispidum aculeis angustis subulatis rubris subarcuatis inæqualibus.*

*Testæ 8, conchiformes, transverse per totum striatæ, non carinatæ: ultima testæ minore.*

fascicula-4. *C. testa octovalvi, corpore ad valvulas utrinque fasciculato.*

*Habitat in Barbaria. E. Brander, Consul Seccorum apud Algiros.*

*Corpus cinereum, leve. Testæ leviter carinatæ. Fasciculi pilorum totidem, albi, juxta testarum latera corpori insident.*

5. *C.*

squamo- 5. C. testa octovalvi semistriata, corpore squamuloso.  
ius. *M. L. U.* 465. \*  
*Habitat in Indiis.*

punctatus. 6. C. testa octovalvi lævi, corpore punctis excavatis.  
*Amœn. acad.* 3. p. 256. Chiton corpore punctato,  
testis octo.  
*Osbeck. iter.* 62.  
*Seb. mus.* 3. t. 1. f. 13.  
*E. N. C.* 1727. p. 63. t. 1. f. 1, 2. Calva serpentis  
diadema.  
*Habitat in Asia, Europa, America.*

ruber. 7. C. testa octovalvi arcuato-substriata, corpore rubro.  
*Fn. suec.* 2119.  
*Habitat in Oceano septentrionali instar Patellæ affixa.*  
*König, Zoega.*  
*Testa ovalis, oblongiuscula, dorso carinata, valvulis ob-*  
*lique subarcuato-striatis.*

albus. 8. C. testa octovalvi lævi: valvula prima postice emar-  
ginata.  
*Habitat in O. Islandico. König.*  
*Testa ovalis, lævis, alba, vix dorsata, minus carinata.*

cinerea. 9. C. testa octovalvi ovata.  
*Habitat in O. Norvegico. König.*  
*Testa vix cinice major, planiuscula, cinerea, ovata*  
*f. postice paulo latior, parum carinata, non glabra.*

301. LEPAS. *Animal Triton.*

*Testa multivalvis, inæquivalvis, basi*  
*affixa.*

Balanus. 10. L. testa conica sulcata fixa, operculis acuminatis.  
*Fn. suec.* 2122. \*  
*M. L. U.* 466. n. 2. \*  
*It. wgoth.* 170.  
*Leuwenb. epist.* 82. p. 472. t. 465.  
*Klein. ostr.* t. 12. f. 94, 95.  
*Gualt. test.* 106. f. P.  
*Ad. angl.* 1758. v. 2. t. 34. f. 17.  
*Bailler. subs.* 127. t. 12. f. 7-10.  
*Habitat ad littora oceani Europæi.*

**Balanoides.** 11. *L. testa conica truncata lævi fixa, operculis obtusis.*

*Fn. succ.* 2123. \*

*List. angl.* 196. t. 2. f. 41. ♂ *conch.* 3. t. 444. f. 28.

*Pet. mus.* 82. n. 802. *Balanus parvus vulgaris.*

*Lenwenh. arc.* 474. t. 465. f. 1. E. ♂ f. 7.

*Argenv. conch.* t. 30. f. D.

*Habitat in O. septentrionalis rapibus, sed minor, copiosior, non supra refluxum altius; debijcens sub fluxu, clausus sub aestu.*

**Tintinna.** 12. *L. testa conica rugosa obtusa fixa. M. L. U. 466.*

n. 3. \*

*Lang. test.* 4. *Balanus tintinnabuliformis lævis.*

*Rumph. mus.* t. 41. f. A.

*Gualt. test.* t. 106. f. H.

*Argenv. conch.* t. 30. f. A.

*Act. angl.* 1758. v. 2. t. 34. f. 8.

*Habitat in O. Europæo.*

*Valde affinis precedenti, sed pollice crassior.*

**Diadema.** 13. *L. testa subrotunda sexlobata sulcata fixa.*

*Gualt. test.* t. 106. f. Q.

*Boccon. recher.* 294.

*Rumph. mus.* t. 14. f. H.

*Habitat ad Mare Mediterraneum & Indicum.*

*Testa figura Echini absque radiis.*

**Testudinaria.** 14. *L. testa plano-convexa fixa, radiis sex excavatis striatis. M. L. U. 467. n. 4. \**

*Bonan. kirch.* 1. f. 36.

*Rumph. mus.* t. 40. f. K. *Verruca testudinaria.*

*Gualt. test.* t. 106. f. M. N. O.

*Pet. gaz.* t. 9. f. 9.

*amb.* t. 1. f. XI.

*Planc. conch.* t. 5. f. 2. 1.

*Klein. ostr.* t. 12. f. 99.

*Act. angl.* 1758. v. 2. t. 34. f. 12, 13.

*Ginan. adr.* 41. t. 30. f. 175.

*Habitat in Pelago, sæpe in Testudinibus, in M. Adriatico.*

**Mitella.** 15. *L. testa compresso-erecta difformiter striata. M. L. U. 467. n. 5. \**

*Lang.*

*Lepadum testæ in diversis diversæ figura & numero valvularum, omnes fixæ, nec è loco mobiles.*

*Lang. test.* 4. *Balanus tulipaformis striatus.*  
*Gesn. ayn.* 121. *Balanus rondeletii.*  
*Rumph. mus.* t. 47. f. M.  
*Argenv. conch.* t. 30. f. E.  
*Aët. angl.* 1758. v. 2. t. 23. f. 4.  
*Pet. gaz.* t. 6 f. 10. *Balanus chinensis striatus.*  
*Klein osir.* t. 12. f. 100.  
*Seb. mus.* 3. t. 16. f. 3.  
*Habitat . .*

Scalpellum. 16. L. testa compressa tredecimvalvi læviuscula, intestino squamoso insidente. *Fn. succ.* 2121. \*

*Gualt. test.* 106. f. c.  
*Ellif. aët. angl.* 1758. v. 2. t. 34. f. 4.  
*Habitat in O. septentrionali.*  
*Hon semper sessilis, sape tenui intestino insidens.*

anatifera. 17. L. testa compressa quinquevalvi striata, intestino insidente.

*Habitat in Pelago Americano; in fossilibus magna.*  
*Testa hujus minuta, semine Lini minor, structura omnino L. anatiferae, sed valvulis sulcatis, excepta prima; Sulci hi distincti, elevati.*

anatifera. 18. L. testa compressa quinquevalvi lævi, intestino insidente *Fn. succ.* 2120. *M. L. U.* 468. n. 6. \*

*Fn. succ.* 1. n. 1350. *Lepas testa compressa basi membrana cylindrica*  
*Aldr. orn. c.* 20. f. 548. *Concha anatifera.*  
*Bonnan. recr.* 2. f. 2. *Tellina pedata.*  
*Imperat. nat.* 904. *Concha pedata.*  
*Stalpart. obs.* 2. p. 458. t. 15.  
*Barth. cent.* 6. p. 271.  
*Worm. mus.* 256.  
*Marcgr. bras.* 188.  
*Grew. mus.* 148.  
*Hoffm. inf.* 3. t. 6.  
*Sibb. mus.* 170. n. 2.  
*Lijz. exerc.* t. 7. f. 4, 5.  
*conch.* t. 440. f. 233.  
*Gualt. test.* t. 106. f. A-D.  
*Argenv. conch.* t. 30. f. F. G.  
*Planc. conch.* t. 5. f. 4.  
*Column. phytob.* 110. t. 30.  
 B b b b

*Bauh.*

*Baub. pin.* 513. Arbor ex cujus ligni putredine vermes. 1. 2. 3.

*Needb. micr. t.* 7. f. 1, 2. & t. 6.

*Seb. mus.* 3. t. 16. f. 1, 2.

*Osb. iter.* 82. *Lepas anatifera* c. Tritone.

*Hil. angl.* 1758. v. 2. t. 34. f. 6.

*Habitat in Pelago.*

aurita. 19. testa membranacea ventricosa tubo insidente, ore o-  
ctoalvi dentato: tubulo gemino aurita.

*Ellis. act. angl.* 1758. t. 34. f. 1. *Lepas nuda* co-  
mosa aurita.

*Edw. av.* 2. t. 286. f. A.

*Seb. mus.* 3. t. 16. f. 5.

*Habitat in O. septentrionali.*

*Intellinum longum, terminatum ventriculo membrana-  
teo. Apertura clausa valvulis testaceis* 8. Tubi 2,  
breves, a tergo ventris sursum spectantes.

### 302. PHOLAS. *Animal* Ascidia.

*Testa* bivalvis, divaricata, cum  
minoribus accessoriis difformi-  
bus, ad cardinem.

*Cardo* recurvatus. connexus car-  
tilagine.

*Dactylus.* 20. Ph. testa oblonga hinc reticulato-striata. *Fn. suec.*  
2124.

*Rond. test.* 23. f. 2.

*Bell. aqu.* 414.

*List. angl. app. t.* 2. f. 3.

*Bonap. recr.* 2. t. 25, 26, 27.

*Gualt. test.* 105. f. A. B. C. D

*Argenv. conch.* t. 30. f. K.

*Ginam. adr.* 44. t. 31. f. 184.

*Seb. mus.* 3. t. 16. f. 6.

*Reaum. act. paris.* 1712. p. 163.

*Planc. conch.* 33. n. 3.

*Habi-*

*Pholades* terebrant, intrant, inhabitant, roduntque rupes marinas calcareas, ne-  
dum cotaceas, intra quas latent phosphorei. *Reaum. act. paris.* 1712. p. 126.  
His natura in tenebris, remoto lumine, alio fulgore clareve, & quanto magis  
humorem habeant, ludere in ore mandentium, lucere in manibus, atque etiam  
in solo & veste desidentibus guttis. *Plin.* IX, 61.



*Habitat intra Europæ scopulos, pertenebratis saxis, non lucens.*

costatus. 21. Ph. testa ovata costis elevatis striata.

*Gualt. test. t. 105. f. G.*

*Habitat intra scopulos Europæ australis.*

striatus. 22. Ph. testa ovata multifariam striata.

*Gualt. test. t. 105. f. F.*

*Habitat intra scopulos maritimos Europæ australis.*

candidus. 23. Ph. testa oblonga undique striis decussatis muricata.

*M. L. U. 469. n. 7. \**

*Bonon. recr. 2. t. 24*

*Gualt. test. t. 105. f. E.*

*List. angl. 193. t. 5. f. 39.*

*app. t. 2. f. 4, 6.*

*Habitat in Europæ & Americæ scopulis marinis.*

pusillus. 24. Ph. testa oblonga rotundata arcuato-striata. †

*Brown. jam. 417. t. 40. f. 11.*

*Habitat in America.*

*Valvulae accessoriae a tergo testæ singulares; an distincti generis.*

crispata. 25. Ph. testa ovali hinc obtusiore crispato-striata, cardinis dente curvo. *M. L. U. 469. n. 8. \**

*Fn. spec. 2125. \* Mya crispata.*

*List. angl. t. 5. f. 38.*

*app. t. 2. f. 7.*

*Habitat in O. septentrionali.*

*Testa tertia exigua ad cardinem. List. app. 36.*

303. MYA. *Animal* Ascidia.

*Testa* bivalvis, hians altera extremitate.

*Cardo* dente (plerisque) solido, crasso, patulo, vacuo (*nec inserto testæ oppositæ.*)

truncata. 26. M. testa ovata postice truncata, cardinis dente anteriorum porrecto obtusissimo. *Fn. svec.* 2126.

*It. wogth.* 199. n. 3. t. 5. f. 3.

*List. angl.* 191. t. 5. f. 36.

*Gualt. test.* t. 91. f. D.

*Habitat* in O. Europæo.

arenaria. 27. M. testa ovata postice rotundata, cardinis dente anteriorum porrecto rotundato denticuloque laterali. *Fn. svec.* 2127. \*

*Baster. subf.* 2. p. 69. t. 7. f. 1, 2, 3. Mya arenaria.

*It. wogth.* 187.

*Habitat* in O. Europæ septentrionalis sub arena, foraminibus duobus detegenda; proboscide arenam excavat.

*Cardinis* dens in altera tantum testa prominens cum denticulo parallelo versus vulvam.

piCTORUM. 28. M. testa ovata, cardinis dente primario crenulato; laterali longitudinali: alterius duplicato. *Faun. svec.* 2129.

*Bonan. recr.* 2. t. 41.

*List. angl. app.* t. 1. f. 4.

*Habitat* in Europæ fluviiis.

margariti- 29. M. testa ovata antice coarctata, cardinis dente primario conico, natibus decorticatis. *Fn. svec.* 2130. \*

*List. conch.* t. 149. f. 4.

*angl. app.* 15. t. 1. f. 1.

*Klein. ostr.* t. 10. f. 47.

*Habitat* in totius orbis arctici cataractis.

30. M.

---

*Myæ sæpius terebrant fundum & intra eundem se defodiunt vel totæ vel quæ partem.*

Perna. 30. M. testa oblonga dilatata basi angustiore compressa.  
*M. L. U. 470. n. 10. \**  
*Argenv. conch. t. 25. f. N.*  
*Habitat in Fretto Magellanico.*  
*Forte Mytili species.*

Vulfella. 31. M. testa linguiformi, cardine terminali depresso semi-orbiculato. *M. L. U. 471. n. 11. \**  
*Mus. Tessin. t. 6. f. 3.*  
*Rumph. mus. t. 46. f. A.*  
*Gualt. test. t. 90. f. H.*  
*Habitat in Indiis.*

arctica. 32. M. testa striata: valvulis carinis duabus spinulosis; cardine edentulo.  
*Habitat in Oceano Norvegico. J. Zoega.*  
*Testa magnitudine Fabæ, rudis, facie Arcæ noæ, pallida. Antice retuso-planiuscula, parte anteriore obtusissima, posteriore brevior, acutiuscula; pars anterior a natibus excurrit angulis duobus remotis antrosum subaculeatis. Cavitas interna lactea est. Cardo vix ullus.*

### 304. SOLEN. *Animal* Ascidia.

*Testa* bivalvis, oblonga, utroque latere hians.

*Cardo* Dens subulatus, reflexus, sæpe duplex, non insertus testæ oppositæ; margo lateralis obsoletior.

Vagina. 33. S. testa lineari recta: extremitate altera marginata, cardinibus unidentatis. *M. L. U. 472. n. 12. \**  
*Rumph. mus. t. 45. f. M.*  
*Gualt. test. t. 95. f. D.*  
*Argenv. conch. t. 27. f. K.*  
*Klein: ostr. t. 11. f. 65.*  
*Habitat in M. Europeo, Indico.*

Siliqua. 34. S. testa lineari recta, cardine altero bidentato. *Fw. Suec. 2131. M. L. U. 473. n. 13. \**

B b b b 3

Rond.

*Cardo in quibusdam speciebus omnino edentulus, dignoscitur tamen ex animali testæ biata ad alteram extremitatem.*

*Rond. test.* 43.

*Bell. aqu. t.* 414. f. 2.

*List. angl. t.* 5. f. 37.

*Bonan. recr. 2. t.* 57.

*Gualt. test. t.* 95. f. C.

*Argenv. conch. t.* 27. f. M.

*Planc. conch. t.* 3. f. 6.

*Ginan. adr. 2 p.* 37. t. 27. f. 170.

*Habitat in O. Europæo.*

*Hæc, præcedens & sequens nimis affines sunt.*

Ensis. 35. S. testa lineari subarcuata, cardine altero bidentato.

*M. L. U.* 473. n. 14. \*

*List. angl. app. t.* 2. f. 9.

*Argenv. conch. t.* 27. f. L?

*Habitat in M. Mediterraneo, Anglico.*

*Testa utraque extremitate rotundata est & præcedente minor ac magis arcuata.*

Legumen. 36. S. testa lineari-ovali recta, cardinibus bidentatis: alterius bifido.

*Planc. conch. t.* 3. f. 5.

*Gualt. test. t.* 91. f. A.

*Adans. sen. 1. t.* 19. f. 3.

*Habitat in M. Mediterraneo. Fr. Logie, algirus, patria Conchiliis dives.*

*Præcedentibus brevior & cardine versus medium sessa, nec ad extremitatem, ut in præcedentibus.*

Cultellus. 37. S. testa ovali-oblonga subarcuata. *M. L. U.* 474. n. 15. \*

*Rumph. mus. t.* 45. f. F.

*Gualt. test. t.* 90. f. E.

*Habitat in Amboinæ littoribus arenosis.*

*Cardinis dentes ut in primis tribus, sed callus marginalis ut in specie prima.*

radiatus. 38. S. testa ovali recta lævi, costa transversali adnata depressa. *M. L. U.* 474. n. 16. \*

*Rumph. mus. t.* 45. f. E.

*Gualt. test. t.* 91. f. B.

*Argenv. conch. t.* 25. f. P.

*Habitat in O. Asiatico.*

*Testa violascea radiis quatuor albis.*

39. S.

- strigilatus. 39. S. testa ovali oblique striata. *M. L. U.* 475. n. 17.\*  
*Rond. test.* 14. Concha nigra.  
*Bonan. recr.* 2. t. 77.  
*Gualt. test.* t. 91. f. C.  
*Adans. seneg.* 1. t. 19. f. 2.  
*Habitat* in M. Mediterraneo.  
*Testa incarnata radiis duobus albis. Dens cardinis recurvatus exsertus; Margoque cardinis prominulus.*
- anatinus. 40. S. testa ovata membranacea inflata pilosa, cardinis costa falcata. *M. L. U.* 475. n. 18.\*  
*Rumph. mus.* t. 45. f. o. Rostrum anatis.  
*Habitat* in O. Asiatici fundo arenoso.  
*Testa pellucida alba & fere membranacea.*
- bullatus. 41. S. testa subrotunda inflata substriata antice crenatohiante.  
*Rumph. mus.* t. 44. f. N.  
*Habitat* - -  
*Dens cardinis unicus; marginales remoti compressi.*
- minutus. 42. S. testa ovali: valvularum angulis utrisque serratis.  
*Habitat* in O. Norvegico. *Martin.*  
*Testa ovalis, magnitudine seminis Cucumeris, longitudinaliter striata, apice truncata. Carinae a cardine versus apicem divergentes, acutae, serrato-dentatae.*
- virens. 43. S. testa ovato-oblonga, umbonibus tumidis.  
*Habitat* in Java.  
*Testa inequivalvis ovato-oblonga, umbonibus gibba, alba, extus virens, fragilissima, diaphana, forma Myæ pictorum, apice & basi vix clausa. Cardo alterius dentibus duobus approximatis absque antagonistis; praeterea callus in utraque testa, quasi dens obsoletus testæ.*

355. TELLINA. *Animal* Tethys.

*Testa* bivalvis, antice hinc ad alterum latus flexa.

*Cardo*: Dentes tres: laterales plani, alterius testæ.

\* *Ovata, crassiuscula.*

Gargadia. 44. *T. testa* subrotunda compressa antice rugosa, rima dentata. *M. L. U.* 476. n. 19. \*

*Rumph. mus. t.* 43. f. N. *Remies* gargadica.

*Klein. ostr. t.* 11. f. 55.

*Habitat in O. Asiatico.*

Lingua telis. 45. *T. testa* subovata scabra: squamulis lunatis quincuncialibus. *M. L. U.* 476. n. 20. \*

*Rumph. mus. t.* 45. f. G.

*Gualt. test. t.* 76. f. B.

*Klein. ostr. t.* 11. f. 62.

*Habitat in O. Asiatico.*

*Differt a T. scobinata, quod sesquialtor quam longa.*

virgata. 46. *T. testa* ovali striis transversis recurvatis antice angulata, dentibus lateralibus prominulis. *M. L. U.* 477. n. 21. \*

*Rumph. mus. t.* 45. f. H. *Tellina* virgata.

*Argenv. conch. t.* 25. f. A. *T. fasciis* roseis.

*Habitat in O. Indico.*

*Dens* lateralis ante vulvam poneque anum triangularis.

angulata. 47. *T. testa* subovata striis transversis recurvatis, antice angulata, dentibus lateralibus nullis.

*Habitat in Java.*

*Affinis T. virgata, sed minus oblonga, alba, immaculata nec radiata; angulo antico magis extrorsum sito & imprimis defectu dentium lateralium. Anus ovalis, nec solis marginibus inflexis.*

48. *T.*

---

*Tellinarum testa antice inflexa, ut altera testa plicam convexam, altera vero cavam ostendat; in suborbiculatis autem vix plica manifesta, sed striæ in eodem loco divergentes genus ostendunt.*

- gari. 48. T. testa ovali: striis transversis recurvatis, dentibus lateralibus obsoletis. *M. L. U.* 478. n. 22. \*  
*Rumph. mus. t.* 45. f. *D.* Tellina gari.  
*Argenv. conch. t.* 25. f. *I.*  
*Habitat in O. Indico.*
- fragilis. 49. T. testa ovata alba gibba: striis transversis recurvatis, natibus flavescens.  
*Habitat in O. Europæo.*  
*Testa magnitudine extimi pollicis, gibba, striis subscabris.*
- \* \* Ovata, compressæ.
- albida. 50. T. testa ovali lævi, nymphis prominentibus. *M. L. U.* 479. n. 23. \*  
*Habitat in Oceano Europæo.*  
*Cardo absque dentibus marginalibus. Sutura ante & post cardinem notata lineis transversis rufis.*
- foliacea. 51. T. testa ovali, pube scabra, rima ferrata. *M. L. U.* 479. n. 24. \*  
*Rumph. mus. t.* 45. f. *K.* Folium.  
*Argenv. conch. t.* 25. f. *E.*  
*Klein. ostr. t.* 11. f. 64.  
*Habitat in O. Indico.*
- planata. 52. T. testa ovata compressa, transversim substriata lævi: marginibus acutis, pube subtomentosa. *M. L. U.* 480. n. 25. \*  
*Gualt. test. t.* 89. f. *G.*  
*Regensf. conch. t.* 3. f. 28.  
*Habitat in O. Europæo, Mediterraneo.*  
*Testa maxime plana, pellucida, incarnata, minus flexa, margine acutissimo.*
- lævigata. 53. T. ovata lævigata, dentibus lateralibus marginatis, pube striato-scabra, nymphis inflexis. *M. L. U.* 480. n. 26. \*  
*Rumph. mus. t.* 45. f. *I.* Tellina lævis.  
*Habitat in O. Europæo & Indico.*
- radiata. 54. T. testa oblonga longitudinaliter subtilissime substriata nitida, sutura anali canaliculata. *M. L. U.* 481. n. 27. \* *Fn. suec.* 2132. \*  
B b b b 5 *Habi-*

*Habitat in Oceano Europæo.*

*Testa alba radiis incarnatis, obsoletissime striata. Rima Nymphis, hiantibus nec prominulis.*

- rostrata. 55. T. testa oblonga: antice angulato-rostrata, angulis subdentatis. *M. L. U.* 481. n. 28. \*  
*Argenv. conch. t. 25. f. 0.*  
*Habitat in O. Indico: Java.*

- inæqui- 56. T. testa oblongo-rostrata: valvula altera plana.  
 valvis. *Habitat in M. Mediterraneo.*  
*Testa longitudine pollicis transversa, lactea, lavis, pel- lucida. Sutura dorsalis recta excurrent in rostrum obtusum patulum. A natibus ad rostri inferiora an- gulus obliquus ut in Tellinis. Valvula altera plana; altera leviter convexa. Cardo dentibus duobus abs- que lateralibus.*

- trifasciata. 57. T. testa ovata læviuscula sanguineo-irradiata, pube rugosa. *Fn. succ.* 2133.  
*List. angl. app. 32. f. 8.*  
*Habitat in O. Europæo.*  
*Testa magnitudine unguis, pallida: radiis 3 sanguineis a cardine ortis, antice magis obtusa; vulva ovata.*

- incarnata. 58. T. testa ovata antice productiore compresso-planius- cula, natibus submucronatis. *Fn. succ.* 2134. \*  
*List. angl. app. 32. t. 1. f. 8.*  
*Gualt. test. t. 88. f. M.*  
*Habitat in O. Europæo, Mediterraneo.*  
*Testa magnitudine extimi pollicis, simillima T. plana- ta, sed incarnata radio uno alterove pallido. Nates acutiuscula.*

- donacina. 59. T. testa ovata compresso-planiuscula læviuscula: an- tice obtusissima.  
*Gualt. test. t. 88. f. N.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*  
*Testa simillima T. incarnata, sed minor, purpurascens radiis plurimis rubris. Regio vulvæ obtusissima & fere truncata, ut in Donace.*

- truncata. 60. T. testa ovali compressa substriata, parte antica trun- cata suturaque distincta.  
*Habitat in Java.*

*Testa*



*Testa similis T. incarnata, sed violacea, magis fragilis, apice anteriore fere truncato. Regionem anteriorem distinguit linea elevata: Dentes omnes emarginati.*

**balaustrina. 61.** *T. testa dilatato-orbiculata læviuscula, valvula altera dentibus lateralibus.*

*Habitat in M. Mediterraneo. J. T. Fagrus.*

*Testa magnitudine seminis Lupini albi, fere orbicularis, sed paulo magis dilatata, albida radiis obsoletis rufis.*

\* \* \* Suborbiculatæ.

**Remies. 62.** *T. testa suborbiculata compressa rugosa. M. L. U. 482. n. 29. \**

*Rumph. mus. t. 43. f. I. Remies.*

*Gualt. test. t. 76. f. F.*

*Habitat in O. Europæo & Indico.*

**reticulata. 63.** *T. testa lentiformi compressa reticulata.*

*Rumph. mus. t. 43. f. E.*

*Habitat in India. Tesdorff.*

*Testa alba: Striis longitudinalibus crispis striisque transversis elevatis lyncea tantum videndis reticulata. Anus cordatus, impressus, brevissimus.*

**scobinata. 64.** *T. testa lenticulari scabra: squamis lunatis quincuncialibus. M. L. U. 482. n. 30. \**

*Gualt. test. t. 76. f. E.*

*Habitat in O. Asiatico.*

*Ani fossula oblonga, nec labia canaliculata.*

**lætca. 65.** *T. testa lentiformi gibba alba pellucida lævi.*

*Gualt. test. t. 71. f. D.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa semine Lupini albi major, parum transversim obsolete striata.*

**carnaria. 66.** *T. testa suborbiculata lævi utrinque incarnata oblique striata: striis hinc reflexis.*

*List. angl. 175. t. 4. f. 25.*

*Gualt. test. t. 77. f. I.*

*Habitat in Oceani brevibus.*

*Testa magnitudine seminis Lupini albi, nonnihil compressa.*

67. T.

- bimacula-67. T. testa triangulo-subrotunda latiore lævi albida: intus maculis duabus sanguineis oblongis. *Fn. svec.* 2135.  
*Habitat in O. Europæo.*  
*Testa vix extimi pollicis magnitudine, extus alba, sed macule interiores parum pellucet; lævis nisi striis aliquot obsoletis circumdata esset. Flexura testæ in hac non manifesta.*
- balthica. 68. T. testa subrotunda lævi extus incarnata. *Fn. svec.* 2136 \*  
*It. æland.* 43.  
*Habitat in M. Balthico.*  
*Testa seminis Lupini albi magnitudine; molliuscula, fragilissima; intus alba, extus incarnata, e triangulo rotundata.*
- piliformis. 69. T. testa subglobosa lævi, intus incarnata, oblique substriata: striis antice angulo acuto reflexis. *Fn. svec.* 2137.  
*Qual. test. t. 7. f. G.*  
*Habitat ad O. Europæi ostia fluviorum.*  
*Testa magnitudine Pisi, alba, fundo purpureo, striata Striis vix oculo nudo manifestis, obliquis, sed anterieus reflexis ad angulum acutum. Cardinis Dens unicus præter laterales prominulos. Rarius tota alba reperitur.*
- divaricata. 70. T. testa subglobosa alba bifariam oblique striata.  
*Habitat in M. Mediterraneo. F. Logie.*  
*Testa magnitudine Pisi, subcompresso-globosa, gibba. Strie tenuissima, bifariam ad utrumque latus ductæ.*
- digitaria. 71. T. testa subglobosa pallida cincta striis obliquis uniformibus.  
*Habitat in M. Mediterraneo. Logie.*  
*Testa magnitudine Pisi, albida, interdum maculis nudatis rufis. Striæ transversæ, sed pulchre oblique, sensim desinentes ad marginem exteriorem, uti striæ in apice digitorum, unde apparet spiraliter striata.*
- cornea. 72. T. globosa glabra cornei coloris: sulco transversali.  
*Fn. svec.* 2138. \*  
*List. angl. app. 22. t. 1. f. 5.*  
*Habitat in Europæ paludibus, stagnis.*  
*Testa magnitudine Pisi, rudis, cornei coloris; at in Islandia quadruplo major.*

306. CARDIUM. *Animal Tethys.*

*Testa bivalvis, subæquilatera, æquivalvis.*

*Cardo Dentibus mediis binis alternatis; lateralibus remotis infertis.*

costatum. 73. *C. testa gibba æquivalvi: costis elevatis carinatis concavis membranaceis. M. L. U. 483. n. 31. \**

*Column. purp. 26. t. 27.*

*Rumph. mus. t. 48. f. 6.*

*List. conch. 1. t. 327. f. 164.*

*Gualt. test. t. 72. f. D.*

*Argenv. conch. t. 26 f. A. Concha exotica.*

*Adans. seneg. 1. t. 18. f. 2.*

*Habitat in M. Africano.*

Cardissa. 74. *C. testa cordata: valvulis compressis dentato-carinatis, natibus approximatis. M. L. U. 484. n. 32. \**

*Column. aqu. 16.*

*Rumph. mus. t. 42. f. E. Cardissa.*

*Gualt. test. t. 84. f. B. C. D.*

*Argenv. conch. t. 26. f. I. Cor veneris.*

*Klein. ostr. t. 10. f. 39.*

*Habitat in O. Asiatico.*

*Variat Testa lateribus utrinque planis aut altera concava.*

retusum. 75. *C. testa cordata: valvulis striatis crenulatis subcarinatis, ano lunato cordiformi intruso.*

*Habitat in India. Sprengler.*

*Testa inter Hemicardium & Fragum media, laevis.*

*Valvula angulo subcarinata, striata & transversim*

*crenulata. Anus profunde intrusus sinu lunari.*

*Margo plicato-dentatus.*

hemica- 76. *C. testa cordata subquadrilatera: valvulis carinatis, natibus distantibus. M. L. U. 484. n. 33. \**

*Rumph. mus. t. 44. f. H.*

*Gualt. test. t. 83. f. C.*

*Habitat in O. Asiatico.*

77. *C.*

*Cardiorum Cardines dentibus lateralibus remotis instructi, qui foraminulo s. foramine opposita valvula inferuntur, dum testa clauditur, quod non obtinet in Testinis.*

- medium. 77. *C. testa subcordata subangulata: valvulis angulatis sulcatis laevibus. M. L. U. 485. n. 34.\**  
*Habitat in O. Indico.*  
*Testa simillima priori, sed exalbido-purpurascente varia, sulcis laevibus absque aculeis, angulisque obsoletis.*
- aculeatum. 78. *C. testa subcordata: sulcis convexis linea exaratis: exterius aculeato-ciliatis.*  
*M. L. U. 485. n. 35.\* Cardium muricatum.*  
*Bonan. recr. 2. t. 96, 97.*  
*Gualt. test. t. 72. f. A.*  
*Argenv. conch. t. 26. f. B. Cor bovis.*  
*Habitat in O. Europæo australi.*  
*Maxime affinis sequenti & forte varietas.*
- echinatum. 79. *C. testa subcordata: sulcis exaratis linea ciliata aculeis inflexis plurimis. Fn. suec. 2139.\* M. L. U. 486. n. 36.\**  
*Rond. test. 22. Concha echinata.*  
*List. angl. t. 5. f. 33.*  
*conch. t. 324. f. 161,*  
*Bonan. recr. 2. t. 90.*  
*Gesn. aquat. 131, 132.*  
*Gualt. test. t. 72. f. B.*  
*Klein. ostr. t. 10. f. 40.*  
*Ginan. adr. 2. t. 19. f. 130.*  
*Habitat in O. septentrionali.*
- ciliare. 80. *C. testa subcordata: sulcis elevatis triquetris: extimis aculeato-ciliatis.*  
*Gualt. test. t. 72. f. C.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*  
*Simillima duobus precedentibus, sed minor & nivea.*  
*Sulci triquetri, latere scilicet altero adnato.*
- tubercula-81. *C. testa subcordata: sulcis obtusis nodosis transversim striatis. M. L. U. 486. n. 37.\**  
*Rumph. mus. t. 48. f. 11.*  
*Argenv. conch. t. 26. f. L.*  
*Habitat . . .*
- Ifocardia. 82. *C. testa cordata: sulcis squamis fornicatis imbricatis.*  
*M. L. U. 487. n. 38.\**  
*Rumph. mus. t. 48. f. 9.*  
*Argenv. conch. t. 26. f. M.*

*Regenf.*

*Regenf. conch.* 20. t. 5. f. 56.

*Habitat* . .

Fragum. 83. C. testa subcordata subangulata: fulcis notatis lunulis elevatis. *M. L. U.* 488. n. 39. \*

*Rumph. mus.* t. 44. f. G. Fragum album.

*Gualt. test.* t. 71. f. N.

*Habitat in* O. Asiatico, Americano.

Unedo. 84. C. testa subcordata: fulcis lunulis coloratis. *M. L. U.* 488. n. 40. \*

*Bonan. recr.* 3. t. 375.

*Rumph. mus.* t. 44. f. F.

*Argenv. conch.* t. 26. f. N. Fragum.

*Gualt. test.* t. 83. f. A. B.

*Regenf. conch.* 12. t. 3. f. 25.

*Habitat* . .

*Vulva labium alterum alteri incumbit, quod vix in precedenti, cui maxime affinis, sed saepe decuplo major.*

murica- 85. C. testa subcordata fulcata lateribus muricata. *M. tum. L. U.* 489. n. 41. \*

*Habitat ad sinum Campechiensem.*

*Testa precedentibus similis, margine undique serrata, extus flavescens; intus umbonibus purpurascens.*

magnum. 86. C. testa oblonga: fulcis angulatis latere ferratis. *M. L. U.* 489. n. 42. \*

*Habitat ad Jamaicam.*

flavum. 87. C. testa subovata fulcata: latere anteriore scabro, posteriore dentato. *M. L. U.* 490. n. 43. \*

*Habitat* . .

*Testa subovata, flava, latere anteriore alba. Sulci crenati nodulis in latere posteriore; margo non rubens.*

laeviga- 88. C. testa obovata: striis obsoletis longitudinalibus. *M. tum. L. U.* 490. n. 44. \*

*Habitat* . .

*Testa simillima precedenti, sed striæ loco sulcorum.*

ferratum. 89. C. testa obovata laevi striis obsoletis, margine interiore ferrato. *M. L. U.* 491. n. 45. \*

*Habitat in* M. Mediterraneo.

*Testa*

*Testa flava, versus cardinem gibba, margine exteriori crenulato, anteriore serrato. Nates regulares.*

- edule. 90. C. testa antiquata: sulcis XXVI obsolete recurvato-imbricatis. *Fn. succ. 2141.\**

*It. xl. 42.*

*Baster, subs. 2. p. 72. t. 8. f. 3, 4.*

*List. angl. 189. t. 5. f. 34.*

*Gualt. test. 71. f. F.*

*Habitat in O. Europæo.*

- rusticum. 91. C. testa antiquata: sulcis XX remotis interstitiis rugosis.

*Rond. test. 1. p. 21. c. 19. Concha striata.*

*Rumph. mus. t. 44. f. K.*

*Gualt. test. t. 71. f. M.*

*Regenf. conch. t. 8. f. 23, 24. & t. 12. f. 77, 78.*

*Habitat in M. Mediterraneo & Europæ australioris.*

*Testa aliis ferruginea fasciis lividis; aliis minor nivea fasciis ferrugineis.*

- pectinata-  
tum. 92. C. testa subcordata pectinata. *M. L. U. 492. n. 47.\**

*Gualt. test. t. 75. f. A.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Teste striæ distantes sursum scabræ; cavitas sub umbonibus flava. Anus ovatus, impressus marginibus prominulis.*

- virgine-  
um. 93. C. testa triangulo-rotundata æquilatera: rugis transversis membranaceo-recurvatis, cardinibus cæruleis.

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa pulchella, fasciata lineis retrorsum imbricatis, remotis, epidermide glauca oblecta. Cavitas alba, sed cardines cærulei: dentibus lateralibus longitudinalibus, linearibus fere Macstræ, sed cardo Cardii.*

*Antiquata testa nobis, quæ longitudinaliter sulcata, sed transversis appositionibus annu-  
notinis quasi intercepta.*

*Pectinata mihi, quæ longitudinaliter sulcata l. striata, at vero antice striis l. sulcis ad  
angulum acutum divergentibus.*

*Longitudinalis testa a natibus ad marginem.*

*Transversalis vero a natibus ad nates arcu margini parallelo.*

307. MACTRA. *animal* Tethys.

*Testa* bivalvis, inæquilatera, æquivalvis.

*Cardo* Dente medio complicato cum adjecta foveola; Lateralibus remotis insertis.

Sprengle. 94. M. testa lævi, vulva plana: rima lunula hiante.

*Habitat* ad Cap. b. Spei Laur. Sprengler.

*Testa* magnitudine fere manus, lævis, subtriangularis, pallida, subdiaphana. Latus antérieur angulo subcarinatum distinctum a limbis. Vulva ad nates lunata, acuta, tota hians in foveolâ cardinis. Latus posterior planiusculum, striatum. Nates incurvæ. Dentes laterales carinis triangulari.

plicataria. 95. M. testa transverse rugoso-plicata diaphana, vulva planiuscula, ano compresso oblongo.

*Habitat* in Java.

*Testa* latitudine ovi, alba, tenuis instar papyri, transversaliter plicata rugis parallelis. Vulva planiuscula, lanceolata, carina ab umbonibus distincta, lævis. Anus ovato-lanceolatus, magis impressus, lævis. Cardinis dentes laterales ex duobus parallelis membranis. Nates incurvæ, recurvæ.

striatula. 96. M. testa lævis diaphana, umbonibus substriatis, vulva lævi impressa carina circumscripta.

*Habitat* in M. Mediterraneo.

*Testa* alba, latitudine juglandis. Vulva lanceolata, in medio longitudinaliter impressiuscula, lævis, carina utrinque distincta. Umbones striati.

glabrata. 97. M. testa lævi diaphana striata, umbonibus lævissimis, vulva anoque striatis.

*Habitat* in O. Africano.

*Testa* magnitudine N. coryli, alba. Nates & umbones lævissimi, glaberrimi, nec striati. Limbus striatus. Vulva nulla carina distincta.

corallina. 98. M. testa lævi subdiaphana alba, fasciis lacteis.

*Bonap. recr.* 3. t. 5-2.

C c c c

Rond.

*Rond. test.* 1. p. 32. t. 33.

*Gualt. test.* t. 71. f. B.

*Planc. conch.* t. 3. f. 4?

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*stultorum*. 99. *M.* testa subdiaphana lævi obsolete radiata, intus purpurascens, vulva gibba.

*Sysl. nat.* 10. p. 681. n. 8. *Cardium stultorum*.

*Habitat in O. Europæo.*

*Variat colore fusco, cinereo, testaceo, sæpius pallide radiata.*

*solida*. 100. *M.* testa opaca læviuscula subantiquata.

*Fn. suec.* 2140. *Cardium solidum*.

*Bonan. recr.* 3. t. 51.

*Rond. test.* 1. c. 7.

*List. angl.* 174. t. 4. f. 24.

*Habitat in O. Europæo.*

*Testa crassa, alba s. flavescens, sæpe cingulis lacteis subimbricata & fere antiquata. Cardio dentibus lateralibus minus elongatis: Foveola major quam in reliquis & dens intermedius minor.*

*lutraria*. 101. testa ovali oblonga lævi, dentibus lateralibus nullis.

*Mya lutraria. Fn. suec.* 2128. *M. L. U.* 470. n. 9.

*List. angl.* 170. t. 4. f. 19.

*Bonan. recr.* 2. t. 19.

*Rumph. mus.* t. 45. f. M.

*Habitat ad ostia fluviorum Oceani Europæi.*

*Cardo destituitur dentibus lateralibus, quibus a congenere tantum differt.*

### 308. DONAX. *Animal Tethys.*

*Testa* bivalvis, margine antico obtusissimo.

*Cardo* Dentibus duobus; marginalique solitario, subremoto, sub ano.

*Scortum*. 102. *D.* testa triangulo-cordata, vulva plana. *M. L. U.* 493. n. 48. \*

*Gualt. test.* t. 85. f. F.

*Argenv. conch.* t. 24. f. L.

*Habitat in America.*

103. *D.*



pubescens. 103. *D. testa antice spinis ciliata. M. L. U. 493. n. 49.\**  
*Habitat in O. Indico.*

*Testa argute decussatim striata: antice plana laterum angulo carinato, versus apicem spinis e stris enatis membranaceis ciliato Rima hians ovata: nymphis nudis. Annus ovato-oblongus.*

rugosa. 104. *D. testa antice rugosa gibba, marginibus crenatis. M. L. U. 494. n. 50.\**  
*Gualt. test. t. 89 f. D.*  
*Habitat in O. Meridionali.*

Trunculus. 105. *D. testa antice lævi, intus violacea, marginibus crenatis. Fn. spec. 2142. M. L. U. 494. n. 51.*  
*List, angl. 190. t. 5. f. 35.*  
*Bonan. recr. 2. t. 47.*  
*Kipin. ostr. t. 11. f. 61.*  
*Adans. seneg. 1. t. 18. f. 1.*  
*Gualt. test. t. 88. f. o.*  
*Argenv. conch. t. 25. f. L.*  
*Klein. ostr. t. 11. f. 61.*  
*Habitat in Oceano Europæo.*

striata. 106. *D. testa antice obtusissima undique striata, margine denticulato, vulva ovata.*  
*Habitat in Europæ australis Oceano.*  
*Reliquis magis gibba & tota, exceptis natibus, striata, & alba.*

denticulata. 107. *D. testa antice obtusissima, labiis transverse rugosis, margine denticulato, nymphis dentiformibus.*  
*Habitat in M. Mediterraneo. F. Logie.*  
*Testa cuneiformis, lævis, longitudinaliter punctato-striata, albida, purpurascens - subfasciata. Vulva subrotunda, minima; antice obtusissima, area media transverse rugosa, laterali recta; margo denticulatus. Intus albicans,*

cuneata. 108. *D. testa cuneiformi, marginibus integerrimis. Mus. L. U. 495. n. 52.\**  
*Habitat . . .*  
*Testa parva, ovata, compressa, violacea f. vario colore.*

scripta. 109. *D. testa ovata compressa lævi, scripta lineis purpureis undatis, rima acuta, marginibus crenulatis. M. L. U. 495. n. 53.\**  
*Rumph.*

*Rumph. mus. t. 43. F. L. M. Literata Xylanensis.*

*Gualt. test. t. 88. f. Q.*

*List. conch. t. 379. f. 222.*

*Bonap. recr. 2. t. 43.*

*Klein. ostr. t. 11. f. 59.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

muricata. 110. D. testa ovata: striis muricatis, margine denticulato. *M. L. U. 496. n. 54.\**

*Habitat in O. Indico.*

*Testa gibba, rufescens; margo anterior denticulatus.*

*Rima hians, terminata antice, utrinque dente compresso. Anus nullus.*

Irus 111. D. testa ovali, rugis membranaceis erectis striatis cincta

*Gualt. test. t. 95. f. A.*

*Habitat in M. Mediterraneo. Brander.*

*Testa magnitudine Phaseoli, ovalis, alba, antice obtusissima, rugosa: rugis arcuatis, membranaceis, reflexo-erectis, striatis, fere crispis, exterioribus sensim anterioribus majoribus. Cardo utrinque dentibus duobus minimis; altero bifido.*

### 309. VENUS. *Animal Tethys.*

*Testa bivalvis, labiis margine antico incumbentibus.*

*Cardo dentibus 3: omnibus approximatis: lateralibus apice divergentibus*

*Vulva & Anus distincta.*

\* *Pubentes.*

Dione. 112. V. testa subcordata transverse sulcata, pube spinosa.

*M. L. U. 497. n. 55.\**

*List. conch. t. 307. f. 140.*

*Rumph. mus. t. 48. f. 4.*

*Olear. mus. 29. f. 4.*

*Pet. gaz. t. 31. f. 9.*

*Gualt. test. t. 76. f. D.*

*Argens.*

*Argenv. conch. t. 24. f. I. Concha veneris occidentalis.*

*Habitat in O. America.*

*Venerem filiam Dionis s. e Concha maris natam finxere Poëtæ; hujus Typus præcipue determinabit Concharum partium metaphoricam denominationem.*

TESTA bivalvis, equivalvis, semicordata, rotundata, subincarnata, postice anticeque magis gibba, umbonibus undique exaratis Striis transversis, distantibus, parallelis, marginatis, subrecurvatis, equalibus: exterioribus obtusioribus: posterius Alternis altioribus acutioribusque, Alternisque abbreviatis minoribus. INTUS lævis, alba, sub umbonibus fornicata. CARDO sinistræ tridentatus: Dentibus approximatis, scrobiculo distinctis; Denticulo intermedio compresso, angustiore: lateralibus divergentibus, crassiusculis, obtusis. Dextræ cardo Denticulis duobus, approximatis, compressis inter scrobiculos duos. MARGO ambitus obtusissimus, integerrimus: NATES recurvate, obtusiusculæ, apice glabræ. ANUS impressus, ovatus, lævis, incarnatus. Antice Pubes ciliaris, utrinque, e natibus ad summum mentis veneris, cingens vulvam Spinis e striis alternis tertiisve testæ oris, subulatis, depressis, adscendentibus, antrorsum arcuatis, subtus canaliculatis, superioribus sensim longioribus: longissimis longitudine ipsius rimæ. VULVÆ regio incarnata, oblique striata sursum a rima ad pubem. Labia leviora, incarnata, inclusa fascia pallida, armata, a natibus ad medium rimæ, Aculeis utrinque quinque brevissimis; margo vulvæ supra rimam connivet sulco longitudinali, intra quem sinistræ margo gibbosior se insinuat. Rima lanceolata, hians labris prominulis, clausa hymene. NYMPHÆ cartilagineæ, retractiores, longitudine rimæ.

Paphia. 113. V. testa subcordata, rugis incrassatis, pube rugis attenuatis, labris complicatis.

*Bonan. recr. f. 2. t. 75.*

*Rumph. mus. t. 48. f. 5.*

*Gualt. test. t. 85. f. A.*

*Argenv. conch. t. 24. f. B.*

*Regenf. conch. t. 7. f. 11.*

*Habitat in O. Lusitanico.*

*Affinis adeo Dysere, ut multis examinatis speciminibus vix ac vix limites dentur.*

C c c c 3

114. V.

**Marica.** 114. V. testa subcordata decussatim striata, pube lamellosa. *M. L. U.* 497. n. 56. \*

*Habitat in O. Americæ.*

*Proxima huic est Argenv. conch. t. 24. f. B.*

**Dysera.** 115. V. testa subcordata: sulcis transversis remotis reflexis, margine crenulato. *M. L. U.* 498. n. 57. \*

*List. conch. t. 278. f. 115, 122, 123.*

*Pet. gaz. t. 93. f. 17.*

*Argenv. conch. t. 24. f. K. Concha Veneris orientalis.*

*γ. List. conch. t. 277. f. 114.*

*Klein. ostr. t. 10. f. 48, 49.*

*δ. Argenv. conch. t. 24. f. Q.*

*Habitat in O. Americæ, Asiæ.*

\* \* *Impuberes subcordatæ.*

**Verrucosa.** 116. V. testa subcordata: sulcis membranaceis striatis reflexis, antice imprimis verrucosis, margine crenulato.

*Gualt. test. t. 75. f. 11.*

*Habitat in Europa australi.*

*Statura & maculis ad Paphiam accedit, ut forte varietas levigata.*

**Cafina.** 117. V. testa subcordata: sulcis transversis recurvis acutis, margine postico crenulato: pone anum canaliculato.

*Habitat in O. Europæo, frequenter etiam fossilis.*

**cancel-  
ta.** 118. V. subcordata, striis transversis membranaceis remotis, ano cordato. *M. L. U.* 506. n. 71. \*

*Gualt. test. t. 88 f. D.*

*Habitat in Oceano Africano.*

*Testa cinerea, leviter striata a natibus ad marginem. Striæ transversæ, remotæ, elevatae, membranaceæ, erecto-patentes. Anus cordatus. Margo subcrenulatus.*

*Variat striis longitudinalibus & absque his striis.*

**Gallina.** 119. V. testa subcordata radiata: striis transversis obtusis, cardinis dente postico minimo, margine crenulato.

*Fn. succ. 2143.*

*Bonn. recr. 2. t. 64, 65.*

*Habitat in M. Mediterraneo, Norvegico, Asiatico.*

*Testa*

*Testa colore varians, sæpe glaberrima licet striata; striae apparent crenulatae, quamvis non sint.*

- petulca. 120. V. testa subcordata subfulcata, margine crenulato, rima subovata hiante, nymphis acutis.

*Habitat in O. Europæ australioris.*

*Testa magnitudine Avellana, albo fuscoque nebuloſa. Anus oblongus.*

- flexuosa. 121. V. testa subcordata: sulcis transversis obtusis, vulvæ labiis angulo elevato distinctis.

*Rumph. mus. t. 43. f. o.*

*Habitat in Indiis. D. C. Solander.*

*Testa magnitudine seminis Aesculi, albida, rufo punctata. Striis transversis vix crenatis, obtusis, juxta vulvam sæpe bifidis. Vulva retusa, ruſa, oblique striata angulis lateralibus elevatis & gibbis. Margo vix manifeste crenulatus, juxta vulvam inflexus.*

- Erycina. 122. V. testa cordata transversim parallele fulcata, sulcis obtusissimis, vulva glabra, ano ovato.

*Habitat in Europa. J. Theqd. Fagens.*

*Simillima Chioni, sed sulcis numerosis profundioribus.*

- mercenaria. 123. V. testa cordata solida transverse substriata lævi, margine crenulato, intus violacea, ano ovato. *Fn. Svec. 2144.*

*List. angl. 229. t. 4. f. 22.*

*Habitat in Pensylvania. P. Kalm: e qua Sylvestrium Nummi parantur. In Norvegia copiose ad ostia maris; editur a Pensylvanis. In montibus Sveciæ fossilis.*

*Testa præ reliquis crassa est & ponderosa. Limbus tantum testæ interne violaceus est.*

- islandica. 124. V. testa cordata transversim striata rudi, nymphis hiantibus, ano nullo. *Zoega.*

*Habitat in Islandia.*

*Similis V. mercenariæ, sed vix ovo gallinaceo major, colore alba.*

- Chione. 125. V. testa cordata transverse subrugosa lævi, cardinis dente posteriori lanceolato. *M. L. U. 500. n. 58.\**

*Rumph. mus. t. 42. f. G.*

*Gualt. test. t. 86. f. A.*

C c c c 4

Argenu

*Argenv. conch. t. 24. f. C.*

*Regenf. conch. t. 8. f. 17.*

*Habitat in O. Asiatico, forte etiam in Europæo.*

*Testa magnitudine fere ovi gallinæ, alba aut subferruginea; margo integerrimus est.*

maculata. 126. V. testa cordata lævi: maculis exoleis sparsis. *M.*

*L. U. 500. n. 59 \**

*List. conch. t. 270. f. 106.*

*Adans. seneg. 1. t. 17. f. 15.*

*Gualt. test. t. 86. f. I.*

*Argenv. conch. t. 24. f. H.*

*Regenf. conch. t. 8. f. 16.*

*Habitat in O. Americano, Africano.*

*Variat magis minaque oblonga.*

Meretrix. 127. V. testa cordata glabra, vulva fusca gibba, nymphis hiantibus. *M. L. U. 501. n. 60. \**

*Argenv. conch. t. 24. f. F.*

*Habitat in O. Indico.*

lata. 128. V. testa subcordata tumida glaberrima albo radiata, labiis subviolaceis.

*Gualt. test. t. 88. f. V.*

*Habitat in M. Mediterraneo & Indico.*

*Testa flavescent, nitidissima, radiis aliquot latis albis depicta. Labia obscuriora. Anus ovatus.*

castrensis. 129. V. triangulo-rotundata gibba glaberrima characteribus angularibus inscripta. *M. L. U. 501. n. 61. \**

*List. conch. t. 262. f. 98.*

*Bonap. recr. 2. t. 376.*

*Rumph. mus. 1. 42. f. K. Chama optica.*

*Gualt. test. t. 82. f. H.*

*Regenf. conch. 2. t. 1. f. 3, 4. & t. 4. f. 41.*

*Habitat in O. utriusque Indiæ.*

Phryne. 130. V. testa subcordata lævi antice posticeque transverse striata, ano obcordato venis violaceis.

*Habitat in O. australiori.*

Meroë. 131. V. testa ovata compressa transverse striata, sutura postica hiant. *M. L. U. 502. n. 62. \**

*Habitat in O. australiori.*

*Testa*

*Testa alba venis leucophais. Nates remota. Sutura  
bians pone anum oblongum, obsoletum. Vulva excisa.  
Affinis plurimum Donaci scripta.*

desflorata. 132. V. testa ovali longitudinaliter rugosa antice violacea,  
nymphis atris.

*Habitat in O. Europæo.*

*Testa latitudine ovi, a cardine ad peripheriam rugosa,  
albida. Latus antierius, præsertim interius, violaceum.*

umbriata. 133. V. testa ovali gibba longitudinaliter striata, transverse  
fulcata, margine crenulato. *M. L. U. 502. n. 63.\**

*List. conch. t. 336. f. 172.*

*Rumph. mus. t. 43. f. F.*

*Gualt. test. t. 75. f. G.*

*Argenv. conch. t. 24. f. C. Chama scobinata.*

*Klein. ostr. t. 10. f. 52.*

*Habitat in O. Indiæ orientalis.*

reticulata. 134. V. testa subcordata: striis elevatis decussatis, ano  
cordato, margine integro. *M. L. U. 503. n. 64.\**

*Bonan. recp. 2. t. 69.*

*List. conch. t. 337. f. 174.*

*Gualt. test. t. 77. f. A.*

*Adans. seneg. 1. t. 16. f. 3.*

*Argenv. conch. t. 26. f. F.*

*Habitat in O. Africano.*

squamosa. 135. V. testa subcordata reticulato-striata rerrorsum squa-  
mosa.

*Rumph. mus. t. 44. f. M.*

*Habitat in O. Indico.*

\* \* \* *Impuberes, orbiculata.*

tigerina. 136. V. testa lentiformi: striis crenatis decussatis, ano  
impresso ovato. *M. L. U. 503. n. 65.\**

*Rumph. mus. t. 43. f. H.*

*Habitat in O. Indico.*

prostrata. 137. V. testa orbiculata transverse striata, labijs scabro-  
membranaceis. *M. L. U. 504. n. 66.\**

*Habitat in O. Indico. Tranquebar.*

C c c c s

*Testa*

*Testa subscabra, exolete testacea radiis albis. Nates reflexæ. Rima oblonga, patula. Annus cordatus.*

pensylva-nica. 138. V. testa lentiformi glabro-rugosa alba, antice utrinque sulco longitudinali. *M. L. U. 504. n. 67.\**  
*Argent. conch. t. 24. f. N. Chama ex Jamaica.*  
*Habitat in America septentrionali.*

incrustata. 139. V. testa lentiformi glaberrima lævissima punctis excavata. *M. L. U. 505. n. 68.\**  
*Habitat in O. Indico.*  
*Testa intus crusta crassa albida. Ani vestigium foraminis rotundo sub natibus.*

punctata. 140. V. testa lentiformi longitudinaliter sulcata, intus punctata. *M. L. U. 505. n. 69.\**  
*Rumph. mus. t. 43. f. G.*  
*Habitat in O. Indico.*  
*Testa intus obducta crusta crassa albida, sed punctata.*  
*Annus ut in precedente.*

tigerina. 141. V. testa lentiformi decussatim striata, ano ovato impresso. *M. L. U. 503. n. 65.\**  
*Rumph. mus. t. 43. f. H.*  
 β. Venus orbicularis. *Syst. nat. 10. p. 688. n. 118.*  
*Habitat intra Tropicos.*  
*Testa interne, ad Annum & rimam rufescens.*

exoleta. 142. V. testa lentiformi transversim striata pallida, obsolete radiata, ano cordato. *Fav. suec. 2145. M. L. U. 506. n. 70.\**  
*List. conch. t. 262. f. 98.*  
*Pet. gaz. 291. f. 127.*  
*Gualt. test. t. 75. f. F, G.*  
*Adans. seneg. 1. 2. 16. f. 4.*  
 β. *Syst. nat. 10. p. 689. n. 123. Venus Lupinus.*  
*Habitat ad Garnsey; in Norvegia.*  
*Testa intus crusta crassa albida. Annus ferrugineus; valde affinis 139, 140.*

borealis. 143. testa lentiformi: striis transversis membranaceis & rectis remotissimis.  
*List. angl. 174. t. 4. f. 23.*  
*Habitat in Oceano Europæo.*

Testa



Testa alba, angulata, ad rimam recta & quasi truncata; striæ inæquales, membranaceæ.

pectinata. 144. V. testa sublentiformi, sulcis longitudinalibus rugosâ; pube antrorsum ramosa. *M. L. U.* 507. n. 72.\*

*Rumph. mus.* t. 42. f. D.

*Gualt. test.* t. 72. f. F. E.

*Argenv. conch.* t. 24. f. P.

*Habitat in Indiis.*

scripta. 145. V. testa lentiformi compressa striata postice angulo recto angulata. *M. L. U.* 507. n. 73.\*

*Rumph. mus.* t. 43. f. C. Chama literata rotunda.

*Gualt. test.* t. 77. f. C.

*Argenv. conch.* t. 24. f. M. Chama optica.

*Habitat in Indiis.*

*Impressio ani lanceolata.*

edentula. 146. V. testa lentiformi subgloboso-lenticulata rugosa edentula; ano ovato. *M. L. U.* 508. n. 74.\*

*Habitat in Indiis.*

Testa subglobosa, diaphana, alba. Anus ovato-acutus, valde excavatus angulo acuto.

\* \* \* \* Impuberes ovales, supra rimam subangulata.

literata. 147. V. testa ovata antice angulata, striis transversis subundulatis. *Fn. suec.* 2146. *M. L. U.* 508. n. 75.\*

*Bonap. recr.* 2. f. 67.

*Rumph. mus.* t. 43. f. B. Chama literata oblonga.

*Gualt. test.* t. 86. f. E. F.

*Argenv. conch.* t. 24. f. A. Chama literata.

*Regenf. conch.* 16. t. 4. f. 39.

*Habitat in Europa & India.*

Color saepe cinerascens, sed plurimum varians, sapiusque characteribus notatus; variat etiam rugis antice longitudinalibus, in majoribus imprimis & indicis.

rotundata. 148. V. testa ovata antice subangulata: striis transversis, cardinis dente intermedio bifido. *M. L. U.* 509. n. 76.\*

*Habitat in O. Indico.*

Testa Anus ovato-lanceolatus, fuscus, retusus. Dentes cardinis utrinque tres: medio bifido.

decussata. 149. V. testa ovata antice angulata decussatim striata. *M. L. U.* 509. n. 77.\*

*Hab.*

*Habitat in O. Indico.*

*Testa Anus minimus, retusus, macula nulla impressa.*  
*Color intus albidus, sapius cum tinctura crocea.*

virginica. 150. V. testa subovata antice subangulata, striis transversis inæquilineatis, vulva tumida.

*Habitat in Indiis.*

*Similis fere V. decussata, sed magis rotunda, pallide incarnata, vix radiata, transverse striata, sed strie verus vulvæ regionem sapius confusæ. Vulvæ regio tumidior, quam in reliquis, oblique striata.*

### 310. SPONDYLUS. *Animal Tethys.*

*Testa inæquivalvis, rigida.*

*Cardo dentibus 2 recurvis, cum foraminulo intermedio.*

Gædero-151. S. testa subaurita spinosa. M. L. U. 510. n. 78.\*  
 pus. Bocc. observ. 1674. p. . . t. 304. Concha hittricina.

Rond. pisc. 1. t. 40.

Rumph. mus. t. 47. f. E.

Bonap. recr. 2. f. 20, 21.

Gualt. test. 100, 101. f. A, B. t. 99. f. F, G.

Argenv. conch. t. 23. f. G. B. L.

Klein. ostr. t. 9. f. 37.

Regenf. conch. 16. t. 4. f. 48.

Seb. mus. 3. t. 88. f. 1-11. ♂ t. 89. f. 8, 7, 4.

*Habitat in M. Mediterraneo, arcte adhaerens scopulis.*

*Natum altera longior, hinc plana, ac si arte secta ant abrasa fuisset.*

regius. 152. S. testa inaurita spinosa. M. L. U. 511. n. 79.\*

Rumph. mus. 156. n. 8.

*Habitat in India.*

*Simillima præcedenti, sed major spinis & sulcis valdius; forte insignis tantum varietas.*

plicatus. 153. S. testa inaurita mutica plicata. M. L. U. 511. n. 80.\*

Rumph. mus. t. 47. Ostrea electrica.

Gualt. test. t. 99. f. 2.

*Habitat in Java.*

311. CHA-

Spondyli tota sua structura testæ ad Ostreas accedunt, sed dentibus cardinis differunt, & spinis volutarum Chamas referunt.

311. CHAMA. *Animal Tethys.**Testa bivalvis, grossior.**Cardo Callo gibbo, oblique inserto  
fossulæ obliquæ.**Vulva clausa absque nymphis.*Cor. 154. C. testa subrotunda lævi, natibus recurvatis, rima  
hiante. *M. L. U.* 516. n. 88. \**Bonan. recr. 2. t. 88.**Rumph. mus. t. 48. f. 10.**Gualt. test. t. 71. f. E.**Argenv. conch. t. 26. f. K. Cor Bovis.**Ginam. adriat. t. 2. t. 19. f. 129.**Seb. mus. 3. t. 86. f. 1.**Habitat in M. Adriatico versus Dalmatiam.**Testa crassa, subrotunda, exalbido-lutescens. Nates  
evidentius, quam in aliis, cornu arietis in modum  
oblique versus anum convolutæ. Rima nymphis nudis,  
hymene obiectis. Ani regio sub natibus retusa. Cardo  
callis compressissimis.*Gigas. 155. C. testa plicata fornicato-squamosa, ano hiante cre-  
nato. *M. L. U.* 512. n. 81. \**Olear. mus. t. 29. f. 6.**Bonan. recr. 2. f. 83, 84.**Rumph. mus. t. 42. f. A. B. Chama squamata.**Gualt. test. t. 92. f. A-G.**t. 93. f. B.**Argen. conch. t. 26. f. E. Imbricata.**Regenf. conch. t. 10. f. 48.**Habitat in M. Asiatico.**Testa pendere librarum 532 in M. L. U., adeoque o-  
mnium testaceorum maxima.**Variat rugis transversis confertissimis*Hippopus. 156. C. testa plicata muricata, ano retuso clauso dentato.  
*M. L. U.* 513. n. 82. \**Bonan. recr. 2. f. 81, 82.**Rumph. mus. t. 42. f. C. Chama aspera obtusa.**Gualt. test. t. 93. f. A.**Argenv. conch. t. 26. f. H. Folium brassicæ.**Regenf. conch. t. 10. f. 49.**Habitat in M. Asiatico.*

157. C.

antiquata. 157. *C. testa subcordata, sulcis longitudinalibus striisque transversis. M. L. U. 514. n. 84.\**

*Gualt. test. t. 71. f. L.*

*Bonan. recr. 2. t. 98. Kirch. 446. f. 96.*

*Adans. seneg. 1. t. 16. f. 2.*

*Habitat in O. Africano.*

trapezia. 158. *C. testa trapezia gibba, sulcis longitudinalibus crenulatis.*

*Habitat in Oceano Norvegico. Zoega.\**

*Testa magnitudine pisi, gibbosa ut Arca Noë, fere trapezia, ferruginea. Nates parum recurvatae, Anus ovato-cordatus. Vulva oblonga, distincta, plana, extus crenata. Striae totius 20, longitudinales, crenatae, nodulis obtusis. Margo crenulatus.*

femiorbiculata. 159. *C. testa femiorbiculata compressa rudi decussate striata. M. L. U. 514. n. 85.\**

*Habitat . . .*

*Testa longitudinaliter striata, imbricata squamis annularibus. Lobus ani albidus margine postico crenato.*

calyculata. 160. *C. testa oblonga, sulcis imbricatis, antice retusa.*

*Gualt. test. t. 90. f. F.*

*List. conch. t. 347. f. 184, 185.*

*Adans. seneg. 1. t. 15. f. 8.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa magnitudine extimi articuli digiti, alba, oblonga, sulcis longitudinalibus imbricatis, squamulis fornicatis. Nates obtuse gibbae, auctae testa juvenilis fusca. Rima minima. Venter antice compresso-gibbus; supra rotundatus. Dorsum compressum, retusum. Anus orbiculatus, minimus; pone anum angulus obtusiusculus valde prominulus exit.*

cordata. 161. *C. testa cordata transversim striata, hinc elongata compressa. M. L. U. 515. n. 86.\**

*Habitat . . .*

*Testa testacea, inferne (non versus marginem exterio-rem) sulcis transversis, distinctis, obtusis. Angulus inter rimam & marginem anteriorem elongatus ob-securior.*

striata. 162. *C. testa subrotunda, sulcis dentatis punctis interstiti-  
etis, ano retuso.*

*Habi-*

*Habitat* - -

Testa alba, extus rufescens: Sulci elevati, longitudinaliter dentati alternis brevioribus. Margo crenulatus. Anus cordatus, retusus.

oblonga. 163. C. testa oblonga antice angulata, dentibus anticis acutis. *M. L. U.* 515. n. 87.

*Habitat* - -

Testa subtilissime decussatim striata, alba, intus lactea; antèrius angulo utrinque excurrente.

Lazarus, 164. C. testa imbricata lamellis laceris, nate oblique subspirali. *M. L. U.* 513. n. 83. \*

*Rumph. mus.* 48. f. 3.

*Argenv. conch.* t. 23. f. F. I. Placenta foliacea.

*Brown. jam.* t. 40. f. 9.

*Sch. mus.* 3. t. 89. f. 9, 11, 6, 5.

*Habitat* in M. Mediterraneo; Americano.

gryphoides. 165. C. testa orbiculata muricata: valvula altera planiore; altera nate productione subspirali.

*Bonap. recr.* 2. t. 22.

*Gualt. test.* t. 101. f. C-I.

*Rond. test.* 1. c. 25. Concha rugata.

*Gesn. aqu.* 316.

*Aldr. exs.* 458.

*List. conch.* t. 212. f. 47. & t. 213. f. 48. & t. 215. f. 50-53.

*Sloan. jam.* t. 241. f. 4-7.

*Adans. seneg.* 1. t. 15. f. 1. Jatonus.

*Habitat* in M. Mediterraneo African alluente. Brander.

Valvulae albae, orbiculatae, punctis muricatae, altera adhaerente alii corpori. Nates obsoletae recurvatae, in spiram contortae, intus auriformes.

bicornis. 166. C. testae valvulis conicis: natibus corniformibus obliquis tubulosis valvula longioribus.

*Column. purp.* c. 19.

*List. conch.* t. 214. f. 49.

*Klein. ostr.* 274. t. 12. f. 87, 88.

*Habitat* in M. Mediterraneo.

Singulae valvulae referunt Patellam cucullatam obliquam; hinc praecedenti multum affinis.

Arcinella. 167. C. testa sulcata muricata excavato punctata, cardinis callo sessili.

*Habi-*

*Habitat in O. Americano. Sprengler.*

*Testa magnitudine pruni, longitudinaliter sulcata sulcis excavato-punctatis, poris imbricato-muricatis; margo crenulatus. Nates subaquaes. Ani regio cordata, intrusa, papillosa, rugosa. Cardinis callosus prominens, valde singularis. Sulcis 4 angustis, quas lamellae totidem, in opposita cavitate, intrant.*

### 312. ARCA. *Animal* Tethys?

*Testa* bivalvis, æquivalvis.

*Cardo* Dentibus numerosis, acutis. alternis, insertis.

\* *Margine integerrimo; Natibus recurvatis.*

tortuosa. 168. A. testa parallelipipeda striata, valvula oblique carinata, natibus recurvis, margine integerrimo. *Musf. L. U. 517. n. 86. \**

*Bonan. kirch. 2. t. 122.*

*Rumph. mus. t. 47. f. K. Ostreum tortuosum.*

*Gualt. test. t. 95. f. B.*

*Klein. ostr. t. 8. f. 16.*

*Habitat in - - Norvegia similis, sed minuta.*

\* \* *Margine integro; Natibus inflexis.*

Nox. 169. A. testa oblonga striata apice emarginata, natibus incurvis remotissimis, margine integerrimo hiantes. *M. L. U. 517. n. 90. \**

*Rond. aqu. 2. p. 27. Concha rhomboides.*

*List. conch. 3. B. f. 6. c. 1. t. 5. Musculus matthioli.*

*Bonan. recr. 2. t. 32. Concha rhomboides.*

*Rumph. mus. t. 44. f. P. Arca Nox.*

*Gualt. test. t. 87. f. H. I. G.*

*Argenv. conch. t. 26. f. G.*

*Ginam. adr. 2. t. 23. f. 159.*

*Regenf. conch. t. 12. f. 73.*

*Habitat in M. Rubro, Mediterraneo, Indico.*

barbata. 170. A. testa oblonga striis barbata, natibus incurvis approximatis, margine integerrimo clauso. *Fin. suec. 1147. M. L. U. 518. n. 91. \**

*Musf.*

*Mus. Tassin.* 116. t. 6. f. 1.

*Rond. test.* 14. *Chama aspera.*

*Bonan. recr.* 2. t. 79.

*Gualt. test.* t. 91. f. F.

*Argenv. conch.* t. 25. f. M.

*Ginan. adr.* 2. t. 23. f. 160.

*Seb. mus.* 3. t. 88 f. 13.

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa apice rotundata, integra; strie ex punctis callosis concatenatis; alternis striis maioribus. Barba striis versus apicem imprimis tenuiorem rigens.*

modiolus. 171. A. testa oblonga striata antice angulata.

*Habitat in M. Mediterraneo. F. Zoega.*

*Testa magnitudine Fabe majoris, extus flavescens, intus alba aut subviolacea, figura omnino Mytili Modioli. Valvulae striatae ad latus vulvae s. anterieus profundius; ad vulvae superiora angulus compressus; posteriora natibus vix vel parum longiora. Nates recurvae. Cardo elongatus, longitudinaliter crenatus s. denticulatus.*

Pella. 172. A. testa ovata pellucida substriata; vulva prominente distincta, margine integerrimo, cardine ciliari.

*Habitat in M. Mediterraneo. F. Logie.*

*Testa magnitudine seminis Helianthi annui, alba, pellucida, oblique striata, nitidissima. Vulva valde prominens, transverse striata. Cardinis dentes subulati acutissimi, (quod non in reliquis) imprimis sub vulva.*

\* \* \* Margine crenato; Natibus recurvatis.

laetea. 173. A. testa subrhomboidea obsolete decussatim striata diaphana, natibus recurvis, margine crenulato.

*Habitat in M. Mediterraneo Brander, Logie.*

*Testa magnitudine Fabe equinae.*

antiquata. 174. A. testa oblique cordata multifulcata sulcis muticis, natibus recurvis, margine crenato. *M. L. U.* 518. n. 91. \*

*Bonan. recr.* 2. t. 74.

*List. conch.* t. 236. f. 70.

*Rumph. mus.* t. 44. f. I.

*Sloan. jam.* t. 241. f. 14, 15, 16.

D d d d

*Gualt.*

*Gualt. test. t. 87. f. C.*

*Adans. seneg. 1. t. 18. f. 6.*

*Habitat in O. Americano, Africano.*

*Valvæ regio quasi angulo compresso prominens.*

senilis. 175. A. testa oblique cordata octofulcata lævi, natibus recurvis, margine plicato. *M. L. U. 518. n. 92.\**

*List. conch. 3. B. f. 2. c. 1. t. 4.*

*Gualt. test. t. 87. f. D.*

*Klein. ostr. t. 10. f. 45.*

*Adans. seneg. 1. t. 18. f. 5.*

*Habitat ad Jamaicam, inque O. Africano.*

granosa. 176. A. testa subcordata sulcis muricatis, natibus recurvis, margine crenato. *M. L. U. 519. n. 93.\**

*Column. purp. 21. t. 20. f. 3.*

*Bonon. recr. 2. t. 73.*

*Gualt. test. t. 87. f. E.*

*Argenv. conch. t. 26. f. C.*

*Habitat in O. Europæ meridionalis.*

decussata. 177. A. testa lenticulari decussatim substriata, natibus recurvis, margine crenato, rima clausa. *M. L. U. 519. n. 94.\**

*Habitat in Indiis.*

pallens. 178. A. testa lenticulari subobliqua decussatim striata, natibus recurvis, margine crenato, rima angustissima. *M. L. U. 520. n. 95.\**

*Habitat in Indiis.*

*Testæ color pallidus. Rima lævis.*

\* \* \* \* Margine crenato; Natibus inflexis.

undata. 179. A. testa lenticulari inaurita læviuscula, natibus inflexis, margine plicato.

*Bonon. recr. 2. t. 61.*

*Habitat ad Jamaicam.*

*Testa picta uti A. pectunculus, sed crassior, vix rugosa, minime sulcata, basi rotundata, margine plicata.*

Pectunculus. 180. A. testa lenticulari subaurita sulcata sulcis subimbricatis, natibus inflexis, margine plicato. *M. L. U. 520. n. 96.\**

*List. conch. 3. B. f. 2. c. 2. t. 1. f. 1, 2.*

*Gualt.*



*Gualt. test. t. 72. f. H*  
*Argenv. conch. t. 27. f. B?*  
*Habitat in O. Americano.*

- Glycy- 181. A. testa suborbiculata gibba substriata, natibus in-  
 meris, curvis, margine crenato. *M. L. U. 521. n. 97.\**  
*Bell. aquat. 408.*  
*Rond. test. 31.*  
*Bonap. recr. 2. t. 60, 61.*  
*Rumph. mus. t. 47. f. 1.*  
*List. conch. 3. B. f. 2. c. 3. t. 2.* Chama glycy-  
 meris.  
*Gualt. test. t. 82. f. C. D.*  
*Adans. seneg. 1. t. 18. f. 10.*  
*Habitat ad insulam Garnsey. Inque O. Africano.*

- pilosa. 182. A. testa suborbiculata æquilatera pilosa, natibus in-  
 curvis, margine crenato.  
*Bonap. recr. 2. t. 80. Nux pilosa.*  
*Gualt. test. t. 73. f. A.* Ponderosa serico indumento.  
*Habitat in M. Mediterraneo. C. Alstræmer.*  
*Simillima C. glycymeri, sed testa perfecte regularis,*  
*et extus toto limbo holoserici veluti instar pilosa;*  
*intus alba; A. glycymeris vero parum irregularis est.*

- numma- 183. A. testa subrotunda lævi subaurita transversim stria-  
 ria. ta, natibus incurvis, margine crenulato.  
*Habitat in M. Mediterraneo.*  
*Testa magnitudine unguis, undato-rufa, non perfecte*  
*lenticularis, vix manifeste transversim striata, au-*  
*ribus, vix manifestis.*

- Nucleus. 184. A. testa oblique ovata læviuscula, natibus incurvis,  
 margine crenulato, cardine arcuato.  
*Habitat in Europa.*  
*Testa magnitudine avellana. Inter Nates Rima tri-*  
*angularis, erecta.*

313. OSTREA. *Animal* Tethys.

*Testa* bivalvis, inæquivalvis, subaurita.

*Cardo* edentulus fossula cava ovata, striisque lateralibus transversis.

*Vulva* *Anus*ve nullus.

\* *Pectines auriculati, æquilateres.*

maxima. 185. O. testa inæquivalvi radiis rotundatis longitudinaliter striatis. *Fn. succ.* 2148. *M. L. U.* 522. n. 98.\*  
*List. conch.* t. 161. f. 1.

*angl.* t. 5. f. 29. *Pecten* maximus.

*Gualt. test.* t. 98. f. A. B.

*Habitat in Oceano Europæo.*

Jacobæa. 186. O. testa inæquivalvi radiis 14 angulatis longitudinaliter striatis. *M. L. U.* 522. n. 99. \*

*Gualt. test.* t. 99. f. B.

*Regenf. conch.* 6. t. 2. f. 19.

*Bonap. recr.* 2. t. 3, 4.

*Ginap. adr.* 2. t. 16. f. 123.

*Habitat in M. Mediterraneo.*

Ziczæa. 187. O. testa inæquivalvi radiis 18 explanatis. *M. L. U.* 523. n. 100. \*

*Habitat in O. australiori.*

*Testa valvula plana radiis obsoletis, sed intus versus marginem plicis duplo pluribus conspiciis.*

striatula. 188. O. testa inæquivalvi radiis 16 oblitteratis transverse membranaceo-striatis, margine integerrimo. *M. L. U.* 523. n. 101. \*

*Habitat in O. Indico.*

*Valvula convexior paulo magis gibba, quam planior; color intus flavesceus radiorum interstitiis albis.*

minuta. 189. O. testa inæquivalvi radiis 20 convexis. *M. L. U.* 524. n. 102. \*

*Habi-*

---

*Ostreæ tantum non omnes, imprimis Pectines, ad cardinem interne sulcis transversis numerosis parallelis in utraque testa oppositis gaudent, quæ probe distinguenda ab Arcis polyleptoginglymis, quarum dentes numerosi alternatim intram alterius sinus.*

*Habitat in O. Indico.*

*Testa gibbiflor, admodum convexa, parvula. T. planior profunde plicata plano-convexa.*

Pleurone 190. O. testa æquivalvi radiis 12 duplicatis, extus lævi.  
 tes. *M. L. U. 524. n. 103. \**

*Rumph. mus. t. 45. f. A. B. Amusium.*

*Gualt. test. t. 73. f. B.*

*Argenv. conch. t. 27. f. G. Umbella f. Solea.*

*Klein. ostr. t. 9. f. 30.*

*Habitat in Indiis.*

Radula. 191. O. testa subæquivalvi radiis 12 convexis: striis decussatis crenatis, auriculis æqualibus. *Mus. L. U. 525. n. 105. \**

*Rumph. mus. t. 44. f. A. B. Radula.*

*Habitat in O. Indico.*

Plica. 192. O. testa subæquivalvi radiis 6 convexis læviusculis, decussato-striata. *M. L. U. 526. n. 106. \**

*Rumph. mus. t. 44. f. O. Pallium maculatum.*

*Argenv. conch. t. 27. f. C.*

*Habitat in O. Indico.*

\* \* *Pectines auricula altera intus ciliato-spinosa.*

Pallium. 193. O. testa æquivalvi radiis 12 convexis, striata scabra squamis imbricata. *M. L. U. 526. n. 107. \**

*Rumph. mus. t. 44. f. B. C. Pecten secundus.*

*Gualt. test. t. 74. f. F.*

*Argenv. conch. t. 27. f. I. Pallium ducale.*

*Regensf. conch. 26. t. 6. f. 59.*

*Habitat in O. australiori & Indico.*

nodosa. 194. O. testa inæquivalvi radiis 9 nodoso-vesicularibus.  
*M. L. U. 527. n. 108. \**

*Rond. test. 25. Concha corallina.*

*Bonan. recr. 2. f. 18.*

*Rumph. mus. t. 48. f. 8.*

*Gualt. test. t. 99. f. C. D.*

*Argenv. conch. t. 27. f. F. Pecten corallinus.*

*Habitat in O. Africano & Indico.*

D d d d 3

195. O.

*Pectines exsiliunt ex aquis; plerique auriculati & inæquivalves sunt, non vero omnes; radiati tamen plerimi sunt.*

Pes felis. 195. O. testa inæqualvi radiis 9 striatis scabris, auricula altera minuta. *M. L. U.* 527. n. 109. \*

*Habitat in O. Africano.*

*Testa parva, pellucida, novem radiis sensim undata.*

pellucens. 196. O. testa subæqualvi radiis 9, lævi: fornice squamis cochleari - hemisphæricis. *Mus. L. U.* 528. n. 110. \*

*Argenv. conch. t. 27. f. H. Pecten semiauritus.*

*Habitat in O. australiogi.*

obliterata. 197. O. testa radiis 24 duplicatis, extus lævi. *M. L. U.* 525. n. 104. \*

*Gualt. test. t. 73. f. C.*

*Habitat in Europa australiore.*

sanguinea. 198. O. testa æqualvi radiis 22 scabris, semiaurita.

*M. L. U.* 528. n. 111. \*

*Gualt. test. t. 74. f. N.*

*Habitat in O. australiore.*

varia. 199 O. testa æqualvi radiis 30 scabris compressis echinatis, uniaurita. *M. L. U.* 529. n. 112. \*

*Gualt. test. t. 74. f. R.*

*Habitat in O. australiore.*

*Simillima priori, sed numero radiorum differens. Color maxime variat.*

Pufio. 200. O. testa æqualvi radiis 40 filiformibus, uniaurita. *M. L. U.* 529. n. 113. \*

*Habitat in O. australiore.*

*Testa magnitudine nucis coryli, utrinque equaliter convexa. Auricula fere unica.*

glabra. 201. O. testa æqualvi radiis 10 lævibus planiusculis, internis striis elevatis duplicatis. *Mus. L. U.* 530. n. 114. \*

*Gualt. test. t. 73. f. H.*

*Regens. conch. t. 1. f. 10.*

*Et t. 2. f. 16.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa subrotunda, glabra, absque striis extus, obsolete plicata, incarnata. Auriculæ æquales.*

opercula- 202. O. testa inæquivalvi radiis 20, subrotunda decussatim  
ris, striato-scabra, operculo convexiore. *Mus. L. U.*

530. n. 115. \*

*Habitat in O. meridionali.*

*Testa opercularis magis quam altera convexa.*

gibba. 203. O. testa æquivalvi radiis 20 glabris, gibba. *Mus.*

*L. U. 531. n. 116. \**

*Brown. jam. t. 40. f. 10.*

*Habitat in M. Americano.*

*Valvula utraque convexa & sanguinea.*

\* \* \* *Pectines valvulis altero latere magis gibbis.*

flavicans. 204. O. testa subæquivalvi gibba radiis 8 striatis, mar-  
gine altero rotundato. *M. L. U. 531. n. 117. \**

*Habitat in O. australiore.*

*Testa quasi obliqua. Auricula altera brevissima; color  
albus fusco rubroque varius; intus albus radiis flavis.*

fasciata. 205. O. testa æquivalvi gibba radiis 20 scabris: interstitiis  
striatis, auriculis æqualibus exoletis. *M. L. U. 532.  
n. 118. \**

*Gvalt. test. t. 74. f. E.*

*Habitat in O. australiori.*

Lima. 206. O. testa æquivalvi gibba radiis 22 imbricatis squa-  
mis, altero margine rotundato, auriculis oblitteratis.

*M. L. U. 532. n. 119. \**

*Bonan. recr. 2. t. 71.*

*Rumph. mus. t. 44. f. D.*

*Gvalt. test. t. 88. f. F.*

*Argenv. conch. t. 27. f. E. Lima.*

*Klein. ostr. t. 9. f. 34.*

*Habitat in O. meridionali.*

*Testa alba oblonga æquivalvis. Auricula obsoleta.*

*Nates hiantes acutangula.*

\* \* \* \* *Rudes, vulgo Ostrea diſſa.*

Malleus. 207. O. testa æquivalvi triloba: lobis transversis. *Mus.*

*L. U. 533. n. 121. \**

*Bonan. kirch. 2. f. 130.*

*Rumph. mus. t. 47. f. H. Ostreum diviſum.*

*Gvalt. test. t. 96. f. D. E.*

D d d d 4

*Argenv.*

*Argenv. conch. t. 22. f. A. Malleus brachiatus.*

*List. conch. 3. B. f. 1. t. 1. f. 1.*

*Klein. ostr. t. 8. f. 14.*

*Seb. mus. 3. t. 91. f. 4, 5. & t. 93. f. 1, 2.*

*Habitat in O. Asiatico, pretiosa.*

*Testa rudis, nigra, oblonga, linearis, hinc flexuosa.*

*Lobi laterales transversii; subulati. Cardo bians lacuna, in cujus medio fossula transversa. Cavitas admodum parva.*

**diluviana.** 208. *O. testa inæquivalvi extus plicata, margine dentibus erectis acutangulis.*

*Habitat . . . fossilis in nostris montibus calcareis.*

*Testa magnitudine O. edulis & ultra. Margo introrsum erectus ad angulum rectum cum testa. Dentes hi perfecte acutanguli, quasi serra exsecti, extusque videntur constare lamellis imbricatis; margo dentium planus, sæpe transversim striatus. Cardinem distincte non vidi. Valvulæ pectinatim plicatæ rugis acutis.*

**Folium.** 209. *O. testa inæquivalvi ovata lateribus obtuse plicata parasitica. M. L. U. 534. n. 122. \**

*Rumph. mus. t. 47. f. A. Ostreum cratium.*

*Regenf. conch. t. 22. f. F.*

*Klein ostr. t. 8. f. 22.*

*Habitat ad Jamaicam.*

*Valvula altera medio longitudinali adhæret Gorgoniis.*

*Cardo lacuna est, unde diversa a Mytilis parasiticis.*

**orbicula-** 210. *O. testa orbiculata plana, margine integro crenato-*  
**ris.** *Gvalt. test. t. 104. f. G.*

*Habitat . . .*

*Testa magnitudine extimi articuli pollicis, compresso-plana, margine obtusissimo crenato.*

**edulis.** 211. *O. testa inæquivalvi semiorbiculata membranis imbricatis undulatis: valvula altera plana integerrima.*

*Fn. spec. 2149. M. L. U. 534. n. 123. \**

*Rond. aqv. 2. p. 37.*

*Gvalt. test. t. 102. f. B. Ostreum vulgare.*

*Gesn. aqv. 2. p. 37. Ostrea.*

*Aldr. exsang. 482. Ostrea rondeletii marina.*

*List. angl. 176. t. 4. f. 26. Ostreum vulgare maximum.*

*hist. 173. 20. Ostrea major sulcata, inæqualiter utrinque ad cardinem denticulata. Klein.*

*Klein. ostr. t. 8. f. 21.*

*Bonap. recr. 108. t. 70. Ostrea.*

*Ginap. adr. 2. t. 18. f. 127.*

*Baster. subf. 2. p. 62. t. 8.*

*Habitat in Oceano Europæo. Frequentes in cœnis Asotorum, vivæ epulæ. Ostrea recens natæ celerrime natandæ facultate gaudent undulato Branchiarum, tunc parum e testis exsertarum, motu, quod sæpius vidit Cel. Baster. subf. v. 2. lib. 3. p. 146; idem de Asia Concha Ledermullerus.*

**femiaurita.** 212. O. testa ovata femiaurita lævi, basi obliqua. *Mus. L. U. 535. n. 124. \**

*Gualt. test. t. 84. f. H.*

*Habitat in O. meridionali.*

**Perna.** O. 213. testa æquivalvi obovata inæquali: hinc rotundiore cardine multoties sulcato.

*Habitat in Indiis.*

*Testa facie Pernæ, subdiaphana, colore ligni putridi s. ferruginea.*

**Ifogonum.** 214. O. testa æquivalvi lobo laterali majore, cardine multoties sulcato. *M. L. U. 533. n. 120. \**

*Rumph. mus. t. 47. f. 1.*

*Gualt. test. t. 97. f. A.*

*Seb. mus. 3. 91. f. 6, 7, 8.*

*Klein. ostr. t. 8. f. 15.*

*Habitat in Indiis.*

*Cardine cum sequenti convenit.*

**Ephippium.** 215. O. testa æquivalvi orbiculata compresso-membranacea, cardine sulcis transversis pluribus. *M. L. U. 535. n. 125. \**

*Rumph. mus. 47. f. B.*

*Habitat in M. Asiatico.*

*Testa compressa ut vix cavitas appareat, extus rudis fusca, distinctissima ab Anomia Ephippio & Placenta.*

314. ANOMIA. *Animal* Corpus Ligula emarginata ciliata, ciliis valvulae superiori affixis. Brachiis 2, linearibus, corpore longioribus, conniventibus, porrectis, valvulae alternis, utrinque ciliatis, ciliis affixis valvulis utrisque.

*Testa* inaequalis: valvula altera planiuscula, altera basi magis gibba; harum altera saepe basi perforata.

*Cardo* edentulus cicatricula lineari prominente introrsum dente laterali; valvulae vero planioris in ipso margine.

*Radii* duo ossei pro basi animalis.

craniola- 216. A. testa orbiculata: valvula gibbosiore conico-con-  
ris. vexa, planiore basi foraminibus tribus. *Faun. suec.*

2150. f. 2150. \*

*Stobai Diff. epist. Lund. 1732. f. 1, 2. Nummulus brattensburgensis.*

*Aët. Upsal. 2. p. 560. t. 152. f. a. idem.*

*Bruckm. cent. 2. epist. 38. p. 390. t. 17. f. 10. Mar-  
lekard.*

*Habitat in Scania ad Ifvo & Balsbergam, nondum  
viva reperta.*

pectinata. 217. A. testa oblonga ramoso-fulcata: gibbosiore postice  
poris duobus.

*Habitat . . fossilis.*

Ephipi- 218. A. testa suborbiculata rugoso-plicata: planiore per-  
um. forata.

*Bonap. recr. 2. t. 56.*

*Argenv. conch. t. 22. f. C.*

*Ginaw. adr. 2. t. 27. f. 172.*

*Habi-*



*Habitat in M. Mediterraneo & Americano.*

Testa alba, magnitudine volæ, intus argentea nitidissima; utraque valvula sæpe plicis quinque longitudinalibus, nec ad cardinem concurrentibus. Planior testa magno foramine.

Cepa. 219. A. testa obovata inæquali violacea: superiore convexa, inferiore perforata.

*Habitat in M. Mediterraneo.*

Magnitudo Nucis Juglandis, sed altera testa plana.

electrica. 220. A. testa subrotunda flava lævi: altera convexo-gibbosa.

*Rumph. mus. t. 47. f. L. Ostreum electricum?*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

Squamula. 221. A. testa orbiculata integerrima plana margine alteo gibba lævi. *Fn. succ. 2151.*

*It. Wgor. 171. Patella.*

*Habitat in Oceano Svecico super Cancros, Fucos.*

patelliformis. 222. A. testa ovata convexa subdiaphana striata, vertice postico recurvo lævi. *Fn. succ. 2152. \**

*Habitat in Oceano Norvegico.*

scobinata. 223. A. testa subrotunda lævi, intus scabra, nate perforata.

*Gualt. test. t. 96. f. A.*

*Habitat in Pelago.*

aurita. 224. A. testa obovata striata subaurita, nate perforata.

*Gualt. test. t. 96. f. B.*

*Habitat . .*

retusa. 225. A. testa obovata striata retusa: convalle longitudinali, nate perforata. *Fn. succ. 2153.*

*Habitat in pelago Norvegico supra Alcyonia. D. Pennant.*

Gryphus. 226. A. testa oblonga lævi: altera plica laterali obsoleta: nate incurvata; altera brevi planiuscula.

*Mus. Tessin. 92. t. 5. f. 9.*

*Olear. mus. 67. t. 33. f. 3.*

*Rumph. mus. t. 59. f. D.*

*List. angl. 238. t. 8. f. 45.*

*Column. aqv. 54. t. 52.*

*Bonan. recr. 2. t. 31.*

*Habitat . . fossilis.*

227. A.

Pecten. 227. A. testa semi-orbiculata depresso multifstriata: valvula altera plana.

*List. angl.* 243. t. 9. f. 49.

*Habitat* . . fossilis.

*Testa inferne s. margine cardinis linea recta s. transversa.*

striatula. 228. A. testa subrotundo-dilatata utrinque gibba striata, valvis aequalibus.

*Habitat* . . fossilis.

*Testa rotundata, sed duplo latior quam longa, postice gibbior, antice margine tenuit.*

truncata. 229. A. testa suborbiculata obsolete striata, cardine truncato.

*List. angl.* 243. t. 9. f. 50.

*Habitat in Pelago Norvegico supra corallia.*

*Testa proxima A. striatulae, suborbiculata, sed cardine recto, exciso, subtilissime longitudinaliter striata, compressa, testa altera medio nonnihil gibba, basi Foramine tendinem exferente instructa, quod foramen in ipso cardine mutilatum seu non undique cinctum testa, verum ad cardinem hians. Margo testae tenuis, interne acutissime denticulatus.*

*Animalculum brachiis lunatis & fere annulatis, depressis, ciliatis.*

reticularis. 230. A. testa cordata decussatim striata: valvula brevior gibbior.

*Mus. Tessin.* 88. t. 5. f. 5.

*Habitat* . . fossilis.

*Testae latera prominula compressa. Natis planioris valvula parum prominet.*

Plicatella. 231. A. testa dilatato-lunata plicata: sulcis longitudinaliter striatis media latiore.

*Habitat* . . fossilis.

*Testae latera submucronata sunt; Plica longitudinales, striae vero, in Plicarum cavitatibus, plicis parallelis s. longitudinalibus. Natum superior admodum prominens.*

crispa. 232. A. testa dilatato-triangulari plicata sulcis rugosis: media latiore.

*Mus. Tessin. p.* . . t. 5. f. 7.

*List*

*List. angl. t. 9. f. 56.*

*Habitat . . fossilis.*

*Testa fere lunata, sed natum superior prominens. Sulci 5 f. 6 rugis arcuatis transversis. Latera testæ submucronata.*

lacunosa. 233. A. testa subrotunda multifulcata: valvulis apice plicatis; altera brevior lacunosa, apice quadridentata.

*Mus. Tessin. . . t. 5. f. 6.*

*List. angl. 249. t. 9. f. 57.*

*Grew. mus. t. 19. f. 6.*

*Habitat . . fossilis.*

pubescens. 234. A. testa obovata fulcata: valvula altera nate ad cardinem dehiscente apertura.

*Habitat in Zoophytis O. Norvegici. J. Zaga.*

*Parva magnitudine vix seminis Cucumeris, alba. Testæ æquales obovatæ, cardinis instar longitudinaliter fulcatæ absque plicaturis, absque retensione; omnes lente visæ quasi pilis brevissimis erectis distantibus hirtæ. Valvula alterius natis postice prominens facie foramen versus valvulam alteram, nec perforata est foramine undique ab eadem testa cincto.*

farcita. 235. A. testa subrotunda multifulcata, valvulis convexis apice octodentatis.

*Habitat . . fossilis.*

Caput serpentis. 236. A. testa obovata striata tomentosa: valvula altera nate longiore perforata. *Fn. succ. 2154.*

*Column. purp. 22. f. 2.*

*Gualt. test. t. 96. f. D.*

*Habitat in abyssis M. Norvegici.*

*Testa obovatæ, tomentosa, antice compressa, longitudinaliter striata, alba. Valvula superior postice prominens longiorque apice perforato ligamento affixocoralliis Zoophytisve; hæc antice paulo longior & declinata. Inferior valvula rotundata, antice reclusa, postice brevior. Margo utriusque crenulatus. Cardo dente utriusque testæ utrinque ad latus prominens.*

Terebracula. 237. A. testa obovata lævi convexa: valvula altera triplicata, altera biplicata. *Fn. succ. 2155.*

*Column. purp. 22. f. 1.*

*List. angl. 240. t. 8. f. 46.*

*Klein.*

*Klein. ostr. t. 11. f. 74.*

*Habitat in M. Norvegico.*

*Natis alterius testæ prominens pertusa est; extus plicæ duæ.*

angulata. 238. A. testa basi laterum compressa, antice plicata: medio tridentato.

*Mus. Tess. 96. t. 5. f. 4.*

*Habitat . . fossilis.*

*Testa laevis, sed antice plicata; numerus plicarum variat; dignoscitur quod latera versus basin multum compressa.*

Hysterita. 239. A. testa dilatata lævi convexa striata subtriloba, antice depressa, margine acuto.

*Mus. Tess. 90. t. 5. f. 1, 2, 3.*

*Column. purp. 22. f. 3? Trilobos.*

*Wolff. bass. 29. t. 3. f. 3, 4, 5.*

*Worm. mus. t. 83.*

*Habitat . . fossilis.*

biloba. 240. A. testa biloba æquali striata.

*Habitat . . a D. Pennant. Fossilis.*

Placenta. 241. A. testa orbiculata plana pellucida, cardinum callis linearibus binis testæ interne adnatis. *Mus. L. U. 536. n. 126.\**

*List. conch. 3. B. f. . 2. c. 2. t. 1.*

*Gualt. test. t. 104. f. B.*

*Seb. mus. 3. t. 90. f. pleraque.*

*Habitat in Pelago.*

*Cardo rufescens. Valvulae aequales integrae.*

spinosa. 242. A. testa spinis longitudine testæ. *D. Solander. †*

*Habitat fossilis in Anglia.*

315. MYTILUS. *Animal Ascidia?**Testa bivalvis, rudis, sæpius affixa Byssō.**Cardo edentulus, distinctus linea subulata excavata longitudinali.*\* Parasitici, *unguibus affixi.*Crista  
galli.

243. M. testa plicata spinosa, labro utroque scabro.,  
*M. L. U. 537. n. 128.*  
*Rumph. mus. t. 47. f. D. Ostreum plicatum minus.*  
*Gualt. test. t. 104. f. C. D. E.*  
*Argenv. conch. t. 23. f. D. Auris porci f. Crista galli.*  
*Sloan. jam. 1. t. 18. f. 1.*  
*Habitat in O. Indici Gorgoniis.*  
*Labra interiora marginum testarum punctis eminentibus scabra.*

Hyotis.

244. M. testa plicata imbricata squamis compressis patulis, labro utroque lævi. *M. L. U. 548. n. 129. \**  
*Rumph. mus. t. 47. f. C. Ostreum plicatum majus.*  
*Argenv. conch. t. 23. f. H. Ostreum sylvestre.*  
*Habitat in Pelagi Gorgoniis.*

Frons.

245. M. testa plicata læviuscula, labro altero scabro.  
*M. L. U. 537. n. 127. \**  
*Argenv. conch. t. 22. f. D. Cratium f. Folium.*  
*Habitat in Pelagi indici Gorgoniis.*  
*Cardo absque lacuna, unde diversus ab Ostrea Folio.*

\* \* Plani *f. compressi, ut plani appareant & subarriti.*margariti-  
ferus.

246. M. testa compresso-plana suborbiculata, basi transversa, imbricata tunicis dentatis. *M. L. U. 538. n. 130. \**  
*Bonan. recr. 2. t. 1.*  
*Imperat. nat. 905. Concha margaritifera.*  
*List. conch. t. 223. f. 57.*  
*Rumph. mus. t. 47. f. F. Matrix perlarum.*  
*Gualt. test. t. 84. f. E. F. G.*  
*Argenv. conch. t. 23. f. A. Gallina guttata.*  
*Habitat in utriusque Indiæ Oceano.*

*Altera*

*Altera testâ (in minoribus) aurita est altero latere, uti Pecten. Cardo rectissimus, longitudine totius testæ. Lamellæ testæ, quibus est imbricata, valde dentatæ sunt.*

- Unguis. 247. M. testa subrotunda longitudinaliter striata pellucida subaurita. *M. L. U. 539. n. 131. \**  
*Habitat in M. Mediterraneo.*  
*Magnitudo unguis humani.*

\* \* \* *Ventricosifusculi.*

- lithopha- 248. M. testa cylindrica utrinque extremitatibus rotunda-  
 gus. *M. L. U. 539. n. 132. \**  
*Rond. aqu. 2. p. 49. Pholas.*  
*List. angl. 235. t. 8. f. 37.*  
*Bonap. recr. 2. t. 28.*  
*Rumph. mus. t. 46. f. F. Pholas.*  
*Gualt. test. t. 90. f. D.*  
*Argenv. conch. t. 30. f. L. Daetylus.*  
*Habitat in O. Indico, Europæo, Mediterraneo, pen-*  
*trans & exedens Marmora, Corallia &c.*  
*Testa indica mollior & fere coriacea; Europæa vero*  
*magis fragilis.*

- rugosus. 249. M. testa rhomboideo-ovali rugosa obtusa antiquata.  
*Gualt. test. 7. f. D.*  
*List. angl. t. 4. f. 21?*  
*Habitat in Norvegiæ lacustribus: ostiis maris. Ani-*  
*mal Ascidia.*  
*Testa vix minimi digiti, ultimi articuli, magnitudi-*  
*ne, ovalis, sed utraque extremitate obtusissima, co-*  
*lore tristi, sulcis parallelis margine undique testæ.*  
*Cardo absque dente; sed margine ejus gibbosiore.*

- bilocula- 250. M. testa cærulea striata, umbonibus fornicatis disse-  
 ris. *pimento albo. M. L. U. 540. n. 133. \**  
*Habitat in O. Indico.*

- exustus. 251. M. testa striata ventre angulato, margine crenato.  
*M. L. U. 540. n. 134. \**  
*Habitat ad Jamaicam.*

- barbatus. 252. M. testa læviuscula ferruginea, extus apice barbata.  
*Fn. succ. 2157.*

*Gina.*

*Ginan. adr. 2. p. 36. t. 27. f. 169. Musculus obscurus pilosus.*

*Gualt. test. t. 91. f. H. Figuræ mediæ*

*Habitat in M. Mediterraneo, Norvegico.*

**edulis.** 253. *M. testa læviuscula violacea, valvulis antice subearinatis, postice retusis, natibus acuminatis. Fn. succ. 2156. M. L. U. 541. n. 135.\**

*It. æl. 43. It. wgoth. 170.*

*List. angl. 182. f. 28.*

*conch. 3. t. 362. f. 20.*

*Bonan. recr. 2. t. 30.*

*Gualt. test. t. 91. f. E.*

*Aldr. exsangu. 512.*

*Rond. aquat. 2. p. 46.*

*Gesn. aquat. 277. Mytilus.*

*Bell. aquat. 397. Mytilus.*

*Ginan. adr. 2. p. 36. t. 23. f. 168.*

*Aët. paris. 1711. t. 3. f. 4, 5.*

*Baster. subj. 3. p. 101. t. 11. f. 9-11.*

*Habitat in O. Europæo, Indico & M. Balthico, sevis scopulis annexus.*

*Plebejis sapit; frequentius devoratus nocet; inter propiocos Maximus, intra arcticum Minimus, uti reliqua testacea. Habet more Pinnae Byssum exserendam. Interdum venenatus, Cepis coquendus.*

*Heyde Ant. Anatome Mytulorum 1683. æt.*

**ungulatus.** 254. *M. testa lævi subcurvata margine posteriore inflexo, cardine terminali bidentato. M. L. U. 541. n. 136.\**

*List. conch. t. 360.*

*Gualt. test. t. 91. f. E. duplex.*

*Regensf. conch. 16. t. 4. f. 47.*

*Habitat in Europa australi; ad Cap. b. spei.*

*Valvulae valde convexæ & juxta se positae ungulas porcorum referunt. Nates distantes, acutæ. Cardo apicis dentibus 2, 3 s. 4 notatus. Color viridis aut carnelescens.*

**bidens.** 255. *M. testa striata subcurvata margine posteriore inflexo, cardine terminali bidentato.*

*Habitat in M. Mediterraneo. Zoega.*

*Simillima tota structura Mytilo unguato, sed striata longitudinaliter. Color cornu sinereus. Magnitudo pollicis transversi.*

E e e e

256. M.

**Modiolus.** 256. *M. testa lævi, margine anteriore carinato, natibus gibbis, cardine sublaterali. M. L. U. 542. n. 137.\**

*Rumph. mus. t. 46. f. B.*

*Argenv. conch. t. 25. f. C. Musculus papuanus.*

*Bradl. natur. t. 3. f. 1.*

*List. conch. t. 256. f. 195. & t. 359. f. 198.*

*Pet. gaz. t. 71. f. 11.*

*Gualt. test. t. 91. f. H. exterior.*

*Klein. ostr. t. 11. f. 67.*

*Adans. seneg. 1. t. 15. f. 1.*

*Habitat in M. Mediterraneo, Norvegico edulis.*

*Testa sæpe semipedalis, subviolacea cortice nigro; umbones tumidi, oblongi. Nates posteriora versus prominentes. Vulvæ regio recurvato-striata. Pars postica paulo ultra nates protuberat. Cardo cartilagineus ante nates, post vero nullus. Variat colore cinereo, luteo, nigro.*

**cygneus.** 257. *M. testa ovata antice compressiuscula fragilissima, cardine laterali.*

*List. angl. app. 29. t. 1. f. 3. Musculus latus maximus. conch. t. 193. f. 8.*

*Gualt. test. t. 7. f. F.*

*Klein. ostr. t. 9. f. 26.*

*Habitat in Europa, ad ostia fluviorum.*

**anatinus.** 258. *M. testa ovali compressiuscula fragilissima margine membranaceo, natibus decorticatis. Fn. svec. 2158.*

*List. angl. app. 30. t. 1. f. 2. conch. t. 154. f. 9.*

*Gualt. test. t. 7. f. E.*

*Habitat in Europæ aquis dulcibus.*

*Similis Myæ Pictorum, sed fragilior & cardine distinctissimus, Anatum cibus.*

**viridis.** 259. *M. testa lævi ovata membranacea pellucida, cardine terminali. M. L. U. 542. n. 138.\**

*Habitat in O. Meridionali.*

**ruber.** 260. *M. testa rugosa, valvulis obliquis antice dilatatis, margine cardinali apicem æquante. M. L. U. 543. n. 139.\**

*Argenv. conch. t. 25. f. Q?*

*Habitat in O. australiore.*



diseors. 261. *M. testa ovali cornea subdiaphana antice longitudinaliter postice transversaliter striata.*

*Habitat in Norvegia, Islandia. J. Zoega, Koenig.*

*Testa magnitudine Faba, cornea, subdiaphana, fusca, marginibus virescentibus. Nates reflexae. Testa tribus arcibus distinguitur: area antica striis constat a natibus ad marginem anteriorem anticum, longitudinalibus; tertia a natibus ad marginem posteriorem posticum, fere transversalibus; intermedia vel striis obsoletis transversalibus vel plane nullis.*

Hirundo. 262. *M. testa laevi, valvulis bilobis, lobo cardinali longiore tenuioreque. M. L. U. 543. n. 140. \**

*List. conch. 3. B. f. 1. t. 1. f. 2.*

*Bonan. recr. 2. t. 58.*

*Rumph. mus. t. 46. f. G. Avicula.*

*Gualt. test. t. 94. f. A. B.*

*Argenv. conch. t. 22. f. B. Avicula f. Hirundo.*

*Klein. ostr. t. 8. f. 13.*

*Habitat in O. meridionali, Mediterraneo.*

*Testa basi contracta, alterius valvulae magis.*

### 316. PINNA. *Animal Limax.*

*Testa subbivalvis, fragilis, erecta, emittens barbam Byssinam.*

*Cardo edentulus, coalitis in unam valvulis.*

rudis. 263. *P. testa sulcata: squamis fornicatis per series digestis. M. L. U. 544. n. 141. \**

*Rumph. mus. t. 46. f. L. Pinna lata.*

*Argenv. conch. t. 25. f. F. Perna.*

*Ginan. adr. 2, t. 25. f. 166.*

*Habitat in O. Meridionali, Mediterraneo, Asiatico.*

*Testa radiorum cornei coloris, longitudinaliter grosse sulcata s. rugosa 5 ad 8 sulcis; nec alba, tenuissimis numerosissimisque striis P. nobilis.*

β. *Testa rudis, facie pernae suilla, nigra extus & intus, saepe non sulcata, ad summos margines, ubi adultior, adpersa squamis raris fornicatis.*

E e e e 2

P. 264.

*Pinnae neque vita fortasse posset servari a Polypto octopodia, nisi opera Cancris Pinnotheris, Aman. acad. 2. p. 48.*

pectinata. 264. P. testa dimidia longitudinaliter striata, latere altero transverse subrugoso.

*Gualt. test. t. 79. f. A.*

*Habitat in India.*

nobilis. 265. P. testa striata: squamis canaliculato-tubulosis subimbricatis. *M. L. U. 544. n. 142. \**

*Bonap. recr. 2. f. 24.*

*Argenv. conch. t. 25. f. B.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Varietates potius quam distinctæ species sunt sex priores hujus generis.*

muricata. 266. P. testa striata: squamis concavis ovatis acutis. *Musf. L. U. 545. n. 143. \**

*List. conch. t. 370. f. 215. Pinna tenuis striata muricata.*

*Rumph. musf. t. 46. f. M. Pinna lata altera.*

*Gualt. test. t. 79. f. D.*

*Hasselqv. itin. 447. n. 137. Concha Pinna.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Hostis Sepia octopodia, custos Cancer Pinnotheres:*

*Amœn. acad. 2. p. 48. Hasselqv. itin. 449, 572.*

rotundata. 267. P. testa, squamis obsoletis, margine rotundata. *M. L. U. 545. n. 144. \**

*Gualt. test. t. 79. f. C.*

*Habitat in O. meridionali.*

saccata. 268. P. testa lævi saccata erectiuscula subfastigiata. *M. L. U. 546. n. 145. \**

*Rumph. musf. t. 46. f. N. Pinna alba.*

*Gualt. test. t. 79. f. F.*

*Habitat in M. Mediterraneo, Indico.*

digitiformis. 269. P. testa lævi tubulosa digitiformi incurva, margine summo membranacea. *M. L. U. 546. n. 146. \**

*Habitat in O. Indico.*

lobata. 270. P. testa nuda lobata. *M. L. U. 547. n. 147. \**

*Habitat in O. Indico.*

*Testa membranacea, dum valvulae explicantur obcordata: lobis lateralibus rotundatis latioribus; a cardine ad lobos nervus; a nervo lineæ laterales duæ.*

317. ARGONAUTA. *Animal* Sepia.

*Testa* univalvis, spiralis, involuta, membranacea, unilocularis.

- Argo. 271. A. carina subdentata. *M. L. U.* 548. n. 148. \*
- Bellon. aqu. t.* 380. Nautilus.
- Bonan. recr. 1. f.* 13. Nautilus f. Naupilius.
- Lift. conch. 4. naut. t.* 3, 4.
- Rumph. mus. t.* 18. f. A. B. 1. 4. Nautilus tenuis.
- Gualt. test. t.* 11. 12. f. A. B. C. Cymbium.
- Argenv. conch. t.* 8. f. A. B. C. Nautilus papyraceus.
- Olear. mus. 66. t.* 32. f. 4. Nautilus.
- Ginan. adr. 2. t.* 3. f. 29.
- Seb. mus. 3. t.* 84. f. 4-12.
- Klein. ostr. t.* 1. f. 3. Nautilus sulcatus.
- Tessin. epist. 1. n.* 28. Cymbium.
- Habitat in* Pelago, M. Indico, Mediterraneo. \*
- Majorem inter ♂ Minorem ex multis specimenibus limites non attingo.
- Navigat emissâ aqua exonerata sentina supinus in summa aquorum, membranâ mirâ tenuitatis extendit. Brachia duo retorquens, cæteris subremigans, velificat, demum hausta se mergens aqua.* Plin. IX: 29.

Cymbium. 272. A. carina rugosa mutica.

*Gualt. test. t.* 12. f. D.

*Habitat in* M. Mediterraneo, minutas.

*Magnitudo vix minima arenulæ, oculo armato lustranda.*

318. NAUTILUS. *Animal* (*Rumph. mus. t.* 17. f. D.)

*Testa* univalvis, isthmis perforatis concamerata, polythalamia.

\* Spirales rotundati.

- Pompi- 273. N. testa spirali, apertura cordata, anfractibus con-  
lius. tiguis obtusis lævibus. *M. L. U.* 549. n. 149. \*

E e e e 3

Rond.

*Domanculam alienam, quemadmodum Cancer Diogenes f. Bernbardus, intrasse Sepiam, cum non connexa sit testâ, sibi adeo alienâ, quis non crederet, nisi tot testes nobis obstringerent, qui propriis oculis viderunt Argonautum velificantem?*

*Rond. aqu. 2. p. 97. Cochlea margaritifera.*

*Bellon. aqu. t. 382. Nautilus alter.*

*Jonst. aquat. t. 10. f. 1, 2, 7.*

*List. conch. 4. Nautil. t. 1. f. 1, 2, 3.*

*Rumph. mus. t. 17. f. A. B. C. Nautilus major crassus.*

*Bonon. recr. 1. t. 1; 2.*

*Gualt. test. t. 17, 18.*

*Agenv. conch. t. 8. f. E. F.*

*Pet. amb. t. 3. f. 7.*

*gaz. t. 99. f. D.*

*Breyn. polyth. 14.*

*Klein. ostr. t. 1. f. 1, 2.*

*Seb. mus. 3. t. 84. f. 1-3.*

*Habitat in India, Africa.*

*Testa pulchre pictura decorticata elaborata, preparata ad pocula aquæ potatorum orientalium.*

**Calcar.** 274. *N. testa spirali, apertura lineari, anfractibus contiguus, geniculis elevatis.*

*Planc. conch. 12. t. 1. f. 3, 4.*

*Gualt. test. t. 19. f. C. B.*

*Lederm. micr. t. 8. f. c. d.*

*Habitat in M. Adriatico, minutus.*

**crispus.** 275. *N. testa spirali, apertura semicordata, anfractibus contiguus, geniculis crenatis.*

*Planc. conch. 10. t. 1. f. 2.*

*Gualt. test. t. 19. f. A. D.*

*Ginan. adr. t. 14. f. 112.*

*Lederm. micr. t. 8. f. 6.*

*Habitat in M. Mediterraneo, minutus.*

**Beccarii.** 276. *N. testa spirali, apertura obovata, anfractibus contiguus torulosis, geniculis insculptis.*

*Planc. conch. 8. t. 1. f. 1.*

*Gualt. test. t. 19. f. H. H. I.*

*Ginan. adr. 2. t. 14. f. 111.*

*Lederm. micr. 16. t. 8. f. a. & t. 4. f. B.*

*Habitat in M. Adriatico, Mediterraneo. D. D. Kabler; minutus.*

**rugosus.** 277. *N. testa spirali, apertura lineari, anfractibus contiguus compressis incrassato-marginatis.*

*Habitat in M. australi. D. Brunniche; minutus.*

Testa

*Testa alba, depresso-plana, dissepimentis prominulis s. rugæ transversæ secundum dissepimenta, e quibus factæ.*

umbilica- 278. N. testa spirali, apertura compresso-lineari, anfractus. Etibus contiguis compressis, umbilico concavo.

*Column. phytob. 2. t. 38. f. E.*

*Habitat Liburni. D. D. Kähler, minutus.*

*Testa sulcis transversis secundum dissepimenta oblique articulata est, præsertim carina propius.*

Spirula. 279. N. testa spirali, apertura orbiculari, anfractibus disjunctis cylindricis. *M. L. U. 549. n. 150.\**

*Swammerd. bibl. 1. t. 7. f. 7, 8.*

*Bonau. kirch. 1. f. 39.*

*List. conch. 4. Naut. t. 1. f. interior.*

*Argenv. conch. t. 29. f. K.*

*Gualt. test. t. 19. f. E.*

*Rumph. mus. t. 20. f. 1.*

*Breyn. polyth. 21. f. 2.*

*Klein. ostr. t. 1. f. 6.*

*Habitat in America, Amboina, Moluccis.*

Semi- 280. N. testa recta, apice incurvato-spirali, anfractibus lituus. contiguis †

*Column. phytob. 2. t. 38. f. D. Semi-Lituus.*

*Habitat Liburni; minutus.*

\* \* Elongati *erectiusculi*.

obliquus. 281. N. testa recto-subarcuata, articulis oblique striatis.

*Gualt. test. t. 19. f. N.*

*Habitat in M. Adriatico, Mediterraneo, Minutus.*

Raphani- 282. N. testa recta subcylindrica, articulis torosis: striis strum. elevatis duodenis, siphone centrali regulari.

*Lederm. micr. t. 4. f. X. posterior.*

*Habitat in M. Mediterraneo. Cl. C. Allioni.*

*Testa longitudine unguis, adeoque & inter minimos maximus. differt a N. Raphano numero striarum, magnitudine, siphone regulari, quodque versus apicem vix attenuatus.*

- Raphanus.** 283. N. testa recta attenuata, articulis torosis: striis elevatis sedenis, siphone sublaterali obliquo.  
*Planc. conch. t. 1. f. 6.*  
*Gualt. test. t. 19. f. L. M.*  
*Lederm. micr. t. 8. f. F. ♂ t. 4. f. X. prior.*  
*Habitat in M. Adriatico, Mediterraneo, minutus.*
- Granum.** 284. N. testa recta ovato-oblonga, articulis torosis: striis elevatis octonis interruptis, siphone obliquo.  
*Habitat in M. Mediterraneo. M. Kähler M. D. Minutus.*  
*Differt a N. 283. quod fere ovata nec longiuscula; striis tantum 8, iisque ad articulorum genicula contractis admodum ♂ fere interruptis, unde testa reticulata apparet; ideoque vix varietatem dicerem, quamvis Siphone conveniat.*
- Radicula.** 285. N. testa recta oblongo-ovata, articulis torosis glabris. †  
*Planc. conch. 14. t. 1. f. 5.*  
*Lederm. micr. t. 8. f. e. ♂ t. 4. f. r. f.*  
*Habitat in M. Adriatico. Minutus.*
- Fascia.** 286. N. testa recta, articulis striatis, geniculis lævibus elevatis.  
*Gualt. test. t. 19. f. O.*  
*Habitat in M. Adriatico. Minutus.*
- Sipunculus.** 287. N. testa recta lævi, articulis cylindricis remotis, geniculis attenuatis cylindricis. †  
*Gualt. test. t. 19. f. R. S.*  
*Habitat in freto Siculo; minutus.*
- Legumen.** 288. N. testa recta compressa articulata hinc marginata, siphone laterali.  
*Planc. conch. 8. t. 1. f. 7.*  
*Gualt. test. t. 19. f. P.*  
*Lederm. micr. t. 8. f. g.*  
*Habitat in M. Adriatico; minutus.*
- Orthoceras.** 289. N. testa recta: anfractibus carinato-striatis.  
*It. æl. 140.*  
*Mus. Tessin. 86. Nautilus rectus.*  
*Scheuch. helv. 7. f. 8. diluv. 938. Alveolus.*  
*Gmelin. act. petrop. vol. 3. p. 246.*

Gron. lap. 71.

Habitat in alto Pelago; Fossilis.

Testa frequentissima petrificata in montibus nostris calcareis, inter omnia fossilia nobis nota sæpe longissima, non dum visa immutata.

### 319. CONUS, *Animal* Limax.

Testa univalvis, convoluta, turbinata.

Apertura effusa, longitudinalis, linearis, edentula, basi integra.

Columella lævis.

\* Truncati f. *Spira fere truncata.*

marmo- 290. C. testa conica fusca, maculis ovatis albis, spiræ  
reus. anfractibus canaliculatis. *M. L. U.* 550. n. 151. \*

*Olear. mus. t.* 31. f. 2.

*Bonap. recr.* 3. f. 123.

*Rumph. mus. t.* 32. f. N. I.

*Gualt. test. t.* 22. f. D.

*Argenv. conch. t.* 15. f. O.

*Pet. gaz. t.* 47. f. 11.

*Seb. mus. 3. t.* 47. f. 1-4. & t. 46. f. 1-4.

*Regenf. conch.* 20. t. 5. f. 53.

Habitat in Asia.

Testa sæpe coronata, atra maculis trigono-ovatis albis.

imperia- 291. C. testa albida: fasciis longitudinalibus lividis cin-  
lis. gulisque linearibus albo fuscoque articulatis. *Mus.*  
*L. U.* 550. n. 152. \*

*Rumph. mus. t.* 34. f. H. I. Kroonhoorn.

*Gualt. test. t.* 22. f. A.

*Argenv. conch. t.* 15. f. F. Corona imperialis.

*Regenf. conch.* 12. t. 3. f. 35.

Habitat . . .

Testa sapius coronata, albida maculis confluentibus caesiis.

litteratus. 292. C. testa conica alba, punctis fuscis. *M. L. U.*  
551. n. 153. \*

*Bonap. recr.* 3. t. 363. 132.

*Rumph. mus. t.* 31. f. D. Voluta musicalis.

E e e e 5

*Gualt.*

*Gualt. test. t. 22. f. F.*

*t. 21. f. O. G.*

*Argenv. conch. t. 15. f. 1.*

*Regensf. conch. 12. t. 3. f. 29. & t. 4. f. 46.*

*Habitat in O. Asiatico.*

*Testa nivea fasciis obsoletis flavis, maculisque sparsis purpurascens.*

**Generalis.** 293. *C. testa conica nitida, spira plana muricata: anfractibus canaliculatis.*

*List. conch. t. 276. f. 35.*

*Rumph. mus. t. 33. f. Y.*

*Gualt. test. t. 20. f. G.*

*Argenv. conch. t. 15. f. T.*

*Regensf. conch. t. 6. f. 65.*

*Pet. gaz. t. 27. f. 11.*

*Habitat in India orientali.*

*Testa politissima, ferruginea s. lutea, fasciis 3, albis, interruptis s. undatis. Spira albida, anfractibus canaliculatis, medio acuminata.*

**Virgo.** 294. *C. testa conica, basi caerulecente. M. L. U. 551. n. 153. \**

*Rumph. mus. t. 31. f. K. Cereola altera.*

*Regensf. conch. t. 8. f. 19.*

*Gualt. test. t. 20. f. B.*

*Habitat in Africano oceano.*

*Similis litteratis colore lacteo aut rubro maculata, basi semper violacea margine acuto. Spira exquisita est.*

**Capitaneus.** 295. *C. testa conica glabra, basi fusca, spira convexiuscula. M. L. U. 552. n. 155. \**

*β. Gualt. test. t. 20. f. I.*

*γ. Rumph. mus. t. 33. f. K. Voluta fasciata 2.*

*Gualt. test. t. 22. f. M.*

*Bonan. recr. 3. t. 139.*

*Argenv. conch. t. 15. f. K.*

*Olear. mus. t. 31. f. 5.*

*Seb. mus. 3. t. 42. 23-25.*

*Regensf. conch. t. 7. f.*

*δ. Bonan. recr. 3. t. 361.*

*Seb. mus. 3. t. 42. f. 29, 30, 32, 28, 35.*

*Habitat in Asia.*

*Testa castia fasciis 2 albis fusco-maculatis. Spira anfractus convexi.*

296. *C.*



- Miles. 296. *C. testa conica rudi, basi fusca, spira convexa.*  
*Rumph. mus. t. 33. f. W.*  
*Argenv. conch. t. 15. f. L.* Pseudo-Architalassus.  
*Seb. mus. 3. t. 42. f. 23, 24, 25.*  
*Habitat in India.*  
*Testa ignobilis pallido-testacea fasciis fusco-ferrugineis.*
- \* \* Pyriformes basi rotundata, subcylindrica quam spiram sesquialongiore.
- Princeps. 297. *C. testa flava: lineis fusco-purpureis longitudinalibus ramosis. M. L. U. 552. n. 156. \**  
*Bonan. recr. t. 138?*  
*Habitat . .*  
*Lineae latae purpureo-fuscae longitudinales subramosae.*
- Ammira-298. *C. testa basi punctato scabra. M. L. U. 553. n. 157. \**
- Summus.  $\beta$ . *C. testa ferruginea maculis albis sparsis: fasciisque 4 flavis tenuissime reticulatis: tertia cingulo albo maculato.*  
*Rumph. mus. t. 34. f. B.* Opper admiral.  
*Argenv. conch. t. 15. f. N.* Architalassus primus.  
*Pet gaz. t. 28. f. 4.* Male.  
*Seb. mus. 3. t. 48. f. 4, 5, 6.*
- ordinari- $\gamma$ . *C. testa testacea maculis albis acutis: fasciis tribus albis subreticulatis, media cingulo articulado.*  
*Rumph. mus. 34. f. C.* Admiral.
- occiden- $\delta$ . *C. testa testacea albo maculata: fasciis quatuor flavis reticulatis cingulo articulado.*  
*Rumph. mus. t. 34. f. D.*
- Cedo nulli.  $\epsilon$ . *C. testa testacea, albo maculata cingulisque tribus, supremo composito, omnibus punctatis.*  
*Seb. mus. 3. t. 48. f. 8.*  
*Habitat in O. Americae meridionalis, pretiosus, at pretiosissimus  $\epsilon$ .*
- vicarius. 299. *C. testa testacea albo maculata, fasciis 4 flavis im-maculatis; secunda angulo divisa.*  
*Argenv. conch. t. 15. f. H.* Architalassus secundus.  
 300. *C.*

---

Ammirallium 298 & 316 varietates nitidas, Turbinis scalaris & Otræ Mallei 177  
 æmulas nobilitavit docta ignorantia, pretiavit quam patiuntur opes stultitia,  
 emitavit barbara luxuria.

Senator. 300. *C. testa conica lævi glabra, spiræ anfractibus obtusis scriptis.*

*Habitat . .*

*Testa flava, albo maculata striis transversis, numerosissimis, albo fuscoque articulatis.*

nobilis. 301. *C. testa subcylindrica lævi glabra. M. L. U. 554. n. 158. \**

*Argenv. conch. t. 15. f. M. Tigris lutea.*

*Habitat . .*

*Testa nitidissima, flava, punctis obscurioribus striata maculisque albis sparsis.*

genuanus. 302. *C. testa cingulis linearibus albo fuscoque articulatis. M. L. U. 554. n. 159. \**

*Rumph. mus. t. 34. f. G. Genesefche Toot.*

*Bonan. recr. 3. t. 337.*

Papilio.  $\beta$ . *Seb. mus. 3. t. 44. f. 1-5. ♂ t. 48. f. 1, 2, 3.*

*Argenv. conch. t. 15. f. V. Ala papilionis?*

*Habitat . .*

*Varietas  $\beta$  fasciis connexis ocellis pupillatis.*

glaucus. 303. *C. testa basi emarginata striata, spiræ inermis anfractibus contiguis. M. L. U. 555. n. 160. \**

*Rumph. mus. t. 33. f. G. G. Botervegie von Boer.*

*Habitat in Asia.*

Monachus. 304. *C. testa gibba fusco-cærulescente nebulata acuta, basi striata. M. L. U. 555. n. 161. \**

*Bonan. recr. 3. t. 126.*

*Rumph. mus. t. 33. f. CC. Capucinus f. Anicula.*

*Regenf. conch. t. 12. f. 68.*

*Habitat . .*

Minimus. 305. *C. testa cinerascente punctis oblongis cincta. Mus. L. U. 556. n. 162. \**

*Argenv. conch. t. 15. f. A. Minimus.*

*Habitat . .*

Rusticus. 306. *C. testa ovata, basi rugoso muricatoque scabra, spiræ conico-convexa. M. L. U. 556. n. 163. \**

*Rumph. mus. t. 32. f. R. Voluta cinerea.*

*Gualt. test. t. 25. f. R.*

*Argenv.*

---

*Coronata testa vocantur quarum anfractus superne tantum notantur tuberculis f. micronibus; inter testas coronatas & calvas nulla datur differentia specialis.*

*Argenv. conch. t. 15. f. D.*

*Habitat in Africa.*

*Testa livida, fascia albido-nebulosa.*

Mercator. 307. C. testa ovata alba, fasciis reticulatis flavis. *M. L.*

*U. 557. n. 164.\**

*Argenv. conch. t. 15. f. P.*

*Bonan. recr. 3. t. 136.*

*List. conch. t. 758. f. 3. & t. 788. f. 41.*

*Adans. seneg. 1. t. 6. f. 3.*

*Habitat - -*

betulinus. 308. C. testa basi submarginata rugosa, spira planiuscula mucronata. *M. L. U. 557. n. 169.\**

*Gualt. test. t. 21. f. B.*

*Olear. mus. t. 32. f. 3.*

*Rumph. mus. t. 31. f. C.*

*Seb. mus. 3. t. 45. f. 1-7, 10, 11.*

*Habitat - -*

figulinus. 309. C. testa basi emarginata rugosa, spira acuminata: anfractibus planiusculis. *M. L. U. 558. n. 166.\**

*Rumph. mus. t. 31. f. V. Voluta filosa.*

*Regenf. conch. t. 10. f. 47.*

*Habitat - -*

obsoletus. 310. C. testa ovata alba: fasciis nigris ex maculis transversis. *M. L. U. 558. n. 167.\**

*List. conch. t. 779. f. 25, 26.*

*Bonan. recr. 3. t. 122.*

*Rumph. mus. t. 33. f. B: B. Musica rusticorum.*

*Gualt. test. t. 25. f. T. Q.*

*Argenv. conch. t. 15. f. G. Hebraica.*

*Pet. gaz. 99. f. 12.*

*Seb. mus. 3. t. 47. f. 28, 29.*

*Adans. sen. 1. t. 6. f. 5.*

*Habitat in India.*

Stercus muscarum. 311. C. testa basi emarginata striata, spiræ anfractibus canaliculatis. *M. L. U. 559. n. 168.\**

*Rumph. mus. t. 33. f. Z. A. A. Voluta arenata.*

*Gualt. test. t. 25. f. N. O. P.*

*Argenv. conch. t. 15. f. S. Bombyx.*

*Pet.*

Locus in plerisque Testaceis, etiamnum in arte desit; Pauci certe Coni Europæi.

*Pet. gaz. t. 75. f. 1.*  
*Regenf. conch. t. 7. f. 2.*  
*Seb. mus. 3. t. 55. f. 1.*  
*Habitat in Asia.*

- varius. 312. *C. testa elongata muricata, spira coronata acuta.*  
*M. L. U. 559. n. 169.\**  
*Argenv. conch. t. 15. f. R.*  
*Habitat - -*

\* \* \* *Elongati basi rotundata, cylindro duplo longiore quam spira.*

- Clavus. 313. *C. testa striis convexis lævibus, basi cærulescente.*  
*Habitat - -*  
*Testa flava, maculis albis reticulata: fasciis duabus saturatioribus, maculis albis majoribus; striæ obsoletæ sunt.*

- Nussatella. 314. *C. testa subcylindrica rubra inermi striis tuberculatis scabra.*  
*Rumph. mus. t. 33. f. EE. Terebellum granulatum.*  
*List. conch. 4. f. 10. c. 6. t. 3. f. 2.*  
*Gualt. test. t. 25. f. L.*  
*Argenv. conch. t. 16. f. P.*  
*Habitat ad Nussatello Insulam Asiæ.*  
*Testa pallida, reliquis longior, striis punctis fulvis scabris.*

- granulatus. 315. *C. testa scabra inermi: striis sulcatis lævibus. M.*  
*L. U. 560. n. 170.\**  
*Rumph. mus. t. 32. f. T. Voluta granulata.*  
*Gualt. test. t. 25. f. H.*  
*Habitat in O. Africano.*  
*Testa magis rubra magisque falcata, quam in reliquis; fasciæ albæ una alterave & puncta purpurea ad strias.*

- Aurissacus. 316. *C. testa incarnata lævi fasciis albidis, anfractuum summis canaliculatis.*  
*Rumph. mus. t. 34. f. A. Oranjen Admiraal.*  
*Pet. amb. t. 7. f. 7.*  
*Seb. mus. 3. t. 48. f. 7.*  
*Habitat - -*  
*Testa aurantia fasciis 3 albidis, striisque albo nigroque variis. Spira canaliculata, aurantia margine maculis oblongis, albis fuscisque.*

Magus. 317. *C. testa subcylindrica: fasciis longitudinalibus albo-punctatis. M. L. U. 560. n. 171.\**  
*Rumph. mus. t. 32. f. Q. Voluta maculosa.*  
*Gualt. test. t. 20. f. F?*  
*Seb. mus. 3. t. 44. f. 27.*  
*Habitat - -*

striatus. 318. *C. testa ovato-oblonga gibba nebulosa: striis tenuissimis parallelis fuscis. M. L. U. 561. n. 172.\**  
*Rumph. mus. t. 31. f. F. Voluta tigrina.*  
*List. conch. t. 755. f. 7. & t. 760. f. 6.*  
*Gualt. test. t. 26. f. D.*  
*Argenv. conch. t. 16. f. C.*  
*Pet. gaz. t. 98. f. 9.*  
*Regenf. conch. 8. f. 16.*  
*Seb. mus. 3. t. 42. f. 5-10.*  
*Adans. seneg. 1. t. 6. f. 2.*  
*Habitat versus littora Hitæ, inque O. Africano.*

Textile. 319. *C. testa venis reticulatis luteis, maculis luteis fuscisque. M. L. U. 561. n. 173.\**  
*Rumph. mus. t. 32. f. O. P.*  
*Gualt. test. t. 25. f. X. AA.*  
*Bonan. recr. 3. t. 135.*  
*Argenv. conch. t. 16. f. D. I. Pannus aureus.*  
*Regenf. conch. 26. t. 6. f. 62.*  
*Seb. mus. 3. t. 47. f. 10, 11, 16, 17.*  
*Habitat ad Bandam Asiæ.*

aulicus. 320. *C. testa venis reticulatis fasciisque longitudinalibus fuscis interruptis. M. L. U. 562. n. 174.\**  
*Bonan. recr. 3. t. 133.*  
*Gualt. test. t. 25. f. Z. V.*  
*Argenv. conch. t. 16. f. G. Nigella.*  
*Regenf. conch. t. 8. f. 25.*  
*Seb. mus. 3. t. 43. f. 1, 2, 4, 5.*  
*& t. 47. f. 13, 14, 15.*  
*Habitat in Asia.*  
*Varietas forte præcedentis.*

\* \* \* \* Laxi ventricosi, in dorsum disjecti super mensam tinnitantes.

Spectrum. 321. *C. testa cærulescente flavo-nebulosa punctis striisque albo-luteis. M. L. U. 562. n. 175.\**  
*Rumph.*

*Rumph. mus. t. 32. f. S. Voluta spectrorum.*

*Gualt. test. t. 25. f. S.*

*Regenf. conch. t. 2. f. 20.*

*Habitat in Asia.*

bullatus. 322. C. testa flava albo-nebulosa. *M. L. U. 563. n. 176.\**

*Gualt. test. t. 26. f. C.*

*Habitat - -*

Tulipa. 323. C. testa oblonga gibba lævi, apertura dehiscente.

*Rumph. mus. t. 34. f. K. L.*

*Argenv. conch. t. 16. f. B. Tulipa.*

*Regenf. conch. 8. t. 2. f. 20.*

*Seb. mus. 3. t. 42. f. 16.*

*Habitat - -*

*Simillimus Geographo, sed minime coronatus; ceterum testa laxè convoluta.*

Geographus. 324. C. testa oblonga gibba coronata, apertura dehiscente.

*Bonap. recr. 3. t. 319.*

*Rumph. mus. t. 31. f. G. Nubecula.*

*Gualt. test. t. 26. f. E.*

*Argenv. conch. t. 16. f. A. Textile seticum.*

*Klein. ostr. t. 5. f. 90. Nubecula, Tulipa gallorum.*

*List. conch. 4. f. 10. c. 7. t. 3. f. 2.*

*Pet. gaz. t. 98. f. 8.*

*Adans. seneg. 1. t. 6. f. 8.*

*Seb. mus. 3. t. 42. f. 1, 2, 3, 4.*

*Habitat in Indiis.*

### 320. CYPRÆA. *Animal* Limax.

*Testa* univalvis, involuta, subovata, obtusa, lævis.

*Apertura* utrinque effusa, linearis, utrinque dentata, longitudinalis.

#### \* Mucronatæ.

Exanthema. 325. C. testa subturbinata ferruginea maculis pallidis rotundis adspersa, linea longitudinali subramosa.

*Pet. gaz. t. 96. f. 6.*

*Regenf. conch. t. 10. f. 38.*

*Seb. mus. 3. t. 76. f. 16, 18.*

*Habitat - -*

*Simi-*

*Similis C. Mappa, sed color atro s. rufo ferrugineus; linea longitudinalis recta uno alterove ramo; cæterum adpersa punctis latis pallidis. Spira mucrone prominens. Subtus pallida, immaculata.*

- Mappa.** 326. *C. testa subturbinata characteribus inscripta, linea longitudinali ramosa. M. L. U. 565. n. 170. \**  
*Rumph. mus. t. 38. f. B. Porcellana montosa.*  
*Argenv. conch. t. 21. f. B. Carte géographique.*  
*Pet. gaz. t. 96. f. 6.*  
*amb. t. 16. f. 2.*  
*Habitat in O. Africa.*  
*Differt a sequenti lateribus lateribus pallidis immaculatis.*

- arabica.** 327. *C. testa subturbinata characteribus inscripta, macula longitudinali simplici. M. L. U. 566. n. 180. \**  
*Rumph. mus. t. 38. f. M. Porcellana literata s arabica.*  
*Barrel. var. t. 1325. f. 20.*  
*Gualt. test. t. 16. f. V.*  
*List. conch. 4. f. 2. c. 2. t. 1. f. 1.*  
*Seb. mus. 3. t. 76. f. 3.*  
*Habitat in India orientali, ad Fretum Sunda.*  
*Differt a precedenti lateribus incrassatis fusco maculatis. Intus violacea est.*

- Argus.** 328. *C. testa subturbinata subcylindrica adpersa ocellis, subtus maculis quatuor fuscis. M. L. U. 567. n. 181. \**  
*Bonan. recr. f. 3. t. 263.*  
*Barr. rar. t. 1325. f. 25.*  
*Rumph. mus. t. 38. f. D. Argus.*  
*Gualt. test. t. 16. f. T.*  
*Argenv. conch. t. 21. f. D. Argus magnus.*  
*List. conch. 4. f. 9. c. 6. t. 9.*  
*Pet. gaz. t. 97. f. 6.*  
*Reyn. conch. 20. t. 5. f. 57.*  
*Habitat in O. Africa.*  
*Subtus macule utrinque due, inque fusca.*

- testudina-** 329. *C. testa obtusa subcylindrica, extremitatibus depresso-*  
**ria.** *M. L. U. 567. n. 182. \**  
*List. conch. 4. f. 9. c. 6. t. 16.*  
*Rumph. mus. t. 38. f. C. Testudinaria.*  
*Pet. amb. t. 8. f. 7.*  
*β. List. conch. 4. f. 10. c. 8. t. 1. Larva est.*  
*Habitat in Sinu Persico.*

Hæc

*Hac in suo genere maxima & reliquis longior; variis absque & cum spira antice manifesta.*

**Bercora-** 330. *C. testa subturbinata gibba livido testaceoque macu-*  
**rim.** *lata, utrinque marginata, subtus plana.*

*Gualt. test. t. 15. f. S. T.*

*Column. aqu. t. 69. f. 1, 2.*

*Pet. gaz. t. 96. f. 7, 8.*

*Barr. ic. t. 1321. f. 23. & t. 1322. f. 4.*

*Adans. seneg. t. 2. f. 1. A.*

*Habitat - -*

*Testa subovata gibba subturbinata undato-glanca maculis griseis fuscisque temere adspersa; antice juxta spiram macula fusca; postice depresso-marginata deflexa; subtus plana: Labro interiore postice valde retuso; apertura antice valde gibba.*

**Carneola.** 331. *C. testa subturbinata pallida fasciis incarnatis, ore*  
*violaceo. M. L. U. 568. n. 183. \**

*Rumph. mus. 38. f. K. Carneola.*

*Pet. gaz. t. 80. f. 8.*

*Habitat in Asia.*

*Testa tenuis oblonga, apertura saepe subviolacea.*

**Zebra.** 332. *C. testa turbinata cinerea fasciis fuscis.*

*Bonap. recr. 3. t. 266.*

*Argenv. conch. t. 21. f. G.*

*Seb. mus. 3. t. 76. f. 5.*

*Habitat - -*

*Statura Carneola, sed duplo major, spira majore evidentiore quam in reliquis. Denticuli aperturae fuscii. Venter ocellis obsoletis.*

**Talpa.** 333. *C. testa subturbinata subcylindrica testacea fasciis*  
*pallidis, subtus incrassata fusca. M. L. U. 568. n. 168. \**

*Rumph. mus. t. 38. f. I. Talpa.*

*Gualt. test. t. 16. f. N.*

*Argenv. conch. t. 21. f. H. Talpa.*

*Pet. amb. t. 16. f. 1.*

*List. conch. 4. f. 9. c. 4. t. 3. f. 2.*

*Barrel. rar. t. 1325. f. 19.*

*Regenf. conch. t. 10. f. 37.*

*Habitat in Asia.*

**amethy-** 334. *C. testa subturbinata: lateribus gibbis corticatis, dorso*  
**sica.** *violaceo. M. L. U. 569. n. 185. \** *Rumph.*



*Rumph. mus. z. 39. f. Q. Achatina.*  
*Pet. gaz. z. 32. f. 10.*  
*List. conch. 4. f. 9. c. 3. s. 4. f. 3.*  
*Habitat in Madagascar.*

lurida. 335. C. testa subturbinata lurida subfasciata, extremitatibus luteis nigro-bimaculatis.

*Gualt. test. z. 13. f. I.*  
*Bonap. recr. 3. z. 251.*  
*Argenv. conch. z. 21. f. C. Souris.*  
*Adans. seneg. 1. z. 5. f. D.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*

Vanelli. 336. C. testa subturbinata maculata punctis lutescentibus, extremitatibus fusco-maculatis, fauce rufa. M. L. U. 562. n. 186.

*Pet. gaz. z. 95. f. 13.*  
*Habitat - -*  
*Apertura inter dentes rufa.*

lota. 337. C. testa subturbinata alba, denticulis subulatis. M. L. U. 570. n. 187.

*Habitat - -*

fragilis. 338. C. testa turbinata ovata glauca testacea-undata subfasciata. M. L. U. 570. n. 188.

*Rond. aqn. 2. p. 102.*  
*Gualt. test. z. 16. f. Q.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*  
*Testa struchura C. arabica, sed picea undis longitudinalibus griseis & fasciis pallidis cincta, ceterum reliquis magis tenuis est.*

• • Obtusa absque spira manifesta.

Caput serpentis. 339. C. testa obtusa triquetra-gibba, pollice obtusiuscula. M. L. U. 571. n. 189.

*Bonap. recr. 3. z. 258.*  
*Rond. aqn. 2. p. 103. f. 3.*  
*Rumph. mus. z. 38. f. F. Caput serpentis minus.*  
*Pet. gaz. z. 96. f. 9.*  
*amb. z. 12. f. 7.*

*List. conch. 4. f. 9. s. 6. z. 7. Concha veneris maculis quasi reticulatis.*

*Gualt. test. z. 15. f. O.*

F f f f f

Adans.

*Adans. seneg.* 1. t. 5. f. 5.

*Habitat in Mauritio.*

mauritiana. 340. C. testa obtusa triquetra-gibba, postice depresso-2-  
cuta; subtus nigra. *M. L. U.* 571. n. 190. \*

*Bonan. recr.* 3. f. 261.

*Rumph. mus.* t. 38. f. E. Caput serpentis majus.

*Pet. gaz.* t. 96. f. 8.

*List. conch.* 4. f. 9. c. 6. t. 8.

*Habitat in Mauritio, Java.*

*Hec magna subtus fusca; precedens parva subtus albida.*

*Hec disco maculis rotundis pallidis sparsis medio gibboso.*

Vitellus. 341 C. testa obtusa livida maculis albis. *M. L. U.* 572. n. 191. \*

*List. conch.* 4. f. 9. c. 4. t. 8. f. 2.

*Bonan. recr.* 3. f. 254.

*Pet. gaz.* t. 80. f. 2.

*Rumph. mus.* 115. t. 38. f. D. falita.

*Habitat ad Sundam Asia.*

Mus. 342. C. testa obtusa retusa gibba cinerea: fascia longitudi-  
nali fusca, denticulis nigricantibus. *M. L. U.*  
572. n. 192. \*

*Rumph. mus.* t. 39. f. S.

*List. conch.* 4. f. 9. c. 1. t. 2.

*Argen. conch.* t. 21. f. E?

*Seb. mus.* 3. t. 76. f. 33, 34.

*Habitat ad Carthagenam.*

Tigris. 343. C. testa obtusa ovata, postice obtusa, antice ro-  
tundata, linea longitudinali testacea. *M. L. U.* 573.  
n. 193. \*

*Bonan. recr.* 3. f. 231, 232.

*Rumph. mus.* t. 38. f. A. Porcellana guttata.

*Gualt. test.* t. 14. f. I. H. L. G.

*List. conch.* 4. f. 9. c. 5. t. 1.

*Pet. gaz.* t. 96. f. 17.

*Barr. rar.* t. 1325. f. 23. & t. 1326. f. 4.

*Habitat in Madagascar, Java.*

*Testa albida s. purpurascens maculis obsoletis, fuscis  
confluentibus; antice posticeque cinerascens; subtus  
nivea.*

Lynx. 344. C. testa oblongo-ovata punctis fuscis lineaque fla-  
vescente; postice acutiuscula, ore rufo. *M. L. U.*  
573. n. 194. \*

*Gualt.*

*Gualt. test. t. 14. f. 2. C. D.*

*List. conch. 4. f. 9. c. 4. t. 9. f. 1.*

*Pet. gaz. t. 97. f. 17.*

*Habitat ad Madagascar.*

*Præcedenti similis nitidaque, sed parva.*

*Isabella.* 345. *C. testa obtusa subcylindrica, extremitatibus luteis.*

*M. L. U. 574. n. 195. \**

*Rumph. mus. t. 39. f. G. Isabella.*

*Argen. conch. t. 21. f. P.*

*Pet. amb. 16. f. 16. gaz. t. 97. f. 16.*

*List. conch. 4. f. 9. c. 2. t. 2. f. 2.*

*Habitat in Mauritio, Madagascar.*

\* \* \* Umbilicatæ.

*Onyx.* 346. *C. testa umbilicata, subtus fusca, supra albida. M.*

*L. U. 574 n. 196. \**

*Bonan. recr. 3. t. 255.*

*Rumph. mus. t. 38. f. G. Porcellana cærulea.*

*Gualt. test. t. 15. f. N.*

*Habitat in Asia.*

*Testa magnitudine pollicis, subtus atrata; supra lutea, albido-flava, similis cæterum Capiti Serpentis; an mutata?*

*clandestina.* 347. *C. testa umbilicata, lineis transversis subtilissimis flavescens passim concurrentibus.*

*Habitat . . . J. Zoega hanc observavit.*

*Testa lævis livida, magnitudine C. Aselli, fascia una alterave pallida obsoleta. Notæ propriæ sunt striæ pictæ, luteæ, transverse passim concurrentes; vix nisi oculo armato manifestæ. Subtus testa alba immaculata est.*

*succincta.* 348. *C. testa umbilicata, labio interiore utraque extremitate rotundato. M. L. U. 575. n. 197. \**

*Habitat . . .*

*Ziczac.* 349. *C. testa umbilicata, subtus lutea punctis fuscis, extremitatibus maculis duabus fuscis. M. L. U. 575. n. 198. \**

*Bonan. recr. 3. t. 242.*

*List. conch. 4. f. 9. c. 3. t. 1. f. 1. Concha ven. undatim depicta.*

F f f f 3

*Pet.*

*Pet. gaz.* t. 12. f. 7.

*Seb. mus.* 3. t. 55. f. 19. n. b, c, d.

*Habitat* - -

**Mirundo.** 350. *C. testa umbilicata, supra caerulefcente, extremitatibus maculis duabus fuscis. M. L. U. 576. n. 199.*

*Pet. gaz.* t. 30. f. 3.

*Habitat* - -

**Asellus.** 351. *C. testa umbilicata alba: fasciis tribus fuscis. M. L. U. 577. n. 200.*

*Bonap. recr.* 3. f. 236.

*Barrel. rar.* t. 1326. f. 27.

*Rumph. mus.* t. 39. f. M. Asellus.

*Argenv. conch.* t. 21. f. T. Asellus.

*Gualt. test.* 15. f. M.

*Pet. gaz.* t. 97. f. 11.

*amb.* t. 16. f. 18.

*Liss. conch.* 4. f. 9. c. 6. t. 3. f. 2.

*Adans. seneg.* 1. t. 5. f. H.

*Habitat* in Maldivis;

**Erycin.** 352. *C. testa umbilicata: macula testacea aequal. M. L. U. 577. n. 202.*

*Habitat* - -

*Differt a C. stolidi macula una, nec pluribus.*

• • • • *Marginata.*

**marginata.** 353. *C. testa umbilicata marginata lutea: punctis rotundis albis. M. L. U. 577. n. 201.*

*Argenv. conch.* t. 21. f. X. Argus minor.

*Pet. gaz.* t. 80. f. K; an t. 8. f. 3?

*Liss. conch.* 4. f. 9. c. 6. t. 3. f. 2.

*Regenf. conch.* t. 12. f. 74.

*Habitat* - -

**Moneta.** 354. *C. testa marginato-nodosa albida. M. L. U. 578. n. 203.*

*Bonap. recr.* 3. f. 233.

*Barrel. rar.* t. 1326. f. 26.

*Liss. conch.* 4. f. 9. c. 8. t. 1. f. 3, 4. Moneta nigrarum.

*Rumph. mus.* t. 39. f. C. Thoracina vulgare f. Caucicum.

*Gualt.*

*Gualt. test. t. 14. f. 4, 5.*

*Argenv. conch. t. 21. f. K. Moneta Congo.*

*Pet. amb. t. 16. f. 14.*

*gaz. t. 97. f. 8. Concha veneris africana f. Moneta nigritarum.*

*Habitas ad Africam, in M. Mediterraneo: Alexandria; imprimis in Maldivis, ubi a feminis legitur sub aqua per tres dies a plenilunio vel ante novilunium, unde transportatur navibus in Bengalam, Siam, Americam, pro Moneta Nigritarum. Amen. acad. 3. p. 239.*

Annulus. 355. C. testa marginata, dorso annulo flavo circumdato.

*M. L. U. 578. n. 204. \**

*Rond. test. 2. p. 103. f. 4. \**

*Rumph. mus. t. 39. f. D. Thoracium quadratum.*

*Gualt. test. 14. f. 1, 2.*

*Pet. gaz. t. 6. f. 8.*

*Habitas ad Amboinam frequens; Alexandria.*

caurica. 356. C. testa margine gibbo inæquali albido fusco-punctato, dorso nebulato-testaceo.

*Rumph. mus. t. 38. f. P.*

*Gualt. test. t. 15. f. X.*

*Habitas in Oceano Indico.*

crofa. 357. C. testa derofo-marginata flava albo-punctata, lateribus macula subfusca. *M. L. U. 578. n. 205. \**

*Rumph. mus. t. 39. f. A. Thoracium oculatum.*

*Gualt. test. t. 15. f. H.*

*List. conch. 4. f. 9. c. 6. s. 2. f. 1.*

*Pet. gaz. t. 97. f. 19.*

*Habitas in Mauritio & insula Adscensionis.*

*Labium exterius transverse profunde sulcatum, macula ferruginea in utroque latere.*

flaveola. 358. C. testa derofo-marginata flavescente albo punctata: lateribus punctis fuscis obsoletis subspatis. *M. L. U. 581. n. 209. \**

*Habitas - -*

spurca. 359. C. testa submarginata lutescente, luteo irrorata, lateribus fusco-punctatis.

*Habitas in M. Mediterraneo.*

F f f f 4

T. f. 1

*Testa ovata, laevis, lutescens, punctis pallidioribus aut saturatioribus confertim adspersa; margo supra crenulatus colore fusco; labium interius pŏssice reflexo apice, quod huic proprium. Testa interdum occurrit livida immaculata diaphana, non dum dentes adepta, sed tamen magnitudine justa, unde apparet hanc senectam exuere. n. 389.*

stolidia. 360. C. testa marginata cinerea, testaceo quadrato variegata. *M. L. U. 580. n. 207. \**

*Argen. conch. t. 21. f. 7.*

*Pet. gaz. t. 97. f. 19.*

*Habitat - -*

helvola. 361. C. testa marginata triquetra-gibba albo-punctata, pŏssice erosa, subtus flava immaculata. *M. L. U. 579. n. 206.*

*Habitat - -*

ocellata. 362. C. testa submarginata lutea: ocellis nigris. *M. L. U. 580. n. 208.*

*List. conch. 4. f. 9. t. 696. f. 43.*

*Bonan. recr. 3. t. 247.*

*Pet. gaz. t. 9. f. 7.*

*Habitat - -*

poraria. 363. C. testa marginata subviolacea albo-punctata. *M. L. U. 581. n. 210. \**

*Habitat - -*

Pediculus. 364. C. testa marginata transversim sulcata. *M. L. U. 582. n. 211. \**

*List. conch. 4. f. 9. t. 7. f. 1.*

*angl. 168. t. 3. f. 17. Concha veneris exigua alba striata.*

*Rumph. mus. t. 39. f. P. Pediculus.*

*Gualt. test. t. 14. f. P. & t. 15. f. P. R.*

*Argen. conch. t. 21. f. L. Pediculus.*

*Pet. amb. t. 16. f. 22.*

*Barr. var. t. 1326. f. 28.*

*Adans. seneg. 1. t. 5. f. 3.*

*Ginaw. 2. t. 13. f. 109.*

*Habitat in Jamaica, Europa.*

*Hec maculas gerit dorsales 3 fuscas. Indica dorso exarato sulco longitudinali; Europæo sulco destituta; Anglica tota absque maculis alba.*

365. C.

Nucleus. 365. C. testa utrinque marginata subrostrata rugosa: supra punctata tuberculis. *M. L. U.* 582. n. 212. \*

*Rumph. mus. t.* 36. f. I. Nux avellana granulata.

*Gualt. test. t.* 14. f. S.

*Argenv. conch. t.* 21. f. V. Variolæ.

*Pet. amb. t.* 16. f. 11. & *gaz. t.* 97. f. 12.

*List. conch. 4. f.* 9. c. 8. t. 2. f. 3.

*Seb. mus. 3. t.* 55. f. 22.

*Habitat in O.* Indiæ orientalis.

staphylæa. 366. C. testa subrostrata, punctis elevatis sine striis, extremitatibus luteis. *M. L. U.* 583. n. 213. \*

*Argenv. conch. t.* 21. f. S. Porcellio.

*Habitat - -*

Cicercula. 367. C. testa utrinque rostrata, adspersa punctis elevatis.

*Rumph. mus. t.* 39. f. 9.

*Gualt. test. t.* 14. f. T.

*Habitat in M.* Mediterraneo.

Globulus. 368. C. testa utrinque rostrata lævi. *M. L. U.* 583. n. 214. \*

*Rumph. mus. t.* 39. f. L. Globulus.

*Gualt. test. t.* 14. f. M.

*Pet. amb. t.* 16. f. O. & *gaz. t.* 97. f. 14.

*Barrel. rar. t.* 1326. f. 31.

*Habitat in Asia.*

### 321. BULLA. *Animal* Limax.

*Testa* univalvis, convoluta, inermis.

*Apertura* subcoarctata, oblonga, longitudinalis, basi integerrima.

*Columella* obliqua, lævis.

Ovum. 369. B. testa ovata obtuse subbirostri, labro dentato. *M. L. U.* 584. n. 215. \*

*Bonani. recr. 3. t.* 252.

*Rumph. mus. t.* 38. f. Q. Ovum.

*List. conch. 4. f.* 9. c. 9. t. 1. f. 4.

*Gualt. test. t.* 15. f. A.

*Argenv. conch. t.* 21. f. A. Ovum.

F f f f 5.

Pet.

*Pet. gaz. t. 97. f. 7.*

*amb. t. 8. f. 6.*

*Habitat in O. Asiatico.*

*Hec media inter Cypræas & Bullas; Labro exteriori precedentibus convenit, interiore levi ad sequentes accedit.*

**Volva.** 370. *B. testa birostri, rostris elongatis striatis acutis. M.*

*L. U. 584. n. 216. \**

*List. conch. 4. f. 9. c. 9. t. 1. f. 1.*

*Seb. mus. 3. t. 55. f. 13-16.*

*Argent. conch. t. 21. f. 1. Radius textoris.*

*Habitat ad Jamaicam.*

**birostris.** 371. *B. testa birostri, margine extus incrassato, rostris elongatis lævibus.*

*Habitat ad Javam.*

*Testa similis B. Volvæ, sed minor, magnitudine Fabæ, angustior, levis, incarnato-albida. Rostra æqualia, lævia, fere ventris testæ longitudine, oblique truncata, altero parum adscendente. Margo extus longitudinalis incrassatus. Rima subæqualis, versus rostrum adscendens latior.*

**Spelta.** 372. *B. testa oblonga utrinque obtusiuscula æquali, labro arcuato: margine intus incrassato.*

*Gualt. test. t. 15. f. 4.*

*Pet. gaz. t. 66. f. 1, 3.*

*Ginan. adr. 2. t. 13. f. 95.*

*Barrel. ic. 31, 32, 35.*

*Habitat in M. Mediterraneo. E. Logie.*

*Testa alba, levis, semine Tritici duplo major, vix birostris, sed magis parula. Apertura longitudinalis, ignota cum denticula obsoleto ad apicem columella. Spira externa omnino nulla.*

**verrucosa.** 373. *B. testa transverse angulata, aucta utrinque puncto osseo. M. L. U. 585. n. 217. \**

*Rumph. mus. t. 38. f. H. Jambos alba.*

*List. conch. 4. f. 9. c. 9. t. 2. f. 3.*

*Gualt. test. t. 16. f. F.*

*Argent. conch. t. 21. f. M.*

*Pet. gaz. t. 99. f. 2.*

*amb. t. 16. f. 23. Gibbs.*

*Seb. mus. 3. t. 55. f. 17.*

*Habitat in India Orientali.*

374. *B.*



*gibbosa.* 374. B. testa angulata: cingulo elevato. *M. L. U.* 585.  
n. 218. \*

*Column. purp.* 29. t. 39. f. 5.

*List. conch.* 4. f. 9. c. 9. t. 1. f. 2, 3.

*Bonap. recr.* 3. t. 249, 339.

*Gualt. test.* t. 15. f. 3.

*Argenv. conch.* t. 21. f. Q.

*Pet. gaz.* t. 15. f. 5.

*Seb. mus.* 3. t. 55. f. 18.

*Habitas in Brasilia.*

*Naucum.* 375. B. testa rotundata pellucida transversim substriata, utrinque umbilicata, *M. L. U.* 586. n. 219. \*

*Bonap. recr.* 3. t. 4.

*Rumph. mus.* t. 27. f. H. Bulla.

*List. conch.* 4. f. 9. c. 10. t. 1. f. ult.

*Gualt. test.* t. 13. f. GG.

*Argenv. conch.* t. 20. f. Q.

*Seb. mus.* 3. t. 38. f. 45.

*Habitas in Asia.*

*sperto.* 376. B. testa subrotunda pellucida transversim substriata, tota hians.

*Gualt. test.* t. 13. f. EE.

*Habitas ad Cap. b. spec. Laur. Spengler.*

*Simillima B. Nanco, antice etiam umbilicata, sed tota ita hians, ut universa testa intus pateat, modo labium interius versus antica parum involutum. An mera varietas?*

*Hydatis.* 377. B. testa rotundata pellucida longitudinaliter substriata, vertice umbilicato.

*Gualt. test.* t. 13. f. DD.

*Habitas in M. Mediterraneo.*

*Magnitudo sapius Pisi minoris.*

*Ampulla.* 378. B. testa rotundata opaca, vertice umbilicato. *Mus.*  
*L. U.* 586. n. 220. \*

*Bonap. recr.* 3. t. 3.

*List. conch.* 4. f. 9. c. 10. t. 1. f. penult.

*Rumph. mus.* t. 27. f. G. Bulla.

*Gualt. test.* t. 12. f. E, H, I. F. G.

*Grev. mus.* t. 9. f. 7, 8.

*Pet. gaz.* t. 59. f. 13.

t. 59. f. 14.

*Column.*

- Column. aqu. t. 69. f. 3.*  
*Barr. ic. t. 1326. f. 37.*  
*Adans. seneg. t. 1. f. 2.*  
*Seb. mus. 3. t. 38. f. 34-44.*  
*Regenf. conch. 20. t. 5. f. 58. & t. 8. f. 21.*  
*Habitat ad ins. Mauriti, Jamaicam, Barbados, Africam.*
- lignaria.** 379. B. testa obovata oblongiuscula transverse striata, vertice subumbilicato.  
*List. conch. t. 714. f. 71.*  
*Habitat . . e musco Tessiniano.*  
*Testa sutura fere Ampulla, sed magis versus apicem angustata, minus umbilicata, colare fere ligni; intus alba & columella flexuosa, ut oculo aditus pateat ad verticem usque.*
- Physis.** 380. B. testa rotundata, glaberrima pellucida lineis crispata, spira retusa. *M. L. U. 587. n. 221.*  
*Gualt. test. t. 13. f. FF.*  
*Argenv. conch. t. 20. f. 1.*  
*Seb. mus. 3. t. 38. f. 146-50.*  
*Habitat . . .*
- Amplustre.** 381. B. testa subrotunda, spira elevata obtusa, fasciis incarnatis. *M. L. U. 587. n. 222.*  
*Habitat in Asia.*  
*Testa alba fasciis rubris.*
- Ficus.** 382. B. testa obovato-clavata reticulato-striata, cauda exserta, spira oblitterata.  
*M. L. U. 637. n. 314. Murex Ficus.*  
*List. conch. 4. f. 10. c. 8. t. 2. f. 3.*  
*Bonan. recr. 3. t. 15.*  
*Rumph. mus. t. 27. f. K. Ficus.*  
*Pet. amb. t. 6. f. 9.*  
*Gualt. test. t. 26. f. I. M.*  
*Argenv. conch. t. 20. f. O.*  
*Klein. ostr. t. 5. f. 93.*  
*Seb. mus. 3. t. 38. f. 13-24. & t. 68. f. 1-6.*  
*Habitat in O. Indico ad Amboinam.*
- Rapa.** 383. B. testa rotundato-turbinata substriata, cauda curva, spira exquisita.  
*M. L. U. 638. n. 315. Murex Rapa.*  
*Rumph. mus. t. 27. f. F. Rapa.*

*Pet. amb. t. 9. f. 8.*

*Gualt. test. t. 26. f. H.*

*Argenv. conch. t. 20. f. K. Rapa.*

*Klein: ostr. t. 4. f. 80.*

*Seb. mus. 3. t. 38. f. 13-16, 18-20, 22, 23. & t. 38. f. 7, 8.*

*Habitat in O. Asiatico, rarius.*

*Muricibus proxima ob caudam, sed textura & omnia hujus cum precedentis naturam Bullae indicant.*

canaliculata. 384. B. testa cylindrica, spiræ anfractibus canaliculatis. *M. L. U. 588. n. 224. \**

*Habitat - -*

*T. testacea pallido nebulata.*

econoidea. 385. B. testa oblongo-turbinata lævi, basi substriata, futuris crenulatis.

*Habitat - -*

*Testa magnitudine glandis, albido-flavescent, structura conis, vix striata, nisi versus basin striis aliquot punctatis. Spira conica, testa dimidia brevior. Anfractus tennes, imbricati, ad marginem punctis quasi crenulati. Basis emarginata. Columella plicis 5 f. 6. Labium obtusum.*

fontinalis. 386. B. testa ovata pellucida contraria, spira obsoleta, apertura ovato-oblonga. *Fa. succ. 2160. \**

*It. wgoth. 49.*

*Habitat in Lacuum plantis subaquaticis.*

Hypnorum. 387. B. testa ovata pellucida contraria, spira prominente, apertura ovato-lanceolata. *Fa. spec. 2159. \**

*Habitat in Europa Muscis humentibus.*

terebellum. 388. B. testa cylindrica, spira subulata basi truncata. *M. L. U. 564. n. 178. \**

*Bonon. recr. 3. t. 57.*

*List. conch. 4. f. 10. c. 6. f. 1.*

*Rumph. mus. t. 30. f. S. Terebellum.*

*Pet. amb. t. 13. f. 24.*

*Argenv. conch. t. 14. f. G.*

*Habitat in Asia.*

*Textura Bulla, Apertura Coni; in bivio posita.*

Cypræa. 389. B. testa ovata, spira oblitterata apice prominulo, apertura postice dilatatiore, columella torta. *Ha-*

*Habitat in M. Mediterraneo. Larva.*

*Magnitudo Glandis & ultra.*

*Hic posui ne testa confundat, quæ denuum labia approximatas, dentesque acquiris 359.*

**virginica.** 390. *B. testa subtrurrita erecta, columella truncata sanguinea.*  
*M. L. U. 612. n. 167. Buccinum virginicum.*

*Bonaw. recr. 3. t. 66.*

*List. conch. 1. 12.*

*Pet. gaz. 1. 22. f. 7.*

*Gualt. test. 1. 6. f. A.*

*Argenv. conch. 1. 14. f. N.*

*Klein. ostr. 1. 7. f. 116.*

*Seb. mus. 3. t. 40. f. 38, 39.*

*Regenf. conch. 1. 10. f. 46.*

*Gualt. test. 1. 6. f. C.*

*Argenv. conch. 1. 14. f. M.*

*Seb. mus. 3. t. 39. f. 62-74.*

*Habitat in Africa fluviiis.*

*Varietas 3 eadem statura, magnitudine, sed colore diversa.*

**schistina.** 391. *B. testa ovata, apertura obovata apiceque sanguineis, columella truncata.* *M. L. U. 589. n. 225.\**  
*Colum. aquat. 1. 16. Buccinum exoticum.*

*List. conch. 1. 579.*

*Bonaw. recr. 3. t. 192.*

*Gualt. test. 1. 45. f. B.*

*Argenv. conch. 1. 13. f. E.*

*Klein. ostr. 1. 3. f. 60.*

*Pet. gaz. 1. 44. f. 7.*

*Seb. mus. 3. t. 71. f. 1-5, 7-9.*

*Adans. seneg. 1. t. 1. f. 1.*

*Habitat in O. Americano. media inter Helices & Bullas.*

*Genus dubium, vix Bulla ob dissectam & truncatam columellam, uti præcedentis. Varietas livida lineis fuscis, undulatis, longitudinalibus; intus albida.*

**322. VOLUTA.** *Animal Limax.*

*Testa unilocularis, spiralis.*

*Apertura ecaudata, subeffusa.*

*Columella plicata: Labio Umbilicove nullo.*

*\* Apertura integra.*

**Anis.** **Midz.** 392. *V. testa coarctata ovali-oblonga, spira rugosa, columella bidentata.* *M. L. U. 589. n. 226.\**

*Bonaw.*

*Bonau. kirch. 3. t. 412.*

*List. conch. 1. 32. f. 30.*

*Rumph. mus. 1. 33. f. HH. Auris midæ.*

*Gualt. test. 1. 55. f. G.*

*Argenv. conch. 1. 13. f. G. Auricula midæ.*

*Klein. ostr. 1. 7. f. 122.*

*Seb. mus. 2. 1. 71. f. 6, 22, 27.*

*Habitat in Indiæ orientalis paludibus.*

*Hæc, antecedens & insequens, quasi media Bullas inter & Helices.*

**Auris Judæ.** 393. V. testa coarctata oblonga, spira lævi, columella tridentata. *M. L. U. 590. n. 226. \**

*Habitat - -*

*Affinis nimium præcedenti.*

**tornatilis.** 394. V. testa coarctata ovata substriata, spira elevata acutiuscula, columella uniplicata.

*Habitat - -*

*Testa rubicunda fasciis albis.*

**blidula.** 395. V. testa coarctata oblongo-ovata opaca striata, spira elevata acutiuscula, columella subplicata. *M. L. U. 590. n. 228. \**

*Bonau. rer. 3. 1. 143.*

*Habitat - -*

*Testa albo griseoque longitudinaliter lineata.*

**livida.** 396. V. testa coarctata ovato-cylindrica, spira subelevata obtusiuscula, columella quinqueplicata. *M. L. U. 591. n. 229. \**

*Gualt. test. 1. 25. f. B.*

*Habitat in Africa.*

*Testa livida fasciis transversis, pallidis, obsoletis.*

**cefea.** 397. V. testa coarctata lævi, spira obtusa, apertura utrinque dentata.

*Habitat - -*

*Testa lurido-livida, fascie Cœni, sed apertura postica coarctata.*

*\* \* Cylindroides s. subcylindrica, emarginata.*

**porphyria.** 398. V. testa emarginata cylindroide lævi, spiræ basi obliterata, labro medio retuso, columella oblique striata. *M. L. U. 591. n. 230. \**

*List.*

*List. conch.* t. 727.

*Bonap. recr.* 3. t. 142.

*Rumph. mus.* t. 39. f. 1.

*Gualt. test.* t. 24. f. O. P.

*Argenv. conch.* t. 16. f. K. *Porphyria*.

*Regensf. conch.* 8. t. 2. f. 15.

*Habitat in Brasilia.*

Testa sequenti quadruplo major, incarnata, scripta lineis testaceis ziczac, in formam castorum.

Affinitas tanta cum sequenti, ut potius varietas, quam distincta species, quamvis pretium hanc nobilitaverit.

*Oliva.*

399. V. testa emarginata cylindroide laevi, spiræ basi reflexa, columella oblique striata. *M. L. U.* 593. n. 231.\*

*List. conch.* 718. f. 2.

*Rumph. mus.* t. 39. f. 2-5. Cylinder.

*Bonap. recr.* 3. t. 141.

*Gualt. test.* t. 23. f. A-N.

*Argenv. conch.* t. 16. f. R. Litterata & N. Q. oliva.

*Regensf. conch.* 2. t. 1. f. 2.

*Seb. mus.* 3. t. 53. f. A-N.

*Habitat in M. Indico.*

Varietates coloribus infinite ludentibus; Litterata praefertur.

*Ispidula.* 400. V. testa emarginata cylindroide laevi, spira prominente margine unico, columella oblique striata. *M. L. U.* 594. n. 232.\*

*Rumph. mus.* t. 39. f. 6, 7.

*Pet. gaz.* t. 59. f. 8.

*Bonap. recr.* 3. t. 369.

*Barr. ic.* 1322. f. 17.

*Adansf. seneg.* 1. t. 4. f. 7.

*Habitat*

Varietates potius hæ tres, quam distinctæ species.

\* \* \* *Ovata* f. *obovata*, *effusa*, *emarginata*.

*Dactylus.* 401. V. testa obovata laevi decussatim striata obtusa, columella sexplicata.

*Gualt. test.* t. 28. f. P.

*Habitat in India.*

Testa albido incarnatoque variegata. Labium vix cre-  
natum. Columellæ plice valde compressæ.

402. V.

miliaria. 402. V. testa submarginata obovata alba, spira oblitterata flaveola, columella oblique striata.

Barr. ic. 30.

Habitat in Mari Mediterraneo frequens.

Similis sequenti, sed minor, glaberrima, spira lineola flava.

monilis. 403. V. testa integra obovata alba, spira oblitterata alba, columella oblique striata.

Habitat in China, unde Armillæ, Monilia.

Perficula. 404. V. testa emarginata ovata lævi, spira retuso-umbilicata, columella septemplicata, labro marginato crenato.

Pet. gaz. t. 8. f. 2.

Barrel. icon. 1326. n. 33.

Gualt. test. t. 28. f. C. D. E.

β. Pet. gaz. t. 8. f. 10.

Bonan. recr. 3. t. 238. male.

Gualt. test. t. 28. f. B.

Adans. seneg. 1. t. 4. f. 4.

Habitat in O. Africano.

Variat colore: alia Cingulata striis rubris; alia Punctata maculis sanguineis.

pallida. 405. V. testa integra oblongo-ovata, spira elevata, columella quadriplicata. M. L. U. 588. n. 223. \*

List. conch. t. 714. f. 70. a.

Adans. seneg. 1. t. 5. f. 3.

Habitat in O. Africano.

Testa venter superne minime subcarinatus est, ut in V. glabella, sed æqualis.

Faba. 406. V. testa submarginata ovata lævi subplicata, spira prominente, columella quadriplicata, labro marginato crenulato.

Gualt. test. t. 28. f. Q.

Habitat in O. Africano.

Testa postice vix emarginata, sed margine tenuiore & arcuato notata.

glabella. 407. V. testa integerrima ovata lævi, spira lævigata, columella quadriplicata, labro gibbo marginato denticulato. M. L. U. 574. n. 233. \*

Gualt. test. t. 28. f. L.

Bonan. recr. 3. t. 326.

G g g g

Klein.

*Klein. ostr. t. 5. f. 92.*

*Adans. seneg. t. 4. f. 1.*

*Habitat in O. Africano.*

*Testa postice vix ac ne vix quidem emarginata, sed margine undique crasso circumdata; variat labro dentato.*

reticulata. 408. V. testa ovata decussatim subsulcata, labro interne striato, columella subperforata.

*Argenv. conch. t. 20. f. M.*

*Habitat - -*

*Testa magnitudine pruni, albo luteoque varia, ovata, oblongiuscula sulcis obsoletis longitudinalibus transversalibusque striata. Apertura alba, effusa laoro interius transversim sulcato. Columella plicis aliquot geminatis. Cauda brevis, subperforata.*

mercato- 409. V. testa emarginata ovata striata, spira obtusata, columella retusa dentata, labro gibbo denticulato.

*Pet. gaz. t. 9. f. 4.*

*Gualt. test. t. 43. f. L.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Simillima insequenti, a qua differt, quod crassior, brevior, nitidius colorata albo luteoque, saepe etiam cingulo ferrugineo articulado notata, sed imprimis, quod transversim striata, striis elevatis subinvercatis.*

rustica. 410. V. testa emarginata ovata laeviuscula, spira prominula, columella retusa denticulata, labro gibbo denticulato.

*Gualt. test. t. 43. f. G. H.*

*Adans. seneg. t. 1. t. 9. f. 28.*

*Habitat in M. Mediterraneo, Africano.*

*Differt a Præcedente quod non striata; convenit columella planiuscula utrinque denticulata & labro interiorum gibbo; ludit coloribus variis, sed tristioribus.*

paupercu- 411. V. testa integra ovata laeviuscula basi striata, spira prominula, columella quadriplicata, labro obtusato.

*Bonap. recr. 3. t. 50.*

*Gualt. test. t. 54. f. L.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa ferruginea, nigra lineis albis, longitudinalibus, subrepandis. Statura duarum præcedentium.*

412. V.



mendica- 412. V. testa subemarginata ovata substriata, spira sub-  
ria. granulata, columella lævi, labro gibbo denticulato.

*Bonan. recr.* 3. t. 50.

*Pet. gaz.* t. 11. f. 5.

*Gualt. test.* t. 52. f. E.

*Habitat in Asia.*

*Testa magnitudine seminis Phaseoli, atra, obsolete scabra. Anfractus ventris fasciis 3. flavis. Spira lineæ unica adscendente anfractibus subquadris; neque columella neque Labrum dentatum est.*

cancella- 413. V. testa integra ovata plicata decussatim reticulata,  
ta. columella triplicata subumbilicata productiuscula.

*Syst. nat.* 10. p. 751. n. 473. *Murex scabriusculus.*

*Gualt. test.* t. 48. f. B. C. D. E.

*Adans. seneg.* 1. t. 8. f. 16.

*Seb. mus.* 3. t. 49. f. 45, 46, 48.

*Habitat in O. Africano.*

*Testa magnitudine nucis Coryli, cancellata rugis longitudinalibus striisque transversis, elevatis, acutis. Color albus ventris fasciis 2. ferrugineis. Spira acuta. Apertura alba. Columellæ cauda brevis, subperforata. Affinitas summa Muricis ob suturas rarius occurrentes, membranaceas, & Labrum intus canaliculatum cum obsolete dentibus; simillima Murici sensuoso, sed brevior.*

\* \* \* \* Fusiformes.

Tringa. 414. V. testa integriuscula oblonga lævi, spira prominente detrita, columella triplicata, labro introrsum subdentato.

*Gualt. test.* t. 43. f. B.

*Adans. seneg.* 1. t. 9. f. 27.

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa nitida, lutea, albo-nebulosa. Spiræ mucro in omnibus, quotquot vidi, detritus. Labrum exterius minime marginatum, in medio vero introrsum gibbum, sed minus quam in precedentibus.*

Cornicu- 415. V. testa subemarginata oblonga lævi cornea, spira  
la. longiuscula, columella quadruplicata, labro æquali mutico.

*Gualt. test.* t. 43. f. N.

*Habitat in Mari Mediterraneo.*

G g g g 2

Simi-

*Similis antecedenti, sed spira magis elongata; testa tota colore cornu; Labrum minime dentatum aut incrassatum; variat colore totius atro.*

Virgo. 416. V. testa integra turrata plicata transverseque striata, columella triplicata perforata.

*Habitat - - - Sprengler.*

Testa longitudine pollicis, subplicata sulcis circiter 12, transversim striata & basi reticulata, anfractibus 10 bifasciatis inferne albo, superne luteo; linea sanguinea distinguit anfractus & fere fascias. Cauda producta fere Strombi & perforata.

Scabricula. 417. V. testa emarginata fusiformi striata transversim rugosa, columella quadriplicata perforata, labro crenulato.

*Syst. nat. 10. p. 740. n. 412. Buccinum scabriusculum.*

*Gualt. test. t. 53. f. D. vel t. 48. f. o.*

*Habitat in India orientali.*

ruffina. 418. V. testa integriuscula fusiformi transversim rugosa, columella quadriplicata, labro crenulato.

*Gualt. test. t. 54. f. G.*

*Habitat in India orientali.*

*Similis V. scabriusculæ, sed angustior, longior, passim incarnato-maculata. Cauda integra absque umbilico. Labrum recurvum, crenulatum tuberculis rotundatis.*

Sanguisuga. 419. V. testa emarginata fusiformi longitudinaliter sulcata transverse striata, columella quadriplicata, labro lævi.

*Pet. gaz. t. 4. f. 5.*

*Rumph. mus. t. 29. f. V. Turricula granulata.*

*Gualt. test. t. 53. f. F.*

*Regensf. conch. 12. t. 1. f. 5.*

*Seb. mus. 3. t. 49. f. 11, 12.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Fasciæ anfractuum e punctis sanguineis distantibus.*

castra. 420. V. testa emarginata fusiformi tereti lævi: spiræ anfractibus plicato-striatis, columella subquadriplicata.

*M. L. U. 595. n. 234. \**

*Gualt. test. t. 53. f. 2.*

*Seb. mus. 3. t. 49. f. 21, 22.*

*Habi-*

*Habitat in O. Asiatico.*

*Variat colore atro, violaceo, flavo, fasciis albidis cincto. Variat etiam ventre subplicato, obsoleto.*

Morio. 421. V. testa subemarginata fusiformi tereti lævi, columella triplicata.

*Seb. mus. 3. t. 49. f. 21, 22.*

*Habitat - - - D. Sprengler.*

*Simillima V. castræ, ut nota una nequeat non & altera dignosci: hæc colore eodem fusco, ventre subtus cincto unica linea alba, qua etiam destituuntur Spiræ anfractus. Corpus testæ duplo crassius, nec spiræ striatum. Columella absque omni labio interiore & dentibus f. plicis tantum 3, iisque parvis.*

Vulpecula. 422. V. testa emarginata fusiformi subangulata inermi transversim striata, columella quadriplicata, fauce striata. *M. L. U. 595. n. 235. \**

*Rumph. mus. t. 29. f. R. Turricula.*

*Gualt. test. t. 54. f. B. C.*

*Pet. gaz. t. 56. f. I.*

*Argent. conch. t. 12. f. V.*

*Habitat in O. Asiatico.*

plicaria. 423. V. testa emarginata fusiformi angulata, angulis anticis subspinosis, columella quadriplicata, labro lævi. *M. L. U. 596. n. 236. \**

*Bonan. recr. 3. t. 65.*

*Rumph. mus. t. 29. f. S. Turricula plicata.*

*Gualt. test. t. 54. f. F.*

*Argent. conch. t. 12. f. Q.*

*Seb. mus. 3. t. 49. f. 23, 24.*

*Habitat in O. Asiatico.*

pertusa. 424. V. testa emarginata fusiformi striata punctis pertusis, labro denticulato, columella quintuplicata. *M. L. U. 596. n. 237. \**

*Gualt. test. t. 54. f. H.*

*Seb. mus. 3. t. 50. f. 28, 47, 48.*

*Habitat - -*

Mitra. 425. V. testa emarginata fusiformi lævi, labro denticulato, columella quadriplicata. *M. L. U. 598. n. 237. \**

episcopalis. *Bonan. recr. 3. f. 120.*

*Rumph. mus. t. 29. f. K. Mitra episcopi.*

G g g g 3

*Gualt.*

- Gualt. test. t. 53. f. G.*  
*Argenv. conch. t. 12. f. G. Mitra.*  
*Regensf. conch. t. 5. f. 33.*  
*papalis. 426. List. conch. t. 839. f. 67. Buccinum dentatum.*  
*Bonap. recr. 3. t. 119. Turbo Thiara.*  
*Rumph. mus. t. 29. f. I. Mitra papalis.*  
*Gualt. test. 53. f. I. L.*  
*Argenv. conch. t. 12. f. E. Thiara.*  
*Regensf. conch. t. 1. f. 1.*  
*Seb. mus. 3. t. 51. f. 1-5, 37.*  
*Habitat in O. Asiatico.*  
*Instrumento venenato tangentem & carnes edentem la-*  
*dit. R.*
- Musica. 427. V. testa marginata fusiformi, anfractibus spinis obtu-*  
*sis, columella octoplicata, labro laevi crassiusculo.*  
*M. L. U. 597. n. 239. \**  
*Bonap. recr. 3. t. 296, 297.*  
*Olear. mus. t. 30. f. 4, 7.*  
*Seb. mus. 3. t. 5. f. 7-19.*  
*Gualt. test. t. 28. f. X. Z.*  
*Argenv. conch. t. 17. f. F. Papyrus musica.*  
*Habitat in O. Americae ad Jamaicam, Barbados.*
- Vesperti- 428. V. testa emarginata fusiformi, anfractibus spinis acu-*  
*lio. tis, columella quadriplicata, labio laevi. M. L. U.*  
*598. n. 240. \**  
*Bonap. recr. 3. t. 294.*  
*Rumph. mus. t. 32. f. H. Vespertilio.*  
*Gualt. test. t. 28. f. G.*  
*Rond. test. 78. Murex caracoides.*  
*Seb. mus. 3. t. 57. f. 5. & t. 67. f. 13-25.*  
*Habitat in O. utriusque Indiae.*
- cabrae. 429. V. testa emarginata fusiformi, anfractibus spinis sub-*  
*acutis, columella plicis quinque validioribus tribusque*  
*obsoletis.*  
*Bonap. recr. 3. t. 293.*  
*Rumph. mus. t. 32. f. I.*  
*Gualt. test. t. 28. f. I. M. V. G. F.*  
*Argenv. conch. t. 17. f. D. Lignum venosum.*  
*Seb. mus. 3. t. 57. f. 1-6. & 64. f. 5, 6.*  
*Habitat in O. Asiatico.*  
*Labrum laeve est.*

**Turbinel-430.** V. testa integriuscula turbinata spinis conicis erectiusculis: superioribus majoribus, columella quadriplicata.

*M. L. U.* 634. n. 307. \* *Murex turbinellus.*

*Bonan. recr.* 3. t. 373.

*Rumph. mus.* t. 24. f. B. *Verrucosa secunda.*

*Gualt. test.* t. 26. f. L.

*Argenv. conch.* t. 17. f. P.

*Seb. mus.* t. 49. f. 76, 77. & t. 60. f. 8.

*Regenf. conch.* 8. t. 2. f. 18.

*Habitat in O. Asiatico ad Nuffaanan.*

**Capitel-431.** V. obovata rugosa nodosa, columella quadriplicata.

*M. L. U.* 633. n. 306. \* *Murex capitellum.*

*Argenv. conch.* t. 18. f. K.

*Habitat in O. Indico. Alba simillima Murici truncato.*

**Ceramica-432.** V. testa ovata acuta spinis divergentibus, columella subquinqueplicata.

*M. L. U.* 634. n. 286. \* *Murex capitellum.*

*Bonan. recr.* 3. t. 368.

*Rumph. mus.* t. 24. f. A. & t. 49. f. L. *Verrucosa ceramica.*

*Gualt. test.* t. 55. f. D.

*Argenv. conch.* t. 18. f. E.

*Habitat in O. Asiæ ad Ceram.*

*Similis V. Turbinello, sed elongatus.*

**Pyrum-433.** V. testa obovata subcaudata, spiræ anfractibus striatis, apice producto glaberrimo, columella triplicata.

*Rumph. mus.* t. 36. f. 7.

*Gualt. test.* t. 46. f. C.

*Habitat in Tranquebar. Sprengler.*

*Testa pyriformis, undulatim striata, pallido-punctato-fasciata. Apex cylindricus basi angulatus, glaberrimus, obtusus. Cauda exserta, patula, integra.*

**lapponica-434.** V. testa obovata lævi, spira acuminata, ventre dilatato.

*Rumph. mus.* t. 37. f. 3. *Murex lapponicus.*

*Seb. mus.* 3. t. 57. f. 25, 26.

*Habitat in O. Americano.*

\* \* \* \* \* *Ventricosæ.*

**æthiopica-435.** V. testa emarginata ventricosa, spira coronata spinis fornicatis, apice papillari, columella quadriplicata.

*M. L. U.* 598. n. 241. \*

*Bonan.*

---

*Volutæ genus facillime distinguitur columella plicata.*

*Bonan. recr. 3. t. 1. Latina.*

*Rumph. mus. t. 31. f. A. B.*

*Gualt. test. t. 29. f. H. I.*

*Seb. mus. 3. t. 65. f. 2, 4, 10-12. & t. 66. f. 8, 9, 10, 6, 7, 3, 15.*

*Argenv. conch. t. 20. f. F. Corona æthiopica.*

*Habitat in M. Persico & Key Asiæ.*

*Umbilicus absque papilla. Fasciæ 2 ferrugineæ interruptæ.*

**Cymbium.** 436. V. testa emarginata ventricosa, spira anfractibus canaliculato-marginatis, apice papillari, columella biplicata. *M. L. U. 599. n. 242. \**

*Column. purp. 29. t. 30. f. 3. Cochlea altera magna.*

*Bonan. recr. 3. t. 6.*

*Gualt. test. t. 29. f. B.*

*Seb. mus. 3. t. 65. f. 5, 6. & t. 66. f. 5, 18.*

*Adans. sen. 1. t. 3. f. 2.*

*Habitat in M. Iberico.*

**Olla.** 437. V. testa emarginata ventricosa, spira levigata, apice papillari, columella quadriplicata. *M. L. U. 599. n. 243. \**

*Aldr. exf. 560. Concha persica.*

*Column. aqu. t. 69. f. 4, 6.*

*List. conch. t. 794. f. 1.*

*Bonan. recr. 3. t. 2.*

*Gualt. test. t. 29. f. A.*

*Argenv. conch. t. 20. f. G.*

*Klein. ostr. t. 5. f. 97.*

*Adans. seneg. t. 3. f. 1.*

*Habitat in Philippinis Asiæ.*

**323. BUCCINUM.** *Animal* Limax.

*Testa* univalvis, spiralis, gibbosa.

*Apertura* ovata, desinens in Canaliculum (f. retusam Lacunam) dextrum, cauda retusum.

*Labium* interius explanatum.

\* a \* Ampullacea inflata, rotunda, tenui-subdiaphana, fragilis.

**Olearium.** 438. B. testa subrotunda cincta sulcis obtusis: lineola elevata interstinctis, apertura edentula.

*Per.*

*Pet. gaz. t. 99. f. 11.*  
*Rumph. mus. t. 27. f. D?*  
*Gualt. test. t. 44. t. T.*  
*Habitat in O. Indico.*

Galea. 439. B. testa obovata inflata cinēta fulcis antice gemina-  
 tis, apertura edentula.

*Bonan. recr. 3. t. 183.*

*Gualt. test. t. 42. f. A.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa magnitudine saepe Capitis humani.*

Perdix. 440. B. testa ovata inflata subfulcata alboque undulata,  
 apertura edentula. *M. L. U. 600. n. 244. \**

*Column. aqu. t. 69. f. 5. Cassida neritoides minor va-*  
*riegata.*

*Bonan. recr. 3. t. 191.*

*List. conch. t. 899. f. 19.*

*Rumph. mus. t. 27. f. C. Cochlea pennata.*

*Gualt. test. t. 51. f. F.*

*Argenv. conch. t. 20. f. A. Perdix.*

*Adans. seneg. 1. t. 7. f. 5.*

*Seb. mus. 3. t. 68. f. 16.*

*Habitat ad Americam.*

Pomum. 441. B. testa ovata cinēta fulcis obtusis, apertura denta-  
 ta. *M. L. U. 600. n. 245. \**

*Barrel. icon. 1325. f. 12.*

*Rumph. mus. t. 27. f. B. Cochlea striata altera.*

*Gualt. test. t. 51. f. C.*

*Argenv. conch. t. 20. f. L.*

*Habitat ad Javam.*

*Anfractus albi, cingulis 12 f. 14 elevatis lutescenti-*  
*bus. Spira summus apex nitidus.*

Dolium. 442. B. testa ovata cinēta fulcis obtusis remotis, cauda  
 prominula. *M. L. U. 601. n. 246. \**

*Rond. test. 106. Cochlea rugosa.*

*Rumph. mus. t. 27. f. A. Cochlea striata f. olcaria.*

*Calceol. mus. 30. t. 41.*

*Bonan. recr. 3. t. 17, 25.*

*Gualt. test. t. 89. f. E.*

*Argenv. conch. t. 20. f. C.*

*List. conch. t. 899. f. 19.*

*Seb. mus. 3. t. 70. f. 1-4. & t. 68. f. 9.*

- G g g g s

*Adans.*

*Adans. seneg.* 1. t. 7. f. 6.

*Habitat in M. Siculo, Africano.*

- \* b \* *Cassidea Caudata: cauda exserta brevi reflexa; Labro extrorsum inermi.*

Echino- 443. B. testa cingulis quatuor tuberculosi, cauda promi-  
phorum. nente. *M. L. U.* 601. n. 247. \*

*Bonan. recr.* 3. t. 19, 18.

*Rumph. mus.* t. 27. f. 1.

*Argenv. conch.* t. 20. f. P.

*Ginan. adr.* 2. t. 5. f. 43.

*Seb. mus.* 3. t. 68. f. 18.

*Habitat in M. Mediterraneo.*

plicatum. 444. B. testa antice subplicata decussatim substriata, aper-  
tura dentata, cauda recurva.

*Bonan. recr.* 3. t. 156.

*Gualt. test.* t. 40. f. C.

*Argenv. conch.* t. 18. f. D? *Cass.*

*Seb. mus.* 3. t. 73. f. 10.

*Habitat ad Jamaicam.*

cornu-  
tum

445. B. testa turbinata scrobiculis punctata coronata, aper-  
tura dentata, cauda recurva. *M. L. U.* 602. n. 249.

*Rond. test.* 2. 77. *Murex triangularis.*

*Bonan. recr.* 3. t. 155.

*Rumph. mus.* t. 23. f. 1.

*Gualt. test.* t. 40. f. D.

*Seb. mus.* 3. t. 73. f. 7, 8, 17, 18.

*Habitat in America.*

rufum. 446. B. testa decussatim striata: cingulis nodosis interstin-  
ctis linea gemina, apertura dentata, cauda recurva.

*M. L. U.* 603. n. 250. \*

*Rumph. mus.* t. 23. f. B. *Cassida rubra.*

*Barrel. rar.* 1325. f. 29.

*Gualt. test.* t. 40. f. F.

*Regens. conch.* t. 12. f. 69.

*Seb. mus.* 3. t. 73. f. 2-6, 9.

*Habitat in Oceano Americano.*

tubero- 447. B. testa cingulis duobus tuberculosi, cauda recurva.  
sum. *M. L. U.* 602. n. 249. \*

*Labat. itin.* 5. p. 262.

*Gualt.*



*Gualt. test. t. 41.*

*Habitat in O. Americano.*

- flamme- 448. B. testa subplicata subcoronata, apertura dentata,  
um. ca da recurva. *M. L. U. 603. n. 251. \**

*Bonap. recr. 3. t. 161.*

*Rumph. mus. t. 23. f. 2.*

*Habitat - -*

- Testicu- 449. B. testa obovata decussatim striata lævigata, striis  
lus. elevatis longitudinalibus, apertura dentata, cauda re-  
curva. *M. L. U. 604. n. 252. \**

*Bonap. recr. 3. t. 162.*

*Rumph. mus. t. 23. f. 3.*

*Gualt. test. t. 39 f. C.*

*Seb. mus. 3. t. 72. f. 17-20. ♂ t. 73. f. 19, 20.*

*Habitat ad Jamaicam.*

*Labium interius oblitteratum & fere nullum.*

- decussa- 450. B. testa decussatim striata lævigata squamulis qua-  
tum. dratis, apertura dentata, cauda recurva. *M. L. U. 604. n. 253. \**

*Rond. test. 83. f. 1. Buccinum parvum.*

*Bonap. recr. 3. t. 157.*

*Gualt. test. t. 40. f. B.*

*Habitat in O. Africano.*

*Labium interius punctis eminentibus notatum. Labi-  
um exterius interne crenatum.*

- Areola. 451. B. testa substriata maculis quadratis quadrifariam cin-  
cta, apertura dentata, cauda recurva. *M. L. U. 605. n. 254. \**

*Bonap. recr. 3. t. 154.*

*Rumph. mus. t. 25. f. 1, B. 2. Areola.*

*Gualt. test. t. 39. f. H. G.*

*Argenv. conch. t. 18. f. I.*

*Klein ostr. t. 6. f. 102.*

*Seb. mus. 3. t. 70. f. 7-9.*

*Habitat in M. Mediterraneo, Java.*

*Alia striata est, alia lævis. Labium exterius inte-  
riori margine dentatum est.*

- \* c \* *Cassidea unguiculata: labro postice extrorsum acu-  
leato; ceterum similia Candatis b.*

- Erinace- 452. B. testa subplicata papillis coronata, labro postico muri-  
us. cato. *M. L. U. 605. n. 255. \** *Rumph.*

*Rumph. mus. t. 25. f. 7.*  
*Gualt. test. t. 39. f. 1. D.*  
*Argenv. conch. t. 17. f. G.*  
*Seb. mus. 3. t. 53. f. 11-16.*  
*Habitat in O. Americano, Alexandria.*

**glaucum.** 453. B. testa lævi papillisque coronata, labro postice muricato. *M. L. U. 606. n. 256.\**  
*Rumph. mus. t. 25. f. A. Cassis cinerea lævis.*  
*Gualt. test. t. 40. f. A.*  
*Seb. mus. 3. t. 71. f. 11, 12, 14, 16.*  
*Habitat in O. Asiatico.*

**Vibex.** 454. B. testa lævi tota, labro postice muricato. *M. L. U. 606. n. 257.\**  
*Bonap. recr. 3. t. 152.*  
*Rumph. mus. t. 25. f. E. 8, 9. Fimbriata lævis.*  
*Gualt. test. t. 39. f. L. F.*  
*Argenv. conch. t. 17. f. H.*  
*Seb. mus. 3. t. 53. f. 3-7.*  
*Regens. conch. t. 10. f. 40.*  
*Habitat ad Jamaicam, Alexandria.*

**papillosum.** 455. B. testa undique tuberculata, labro postice muricato. *M. L. U. 607. n. 258.\**  
*Rumph. mus. t. 29. f. M. Buccinum granulatum rotundum.*  
*Argenv. conch. t. 12. f. I.*  
*Seb. mus. 3. t. 49. f. 57, 58, 59.*  
*Habitat in O. Asiatico.*

**Glans.** 456. B. testa lævi, labro postice muricato, labioque interiore bidentato. *M. L. U. 607. n. 259.\**  
*Rumph. mus. t. 29. f. P.*  
*Seb. mus. 3. t. 39. f. 56, 57, 60.*  
*Habitat in O. Asiatico.*

\* d \* Callosa : columellæ labio dilatato incrassato.

**Arcularia.** 457. B. testa plicata papillisque coronata, labio interiore explanato gibbo. *M. L. U. 608. n. 260.\**  
*Rumph. mus. t. 27. f. M. Arcularia major.*  
*Gualt. test. t. 44. f. R. O.*  
*Argenv. conch. t. 17. f. C.*  
*Seb. mus. 3. t. 53. f. 32, 33.*  
*Habitat ad Javam.*

458.B.

- Pullus.** 458. B. testa gibba oblique striata, labio interiore explanato gibbo.  
*List. conch. t. 970. f. 25, 26.*  
*Gualt. test. t. 44. f. M. N.*  
*Adans. seneg. 1. t. 8. f. 11.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*  
*Præcedenti dimidio minor, ferruginea, striis longitudinalibus, sed obliquis & fascia transversa alba.*
- gibbosulum.** 459. B. testa gibba lævi, labio interiore explanato gibbo.  
*Gualt. test. t. 44. f. L.*  
*Seb. mus. 3. t. 53. f. 46.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*
- mutabile.** 460. B. testa lævi: adultiore rugosa, spira exserta, labio interiore subexplanato.  
*Gualt. test. t. 44. f. B.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*  
*Testa Tenera, lævis, pallida, anfractibus margine superiore obsolete albis rufisque. Spira exquisita anfractibus distinctissimis, longitudine testæ. Adultior vero longitudinaliter rugosa evadit, cinerea, opaca; labium interius antice extenditur crassiusculum.*
- Neritum.** 461. B. testa convexa obtusa lævi, labio interiore explanato gibbo obsoleto.  
*Gualt. test. t. 65. f. C. I.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*  
*Testa magnitudine Pisi, facie Neritæ, fere orbiculata, convexa, obtusa, lævis, pallida, sutura superiore secundum anfractus linea purpurascente vermiculari. Subtus planiuscula, alba, gibbosa. Apertura postice emarginata, unde a Neritis diversa.*
- \* e \* *Detrita: columellæ labium quasi abrasum, planum.*
- Harpa.** 462. B. testa varicibus æqualibus longitudinalibus distinctis mucronatis, columella lævigata. *Mus. L. U. 609. n. 261. \**  
*Bonan. recr. 3. t. 185.*  
*List. conch. t. 992. f. 55.*  
*Pet. gaz. t. 48. f. 13.*  
*Rumph. mus. t. 32. f. K, L, M. Harpa.*  
*Gualt. test. t. 29. f. C, D, E, G.*  
*Argenv. conch. t. 20. f. D. Harpa nobilis.*

Regenf.

*Regenf. conch. t. 2. f. 14.*

*Klein. ostr. t. 6 f. 105.*

*Seb. mus. 3 t. 70. f. 10.*

*Habitat ad Bengala.*

costatum. 463. B. testa varicibus æqualibus longitudinalibus confertis mucronatis, columella lævigata.

*Habitat - -*

*Simillima precedenti, forte varietas, sed costæ approximatae.*

persicum. 464. B. testa scabra, labro crenulato, columella plana.

*M. L. U. 609. n. 262. \**

*Grew mus. t. 9 f. 5, 6.*

*Rumpb. mus. t. 27. f. E. Cochlea patula.*

*Gualt. test. t. 51. f. L.*

*Argenv. conch. t. 20. f. E. Concha persica.*

*S. b. mus. 3. t. 72. f. 10-16.*

*Habitat in O. Asiatico.*

patulum. 465. B. testa muricata, labro extus crenato, columella falcata. *M. L. U. 610. n. 263. \**

*Gualt. test. t. 51. f. D, E.*

*Argenv. conch. t. 20. f. H. Morum.*

*Bonap. recr. 3. t. 368.*

*List. conch. t. 989. f. 49.*

*Adans. seneg. 1. t. 7. f. 3.*

*Habitat in America.*

*Affinis Nerita nodosa, sed hujus apertura postice finit exit; Nerita vero non. Anfractus ventris cingulo triplici nodoso acuto & duplici inferiore obtusiore.*

hemasto- 466. B. testa submuricata, labro intus striato, columella planiuscula, fauce fulva.

ma.

*Gualt. test. t. 51. f. A.*

*Habitat in O. Europæo.*

*Testis ovata, rudis, cincta duplici fascia nodosa anfractuum. Faux crocea, Lubrum intus crenulatum & striatum.*

Lapillus. 467. B. testa ovata acuta striata lævi, columella planiuscula. *Fa. succ. 2167.*

*Ad. parif. 1711. p. 199. t. 6. f. 5. 7.*

*Adans. sen. 1. t. 7 f. 4*

*List. angl. 158 t. 3. f. 5, 6.*

*Habitat ad Oceani Europæi littora.*

*Turbi-*

*Turbini laterali convenit facie, loco, magnitudine, consistentia.*

*Purpura aliqua ex hoc elicitur; vide Ström. fündm. 183.*

- Smaragdulus. 468. B. testa ovata acuta glaberrima, columella subplicata planiuscula. *M. L. U. 670. n. 264. \**  
*Argenv. conch. t. 9. f. P. Smaragdus minor.*  
*Seb. mus. 3. t. 54. f. 14, 15, 16.*  
*Habitat - -*

\* f \* *Lævigata (nec præcedentia).*

- spiratum. 469. B. testa lævi, anfractibus canali plano distinctis, columella abrupta perforata. *M. L. U. 611. n. 265. \**  
*Column. purp. 15. t. 16. f. 2.*  
*Bonan. recr. 3. t. 370. & 70.*  
*Rumph. mus. t. 49. f. C. D.*  
*Gvalt. test. t. 51. f. H.*  
*Argenv. conch. t. 20. f. N. Contabulata.*  
*Regenf. conch. t. 10. f. 41.*  
*Seb. mus. 3. t. 73. f. 21-26.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*  
*Variat anfractu suturæ l. rotundato l. plano.*

- glabratum. 470. B. testa glaberrima, anfractibus obsoletis: infimo basi subcanaliculato producto. *M. L. U. 611. n. 266. \**  
*Bonan. recr. 3. t. 149. male.*  
*List. conch. t. 982.*  
*Gvalt. test. t. 43. f. T.*  
*Argenv. conch. t. 12. f. G. prior.*  
*Klein. ostr. 37. t. 2. f. 47. Diplacus.*  
*Habitat in O. Americano, Tranquebar.*  
*Testa quasi butyro s. oleo inundata flava. Columella subperforata.*

- prærosum. 471. B. testa ovata lævi atra, spira cariosa, columella glaberrima.  
*Habitat in Europa australiore, ad aquæductum Sevilla Alström.*  
*Testa magnitudine fere Fabæ, tota atra, rudis; vertex cariosus erosus & quasi præmorsus.*

\* *Angulata (nec antea dicta).*

- undosum. 472. B. testa ovata: striis transversis elevatis glabris, ventre

tre obtuse quinquangulari, labro intus striato. *Musf.*  
*L. U.* 612. n. 268. \*

*Rumph. musf.* t. 29. f. O. Buccinum undosum.

*Argenv. conch.* t. 12. f. N.

*Klein. ostr.* t. 3. f. 61.

*Seb. musf.* 3. t. 52. f. 26.

*Habitat in Asia.*

Bezoar. 473. B. testa subrotunda rugosa, anfractibus antice lamellatis, columella perforata.

*Argenv. conch.* t. 18. f. G.

*Habitat - - Tesdorff.*

Testa magnitudine pomi, rudis, decussatim rugosa f. striata, postice perforata. Anfractus ventris antice imbricati lamellis exstantibus, undulatis, numerosissimis. Spira angulata lateribus rectis, antice planiuscula, plicata aut superne dentata. Maxime affine *Murici*.

glaciale. 474. B. testa lævi substriata ovato-oblonga, anfractu infimo subcarinato. *Fn. succ.* 2162. \*

*Habitat in O. Septentrionali ad Spitzbergam insulam.*

undatum. 475. B. testa oblonga rudi transversim striata: anfractibus curvato-multangulis. *Fn. succ.* 2263. \*

*Bonap. recr.* 3. t. 189, 190.

*List. angl.* 156. t. 3. f. 2.

*Seb. musf.* 3. t. 39. f. 78, 79, 80.

*Habitat in O. Europæo.*

*Simillimum Murici antiquo ♂ despecto, æque rude.*

*Ovarium Ellis corall.* 32. f. B. b.; *Vesicaria marina vulgo.*

reticulatum. 476. B. testa ovato-oblonga transversim striata longitudinaliter rugosa, apertura dentata.

*Gualt. test.* t. 44. f. G, C, E.

*Bonap. recr.* 3. t. 62.

*List. conch.* t. 966. f. 21.

*Pet gaz.* t. 64. f. 8. ♂ t. 75. f. 4.

*Act. parisi.* 1710. p. 463. ♂ 1711. p. 199. t. 6. f. 9.

*Adans. seneg.* 1. t. 8. f. 9.

*Habitat in M. Mediterraneo.*

Testa omnibus facile coloribus varians, magnitudine *Avellanae*. (Animal inhabitans *Tritonem* esse retulit

*D. D. Kähler.*)

nitidulum. 477. B. testa ovato-oblonga nitida fasciata longitudinaliter striato-rugosa, labro intus subdentato.

*Gualt. test. t. 52. f. C.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa variat admodum colore & fasciis, saepe cingulo nigro circumdata. Columella labio minime replicato.*

lævigatum. 478. B. testa ovato-oblonga nitida fusco-striata lævi, apertura edentula unilabiata.

*Gualt. test. t. 52. f. B.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa precedenti simillima, pallida, obsolete maculata striis obscurioribus; sed differt apertura minime dentata & columella absque labio; Spira etiam minima plicata sunt.*

\* g \* *Turrita: lævia, subulata.*

maculatum. 479. B. testa turrita subfusiformi, anfractibus lævibus indivisis integerrimis. *M. L. U. 613. n. 269. \**

*Bonan. recr. 3. t. 317.*

*Rumph. mus. t. 30. f. A. D. Strombus 1, 2, 3.*

*Gualt. test. t. 56. f. I.*

*Argenv. conch. t. 14. f. A.*

*Seb. mus. 3. t. 56. f. 6.*

*Habitat in O. Africæ, Asiæ.*

*Testa flavescent maculis purpurascens.*

subulatum. 480. B. testa turrita subulata lævi indivisa integerrima.

*Bonan. recr. 3. t. 118.*

*Rumph. mus. t. 30. f. B.*

*Gualt. test. t. 56. f. B.*

*Argenv. conch. t. 14. f. X.*

*Seb. mus. 3. t. 56. f. 11, 16.*

*Habitat in Indiis.*

*Pallida maculis ferrugineis in singulo anfractu per paria adscendentibus; differt a B. maculato testa minime gibba.*

crenulatū. 481. B. testa turrita, anfractibus bifidis margine crenatis.

*M. L. U. 613. n. 270. \**

*Gualt. test. t. 57. f. L.*

*Argenv. conch. t. 14. f. T.*

*Seb. mus. 3. t. 56. f. 35.*

*Habitat in O. Africano.*

H h h h

482. B.

hecticum. 482. B. testa turrita, anfractibus bifidis margine superiore compresso - attenuato.

*Gualt. test. t. 56. f. C.*

*Seb. mus. 3. t. 56. f. 21.*

*Habitat in O. Africano.*

vittatum. 483. B. testa turrita substriata, sutura anfractuum duplici crenulata.

*Klein. ostr. t. 7. f. 121.*

*Habitat - - - J. Zæga.*

*Testa ex ovato turrita, albida, remote transversaliter striata. Sutura duplicata, vix triplicata, articulo crenata, anfractus distinguens.*

strigilatum. 484. B. testa turrita, anfractibus bifidis oblique striatis.

*M. L. U. 614. n. 271. \**

*Rumph. mus. t. 30. f. H. Strombus 9 granulatus.*

*Bonan. recr. 3. t. 110.*

*Gualt. test. t. 57. f. O.*

*Argenv. conch. t. 14. f. R.*

*Habitat in O. Asiatico.*

duplicatum. 485. B. testa turrita, anfractibus bipartitis striatis. *M. L. U. 614. n. 272. \**

*Bonan. recr. 3. t. 110.*

*Gualt. test. t. 57. f. N.*

*Habitat in O. Indico.*

lanceatum. 486. B. testa turrita lævi, anfractibus integris lineis longitudinalibus testaceis.

*Rumph. mus. t. 30. f. G.*

*Argenv. conch. t. 14. f. Z.*

*Habitat in India.*

*Testa apice lævissime striata. Cauda vix retusa.*

dimidiatum. 487. B. testa turrita, anfractibus bifidis lævibus.

*Seb. mus. 3. t. 56. f. 16, 19, 23, 24, 27.*

*Habitat in O. Africano.*

murinum. 488. B. testa turrita, anfractibus subangulatis, striis tribus muricatis.

*Gualt. test. t. 57. f. P.*

*Habitat ad Africam.*

*Testa nigra, basi gibba, anfractibus saepe basi albis.*



324. STROMBUS. *Animal* Limax.

*Testa* univalvis, spiralis, latere ampliata.

*Apertura*, Labro sæpius dilatato, definens in canalem finistrum.

\* Digitati; labio in lacinias lineares exeunte.

Fusus. 489. S. testa turrita lævi, cauda subulata, labro dentato.

*M. L. U.* 638. n. 316. Murex Fusus.

*Bonap. recr.* 3. t. 121.

*Argenv. conch.* t. 13. f. D. Fusum.

*Klein. ostr.* t. 4. f. 77.

*Seb. mus.* 3. t. 56. f. 1, 2, 3.

*Habitat* in America; rarior.

Genus hujus difficile determinatur. *Testa lævi a Muricibus omnino differt; Cauda magis recta a Strombis aliquatenus recedit, sed labro dentato convenit.*

Pes pele- 490. S. testæ labro tetractylo palmato digitis angulato,  
cani. fauce lævi. *Fn. succ.* 2164. \* *M. L. U.* 615. n. 273. \*

*Rond. test.* 92. f. 1, 2.

*Bonap. recr.* 3. t. 85, 86, 87.

*List. conch.* t. 866. f. min.

*Gualt. test.* t. 53. f. B. C. A.

*Argenv. conch.* t. 17. f. M.

*Seb. mus.* 3. t. 62. f. 17.

*Ginap. adr.* 2. t. 7. f. 58-60.

*Habitat* in O. Europæo, Norvegico, Mediterraneo, Americano.

Chiragra. 491. S. testæ labro hexactylo, digitis curvis, cauda recurvata. *M. L. U.* 615. n. 274. \*

*Bellon. aqu.* 422.

*Barrel. rar.* 1327. f. I.

*Bonap. recr.* 3. t. 312.

*Rumph. mus.* t. 35. f. A. B. Harpago.

*Seb. mus.* 3. t. 83. f. 1, 2.

*Gualt. test.* t. 35. f. B. A. & t. 36. f. B.

*Habitat* ad Bandam Aficæ.

H h h h 2

Digitl

*Digiti antrorsum incurvati, subtus sutura coaliti. Labium subtus antice distinctum rima; inter digitos posteriores ad caudam hians. Faux sanguinolenta, in labio interiore substriata.*

**Scorpius. 492.** S. testæ labro heptadactylo, digitis nodosis: postico longissimo. *M. L. U.* 616. n. 275. \*

*Rumph. mus. t. 36. f. K.* Cornuta nodosa.

*Gualt. test. t. 36. f. C.*

*Argenv. conch. t. 17. f. B.* Scorpio.

*Habitat in O. Asiatico.*

*Faux violacea, striata.*

**Lambis. 493.** S. testæ labro heptadactylo: digitis rectiusculis, fauce lævi. *M. L. U.* 617. n. 276. \*

*Rond. test. 79. f. 71.* Aporrhais.

*Barrel. rar. 1326. f. 7.*

*Bonan. recr. 3. t. 315.*

*Rumph. mus. t. 35. f. E. F.* Cornuta.

*Gualt. test. t. 35. f. C.*

*t. 36. f. A.*

*Argenv. conch. t. 17. f. E.* Lambis.

*Regensf. conch. 16. t. 4. f. 45.*

*Habitat in O. Asiæ.*

*Testa testacea albo maculata. Faux subincarnata.*

**Millepeda. 494.** S. testæ labro decadactylo, digitis inflexis, fauce substriata, dorso gibbere compresso. *M. L. U.* 618. n. 277. \*

*Bonan. recr. 3. t. 311.*

*List. conch. t. 868. f. 23. & 869. f. 24.*

*Rumph. mus. t. 36. f. I.* Cornuta millepeda.

*Argenv. conch. t. 18. f. B.* Millepeda.

*Habitat in O. Asiæ.*

\* \* Lobati.

**Lentiginosus. 495.** S. testæ labro antice trilobo incrassato, dorso verrucoso coronato, cauda obtusa. *M. L. U.* 619. n. 278. \*

*Rond. test. 91.* Turbo auritus.

*Bonan. recr. 3. t. 300.*

*Barrel. rar. 1326. f. 4. & 1327. f. 5.*

*Rumph. mus. t. 37. f. Q.* Lentiginosa.

*Gualt. test. t. 32. f. A.*

*Argenv.*

*Argenv. conch. t. 18. f. C.*

*Seb. mus. 3. t. 62. f. 11.*

*Habitat in O. Asiæ.*

*Blatta Byzantina est hujus operculum; color rana.*

Gallus. 496. S. testæ labro dilatato: antice mucronato longissimo, dorso coronato, cauda recta. *M. L. U. 619. n. 279.\**

*Bonan. recr. 3. t. 309, 310.*

*Rumph. mus. t. 37. f. 5. Laphoorn.*

*Gualt. test. t. 32. f. M.*

*Seb. mus. 3. t. 62. f. 1, 2.*

*Habitat - -*

Auris dianæ. 497. S. testæ labro antice mucronato, dorso muricato, cauda erecta acuta. *M. L. U. 620. n. 280.\**

*Rumph. mus. t. 37. f. R. Pugiles.*

*Gualt. test. t. 32. f. H.*

*Argenv. conch. t. 17. f. O. Auris Dianæ.*

*Klein. ostr. t. 6. f. 106.*

*Seb. mus. 3. t. 61. f. 1-4. & t. 62. f. 13.*

*Habitat in O. Asiæ.*

*Labrum sauce incarnata.*

Pugilis. 498. S. testæ labro antico prominente rotundato lævi, spiræ spinosa, cauda triloba obtusa. *M. L. U. 620. n. 281.\**

*List. conch. t. 906. f. 26.*

*Bonan. recr. 3. t. 299.*

*Gualt. test. t. 32. f. B.*

*Argenv. conch. t. 18. f. A.*

*Klein. ostr. t. 6. f. 108.*

*Habitat ad Jamaicam.*

*Faux rubra est, testæ crocea.*

marginatus. 499. S. testæ labro prominulo, dorso marginato lævi, cauda integra.

*Habitat - -*

Luhuanus. 500. S. testæ labro prominulo, dorso lævi, anfractibus rotundatis æqualibus. *M. L. U. 621. n. 282.\**

*Rumph. mus. t. 37. f. S. Luhuanæ.*

*Argenv. conch. t. 17. f. N.*

*Seb. mus. 3. t. 61. f. 20, 21. & t. 62. f. 31, 32.*

*Habitat in O. Asiæ frequens.*

*Faux sanguinea.*

H h h h 3

501.

**gibberulus.** 501. S. testæ labro prominulo, dorso lævi, anfractibus gibbosis inæqualibus. *M. L. U.* 621. n. 283. \*

*Rumph. mus. t. 37. f. V.* Canarium.

*Bonan. recr. 3. t. 150.*

*Seb. mus. 3. t. 61. f. 53.*

*Habitat in O. Asiæ.*

*Latus inferius testæ planiusculum est.*

**Oniscus.** 502. S. testa obovata cingulis nodosis, mucrone subulato lævi.

*Gualt. test. t. 22. f. I. an?*

*Seb. mus. 3. t. 55. f. 23. a-g.*

*Habitat - -*

Testa magnitudine coryli, obovata, cingulis tribus subnodosis: nodis ordine longitudinali itidem dispositis, pallida, maculis nigricantibus sparsis contaminata. Spira obtusissima cingulo solitario noduloso: apice tenuissimo albo. Apertura alba, longitudinalis, columella lævi; Labro exteriori vix repando. Cauda nulla & basis vix manifeste emarginata.

\* \* \* Ampliati.

**Lucifer.** 503. S. testæ labro antice rotundato integro, ventre dupliciter striato, spira carinata: tuberculis superioribus minutis.

*Bonan. recr. 3. t. 303, 304.*

*Barrel. var. t. 1327. f. 7.*

*Rumph. mus. t. 49. f. M.*

*Argenv. conch. t. 17. f. I.*

*Klein. ostr. t. 4. f. 85.*

*Seb. mus. 3. t. 62. f. 38, 39.*

*Habitat ad Americam australem.*

*Differt a sequenti testa minus crassa, & imprimis spiræ minimis, nec magnis crassis pollicaribus ut in illa.*

*Conf. Gualt. test. t. 55. f. B. an bujus Larva?*

**Gigas.** 504. S. testa labro rotundato maximo, coronata ventre spiraque spinis conicis patentibus.

*Bonan. recr. 3. t. 321. 307.*

*Gualt. test. 33. f. A.*

*Rond. pisc. 76. Murex marmoreus.*

*Coloma.*

*Litteri conchiliorum historiam cum tabularum numeris adpositis non obtinui, citationes ejusdem nonnullas aliorum oculis tantum vidi.*

*Column. aquat. t. 60. f. 5.*

*Gesn. aquat. 340. Conchylum.*

*Aldr. exsang. Murex marmoreus.*

*List. conch. t. 860. f. 17, 18. ♂ t. 882. f. 4.*

*Olear. mus. t. 32. f. 5.*

*β. Gualt. test. 54. f. M.*

*Habitat in America.*

*Testæ color internus vividissimus.*

latissimus. 505. S. testa labro rotundato maximo, ventre inermi,  
spira subnodosa. *M. L. U. 622. n. 284. \**

*Rumph. mus. t. 36. f. L. Alata lata.*

*Seb. mus. 3. t. 63. f. 1, 2.*

*Habitat in O. Asiæ.*

Epidromis. 506. S. testa labro rotundato brevi, ventre lævi, spira  
subnodosa. *M. L. U. 622. n. 285. \**

*Barr. rar. 1727. f. 2.*

*Rumph. mus. t. 36. f. M. Epidromis.*

*Seb. mus. 3. t. 62. f. 21.*

*Habitat in O. Asiæ.*

Canarium. 507. S. testa subcordata, labro rotundato brevi retuso,  
spiraque lævi. *M. L. U. 623. n. 287. \**

*Bonan. recr. 3. t. 146.*

*Pet. gaz. t. 98. f. 11.*

*Rumph. mus. t. 36. f. N.*

*Gualt. test. t. 32. f. N. L.*

*Argenv. conch. t. 17. f. Q.*

*Klein. ostr. t. 4. f. 73.*

*Seb. mus. 3. t. 62. f. 28, 29, 24, 25.*

*Habitat in O. Asiæ.*

*Testa admodum gibba & quasi pinguis apparet.*

vittatus. 508. S. testa labro rotundato brevi, ventre lævi, spiræ  
elongatæ anfractibus sutura elevata distinctis. *M. L. U. 623. n. 287. \**

*Rumph. mus. t. 36. f. O. Epidromis.*

*Argenv. conch. t. 12. f. F.*

*Pet. gaz. t. 98. f. 12.*

*Seb. mus. 3. t. 62. f. 18, 19, 20. ♂ t. 79. f. 1.*

*Habitat in O. Asiæ.*

H h h h 4

Con-

---

Strombi Junioris testæ carent omni labro & turbinatæ existunt, quas ad distincta genera perperam retulere Authores.

Confer. *Gualt. test. t. 33. f. B. Argenv. conch. t. 13.*  
*f. C. An sola varietas?*  
*Variat testa laevi & subplicata; semper elongata.*

ecino- 509. testa labro rotundato retuso, ventre laevi cingulis  
 ōus. quatuor pallidis lineari-punctatis.

*Rumph. mus. t. 37. f. X.*

*Gualt. test. t. 33. f. B.*

*Argenv. conch. t. 13. f. C.*

*Seb. mus. 61. f. 15. & 62. f. 20.*

*Habitat in India.*

*Testa laevis, testacea, dorso subcarinato cincto lineis bigeminis albo-punctatis. Spiræ anfractus striati carinula crenata. Labrum exterius intus striatum; Interius adnatum, laeve, gibbum, antice substriatum.*

Spinofus. 510. S. testa labro attenuato integro subplicato coronato  
 spinis argutis, spira aculeata.

*Gualt. test. t. 55. f. E.*

*Argenv. conch. t. 33. f. 10.*

*Pet. gaz. t. 78. f. 11.*

*Syst. nat. 10. p. 715. n. 271. Conus spinofus.*

*Habitat - - - mihi fossilis tantum.*

*Statura Volutæ vespertilionis, sed basis minime emarginata, nec columella plicata. Lineolæ purpurascetes, parallelæ, numerosæ cingunt testam albidam, superne angulatam & spinis acutissimis coronatam. Mirum colores perennare in fossili testa?*

Fisurella. 511. S. testa labro continuato in carinam fissam longitudinalem.

*Argenv. conch. t. 33. lin. 2. n. 6. Mitra.*

*Pet. gaz. t. 73. f. 7, 8.*

*Habitat in India Orientali. Comes Stroganow. J. Falk, Profess. Petropol.*

*Testa magnitudine & statura Turbinis Clathri, alba: anfractus costis carinatis, excepto maximo, subtus laevi. Apertura oblongiuscula. Labrum exterius parum dilatatum; interius adnatum apertura: ex his labris excurrit per latus testæ in carinam fissam longitudinalem, apice recurvatam supra testæ verticem. Cauda brevis, recta, finis parum distincta a labro.*

Ureus. 512. S. testa labro attenuato retuso brevi striato, ventre  
 spiraque plicato-nodosis, apertura bilabiata inermi.  
*M. L. U. 624. n. 288. \* Rumph.*

*Rumph. mus. t. 37. f. T. Canarium bene.*

*Petiv. gaz. t. 98. f. 19.*

*Gualt. test. t. 32. f. G.*

*Seb. mus. 3. t. 60. f. 28, 29. & t. 62. f. 45, 41, 47.*

*Habitat in O. Asia.*

dentatus. 513. S. testa labro attenuato brevi dentato, ventre spiraque plicatis.

*Habitat - -*

\* \* \* Turrity spira longissima.

tubercula-514. S. testa turrity ovato-oblonga tuberculata, labro tus. incrassato.

*Habitat in M. Mediterraneo.*

Testa ovato-oblonga, rudis, quasi calce obducta, anfractibus seriatis punctis corneis eminentibus. Labrum sutura quasi gibbum. Apertura ovata. Cauda brevissima, recurvata.

palustris. 415. S. testa turrity laeviuscula, labro postice soluto.

*Rumph. mus. t. 30. f. Q.*

*Seb. mus. 3. t. 50. f. 13, 14, 17, 18.*

*Habitat in India paludibus.*

ater. 516. S. testa turrity laevi, labro antice posticeque soluto.

*M. L. U. 624. n. 289. \**

*Rumph. mus. t. 30. f. R.*

*Habitat in Asia paludibus.*

lividus. 517. S. testa turrity subangulata nodoso-spinosa, labro antice soluto. *M. L. U. 625. n. 290. \**

*Habitat in - -*

### 325. MUREX. *Animal* Limax.

*Testa* univalvis, spiralis, exasperata  
suturis membranaceis.

*Apertura* definens in canalem integrum, rectum s. subadscendentem.

\* a \* Spinosi cauda exserta.

Haustel- 518. M. testa ovata tuberculata, cauda elongata subulata lum. recta muricata. *M. L. U. 626. n. 291. \**

H h h h 5

Bonaw.

- Bonan. recr.* 3. t. 268.  
*Rumph. mus.* t. 26. f. F. Haustellum.  
*Gualt. test.* t. 30. f. E.  
*Argenv. conch.* t. 19. f. B. Haustellum.  
*Klein. ostr.* t. 4. f. 81.  
*Seb. mus.* 3. t. 78. f. 5, 6.  
*Habitat in O. Asiæ.*

*Tribulus.* 519. *M.* testa ovata spinis setaceis trifariis, cauda elongata subulata recta similiter spinosa. *M. L. U.* 626. n. 292. \*

- Column. aqv.* t. 60. f. 6. *Purpura clavata.*  
*Olear. mus.* t. 39. f. 1.  
*List. conch.* t. 902. f. 22.  
*Bonan. recr.* 3. t. 269. *Hystrix marina.*  
*Rumph. mus.* t. 26. f. G. 3. \* *Tribulus.*  
*Gualt. test.* t. 31. f. A. B. \*  
*Argenv. conch.* t. 19. f. A. \*  
*Seb. mus.* 3. t. 78. f. 1-4.  
*Habitat in O. Asiæ, Java.*  
*Nobilior varietas \* spinis longissimis integris parallelis pectinata.*

*cornutus.* 520. *M.* testa subrotunda spinis subulatis obliquis cincta, cauda elongata subulata recta spinis sparsis. *M. L. U.* 627. n. 293.

- Column. aqv.* t. 60. f. 3. *Purpura cornuta.*  
*Pet. gaz.* t. 68. f. 12.  
*Rumph. mus.* t. 20. f. 5.  
*Gualt. test.* t. 30. f. DD.  
*Bonan. recr.* 3. t. 283.  
*Kirch. mus.* t. 901. f. 21.  
*Adans. seneg.* 1. t. 8. f. 20.  
*Seb. mus.* 3. t. 78. f. 7, 8, 9.  
*Habitat in O. Africano.*

*Brandaris.* 521. *M.* testa subovata spinis rectis cincta, cauda medio-cri subulata recta spinisque oblique circumdata.

- Rond. test.* 64. *Murex Purpura.*  
*Bonan. recr.* 3. t. 281 (γ) 282 (β).  
*Rumph. mus.* t. 26. f. 4 (γ).  
*Gualt. test.* t. 30. f. F. (β).  
*Regens. conch.* 20. t. 6. f. 67.  
*Pet. gaz.* t. 68. f. 12.  
*Ginan. adr.* 2. t. 8. f. 61, 62.

*Habi-*



*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Variat  $\alpha$  ventre triplici cingulo spinarum subulatarum.*

*$\beta$  duplici cingulo spinarum subulatarum.  $\gamma$  duplici cingulo spinarum conicarum, nivea.*

Truncu- 522. M. testa ovata nodosa antierius spinis cineta, cau-  
lus. da brevior truncata perforata. *M. L. U. 627.*  
*n. 294. \**

*Column. purp. t. 13. f. 1.*

*Bonan. recr. 3. t. 274, 277, 271.*

*Gualt. test. t. 31. f. C.*

*Argenv. conch. t. 19. f. G?*

*Klein. ostr. t. 6. f. 104.*

*Habitat in M. Mediterraneo, Jamaica.*

\*  $\beta$  \* *Fronodosi juturis crispato-frondescentibus, cauda abbreviata, vulgo Purpuræ dicti.*

ramosus. 523. M. testa trifariam frondosa, spira contigua, cauda  
truncata. *M. L. U. 628. n. 295. \**

*Column. aqv. t. 60.*

*Bonan. recr. 3. t. 275, 276.*

*Rumph. mus. t. 26. f. 1. A. Murex ramosus.*

*Gualt. test. t. 38. f. A. & t. 37. f. G, H, I, D, L.*

*Argenv. conch. t. 19. f. E, H, C. Purpura ramosa.*

*Klein. ostr. t. 4. f. 8.*

*Regenf. conch. t. 1. f. 6.*

*Seb. mus. 3. t. 77. f. 1, 2, 7.*

*Habitat in Sinu Persico, Jamaica.*

Scorpio. 524. M. testa quadrifariam frondosa, spira capitata, cau-  
da truncata. *M. L. U. 628. n. 296. \**

*Rumph. mus. t. 26. f. D. Scorpio.*

*Gualt. test. t. 37. f. M.*

*Argenv. conch. t. 19. f. D.*

*Seb. mus. 3. t. 77. f. 13-16.*

*Habitat in O. Asiatico.*

saxatilis. 525. M. testa quinquefariam frondosa, spira contigua,  
cauda abbreviata. *M. L. U. 629. n. 297. \**

*Rumph. mus. t. 26. f. C. 2. Murex minor.*

*Argenv. conch. t. 19. f. F.*

*Seb. mus. 3. t. 77. f. 4, 5, 6.*

*Regenf. conch. 2. t. 1. f. 6. & t. 9. f. 26.*

*Habitat in O. Asiatico.*

- Erina- 526. M. testa multifariam subfrondoso-spinosa, spiræ an-  
ceus. fractibus retuso-coronatis, cauda abbreviata.  
*Gualt. test. t. 49. f. H.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*

\* γ \* Varicosi: *suturis rotundatis torosis crassisque.*

- Rana. 527. M. testa varicibus oppositis compressis scabra, cingu-  
lis muricatis, apertura subedentula ovata. *M. L. U.*  
629. n. 298. \*  
*Bonan. recr. 3. t. 182.*  
*Petiv. gaz. t. 100. f. 12.*  
*Rumph. mus. t. 24. f. G. Rana.*  
*Gualt. test. t. 49. f. L.*  
*Argenv. conch. t. 12. f. P. R.*  
*Seb. mus. 3. t. 60. f. 13-20.*  
*Regenf. conch. 26. t. 6. f. 64.*  
*Habitat in O. Asiatico.*  
*Varietas suturis spinis aliquot elongatis e Tranquebar.*

- Gyrinus. 528. M. testa varicibus oppositis continuatis, punctis tu-  
berculosis fasciata, apertura edentula orbiculari.  
*Seb. mus. 3. t. 60. f. 25-27.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*  
*Testa magnitudine nucis coryli, quiescens apice adscen-  
dente, undique punctis eminentibus fasciata; Sutura  
laterales continuatæ, obtusæ; color albus fasciis soli-  
tariis in singulo anfractu, sed in infimo binis, per  
duos ordines punctorum dilatatis.*

- Lampas. 529. M. testa varicibus suboppositis, gibbosa tuberibus  
longitudinaliter tuberculosis, apertura edentula. *M.*  
*L. U. 630. n. 299. \**  
*Rond. test. 2. p. 81.*  
*Gualt. test. t. 50. f. D.*

Bubo. β. *Rumph. mus. t. 28. f. C. Hector.*

Rubeta. γ. *Rumph. mus. t. 28. f. D. Ajax.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa viva epidermide vestita, ut in proximis.*

- Olearium. 530. M. testa varicibus subalternis numeroso-tubercula-  
ta, dorso postice mutico striato, apertura edentula.

*Rond.*

---

Varietates conchyliorum exclusi numerosissimas, Murices tamen frondosos admisi, quan-  
vis inter se nimis affines.

*Rond. test.* 2. p. 88.

*Column. aqu.* t. 53.

*Bonan. recr.* 3. t. 289, 105.

*List. conch.* t. 932. f. 27, 31, 32.

*Adans. seneg.* 1. t. 8. f. 12.

*Seb. mus.* 3. t. 51. f. 29, 31.

*Rumph. mus.* t. 49. f. H.

*Gualt. test.* t. 50. f. A.

*Habitat in Europa australi, M. Mediterraneo, Africano.*

**Femorale.** 531. *M. testa varicibus decussatis trigona rugosa, antice nodulosa, apertura edentula: antice transversa. M.*  
*L. U.* 630. n. 300. \*

*Grew. mus.* t. 11. f. 7, 8.

*List. conch.* t. 941.

*Bonan. recr.* 3. t. 290.

*Rumph. mus.* t. 26. f. B. *Murex saxatilis.*

*Gualt. test.* t. 50. f. C.

*Argenv. conch.* t. 13. f. B.

*Regens. conch.* 6. t. 2. f. 21.

*Seb. mus.* 3. t. 63. f. 7, 8.

*Habitat in O. Asiatico.*

**cutaceus.** 532. *M. testa varice solitaria, nodis angulata subrugosa, apertura dentata, columella perforata.*

*Seb. mus.* 3. t. 49. f. 72. bene.

*Habitat - -*

*Testa alba, magnitudine n. juglandis. Venter sutura unica labro opposita, dorso levissime striata & tribus nodis antice angulata. Labrum intus scrobiculato-canaliculatum & subdentatum. Cauda productiuscula. Columella in medio perforata. Venter subtus rugis striatis notatus.*

**Loto-  
rium.**

533. *M. testa varicibus decussatis angulata, nodis longitudinaliter tuberculosis, cauda flexuosa, apertura dentata. M. L. U.* 631. n. 301. \*

*Rumph. mus.* t. 26. f. B?

*Argenv. conch.* t. 13. f. M?

*Habitat - -*

**Pileare.** 534. *M. testa varicibus decussatis, subnodoso-rugosa, apertura dentata, cauda subadscendente.*

*Gualt. test.* t. 49. f. G.

*Seb. mus.* 3. t. 57. f. 29, 31, 23, 24.

*Habitat in M. Mediterraneo.*

- Pyrum.** 535. *M. testa varicosa ovata, transversim sulcata nodosa, cauda longiore flexuosa supulata.*  
*Rumph. mus. t. 26. f. E?* *Pyrum exsiccatum.*  
*Gualt. test. t. 37. f. F.*  
*Argenv. conch. t. 13. f. O.*  
*Regensf. conch. t. 5. f. 50.*  
*Habitat - -*  
*Testa alba, longitudinaliter striata, angulata, transversim sulcata. Cauda longitudine testæ. Faux labro interiore explanato.*
- Rubecula.** 536. *M. testa varicibus decussatis, obtusa rugis nodosis, ventre æquali, apertura dentata.* *M. L. U. 651. n. 302. \**  
*Argenv. conch. t. 12. f. K.*  
*Gualt. test. t. 49. f. I?*  
*Seb. mus. 3. t. 49. f. 1-5.*  
*Habitat - -*
- Scrobila-** 537. *M. testa varicibus scrobiculatis suboppositis, levitor.*  
*gata, apertura dentata.*  
*Gualt. test. t. 49. f. B.*  
*Seb. mus. 3. t. 60. f. 13, 15.*  
*List. conch. t. 939. f. 34, 39.*  
*Pet. gaz. t. 100. f. 12.*  
*Adans. seneg. l. t. 8. f. 13.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*
- reticula-** 538. *M. testa varicibus suboppositis reticulata, maculis tuberculatis, columella subdentata, cauda adscendente.*  
*ris.*  
*M. L. U. 632. n. 303. \**  
*Rumph. mus. t. 29. f. N.*  
*Bonap. recr. 3. t. 193.*  
*Gualt. test. t. 49. f. M.*  
*Habitat in Carolina.*
- Anus.** 539. *M. testa varice labiisque dilatato - membranaceis, gibbosa reticulato-tuberculata, apertura sinuosa, cauda erecta.* *M. L. U. 634. n. 304. \**  
*Bonap. recr. 3. t. 279, 280.*  
*Rumph. mus. t. 24. f. F.* *Auris hirsuta.*  
*Pet. gaz. t. 74. f. 9. vel. t. 99. f. 10.*  
*Gualt. test. t. 37. f. B, E.*  
*Argenv. conch. t. 12. f. H.* *Distorsio f. Grimace.*  
*Seb. mus. 3. t. 60. f. 6, 7.*  
*Habitat in O. Asiatico.* \* \*

\* ♂ \* Ecaudati *subechinati*.

- Ricinus. 540. M. testa ecaudata obovata, spinis subulatis, apertura dentata, labro dentato. *M. L. U.* 633. n. 305. \*  
*Rumph. mus.* t. 24. f. E. Os luteum.  
*Gualt. test.* t. 28. f. N.  
*Seb. mus.* 3. t. 60. f. 37, 39, 42.  
*Habitat in O. Asiatico.*  
*Faux violacea.*

- nodus. 541. M. testa ecaudata obovata, spinis conicis, labro dentato, columella laevi colorata. *Mus. L. U.* 635. n. 309. \*  
*Habitat - -*  
*Faux incarnata.*

- neritoideus. 542. M. testa ecaudata nodosa plurimis ordinibus, labro angulato, columella planiuscula.  
*Syst. nat.* 10. p. 777. n. 628. Nerita nodosa.  
*Bonap. recr.* 3. t. 173, 174.  
*List. conch.* t. 804. f. 13.  
*Gualt. test.* t. 66. f. B. B.  
*Klein. ostr.* 17. t. 1. f. 30.  
*Habitat - -*  
*Structura Neritæ; habitus Muricis. Apertura non effusa est, verum uti Neritæ integra, sed habitus hujus generis.*

- Hystrix. 543. M. testa ecaudata subovata, spinis acutis, apertura edentula repanda. *M. L. U.* 635. n. 310. \*  
*Argenv. conch.* t. 17. f. A. Hericius.  
*Seb. mus.* 3. t. 60. f. 60. f. 38.  
*Habitat - -*

- Mancinella. 544. M. testa ecaudata ovata, spinis obsoletis, apertura edentula, columella transversim striata. *M. L. U.* 636. n. 311. \*  
*Rumph. mus.* t. 24. f. 5.  
*Argenv. t.* 20. f. H.  
*Habitat - -*

- Hippocastanum. 545. M. testa ecaudata ovata striata quadratariam subspinosa, apertura transversim striata. *M. L. U.* 636. n. 312. \*  
*Rumph. mus.* t. 24. f. 4. Pimpeltjes e banda.  
*Gualt.*

*Gualt. test. t. 31. f. F.*  
*Argenv. conch. t. 17. f. L?*  
*Klein. ostr. t. 7. f. 112.*  
*Regenf. conch. 12. t. 13. f. 32.*  
*Habitat in O. Asiæ ad Bandam.*

546. M. testa ecaudata subturrita longitudinaliter costata, transversim cancellata, apertura striata.

*Bonan. recr. 3. t. 35.*  
*Gualt. test. t. 51. f. G. I.*  
*Argenv. conch. t. 12. f. O.*  
*Seb. mus. 3. t. 49. f. 45, 46, 47.*  
*Habitat - -*  
*Columellæ plicâ una alterave.*

Melonge-547. M. testa ecaudata obovata glauca, anfractu subspinosa, spira prominula, apertura lævi. *M. L. U. 637. n. 313. \**

*Bonan. recr. 3. 295. 186.*  
*Rumph. mus. t. 24. f. 2, 3.*  
*Gualt. test. t. 26. f. F.*  
*Argenv. conch. t. 18. f. H.*  
*Regenf. conch. 20. t. 5. f. 49. & t. 10. f. 36.*  
*Seb. mus. 3. t. 72. f. 1-8.*  
*Habitat in America.*  
*Variat cum & sine spinis.*

\* ? \* Caudigeri: cauda subulata clausa recta elongata, testa inermi.

548. M. testa ecaudata subplicata ovata acuminata apice carioso.

*Habitat in Aquæductu ad Sevilam. Cl. Alstræmer.*  
*Testa magnitudine Faba, ovata, oblonga, acuminata, cinerea, subdiaphana, longitudinaliter sulcata, sed obsoletius. Apex cariosus. Basis emarginata.*

549. M. testa turrita cingulis acutis maculatis recto-caudata, labro fisso. *M. L. U. 639. n. 317. \**

*List. conch. t. 917. f. 11.*  
*Rumph. mus. t. 29. f. L. Turris babylonica.*  
*Gualt. test. t. 51. f. NN.*  
*Argenv. conch. t. 12. f. M. Turris babylonica.*  
*Regenf. conch. t. 1. f. 9.*  
*Seb. mus. 3. t. 79. f. lateralis.*  
*Habitat in Asia.*

550. M.

javanus. 550. M. testa turrita cingulis nodosis immaculatis, labro sinu separato.

*Habitat in Java. Noordgren.*

Simillimus *M. babylonico*, sed albus immaculatus. Anfractus substriati, cincti carina vel tuberculis nodosi vel angulati. Labrum fissum versus basin, sed sinu latiusculo, magis obtuso. Cauda longior aut brevior variat.

Colus. 551. M. testa turrita subrecto-caudata striata nodosa carinata, labro crenulato. *M. L. U. 639. n. 317. \**

*Bonan. recr. 3. t. 360.*

*Rumph. mus. t. 29. f. F. Fusus.*

*Gualt. test. t. 52. f. L.*

*Argenv. conch. t. 12. f. B.*

*Klein. ostr. t. 4. f. 78.*

*Regenf. conch. t. 12. f. 62.*

*Seb. mus. 3. t. 19. f. centralis.*

*Habitat in utraque India.*

Testa cauda huius longissima. Variat ventre tereti & angulato.

Morio. 552. M. testa patulo-caudata nigra fascia alba, spiræ anfractibus subnodosis, columella rugosa. *M. L. U. 640. n. 319. \**

*Bonan. recr. 3. t. 357.*

*Regenf. conch. t. 11. f. 61.*

*Adans. seneg. t. 2. f. 31.*

*Seb. mus. 3. t. 88. f. omnes & t. 52. f. 5, 6.*

*Habitat in M. Africano.*

Cochlidi-um. 553. M. testa patulo-caudata, spiræ anfractibus supra planis. *M. L. U. 640. n. 320. \**

*Argent. conch. t. 12. f. A.*

*Seb. mus. 3. t. 57. f. 27, 28.*

*Habitat -*

Spirillus. 554. M. testa caudata, spiræ mucronatæ anfractibus supra convexis.

*Habitat in Tranquebar. Sprengler.*

Simillimus *M. canaliculato*, sed anfractus sulca non distincti. Corpus subius ventricosum, supra convexum, spiræ centro mucrone prominente obtuso: Anfractus supra margine acuto cincti. Cauda subcylindrica, nec versus aperturam ventris dilata, sed Columella ruga transversa a ventre distincta.

l i i i

555. M.

canalicu- 555. *M. testa patulo-caudata, spiræ anfractibus supra ca-*  
latus. *naliculo distinctis. M. L. U. 641. n. 321. \**

*Gualt. test. 47. f. A.*

*Seb. mus. 3. t. 68. f. 22.*

*Ellis corall. 85. t. 33. f. B.*

*Grannm. β. M. testa hemisphærica glabra diaphana, cauda recta*  
*patula, vertice papillari. Syst. nat. 10. p. 752. n. 477.*

*Ellis. corall. 851. t. 33 f. a. A.*

*Baister. subf. 1. 6. f. 2. B.*

*Habitat ad Canadam.*

*Varietas β est pullus. Testa grano Secalis minor, al-*  
*ba. Anfractus apicis, antice vix manifeste rugo-*  
*sus. Cauda recta, longitudine ipsius testæ. Aper-*  
*tura obovata.*

aruanus. 556. *M. testa patulo-caudata, spira spinoso-coronata.*  
*M. L. U. 641. n. 322. \**

*Rumph. mus. t. 28. f. A. Buccinum aruanum.*

*Gualt. test. t. 47. f. B.*

*Bonan. recr. 3. t. 101.*

*Habitat ad Novam Guineam, Chinam.*

*Testa ponderosa rudis, saepe nigra f. subcaerulea.*

perversus. 557. *M. testa patulo-repandoque caudata, spira contraria*  
*subcoronata. M. L. U. 642. n. 323. \**

*Gualt. test. t. 30. f. B.*

*Argenv. conch. t. 18. f. F. Unique.*

*Habitat in O. Americano.*

antiquus. 558. *M. testa patulo-caudata oblonga, anfractibus octo*  
*teretibus. Fn. suec. 2165.*

*Gualt. test. t. 46. f. E.*

*Habitat in O. Europæo: Norvegico.*

*Simillimus, cum sequenti, est Buccino undato.*

despectus. 559. *M. testa patulo-subcaudata oblonga, anfractibus octo:*  
*lineis duabus elevatis. Fn. suec. 1266.*

*\* It. Wgoth. t. 5. f. 8.*

*List. angl. t. 3. f. 1.*

*Habitat in O. Septentrionali: Islandia.*

*Rudis omnino uti præcedens testa est.*

Tritonis. 560. *M. testa ventricosa oblonga lævi, anfractibus ro-*  
*tundatis, apertura dentata, cauda brevi. M. L. U.*  
*642. n. 324. \**

*Rond. test. 81. Buccinum.*

*Rumph. mus. t. 28. f. B. Buccinum Tritonis.*

*Gualt. test. t. 48. f. A.*

*Seb. mus. 3. t. 81. f. omnes.*

*Habi-*



*Habitat in Archipelago, America. In Oriente & Africa etiam hodie pro cornu militari a Pastoribus usurpatur vebementiori sono, quam tuba stentoreæ vulgaris aut Cornu Capri.*

*Buccina jam prisicos coquebat ad arma Quirites.*

*Anfractus distincti sutura nodulosa, hinc inde quasi abscissi & adglutinati nodo. Apex saepe diffractus. Columella striis transversis nigris. Color lividus, nigro quasi imbricatus.*

**Pusio.** 561. *M. testa ventricosa oblonga lævi, anfractibus rotundatis, spira striata, apertura lævi, cauda brevi.*

*Bonan. recr. 3. t. 40.*

*Gualt. test. t. 52. f. I.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa magnitudine nucis Avellanae, glauco-cerulea, fasciis longitudinalibus griseis undatis. Sutura simplex.*

**Tulipa.** 562. *M. testa ventricosa oblonga lævi, anfractibus rotundatis sutura geminata, apertura uniplicata, cauda patula striata.*

*Bonan. recr. 3. t. 187.*

*List. conch. t. 911.*

*Rumph. mus. t. 49. f. H.*

*Gualt. test. t. 46. f. A.*

*Argenv. conch. t. 13. f. K. Tulipa.*

*Regenf. conch. t. 9. f. 35.*

*Seb. mus. 3. t. 57. f. 25, 26. & t. 71. f. 23-31.*

*Habitat - -*

**elathratus.** 563. *M. testa oblonga caudata, plicis longitudinalibus submembranaceis sulcata.*

*Klein. ostr. t. 3. f. 67.*

*Habitat in Islandiæ Mari. J. Zoega. König.*

*Testa magnitudine & facie Turbinis elathri, sed leviter caudata. Plicæ plurimæ, longitudinales, erectæ, compressæ, superne inclinatæ.*

**dolartum.** 564. *M. testa patulo-caudata ovata, anfractibus cingulis aliquot elevatis obtusis.*

*Bonan. recr. 3. t. 347.*

*Habitat in Oceano. Joh. Hinr. Ferber.*

*Testa juglandis magnitudine, cornea, ovata, utrinque magis attenuata. Cingula maxime elevata, obtusa, plura, ventrem cingunt, inter quæ testa substriata*

11112

est, &

est, & 2 cingunt spiram anfractus. Apertura ovata, antice subtransversa, excavata ad marginem anteriorem secundum cingula; Postice attenuata in canalem vix manifestum, vixque emarginatum. Columella perforata.

corneus. 565. M. testa oblonga rudi, anfractuum marginibus complanatis, apice tuberculoso, apertura edentula, cauda adscendente.

*It. wgoth. t. 5. f. 6. fossilis.*

*Gualt. test. t. 46. f. F.*

*List. angl. 157. t. 3. f. 4.*

*Habitat in Europa australiore.*

*Testa digito brevior, colore cornu, laevis, sed non glabra, opaca.*

lignarius. 566. M. testa oblonga rudi, anfractibus obtuse nodosis, apertura edentula, cauda brevi rectiuscula.

*Bonon. recr. 3. t. 32.*

*Gualt. test. t. 52. f. S?*

*Seb. mus. 3. t. 52. f. 4.*

*Habitat in Europa australi.*

*Testa vix digiti longitudine; anfractus laeves, rudes, simplici serie tuberibus obtusis.*

Trapezium. 567. M. testa oblonga obtuse angulata, anfractibus subnodosis, apertura dentata, cauda brevior recta. M.

*L. U. 643. n. 325. \**

*Bonon. recr. 3. t. 287.*

*Rumph. mus. t. 29. f. E. & t. 49. f. K. Pseudo Purpura.*

*Gualt. test. t. 46. f. B.*

*Argenv. conch. t. 13. f. F, H.*

*Habitat ad Amboinam.*

*Lineae geminae semper, fuscae, integrae.*

syracusanus. 568. M. testa oblonga, anfractibus striatis plicatis, tuberculoso-carinatis, apertura edentula, cauda brevi.

*Bonon. recr. 3. t. 80.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa anfractuum testis testaceis, parietibus vero albis.*

reticulatus. 569. M. testa oblonga, anfractibus rotundatis plicatis transversim reticulatis, apertura dentata, cauda brevi.

*Rond. test. 89. Turbo angulatus.*

*Habi-*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa oblonga anfractibus elevato-striatis, albida, longitudinaliter subplicata angulis elevatis ferrugineis. Cauda brevis. Apertura intus striata.*

scriptus. 570. M. testa subcaudata fusiformi laevi pallida: striis fuscis longitudinalibus variis, labio dentato.

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa S. Hordei paulo major, undique laevis, oblonga, vix caudata, pallide albida, commaculata striis oblongis flexuosis subpiceis.*

\* η \* *Turriti subulati, cauda brevissima.*

Vertagus. 571. M. testa turrita, anfractibus superne plicatis, cauda adscendente, columella intus plicata.

*Bonap. recr. t. 84.*

*Rumph. mus. 100. t. 30. f. K. Strombus caudatus albus.*

*Pet. gaz. t. 56. f. 4.*

*Argenw. conch. t. 14. f. P.*

*Gualt. test. t. 57. f. D.*

*Habitat - -*

*Testa alba, digitiformis. Anfractus saepius 15, superne plicati. Cauda brevissima, adscendens. Columella plica altera prope spiram, altera in medio.*

Aluco. 572. M. testa turrita, anfractibus tuberculatis, stria media spinosa, columella uniplicata, cauda adscendente.

*M. L. U. 643. n. 326. \**

*Bonap. recr. 3. t. 69. 83.*

*Rumph. mus. t. 30. f. O. N. Strombus angulosus.*

*Gualt. test. t. 57. f. G. A.*

*Argenw. conch. t. 14. f. H. Eruca contabulata.*

*Seb. mus. 3. t. 51. f. 25.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa cinerea labro rotundato.*

fuscatus. 573. M. testa turrita, anfractibus crenulatis: stria superiore denticulata.

*Gualt. test. t. 56. f. H.*

*Argenw. conch. t. 14. f. a.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa fusca, basi obtusa.*

torulosa. 574. M. testa turrita, anfractibus s. perne zona torulosa, cauda brevi.

*Habitat* - - - e Museo Hen. Gyllenborg.

Testa alba, laevis s. parum longitudinaliter striata. Anfractus cincti zona gibba, elevata, obtusa, torulosa. Apex plicatus.

Radula. 575. M. testa turrita, anfractibus tuberculatis: striis duplici serie punctatis.

*Gualt. test. t. 58. f. F.*

*Habitat* in O. Africano.

Testa subincarnata, basi obtusa; Anfractuum puncta saepe apice alba.

asper. 576. M. testa turrita, anfractibus sulcatis transversim striatis muricatis, cauda adscendente.

*Habitat* in M. Guineensi.

Testa lactea, subulata, solida, 12 s. 14 sulcis longitudinalibus: singulis 4 pluribus; ore spinis brevibus. Cauda adscendens labro interiore planiusculo, uniplicato.

granulatus. 577. M. testa turrita tuberculis decussatim adpersa, cauda acuta adscendente.

*Bonan. recr. 3. t. 81.*

*Rumph. mus. t. 30. f. L.* Strombus caudatus angulosus.

*Argenv. conch. t. 14. f. K.*

*Klein. ostr. t. 7. f. 119.*

*Habitat* in O. Asiatico.

Testam tantum vidi, quam inhabitavit & reformavit hospes Bernhardus Eremita.

decollatus. 578. M. testa turrita anfractibus longitudinaliter plicato-sulcatis, apice decollato.

*Habitat* - - - Musei De Geer.

Similis *Helici decollatae*, sed basis emarginata. Anfractus margine superiore attenuato: striae longitudinales plicis imbricatis, interjectis sulcis ipsis atris opacis. Apex truncatus. Apertura obovata.

326. TROCHUS. *Animal* Limax.*Testa* univalvis, spiralis, subconica.*Apertura* subtetragono-angulata f. -rotundata, superius transversa, coarctata; *Columella* obliquata.

\* Umbilicati erecti, perforata columella.

niloticus. 579. T. testa conica læviuscula subumbilicata.

*Olear. mus.* t. 29. f. 5.*Bonau. recr.* 3. t. 102.*Rumph. mus.* t. 21. f. A.*Gualt. test.* t. 59. f. B. C.*Argenv. conch.* t. 11. f. C.*Règenf. conch.* t. 4. f. 42.*Habitat* in O. Indico.*Testa* magna, ponderosa, picta striis oblique perpendicularibus rubris, etiam subtus; apex obsolete nodulosus. Anfractus minime nodosi. *Apertura* argentea labro interiore obsolete bilobo. *Detracta* extima tunica evadit tota argentea. Differt a *T. maculato*: Fauce intus minime striata, sed lævi. *Columella* non denticulata: *Basi ventris* convexa lævi, nec decussatim striata & planiuscula.maculatus. 580. T. testa conica tuberculata, umbilico obliquo, labio interiore obsolete bilobo. *M. L. U.* 644. n.

327. \*

*Bonau. recr.* 3. t. 96.*Rumph. mus.* t. 21. f. B, 4, 3. *Trochus* maculosus.*Gualt. test.* t. 61. f. E.*Argenv. conch.* t. 11. f. C.*Habitat* in O. Americano, Asiatico.perspectivus. 581. T. testa convexa obtusa marginata, umbilico pervio crenulato. *M. L. U.* 646. n. 329. \**Grew. mus.* t. 11. f. 3, 4.*List. conch.* 4. f. 8. c. 3. t. 1, 2.*Bonau. recr.* 3. t. 27, 28.*Rumph. mus.* t. 27. f. L. Umbilicata.

*Pet. ambain. t. 2. f. 14.*

*Gualt. test. t. 65. f. O.*

*Argenv. conch. t. 11. f. M. Solarium.*

*Regenf. conch. 26. t. 6. f. 61.*

*Seb. mus. 3. t. 40. f. 1. 2, 13, 14, 28, 41, 42.*

*Habitat ad O. Aethiæ littora; Alexandria frequens.*

*Umbilicus stupendum naturæ artificium.*

hybridus. 582. T. testa umbilicata convexa, columella bidentata, umbilico crenulato. *M. L. U. 646. n. 330. \**

*Habitat in M. Mediterraneo.*

cruciatus. 683. T. testa umbilicata convexa: striis calloso-punctatis, columella unidentata.

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa Avellana minor, ferruginea, fasciis longitudinalibus quatuor albidis.*

pharaoni- 584. T. testa subovata striata: punctis concatenatis globosis, columella aperturaque dentata, umbilico crenato. *M. L. U. 647. n. 331. \**

*Bonan. recr. 141. p. 3. t. 222.*

*Rond. test. 104. Umbilicus varius.*

*Lisl. conch. 4. f. 8. c. 4. t. 1.*

*Pet. gaz. t. 14. f. 10.*

*Gualt. test. t. 63. f. B.*

*Argenv. conch. t. 11. f. L. Q. Camisole.*

*Adans. seneg. 1. t. 12. f. 2.*

*Habitat in M. Mediterraneo, Brasiliæ.*

*Puncta nivea & atra, alterna serie in ordinibus transversis.*

Magus. 585. T. testa oblique umbilicata convexa: anfractibus supra obtuse nodulosis. *M. L. U. 647. n. 332. \**

*Gualt. test. t. 64. f. C.*

*Argenv. conch. t. 11. f. S. Sorcière.*

*Regenf. conch. 12. t. 3. f. 27.*

*Seb. mus. 3. t. 74. f. 13, 14.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

Modulus. 586. T. testa umbilicata striata: supra plicata, subtus convexiore, apertura obovata unidentata.

*Seb. mus. 3. t. 34. f. 12.*

*Habitat - - e Musco Tessiniano.*

*Testa magnitudine T. pharaonis, albida, purpurascens, maculata, subenticularis, supra obtuse plicata, sub-*

*tus*

*tus magis convexa, undique striata, juxta umbilicum in apertura Dens e columella plicata.*

- murica- 587. T. testa subumbilicata ovata: tuberculis muricatis.  
tus. M. L. U. 648. n. 333. \*  
*Gualt. test. t. 64. f. II.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*
- scaber. 588. T. testa umbilicata subovata: sulcis alternis majori-  
bus moniliformibus. M. L. U. 648. n. 334. \*  
*Argenv. conch. t. 11. f. T.*  
*Habitat - -*
- varius. 589. T. testa oblique umbilicata convexa, anfractibus sub-  
marginatis.  
*Habitat in M. Mediterraneo.*  
*Testa convexa, cincta margine obsoleto, pallida fasciis cinerascens.*
- cinera- 590. T. testa oblique umbilicata ovata, anfractibus rotun-  
rius. datis. Fn. spec. 2167.  
*Habitat in M. Mediterraneo, Norvegico.*  
*Testa cinerea fasciis obliquis pallidis.*
- divarica- 591. T. testa subumbilicata ovata: anfractu infimo remo-  
tus. tiore, umbilico subconsolidato.  
*Habitat in M. Mediterraneo.*  
*Testa viridis, fasciata punctis sanguineis. Anfractus versus aperturam magis remotus a reliqua spira.*
- umbilica- 592. T. testa cylindrico-umbilicata conico-convexa: an-  
ris. fractu submarginato.  
*Habitat in M. Mediterraneo.*  
*Testa sapius ferruginea nebulosa; umbilicus pervius te- res exacte cylindricus, præter anfractus minores in- teriores & intus albus.*
- Solaris. 593. T. testa umbilicata convexo-conica, anfractibus spi-  
noso-radiatis, apertura semicordata. M. L. U. 645.  
n. 328. \*  
*Bonan. recr. 3. t. 366, 367. mala.*  
*Rumph. mus. t. 20. f. K. Zonnehooren.*  
*Argenv. conch. t. 9. f. K.*  
*Gualt. test. t. 65. f. N. P?*  
*Habitat in India Orientali; rarissimus.*

\* \* Imperforati erecti, umbilico clauso.

vestiarius. 594. T. testa imperforata conico-convexa, basi gibboso-calloſa, apertura ſubcordata.

*Pet. gaz. t. 11. f. 6.*

*Gualt. teſt. t. 65. f. E, F, G.*

*Habitat in M. Mediterraneo, Aſiatico, Chinenſi.*

*Statuta T. pharaonii, ſupra glauca, lineis tranſverſis undatis pallidis, colore luſcentibus. Subtus notata callo convexo lato albido.*

Labio. 595. T. teſta imperforata ovata ſubſtriata, columella undentata. *M. L. U. 649. n. 335. \**

*Liſt. conch. 4. ſ. 8. c. 4. t. 3.*

*Rumph. muſ. t. 21. f. E. Labio.*

*Gualt. teſt. t. 63. f. D, E, G.*

*Argenv. conch. t. 9. f. N.*

*Regenf. conch. t. 10. f. 39.*

*Habitat in O. Africano & Aſiatico.*

Tuber. 596. T. teſta imperforata depreſſiuſcula, anfractibus ſubcarinatis margine ſuperiore inferioreque noduloſis.

*Argenv. conch. t. 11. f. R.*

*Regenf. conch. t. 3. f. 27.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Apertura ſubrotunda eſt & carina anfractuum lateralis.*

ſtriatus. 597. T. teſta imperforata conica: anfractu infimo ſubangulato, apertura obovata.

*Gualt. teſt. t. 61. f. N.*

*Habitat in M. Mediterraneo. Minutus.*

*Teſta alba lineis longitudinalibus obliquis nigris; ſimilis ſequentibus duobus, ſed infimus anfractus angulo cinctus eſt.*

conulus. 598. T. teſta imperforata conica lævi, anfractibus linea elevata interſtinctis.

*Bozan. recr. 3. t. 91. 99.*

*Liſt. angl. 166. t. 3. f. 15.*

*Gualt. teſt. t. 61. f. N. M.*

*Habitat in M. Mediterraneo & O. Europeo.*

*Teſta ſequenti ſimillima, ut fere varietas minima, etiam apice tuberculata, ſed linea inter anfractus promi- nula; color pulcherrime variegatus.*



**Zizyphus.** 599. T. testa imperforata conica livida lævi, anfractibus marginatis. *Fn. succ.* 2168. *M. L. U.* 650. n. 336.\*

*Bonon. recr.* 3. t. 93.

*Rumph. mus.* t. 21. f. 1.

*List. angl.* 166. t. 3. f. 14.

*Gualt. test.* t. 61. f. B, C.

*Argenv. conch.* t. 11. f. N?

*Klein ostr.* t. 2. f. 36.

\* *Habitat in M. Mediterraneo & Europæo.*

*Testa, exuta tunica extima, plumbea evadit.*

\* \* \* *Turriti umbilico exserto, qui positi cadunt in latus.*

**Telescopium.** 600. T. testa imperforata turrita striata, columella exserta spirali. *M. L. U.* 650. n. 337. \*

*Bonon. recr.* 3. t. 92.

*List. conch.* 4. f. 8. c. 1. t. 5. f. 1.

*Rumph. mus.* t. 21. f. 12.

*Gualt. test.* t. 60. f. D, E.

*Argenv. conch.* t. 14. f. B. *Telescopium.*

*Sch. mus.* 3. t. 50. f. 1-12.

*Habitat* - -

**dolabratus.** 601. T. testa umbilicata turrita glabra, columella exserta recurvato-contorta plicata. *M. L. U.* 651. n. 338.\*

*Argenv. conch.* t. 14. f. L.

*Habitat in Africa; terrestris.*

*Apertura singularis distorto ad columellam ore triplicato.*

*Umbilicus perforatus. Color Bullæ Virgineæ.*

**perversus.** 602. T. testa imperforata turrita glabra, anfractibus contrariis serie duplici excavato-punctatis.

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa parva, anfractibus cylindricis, duplici serie excavato punctatis, præter margines anfractuum etiam crevato punctatis. Apertura quadrata: columella basi prominula, at non in canalem evidentem. Color fere corneus.*

**punctatus.** 603. T. testa imperforata turrita, anfractibus serie triplici punctorum prominentium.

*Habitat in Europa australi.*

*Testa magnitudine præcedentis s. Hordei, ferruginea, undique punctis obtusis eminentibus oblecta, in singulo anfractu serie triplici, quarum intermedia minor est.*

*Aper-*

*Apertura quadrata cum columella prominula, vix manifeste canaliculata.*

striatellus. 604. T. testa turrita imperforata: striis longitudinalibus parallelis obliquis.

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa admodum parva, subulata, alba, apice violacea.*

### 337. TURBO. *Animal* Limax.

*Testa univalvis, spiralis, solida.*

*Apertura coarctata, orbiculata, integra.*

\* Neritoidei *apertura margine columnari plano imperforato.*

obtusatus. 605. T. testa subrotunda laevi: superne ventricosiore obtusissima, margine columnari plano.

*Habitat in O. Septentrionali.*

Neritoi- 106. T. testa ovata glabra obtusiuscula, margine colum-  
des. nari plano.

*Gvalt. test. t. 45. f. F.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa Neritis maxime affinis. Minuta.*

littoreus. 607. T. testa subovata acuta striata, margine columnari plano. *Fn. suec. 2169.*

*It. wgoth. 169. 199. t. 5. f. 4.*

*Swamm. bibl. 183.*

*List. angl. 162. t. 3. f. 9.*

*Gvalt. test. t. 45. f. G.*

*Baster. subs. 3. p. 110. f. 1. Turbo littoratis.*

*Habitat in O. Europeo, frequens ad littora Norvegiæ; quando littora ascendit, indicat ventum a terra, pacatum ad littus. Ström.*

murica- 608. T. testa umbilicata subovata acuta cincta striis punctis eminentibus, margine columnari obtusiusculo.

*Gvalt. test. t. 45. f. E.*

*Habitat in Europa australi.*

\* \* Solidi *imperforsati*.

Cimex. 609. T. testa oblongo-ovata striis decussatis: punctis eminentibus.

*Gualt. test. t. 44. f. X.*

*Adans. seneg. 1. t. 10. f. 6.*

*Habitat in M. Mediterraneo; minutus.*

Pullus. 610. T. testa imperforata ovata lævi, apertura antice ducta.

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa magnitudine seminis Carthami nitida, picta varie fasciis maculisque purpurascens fuscis albidisve.*

*Apertura antice angulum format, uti T. Petholatus, cui valde affinis.*

persona- 611. T. testa imperforata convexa lævi, apertura didu-  
tus. sta. *M. L. U. 652. n. 339. \**

*Rumph. mus. t. 19. f. 1.*

*Habitat - -*

Pethola- 612. T. testa imperforata ovata lævi nitida, anfractibus  
tus. sursum subangulatis. *M. L. U. 652. n. 340. \**

*Bellon. aqu. 340 Cochlus f. Umbilicus.*

*Rumph. mus. t. 19. f. D, 5, 6, 7. Cochlea petholata.*

*Argenv. conch. t. 9. f. K. Cochlea variegata.*

*Klen. ostr. t. 2. f. 51.*

*Seb. mus. 3. t. 74. f. 23-29.*

*Regenf. conch. t. 8. f. 18. ♂ t. 9. f. 25.*

*Habitat ad Barbados.*

Cochlus. 613. T. testa imperforata ovata striata: stria unica dorsali crassiore.

*List. conch. t. 584. f. 40.*

*Rumph. mus. t. 19. f. 4.*

*Argenv. conch. t. 9. f. I.*

*Regenf. conch. t. 1. f. 12.*

*Seb. mus. 3. t. 74. f. 20, 21, 6.*

*Habitat in O. Asiatico. Alexandria, Islandiæ.*

*Similis T. argyrostomo, sed nulle striæ transversæ.*

*Umbilicus Veneris officinarum nostratum propriè hujus operculum subrotundum, gibbum, lateribus striatum.*

Chryso- 614. T. testa imperforata subovata rugosa: anfractibus  
stomus. bifariam spinulis fornicatis cineta. *M. L. U. 653.*

*n. 341. \**

*Rumph.*

*Rumph. mus. t. 19. f. E.* Cochlea lunaris aspera.

*Gvalt. test. t. 62. f. H.*

*Argenv. conch. t. 9. f. D.* Os aureum.

*Klein. ostr. t. 7. f. 126.*

*Seb. mus. 3. t. 74. f. 9, 10, 11.*

*Habitat in O. Asiatico.*

*Faux sapius in adultis aurea est; anfractus superni plicati.*

**Tectum 615.** T. testa imperforata ovata: spinis obtusis depressis, persicum. Subtus papillosa. *M. L. U. 653. n. 342.\**

*Argenv. conch. t. 11. f. P.*

*Habitat - -*

*Operculum hujus Umbilicus veneris incarnatus.*

**Pagodus. 616.** T. testa imperforata conica, spinis obtusis concatenatis, subtus papilloso-striata. *M. L. U. 654. n. 343.\**

*Rumph. mus. t. 21. f. D.* Trochus papuanus f. longavus.

*Gvalt. test. t. 62. f. B. C.*

*Argenv. conch. t. 11. f. A.* Pagodus.

*Habitat in O. Asiatico.*

**Calcar. 617.** T. testa subimperfiorata depressa: anfractibus scabris supra spinis fornicato-compressis. *M. L. U. 654. n. 344.\**

*List. conch. 4. f. 6. t. 1. f. 3, 4.*

*Rumph. mus. t. 20. f. I.* Calcar.

*Argenv. conch. t. 11. f. H.* Calcar bene.

*Klein. ostr. t. 1. f. 27.*

*Habitat ad Airboinam.*

**rugosus. 618.** T. testa imperforata subovata striata, anfractibus superne rugosis.

*Bonap. recr. 3. t. 12.*

*Gvalt. test. t. 63. f. C. F. H.*

*Seb. mus. t. 3. f. 74. f. 14, 13.*

*Habitat in India.*

*Faux argentea columella labro purpureo. Anfractus striati latere superiore rugis obsolete nodosi.*

**marmora-619.** T. testa imperforata subovata laevi: anfractibus trifariam marginato-nodulosa, cauda postice explanata.

*M. L. U. 655. n. 345.\**

*Rumph. mus. t. 19. fig. A. B.* Cochlea lunaris major.

*Gvalt. test. t. 64. f. A.*

*Klein.*

*Klein. ostr. t. 7. f. 124.*

*Seb. mus. 3. t. 74. f. 1, 2.*

*Regensf. conch. 20. t. 5. f. 52.*

*Habitat in O. Aliae ad Zeylonam, Javam.*

*Columella postice extus dilatata. Testa ponderosa.*

farmati- 620. T. testa imperforata convexa obtusa: anfractibus su-  
cus. pra nodosis canali interstinctis.

*Argenv. conch. t. 11. f. B.*

*Habitat - -*

Olearius. 621. T. testa imperforata convexa obtusa angulato-lævi.  
*Rond. test. 96.*

*Bonan. recr. 3. t. 9.*

*Gualt. test. t. 68. f. A.*

*Argenv. conch. t. 20. f. B.*

*Klein. ostr. t. 7. f. 125.*

*Habitat in India.*

*Testas tantum reformatas vidimus, easque maximas solidissimasque.*

\* \* \* Solidi umbilico perforato.

Pica. 622. T. testa umbilicata conico-rotundata lævi, denticulo umbilicali. *M. L. U. 655. n. 346. \**

*Bonan. recr. 3. t. 29, 30.*

*Rumph. mus. t. 21. f. A.*

*Gualt. test. t. 68. f. B.*

*Argenv. conch. t. 11. f. G. Pica.*

*Pet. gaz. t. 70. f. 9.*

*List. conch. t. 640. f. 30.*

*Adansf. seneg. 1. t. 12. f. 7.*

*Regensf. conch. t. 6. f. 66. ♂ t. 11. f. 57.*

*Habitat in M. Sardinico.*

*Umbilicus canali duplici obtuso.*

sanguineus. 623. T. testa subumbilicata conico-convexa striata lævi: anfractibus subfulcatis.

*Habitat in M, Mediterraneo ad littora Algirie. E. Brander.*

*Testa magnitudine Pisi, sanguinea, convexa, anfractibus obtuse sulcata; umbilicus aliis perforatus, aliis nequaquam.*

624. T.

---

*Cochlea farmatica, Thevet, Cosm. 120. & ex eo aliorum, fabulosa est.*

Argyro- 624. T. testa umbilicata subovata exarata lineis dorsalibus  
stomus. elatioribus transverse striatis. *M. L. U.* 656. n. 347.\*

*List. conch. t. 584. f. 40.*

*Rumph. mus. t. 19. f. 3.*

*Gualt. test. t. 64. f. D.*

*Argenv. conch. t. 9. f. F.* Os argenteum.

*Seb. mus. 3. t. 74. f. 6.*

*Regenf. conch. t. 10. f. 43.*

*Habitat in M. Indico.*

*Affinitas summa T. cochli, sed umbilicatus fauce argentea.*

margari- 625. T. testa umbilicata subovata lineis dorsalibus elatio-  
raceus. ribus laevibus. *M. L. U.* 656. n. 348. \*

*Bonan. recr. 3. t. 11.*

*Rumph. mus. t. 19. f. 3.*

*Argenv. conch. t. 9. f. A.*

*Seb. mus. 3. t. 74. f. 3.*

*Habitat - -*

*Testa Similis T. Argyrostomo, sed albido-virens maculis fuscis, nec purpurascens aut ferrugineas.*

Delphi- 626. T. testa umbilico hispido, anfractibus spinis ramosis.  
nus. *M. L. U.* 657. n. 349. \*

*Grew. mus. t. 11, f. 5, 6.*

*Bonan. recr. 3. t. 31.*

*Rumph. mus. t. 20. f. H.* Cochlea laciniata.

*Pet. amb. t. 3. f. 1.*

*Gualt. test. t. 68. f. C.*

*Argenv. conch. t. 9. f. H.* Delphinus.

*Seb. mus. 3. t. 58. f. 1-27.*

*Regenf. conch. t. 3. f. 14.*

*Habitat in O. Asiatico.*

distortus. 627. T. testa umbilicata submucronata undique spinis laevibus. *M. L. U.* 657. n. 350. \*

*List. conch. 4. f. 6. c. 6. t. 1. f. 1, 2.*

*Gualt. test. t. 68. f. D.*

*Habitat - -*

*Varietas procul dubio antecedentis.*

\* \* \* \* Cancellati.

crenellus. 628. T. testa umbilico patente planiuscula, anfractibus teretibus: striis crenatis.

*Habitat - -*

Testa

Testa magnitudine seminis Lupini, rufa, solida, supra plano-convexa, subtus umbilico-patentissimo concava. Anfractus teretes, longitudinaliter striati, striis crenatis.

Thermalis. 629. T. testa umbilicata oblongiuscula obtusa, anfractibus teretibus lævibus.

Habitat prope Thermas Pisanas, in aquis dulcibus.

Testa semine Brassicæ paulo major, alba. Anfractus teretes, quaterni. Apertura orbicularis. Umbilicus minutus.

Scalaris. 630. T. testa cancellata conica, anfractibus distantibus.

M. L. U. 658. n. 351. \*

Rumph. mus. t. 49. f. A. Scalare Wenteltrap.

Pet. amb. t. 2. f. 9.

Gualt. test. t. 10. f. ZZ.

Argenv. conch. t. 14. f. V. Scalaris.

Habitat - -

Varietas fere sequentis, sed magnitudine, anfractibus omnino distantibus, solisque cingulis connexis differt; preciosissimus artis perditæ luxus.

Clathrus. 631. T. testa cancellata turrata exumbilicata, anfractibus contiguis lævibus. Fn. Svec. 2170. M. L. U. 658. n. 352. \*

Rond. test. 89. f. 5.

List. conch. t. 588. f. 51.

Bonan. recr. 3. t. 111.

Rumph. mus. t. 29. f. W. Buccinum scalare.

Gualt. test. t. 58. f. H.

Klein. ostr. t. 3. f. 66.

Planc. conch. t. 5. f. 7, 8.

Ginan. adr. 2. t. 6. f. 54.

Habitat in O. Europæo, Americano, Islandico, Mediterraneo. Purpura violacea veterum, nec punicea, ab hoc desumpta. Plancus.

Hæc habet cingula longitudinalia in infimo anfractu versus basin convexa mediante carinula, quod neque T. Scalaris, neque ambiguus obtinet; præterea cingula membranacea longitudinaliter huic 12 f. 16, cum in Sculari 8, in ambigua 30 adsint.

ambiguus. 632. T. testa cancellata turrata umbilicata, anfractibus contiguis lævibus.

Habitat in M. Mediterraneo.

K k k k

Simil-

Simillima *T. Clathro*, a quo differt membranis duplo pluribus, anfractibus ipsis non albis, sed palliatis, 2 f. 3 lineis ferrugineis secundum anfractus pictis & basi umbilicata.

crenatus. 633. *T. testa subcancellata turrita: anfractibus contiguis supra crenatis. M. L. U. 659. n. 353. \**  
*Habitat - -*

lacteus. 634. *T. testa cancellata turrita: striis longitudinalibus elevatis confertis.*  
*Ginan. adr. 2. t. 6. f. 55.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*  
*Testa similis T. Clathro, sed minor Gr. Hordei, striis elevatis, nec tamen membranaceis, & valde confertis; nivea.*

striatulus. 635. *T. testa subcancellata turrita: anfractibus contiguis cingulisque varicosis interceptis.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*  
*Testa magnitudine seminis Hordei, alba, anfractibus cinctis striis membranaceis parvis, passimque rugis convexis callosis. Apertura minus orbiculata, fere obovata & subtus subangulata.*

Uva. 636. *T. testa cancellata ovata obtusa: anfractibus contiguis: striis longitudinalibus imbricatis. M. L. U. 659. n. 354. \**  
*Pet. gaz. t. 27. f. 2. Olivaris striata fasciata.*  
*Bonan. recr. 3. t. 140.*  
*Gualt. test. t. 58. f. D.*  
*Seb. mus. 3. t. 55. f. 21. n. a-b.*  
*Habitat - -*  
*Apertura unidentata.*

corneus. 637. *T. testa umbilicata rotundata acutiuscula: anfractibus teretiusculis decussato-striatis, apertura reflexa. M. L. U. 660. n. 355. \**  
*Habitat - -*

reflexus. 638. *T. testa umbilicata convexo-prominula, anfractibus teretibus substriatis, apertura reflexa.*  
*Habitat in Europa australi.*



Lincina. 639. T. testa oblonga obtusa rugoso - striata, apertura limbo dilatato plano crenato.

*List. conch. t. 26. f. 24.*

*Sloan. jam. 2. t. 240. f. 12, 13.*

*Klein. ostr. t. 3. f. 71.*

*Brown. jam. t. 40. f. 5.*

*Habitat in Jamaica. Terrestris.*

\* \* \* \* \* Turriti proprie dicti.

imbrica- 640. T. testa turrita: anfractibus deorsum Imbricatis. *M.*  
tus. *L. U. 660. n. 356. \**

*Gualt. test. t. 58. f. E.*

*Seb. mus. 3. t. 56. f. 32.*

*Habitat in Jamaica.*

replicatus. 641. T. testa turrita lævi: anfractibus sursum imbricatis.  
*M. L. U. 661. n. 357. \**

*Argenv. conch. t. 14. f. E.*

*Habitat - -*

acutangulus. 642. T. testa turrita: anfractibus carina unica majore a-  
cuta. *M. L. U. 661. n. 358. \**

*Bonan. recr. 3. t. 117.*

*Gualt. test. t. 58. f. B.*

*Habitat - -*

duplica- 643. T. testa turrita: anfractibus carinis duabus acutis.  
tus. *M. L. U. 662. n. 359. \**

*Bonan. recr. 3. t. 114.*

*List. angl. 160. t. 3. f. 7.*

*Gualt. test. t. 58. f. C.*

*Argenv. conch. t. 14. f. C. Torculum.*

*Seb. mus. 3. t. 56. f. 7, 8.*

*Habitat in O. Europæo.*

exoletus. 644. T. testa turrita: anfractibus carinis duabus obtusis  
distantibus.

*Bonan. recr. 3. t. 113.*

*Habitat in Europa australi.*

Terebra. 645. T. testa turrita: anfractibus carinis sex acutis. *Fu.*  
*svec. 2171. M. L. U. 662. n. 360. \**

K k k k 2

Column.

---

*Turriculæ anfractuum genus non constituunt; sed militans sub Murice, Strombo, Buccino, Tracho, Turbine,*

*Column. aqv. t. 53. f. 2.*  
*Bonan. recr. 3. t. 115.*  
*Rumph. musf. t. 30. f. M.*  
*Gualt. test. 58. f. A.*  
*Argenv. conch. t. 14. f. D.*  
*Adans. seneg. 1. t. 10. f. 6.*  
*Seb. musf. 3. t. 56. f. 40.*  
*Habitat in O. Europæo.*

variegatus. 646. T. testa turrita, anfractibus planiusculis: striis septem obsoletis.

*Bonan. recr. 3. t. 112.*  
*Seb. musf. 3. t. 56. f. 26, 34, 31, 33.*  
*Habitat - -*

ungulatus. 647. T. testa turrita: anfractibus striis decem exoletis.

*Habitat in O. Europæo.*

annulatus. 648. T. testa turrita: anfractuum sutura marginata prominente. †

*Gualt. test. t. 58. f. L.*  
*Habitat - -*

bidens. 649. T. testa turrita pellucida: anfractibus contrariis, sutura subcrenata, apertura postice bidentata.

*Bonan. recr. 3. t. 41. Aucta.*  
*Gualt. test. t. 4. f. C.*  
*Habitat in Europa australi; terrestris.*

perversus. 650. T. testa turrita pellucida: anfractibus contrariis, apertura edentula. *Fn. succ. 2172. \**

*List. angl. 124. t. 2. f. 11.*  
*Habitat in Europæ muscosis; terrestris.*

muscorum. 651. T. testa ovata obtusa pellucida: anfractibus senis secundis; apertura edentula. *Fn. succ. 2173. \**

*It. æl. 99.*  
*List. angl. 121. t. 2. f. 6.*  
*Habitat in Europæ muscosis; terrestris.*

auriscalpi. 652. T. testa turrita alba lævissima, apertura labio porrecto planiusculo concavo obtuso.

*Argenv. conch. t. 32. f. 19?*  
*Habitat in M. Mediterraneo. F. Logie.*

*Testa*

*Testa subulata, lactea, glaberrima, 7 f. 8 spirarum. Apertura dilatata auriscalpium referens; Labro porrecto, obtuso, concavo, marginato.*

politus. 653. T. testa turrita imperforata glaberrima, apertura ovata. *Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa Gr. Hordei magnitudine, albissima, opaca nec pellucida, nitidissima, anfractibus linea excavata tenui interstinctis.*

Nautilus. 654. T. testa planiuscula anfractibus annulatis dorso cristatis. † *Syst. nat. 10. p. 709. n. 234. Nautilus crista.*

*Act. belv. 4. p. 212. t. 9. f. 21, 22.*

*Rœf. inf. 3. p. 599. t. 97. f. 7.*

*Habitat in Ceratophyllo Germaniæ, Helvetiæ; minutus.*

### 328. HELIX. *Animal* Limax.

*Testa univalvis, spiralis, subdiaphana, fragilis.*

*Apertura coarctata, intus lunata f. subrotunda: segmento circuli demto.*

\* Ancipites, *testa longitudinaliter utrinque angulata.*

Scarbæus. 655. H. testa ovata subancipiti, apertura dentata. *M. L. U. 663. n. 361. \**

*List. conch. 4. f. 5. c. 5. t. 1. f. 1, 2.*

*Bonan. recr. 3. t. 385.*

*Rumph. mus. 91. t. 27. f. I. Cochlea imbrium.*

*Pet. gaz. t. 4. f. 10.*

*Gualt. test. t. 4. f. S.*

*Argenv. conch. t. 12. f. T.*

*Klein. ostr. t. 1. f. 23.*

*Habitat in Asiæ montibus.*

\* \* Carinatæ *anfractibus margine acuto.*

Lapicida. 656. H. testa carinata umbilicata utrinque convexa, apertura marginata transversali ovata. *Fn. suec. 2174. \**

*M. L. U. 362. \**

*It. wgstb. 27.*

*List. angl. 126. t. 2. f. 14.*

*Habitat in Europæ rupibus terrestribus; ut Larvæ lignum, sic calcem rodens.*

K k k k 3

657.

- Oculus capri. 657. *H. testa subcarinata umbilicata convexa, apertura marginata. M. L. U. 664. n. 363. \**  
*Rumph. mus. t. 27. f. O?*  
*Argenv. conch. t. 11. f. F.*  
*Pet. gaz. t. 76. f. 6.*  
*Habitat in Aliæ arboribus.*
- Albella. 658. *H. testa carinata umbilicata planiuscula: subtus gibba, apertura semicordata. Fn. succ. 2175. \**  
*It. æl. 65.*  
*Gualt. test. t. 3. f. Q.*  
*Habitat in Europæ rupibus.*
- striatula. 659. *H. testa subcarinata umbilicata convexa striata, subtus gibbosiore, apertura subrotundo-lunata.*  
*Habitat Algeriæ. E. Brander.*  
*Testa grisea anfractibus transverse striatis. Umbilicus patulus.*
- algebra. 660. *H. testa subangulata umbilicata convexa: anfractibus senis, umbilico pervio.*  
*Habitat in Mauritania. E. Brander.*  
*Differt a priori anfractibus 6, nec 4; umbilico patentissimo, nec tenui; anfractuum angulo obsoleto, nec patulo.*
- Leucas. 661. *H. testa subcarinata umbilicata convexa lævi: subtus gibbosa, umbilico minutissimo, apertura subrotundo-lunata.*  
*Habitat in Africa. E. Brander.*  
*Testa albida: supra fascia; subtus lineis purpurascens.*
- Planorbis. 662. *H. testa subcarinata umbilicata plana: supra concava, apertura oblique ovata utrinque acuta. Fn. succ. 2176. \**  
*List. angl. 145. t. 3. f. 27. - - conch. 2. t. 138. f. 42.*  
*Pet. gaz. t. 10. f. 11.*  
*Gualt. test. t. 4. f. EE.*  
*Klein. ostr. t. 1. f. 8.*  
*Habitat in Europæ stagnis.*
- complanata. 663. *H. testa deorsum carinata umbilicata convexa: subtus plana, apertura semicordata. Fn. succ. 2177. \**  
*Habitat in Europæ aquis dulcibus.*

- ringens. 664. H. testa subcarinata imperforata convexa, apertura resupinata: labio postice quadruplicato.  
*Bonan. recr. 3. t. 330.*  
*Argenv. conch. t. 32. f. 13.*  
*Habitat - - e Museo Tessiniano.*  
*Testa magnitudine H. lapicida, sed magis convexa, livida, anfractu in medio carinato albo. Apertura H. Caricollæ, extrorsum dilatato-marginata, elongata. Labio postico intus plicis 4, antico duabus.*
- Carocol- 665. H. testa carinata imperforata utrinque convexa. *M.*  
 la. *L. U. 664. n. 364. \**  
*Argenv. conch. t. 11. f. D. Lucerna antiqua.*  
*Habitat - - terrestris.*  
*Simillimus H. Lapicidæ, sed magnitudine volæ manus, nec ut illa, tantum extimi digiti.*
- Cornu 666. H. testa subcarinata imperforata convexa, apertura  
 militare. papulo-marginata. *M. L. U. 665. n. 365. \**  
*Gualt. test. t. 3. f. I.*  
*Habitat - - ; terrestris.*  
*Testa alba apertura fulva quasi e pigmenta illito.*
- Vortex. 667. H. testa carinata: supra concava, apertura ovali  
 plana. *Fn. svec. 2172. \**  
*List. angl. 145. t. 2. f. 28.*  
*Gualt. test. t. 4. f. GG.*  
*Habitat in Europæ stagnis.*
- scabra. 668. H. testa subcarinata imperforata ovata acuminata striata.  
*Habitat - -*  
*Testa fasciis fuscis dissectis: in inferiore anfractu linea elevata.*
- gothica. 669. H. testa carinata utrinque convexa cornea: fasciis  
 subferrugineis.  
*Habitat in Sveciæ nemoribus.*
- Gualtie- 670. H. testa carinata imperforata depressa decussatim stria-  
 rana. ta, apertura utrinque acuta. \*  
*Gualt. test. t. 68. f. E.*  
*Habitat - -*
- \* \* \* Rotundatæ anfractibus & umbilicatæ.
- cornea. 671. H. testa supra umbilicata plana nigricante, anfractibus  
 quatuor teretibus. *Fn. sv. 2179. \* M. L. U. 665. n. 366. \**  
*List.*

*List. angl.* 143. t. 2. f. 26. - - *exercit.* 2. p. 59.

*Gualt. test.* t. 4. f. DD.

*Argenv. conch.* t. 31. f. 7. c.

*Habitat in Europæ aquis dulcibus.*

*Spirorbis.* 672. H. testa utrinque concava plana albida, anfractibus quinque teretibus. *Fn. suec.* 2180. \*

*Habitat in Europæ Lacubus, magnitudines Sem. Anetbi.*

*contorta.* 673. H. testa subumbilicata plana utrinque æquali, apertura lineari arcuata. *Fn. suec.* 2181. \*

*Habitat in Europæ stagnis supra plantas.*

*Cornu arietis.* 674. H. testa umbilicata planiuscula, apertura ovali. *M. L. U.* 666. n. 367. \*

*List. conch.* t. 136. f. 40. Cochlea marina compressa.

*Klein. ostr.* t. 1. f. 7.

*Seb. mus.* 3. t. 39. f. 14, 15.

*Habitat in Europa; fluviatilis.*

*Alba cingulis duobus ferrugineis.*

*hispida.* 675. H. testa umbilicata convexa hispida diaphana, anfractibus quinque, apertura subrotundo-lunata. *Fn. suec.* 2182. \*

*Habitat in Svecia; terrestris.*

*ampullacea.* 676. H. testa subumbilicata subglobosa glabra, anfractibus supra ventricosioribus, umbilico subobscuro, apertura ovato-oblonga. *M. L. U.* 666. n. 368. \*

*Rumph. mus.* t. 27. f. Q.

*Gualt. test.* t. 1. f. R.

*Seb. mus.* 3. t. 38. f. 1-5, 58, 59.

*Habitat in Asia; terrestris.*

*Pomatia.* 677. H. testa umbilicata subovata obtusa decolore, apertura subrotundo-lunata. *Fn. suec.* 1283.

*Bonon. recr. pag.* 221. cum. figur.

*Gesn. aqu.* 255. Pomatia.

*Aldr. exsangu.* 389. Cochlea terrestris gypso obserata.

*List. angl.* 111. t. 2. f. 1.

*Swamm. bibl.* t. 4. f. 2.

*Gualt. test.* t. 1. f. A.

*Argenv. conch.* t. 32. f. 1. Pomatia.

*Habitat in Angliæ, Galliæ nemoribus.*

- glauca. 678. *H. testa umbilicata subrotunda acuminata, labro marginato, apertura ovali. M. L. U. 668. n. 369.\**  
*Habitat - -*
- citrina. 679. *H. testa umbilicata convexa obtusa flavescente: fascia fusca. M. L. U. 667. n. 370.\**  
*Gualt. test. t. 2. f. D.*  
*Argenv. conch. t. 32. f. 10.*  
*Sch. mus. 3. t. 39. f. 1-6.*  
*Habitat in Jamaica australi; terrestris.*
- arbutorum. 680. *H. testa umbilicata convexa acuminata, apertura suborbiculari bimarginata: antice elongata. Fn. succ. 2184.\* M. L. U. 668. n. 371.\**  
*List. angl. 119. t. 2. f. 4 - - conch. 1. n. 52.*  
*Argenv. conch. t. 32. f. 8.*  
*Habitat in Europæ arbusculis.*
- zonaria. 681. *H. testa umbilicata convexa depressiuscula, apertura oblongiuscula marginata.*  
*Gualt. test. t. 3. f. L. LL.*  
*Habitat in Europa australi; terrestris.*  
*Testa magnitudine H. nemoralis, anfractibus 4, convexa spira depressiuscula, alba aut flavescent: ventre fasciis 2, spira vero unica ferruginea. Apertura extrorsum oblonga margine patente. Umbilicus ad apicem usque perforatus.*
- ungulina. 682. *H. testa umbilicata convexa, apertura marginata suborbiculata: supra elongata. M. L. U. 668. n. 372.\**  
*Rumph. mus. t. 27. f. R. Lapillus.*  
*Pet. gaz. t. 1. f. 6. Planorbis indica.*  
*Klein. ostr. t. 1. f. 11.*  
*Habitat in India.*
- itala. 683. *H. testa umbilicata convexa obtusa: anfractibus 5 teretibus, umbilico patulo, apertura suborbiculata.*  
*Habitat in Europa australi; terrestris.*  
*Testa albida, fascia una fusca; magnitudo Coryli.*
- lusitanica 684. *H. testa umbilicato-perforata convexa obtusa, anfractibus quinque teretibus flavescenti-albidis, umbilico patulo.*  
*Gualt. test. t. 2. f. T.*  
 K k k k 5 *Habi-*

*Habitat in Europa australi; terrestris.*

*Magnitudo minoris Pomi, alba absque fascia, dorso levissime flavescens. Anfractus rotundi angulo omnino obsoleto, ubi anfractus superne affigendi.*

mammil- 685. H. testa umbilicata ovata, anfractibus tribus striatis, laris. apertura ovata apici adnata.

*Argenv. conch. t. 31. f. lin. 2. n. 7. Nimis mucronata.*

*Habitat in Africa fluviiis.*

*Testa similis Neritæ mammillæ, sed transverse confertim subtilissime, longitudinaliter vero remotius striata. Apertura magna, ovata labro interiore antice anfractui adnato.*

hispana. 686. H. testa umbilicata convexa, anfractibus 5 teretibus, umbilico tenui-perforato, apertura suborbiculata.

*Habitat in Europa australi.*

*Testa colore corneo.*

lutaria. 687. H. testa umbilicata ovato-oblonga: interne coloratior, apertura subovata. M. L. U. 669. n. 373.\*

*Habitat - -*

\* \* \* \* Rotundatæ imperforatæ.

perversa. 688. H. testa subumbilicata ovato-oblonga contraria sulphurea. M. L. U. 669. n. 374. \*

*Grew. mus. t. 10. f. 9.*

*Bonan. retr. 3. t. 116.*

*Pet. gaz. t. 44. f. 7.*

*Gualt. test. v. 5. f. P. O.*

*Argenv. conch. t. 12. f. G. Unique.*

*Habitat - - fluvialis. Variat colore flavo & corneo.*

janthina. 689. H. testa subimperfecta subrotunda obtusa diaphana fragilissima, apertura postice dilatata, labro emarginato. M. L. U. 670. n. 375. \*

*Column. aquat. 23. t. 22.*

*purp. t. 13. f. 2.*

*Bonan. retr. 3. t. 5.*

*Sloan. jam. t. 1. f. 4. & t. 572. f. 23.*

*Rumph. mus. t. 20. f. 2.*

*Gualt. test. t. 64. f. O.*

*Ad. angl. 301. p. 2051. Cochlea colore speciosior.*

*Brown.*



*Brown. jam.* 399. t. 39. f. 1. Cochlea purpurea tenuis, ore ampliore

*Habitat in Europa, Asia, Africa; in M. Mediterraneo frequentior; etiam pelagica.*

*Animalculum vivum madet sanie violacea, manus altrestantis inficiente.*

**Vivipara.** 690. H. testa imperforata subovata obtusa cornea: cingulis fuscatis, apertura suborbiculari. *Fn. succ.* 2185.\*

*List. angl.* 133. t. 2. f. 18. - - *exerc.* 2. p. 17. t. 2. *conch.* 2. t. 126. f. 26.

*Gualt. test.* t. 5. f. 1.

*Swamm. bibl.* t. 9. f. 3.

*Seb. mus.* 3. t. 38. f. 12.

*Habitat in Europæ stagnis, argillosis imprimis.*

**nemoralis.** 691. H. testa imperforata subrotunda lævi diaphana fasciata, apertura subrotundo-lunata. *Fn. succ.* 2186.

*M. L. U.* 670. n. 376. \*

*It. æl.* 127.

*It. wgoth.* 84.

*List. angl.* 116. t. 2. f. 3. - - *conch.* t. 1. n. 53.

*Pet. mus.* 5. n. 14.

*Gualt. test.* t. 1. f. P.

*Habitat in Europæ arboribus.*

**lucorum.** 692. H. testa imperforata subrotunda lævi fasciata, apertura oblonga fusca.

*Gualt. test.* t. 1. f. C.

*Habitat in Europæ arboribus.*

**grisea.** 693. H. testa imperforata subovata obtusa grisea: fasciis duabus pallidis, apertura oblongiuscula.

*Gualt. test.* t. 1. f. B.

*Habitat in Europa australi; terrestris.*

*Svecica triplo minor australi.*

**Hæmastoma.** 694. H. testa imperforata subrotunda fusca: fascia longitudinali alba, apertura purpurea. *M. L. U.* 671.

n. 377. \*

*Habitat - -*

\* \* \* \* \* **Turritæ.**

**decollata.** 695. H. testa imperforata turrita: spira mutilato-truncata, apertura obovata. *M. L. U.* 671. n. 378. \*

*Bonan.*

*Bonan. recr. 3. t. 56.*

*Pet. gaz. t. 66. f. 1.*

*Gualt. test. t. 4. f. O. P. Q.*

*Argæuv. conch. t. 31. f. 5.*

*Habitat in Europa australi, Oriente; terrestres.*

*Testa apice transversim abscissa & consolidata est.*

subcylindrica. 696. H. testa imperforata turrata subcylindrica obtusa, anfractibus quatuor, apertura ovali.

*Habitat in aquis dulcibus Europæ borealis.*

*Testa magnitudine grani secalis, cornea, pallida. Anfractus 4. Apex obtusissimus, rotundatus. Umbilicus nullus. Apertura ovalis, margine interiore reflexo.*

stagnalis. 697. H. testa subperforata subturrata, anfractibus quinque, apertura ovata.

*Baister. subsf. 2. p. 77. t. 7. f. 4. Turbo stagnalis.*

*Habitat in aquis dulcibus. D. Baister.*

*Testa magnitudine vix grani secalis, cornea, pallida, ovato-oblonga, acutiuscula. Umbilicus adeo parvus ut fere nullus. Apertura ovata marginata.*

octona. 698. H. testa subperforata turrata, anfractibus octo, apertura subrotunda.

*Gualt. test. t. 6. t. BB.*

*Habitat in Sveciæ subpaludosis.*

*Testa magnitudine grani Secalis, cornea, Umbilicus adeo obsolete perforatus, ut vix constet utrum vere perforatus dicendus. Apertura fere orbiculata.*

pella. 699. H. testa imperforata ovata acuminata transverse striata fusca: fasciis flavis.

*Habitat in Islandia. Zæga.*

*Testa ovato-oblonga, decumbens magnitudine Lithospermi seminis, fusco-ferruginea, anfractibus transverse striatis. Fascia in primo anfractu duplex; in reliquis simplex ad eorum basin. Apertura semiovata.*

\* \* \* \* \* Ovata imperforata.

Pupa. 700. H. testa subimperfecta ovato-oblonga rudi, anfractibus senis, apertura lunato-oblonga.

*Habitat in Mauritania. E. Brander.*

- barbara. 701. H. testa imperforata oblonga rudi: anfractibus octo-  
nis, apertura subrotundo-lunata.  
*Habitat* Algeriæ. E. Brander.  
*Testa præcedenti similis, sed dimidio minor f. Hordei*  
*semine paulo major; infima apertura subtus sæpe fa-*  
*scia grisea cincta.*
- Amarula. 702. H. testa imperforata oblonga, anfractibus spinoso-  
dentatis. M. L. U. 672. n. 379. \*  
*Rumph. mus. t. 33. f. FF.. Voluta fluviatilis.*  
*Argenv. conch. t. 31. f. 6. β.*  
*Habitat in Asiæ fluviiis.*
- stagnalis. 703. H. testa imperforata ovato-subulata subangulata,  
apertura ovata. Fn. succ. 2188. \*  
*Pet. mus. 82. n. 85.*  
*List. angl. 137. t. 2. f. 21. -- conch. 2. t. 123. f. 21.*  
*Gualt. test. t. 5. f. I.*  
*Frisch. inf. 8. t. 7.*  
*All. helv. 5. p. 283. n. 4. t. 3. f. 25, 26.*  
*Habitat in Europæ stagnis.*
- fragilis. 704. H. testa imperforata ovato-subulata tereti pellucida,  
apertura ovato-oblonga. Fn. succ. 2187. \*  
*Habitat in Europa.*
- putris. 705. H. testa imperforata ovata obtusa flava, apertura o-  
vata. Fn. succ. 2189. \*  
*Bonan. recr. 6. t. 54?*  
*Tulp. obs. 210. t. 201.*  
*List. angl. 140. t. 2. f. 24. -- conch. 2, 123. f. 23.*  
*Klein. ostr. t. 3. f. 70.*  
*Gualt. test. t. 5. f. 5.*  
*Habitat in Europæ stagnis.*
- limosa. 706. H. testa imperforata oblongiuscula pellucida acuta,  
apertura ovata. Fn. succ. 2190.  
*Gualt. test. t. 5. f. H.*  
*Habitat in Europæ paludibus.*
- tentacula- 707. H. testa imperforata ovata obtusa impura, apertura  
ra. subovata. Fn. succ. 2191. \*  
*Bonan. recr. 3. t. 201.*  
*List. angl. 135. t. 2. f. 19. -- conch. 642. f. 33-35.*  
*Klein. ostr. t. 2. f. 53. 54.*  
Adams.

*Adans. seneg.* 1. t. 12. f. 1.

*Habitat in Europæ stagnis.*

**Auricula-** 708. *H. testa imperforata ovata obtusa, spira acuta brevissima, apertura ampliata. Fn. suec.* 2192.

*Gvalt. test. t. 5. f. F.*

*List. angl.* 139. t. 2. f. 23. - - *exerc.* 2. p. 54.

*conch.* 2. t. 123. f. 32.

*Argenv. conch.* t. 31. f. 7. *bona.*

*Klein. ostr.* 54. t. 3. f. 69.

*Alt. helv.* 5 p. 283. n. 5. t. 3. f. 27. 28.

*Habitat in Europæ fluviiis, stagnis.*

**lævigata.** 709. *H. testa imperforata obovata obtusissima pellucida lævissima.*

*Habitat - -*

*Testa magnitudine Pisi, pellucida, lævissima, nitida, obovata, obtusissima. Umbilicus vix ullus. Apertura magna, subinnata, postice elongata. Color cornu fivis obsoletis, longitudinalibus, obscurioribus; Labio interiore albo.*

**balthica.** 710. *H. testa imperforata ovata acuminata, rugis elevatis, apertura ovata ampliata. Fn. suec.* 2193. \*

*It. gotl.* 261.

*Habitat ad M. Balthici littora.*

**Neritoida.** 711. *H. testa imperforata convexa longitudinaliter striata, rima umbilicali, apertura subrotunda. Musf. L. U.*

*672. n. 380. \**

*Gvalt. test. t. 64. f. I.*

*Habitat - -*

*Testa livida.*

**perspicua.** 712. *H. testa imperforata convexo-ovata, labro nullo, apertura ad apicem usque hiant. M. L. U.* 673. n. 381. \*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa lactea, pellucida, in apicem usque perspicua, ut Haliotis, sed tragus non perforatus; inter Helices & Bullas media.*

**Haliotoida.** 713. *H. testa imperforata depresso-planiuscula striis undatis, apertura ovali dilatata usque in apicem. Musf. L. U.* 673. n. 382. \*

*Pet.*

*Pet. gaz. t. 12. f. 4.*  
*Rumph. mus. t. 40. f. R.*  
*Gualt. test. t. 69. f. F.*  
*Argenv. conch. t. 7. f. D. C.*  
*List. conch. t. 570. f. 21.*  
*Bonau. kirch. 475. n. 404.*  
*Klein. ostr. t. 7. f. 114.*  
*Adans. seneg. t. 2. f. 2.*  
*Habitat in M. Mediterraneo, Americano, Asiatico.*

ambigua. 714. H. testa subimperfiorata convexa: fulcis remotis compressis, apertura semiorbiculari.

*Adans. seneg. 1. t. 13. f. 1.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa parva Neritæ, alba, convexa; spira lateralis, obtusa, tota cingitur lineis remotis 6 ad 8 compressis, elevatis: apertura semiorbiculari, hinc etiam Nerita, modo Labium interius non esset reflexum; umbilicus perforatus est in junioribus, in adultioribus vero nullus.*

### 329. NERITA. *Animal* Limax.

*Testa univalvis, spiralis, gibba, sub-rus planiuscula.*

*Apertura semiorbicularis: labio columellæ transverso, truncato, planiusculo.*

\* Umbilicatæ.

Canrena. 715. N. testa umbilicata lævi, spira submucronata, umbilico gibbo bifido. *M. L. U. 674. n. 383.\**

*Bonau. recr. t. 224, 228.*

*Rumph. mus. t. 22. f. C. Valvata.*

*Gualt. test. t. 67. f. E, Q, R, S, V, X.*

*Argenv. conch. t. 10. f. C.*

*Regensf. conch. 10. t. 3 f. 34.*

*Adans. seneg. 1. t. 13. f. 3.*

*Habitat in O. Asiæ, Africæ.*

glaucina. 716. N. testa umbilicata lævi, spira obtusiuscula, umbilico semiclauso: labio gibbo dicolori. *Fn. succ. 2197.\**

*M. L. U. 674. n. 384.\**

*Rumph.*

*Rumph. mus. t. 22. f. A. Valvata lævis.*

*Gualt. test. t. 67. f. M, P, T.*

*List. angl. 163. t. 3. f. 10.*

*Adans. seneg. 1. t. 13. f. 14.*

*Habitat in O. Europæo, Africano.*

Vitellus. 717. N. testa umbilicata subglobosa, umbilico perforato æquali.

*Rumph. mus. t. 22. f. D. Valvata 5.*

*Habitat in O. Asiæ.*

Albu- 718. N. testa umbilicata convexa, umbilico subcordato:  
men. lobo explanato. *M. L. U. 675. n. 385. \**

*List. conch. 4. f. 5. c. 3. f. 1, 2.*

*Rumph. mus. t. 22. f. B. Vitellus compressus.*

*Gualt. test. t. 67. f. A, B.*

*Argenv. conch. t. 10. f. T.*

*Regens. conch. 20. t. 5. f. 54.*

*Habitat in O. Asiæ.*

Mammil- 719. N. testa umbilicata ovata glabra, umbilico oblecto,  
la. apertura ovata. *M. L. U. 675. n. 386. \**

*Column. aqu. t. 52. f. ult. Cochlea nivea.*

*List. conch. 4. f. 5. c. 3. t. 1. f. 3, 4.*

*Rumph. mus. t. 22. f. F. Valvata 7: Albula.*

*Gualt. test. t. 67. f. C, D.*

*Argenv. conch. t. 10. f. X. Uber tenue.*

*Seb. mus. 3. t. 38. f. 9, 10.*

*Habitat ad Barbados, Alexandriæ.*

*Umbilicus in aliis perforatus pallida; in aliis crassiusculus, totus oblectus, alba. Labium interius non transversale, sed oblongius est.*

\* \* Imperforatæ labio edentulo.

Corona. 720. N. testæ anfractibus coronatis spinis, labiis edentulis. *M. L. U. 676. n. 387. \**

*Rumph. mus. t. 22. f. O. Valvata spinosa.*

*Pet. amb. t. 3. f. 4.*

*Argenv. conch. t. 10. f. 2.*

*Habitat in Asiæ fluviss.*

Radula. 721. N. testa sulcata tuberculis æqualibus, labiis edentulis. *M. L. U. 676. n. 388. \**

*Habitat - -*

722. N.

- cornea. 722. N. testa obsolete striata, labiis edentulis. *M. L.*  
*U.* 677. n. 389. \*  
*Argenv. conch. t.* 10. f. *M.*  
*Habitat* - -
- fluvialis. 723. N. testa rugosa, labiis edentulis. *Fn. suec.* 2194.\*  
*List. angl.* 136. t. 2. f. 20.  
*conch.* 2. p. 1. t. 38.  
*Pet. mus.* 67. n. 718.  
*Habitat in Europæ cataractis.*
- littoralis. 724. N. testa lævi, vertice carioso, labiis edentulis. *Fn.*  
*suec.* 2195. \*  
*It. æl.* 261.  
*List. angl.* 164. t. 2. f. 3.  
*conch. t.* 4. f. 8. f. 39.  
*Pet. mus.* 67. n. 717.  
*Gualt. test. t.* 4. f. *LL.*  
*Habitat ad Maris Europæi littora scopulosque, modis*  
*innumeris variegata; eadem minor in lacubus dulcibus.*
- lacustris. 725. N. testa læviuscula cornea, apice exquisito, labiis  
 edentulis. *Fn. suec.* 2196.  
*Gualt. test. t.* 4. f. *MM.*  
*Habitat in Europæ lacubus & Fontibus calidis.*  
*Testa similis N. littorali, sed cornea, nec vertice ca-*  
*rioso.*
- \* \* \* Imperforatæ labio dentato.
- pulligera. 726. N. testa lævi rudi, spirula excavato - oculata, la-  
 bio interiore lævi crenulato.  
*Rumph. mus.* 76 t. 22. f. *H.* Valvata 10 fluvialis.  
*Habitat in Indiæ fluviis; pullos in dorso testæ gerit.*  
*Testa similis fluviali, sed quadruplo major, rudis,*  
*fusca s. cornea, læviuscula, opaca. Spiræ locus*  
*marginè prominulo acuto cinctus & excavatus. Faux*  
*pallida, flavicans absque striis. Labium interius*  
*planum, crenulatum. Dorsum testæ sape notatum*  
*cicatricibus pallidis, quolibet, margine albo cinctis,*  
*a casu pullorum, qui supra dorsum excluduntur.*
- pupa. 727. N. testa lævi subrotunda lactea, anfractuum striis  
 transversis nigris parallelis.  
*Habitat* - -

Media inter *N. littoralem* & *virgineam*; magnitudo *N. littoralis*. Labium omnino planum & lævissime dentatum. Testa lactea: Striis anfractuum nigris transversis obliquis distantibus.

bidens. 728. *N. testa lævi viridi, labio interiore bidentato. M. L. U. 677. n. 309. \**  
Habitat - -

viridis. 729. *N. testa lævi viridi, labio interiore medio crenulato. Brown. jam. 399. N. minima viridis. Habitat ad Minorcam, Jamaicam. E. Brander. Testa parva admodum, viridis, interdum fusco lacteoque undata, ad labium albo-maculata.*

virginea. 730. *N. testa lævi ovata, labio interiore gibbo denticulato. M. L. U. 678. n. 391. \**  
*Bonan. recr. 3. t. 204.*  
*Pet. gaz. t. 11. f. 3.*  
*Argenv. conch. t. 10. f. P.*  
Habitat in M. Mediterraneo.

polita. 731. *N. testa lævi, vertice oblitterato, labiis utrisque dentatis. M. L. U. 678. n. 392. \**  
*Bonan. recr. 3. t. 221.*  
*Rumph. mus. t. 22. f. I, 2. Valvata alpina.*  
*Gualt. test. t. 66. f. G.*  
*Argenv. conch. t. 10. f. K.*  
*Regenf. conch. 16. t. 4. f. 43.*  
*Seb. mus. 3. t. 59. f. 1-3.*  
Habitat in O. Asiæ.

Peloron- 732. *N. testa striata, labiis dentatis: interiore planiusculo ta. rugoso. M. L. U. 679. n. 393. \**  
*Rumph. mus. t. 22. f. K. Valvata 2 fasciata.*  
Habitat in O. Asiæ ad Bandam.

Albicila. 733. *N. testa striata, labiis subdentatis: interiore tuberculato. M. L. U. 679. n. 394. \**  
*Rumph. mus. t. 22. f. 8.*  
Habitat ad Hitoc.

Histrion. 734. *N. testa sulcata transverseque striata, labio interiore dentato. M. L. U. 680. n. 395. \**  
*Rumph. mus. t. 22. f. 6.*  
Habitat - -

735. *N.*



plicata. 735. N. testa sulcata, labiis dentatis: interiore rotundato; exteriori utrinque dentibus acutis conicis. *M. L. U.* 680. n. 396. \*

*Habitat* - -

grossa. 736. N. testa sulcata, labiis dentatis: interiore convexo rugoso. *M. L. U.* 681. n. 397. \*

*Rumph. mus. t. 22. f. N.*

*Gualt. test. t. 66. f. V.*

*Habitat in O. Afrix.*

Chamæleon. 737. N. testa sulcata sulcis viginti, labiis dentatis: interiore rugoso tuberculato. *M. L. U.* 681. n. 398. \*

*Rumph. mus. t. 22. f. L. Valvata 3 undulata.*

*Argenv. conch. t. 10. f. Q.*

*Regens. conch. 12. t. 3. f. 26.*

*Habitat in O. Afrix ad Bandam.*

undata. 738. N. testa sulcata sulcis triginta, labiis dentatis: interiore rugoso tuberculato. *M. L. U.* 682. n. 399. \*

*Rumph. mus. t. 22. f. 4.*

*Gualt. test. t. 66. f. X.*

*Habitat in O. Afrix ad Amboinam.*

*Differt a precedenti etiam apice magis prominente, & fasciis latiusculis, nec tenuibus.*

Exuvia. 739. N. testa sulcata, labiis dentatis: interiore tuberculato. *M. L. U.* 682. n. 400. \*

*Bonan. recr. 3. t. 220.*

*List. conch. 4. f. 1. c. 1. t. 2. f. 5.*

*Rumph. mus. t. 22. f. M.*

*Pet. gaz. t. 100. f. 6.*

*Gualt. test. t. 66. f. CC.*

*Argenv. conch. t. 10. f. I.*

*Seb. mus. 3. t. 59. f. 4-9.*

*Habitat in O. Americæ & Afrix.*

### 336. HALIOTIS. *Animal* Limax.

*Testa auriformis, patens: Spira occultata laterali; Disco longitudinaliter poris pertuso.*

Midæ. 740. N. testa subrotunda utrinque nitida. *M. L. U.* 683. n. 401. \*

L 1112

*Gualt.*

*Haliotides similis, ideoque & synonymis obscurior.*

*Gualt. test. t. 69. f. B.*

*Habitat - -*

- tubercu- 741. *H. testa subovata, dorso transversim rugoso tuber-*  
lata. *culato. Fn. suec. 2198.*

*Fn. suec. 1326. Haliotis striata rugosa.*

*Rond. pisc. 5. Auris marina.*

*Bell. aquat. 395.*

*Gesn. aqu. 808. ♂ 807. Patella major f. fera.*

*Aldr. exsang. 551. f. 1, 2.*

*Rumph. mus. t. 40. f. G, H.*

*Bonan. recr. 1. t. 10, 11.*

*List. angl. 167. t. 3. f. 16.*

*conch. t. 611. f. 2-6.*

*Ginan. adr. 2. t. 3. f. 27.*

*Adansf. seneg. 1. t. 2. f. 1.*

*Habitat in O. Europæo.*

- striata. 742. *H. testa ovata ferruginea transversim rugosa longi-*  
tudinaliter striata. *M. L. U. 684. n. 403. \**

*Habitat in O. Asiæ.*

- varia. 743. *H. testa ovata, striis longitudinalibus: majoribus tu-*  
berculatis. *M. L. U. 684. n. 404. \**

*Habitat - -*

*Margo huic inæqualis, sequenti æqualis, utraque parva.*

- marmo- 744. *H. testa ovalis: striis longitudinalibus; transversis*  
rata. *obsoletis. M. L. U. 685. n. 405. \**

*Argenv. conch. t. 7. f. B.*

*Habitat in O. Africano.*

- afinina. 745. *H. testa læviuscula oblonga margine subfalcato, dor-*  
so nervis elevatis. *M. L. U. 685. n. 406. \**

*Rumph. mus. t. 40. f. E, F.*

*Gualt. test. t. 69. f. D.*

*Argenv. conch. t. 7. f. E.*

*Regensf. conch. t. 9. f. 20.*

*Habitat in O. Indiæ.*

- parva. 746. *H. testa ovata rubra, ventre angulo elevato. M.*  
*L. U. 686. n. 407. \**

*Habitat in O. Africano.*

*Haliotides præcedentes valde affines & forte omnes*  
*tantum varietates.*

331. PATELLA. *Animal* Limax.

*Testa* univalvis, subconica, absque spira.

\* Labiatæ *f. labio interno instructæ.*

equestris. 747. P. testa integra orbiculata extus perfoliata, labio for-  
nicali perpendiculari. *M. L. U.* 687. n. 408. \*

*Rumph. mus. t. 40. f. P, Q.*

*Pet. amb. t. 16. f. 28.*

*Gualt. test. t. 9. f. X.*

*Argenv. conch. t. 6. f. K.* Cabochon.

*Habitat in* O. Indico.

Neritoidæ. 748. P. testa integra ovata apice subspirali, labio laterali.

*M. L. U.* 688. n. 409. \*

*Habitat - -*

chinensis. 749. P. testa integra subconica lævi, labio sublaterali.

*M. L. U.* 688. n. 410. \*

*Bonap. recr. 1. t. 12.*

*List. conch. 4. f. 1: c. 7. f. 3.*

*Argenv. conch. t. 6. f. F.* Mitella chinensis.

*Habitat in* M. Mediterraneo.

porcellana. 750. P. testa integra ovali, apice recurvo, labio postice  
plano. *M. L. U.* 689. n. 411. \*

*Rumph. mus. t. 40. f. O.*

*Habitat in* O. Indiæ.

fornicata. 751. B. testa integra ovali postice oblique recurva, labio  
postico concavo.

*List. conch. t. 545. f. 34.*

*Argenv. conch. t. 6. f. N.*

*Adans. seneg. 1. t. 2. f. 8.*

*Habitat ad* Ilvam insulam, inque M. Mediterraneo  
passim.

*Differt a* precedenti spira laterali, labioque con-  
cavo albo.

\* \* Dentatæ basi *f. margine angulatæ.*

Crepidula. 752. P. testa ovali planiuscula lævi, labio postice plano.

*M. L. U.* 689. n. 412. \*

L 1113

val

*Gualt. test.* 9. t. 69. f. H. *Crepidula michellii*.

*Adansf. seneg.* 1. t. 1. f. 1. *Cymbium*.

*Habitat in M. Mediterraneo, imprimis ad Barbariam.*

laciniosa. 753. P. testa radiis elevatis inæqualibus: extus crassioribus obtusis.

*Rumph. mus.* t. 40. f. C.

*Argenv. conch.* t. 6. f. O.

*Habitat in India.*

faccharina. 754. P. testa angulata: costis septenis carlnatis obtusis.

*M. L. U.* 690. n. 413. \*

*Bonan. kirch.* 1. t. 32.

*List. conch.* 4. f. 1. c. 3. t. 1. f. 1, 2.

*Rumph. mus.* t. 40. f. B.

*Pet. amb.* t. 3. f. 3.

*Gualt. test.* 9. f. I, M, O.

*Argenv. conch.* t. 6. f. M. *Asterolepas*.

*Klein. ostr.* t. 8. f. 4.

*Habitat ad Barbados.*

barbara. 755. P. testa dentata: costis novendecim elevatis fornicato-muricatis. *M. L. U.* 690. n. 414. \*

*Habitat - -*

granularis. 756. P. testa dentata: striis elevatis angulatis imbricatis.

*M. L. U.* 691. n. 415. \*

*List. conch.* 4. f. 1. c. 3. t. 3. f. 2.

*Gualt. test.* t. 9. f. F.

*Argenv. conch.* t. 6. f. G.

*Regenf. conch.* 8. t. 2. f. 24.

*Habitat in O. Europæ australis.*

*Testæ fundus ferrugineus sub centro.*

granatina. 757. P. testa angulata: striis numerosis muricatis. *Mus.*

*L. U.* 691. n. 416. \*

*List. conch.* 4. f. 1. c. 3. t. 2. f. 3, 4.

*Argenv. conch.* t. 6. f. H.

*Regenf. conch.* t. 9. f. 31.

*Habitat in O. Europæ australis.*

*Testa lutea striarum mucronibus albis.*

vulgata. 758. P. testa subangulata: angulis quatuordecim obsoletis, margine dilatato acuto. *Fr. succ.* 2199. \*

*List. angl.* 195. t. 5. f. 40. *malu.*

*Gualt.*

*Gualt. test. t. 8. f. L.*

*Ginan. adr. 2. t. 2. f. 17.*

*Habitat in O. Europæi rupibus, saxis, frequens.*

*Testa subius colore testudinis.*

cærulea. 759. P. testa eroso-subangulata: striis numerosis inæqualibus, subtus cærulea.  
*Habitat in M. Mediterraneo.*

tuberculata. 760. P. testa subdentata conica tuberculata: postice retusa. *M. L. U. 692. n. 417. \**  
*Habitat - -*

\* \* \* *Mucronatæ vertice acuminato recurvo.*

ungarica. 761. P. testa integra conico-acuminata striata: vertice hamoso revoluta.  
*Gualt. test. t. 9. f. V, W.*  
*Klein. ostr. t. 8. f. 10.*  
*Ginan. adr. 2. t. 3. f. 24.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*

antiquata. 762. P. testa integra oblonga imbricata, vertice postice recurvato.  
*Habitat - -*  
*Testa opaca, lactea, multum imbricata. Apertura ovata, apex posticus, recurvus.*

mammillaris. 763. P. testa integra conica striata subdiaphana, vertice reflexo lævi.  
*List. conch. t. 537. f. 17.*  
*Klein. ostr. t. 8. f. 1.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*

tricarinata. 764. P. testa substriata antice tricarinata, vertice revoluta.  
*Habitat - -*  
*Testa alba, ovata, magnitudine n. coryli, extus striata, antice carinis 3 distinctis, excurrentibus in marginem inde angulatum. Spira recurvata, postice posita.*

pectinata. 765. P. testa integra ovata: striis rugosis subramosis, vertice subcentrali reflexo mucronato.  
*Habitat in M. Mediterraneo.*

L i l l 4

*Testa*

*Testa opaca; intus lavis testudinea; extus striis numerosis, longitudine inequalibus.*

- lutea. 766. P. testa integra ovali convexa striata, vertice submarginali reflexo mucronato. *M. L. U.* 692. n. 418. \*

*Rumph. mus. t. 40. f. I.*

*Habitat in India.*

*Vertex prope marginem anteriorem residet.*

- unguis. 767. P. testa integerrima oblonga margine antico retusa, vertice mucronato carinato. *M. L. U.* 693. n. 419. \*

*Rumph. mus. t. 40. f. L.*

*Pet. gaz. t. 32. f. 9.*

*Habitat in Amboina ad littora, sub Arena.*

- cristata. 768. P. testa vertice revoluto, dorso cristato carinato. *Brunnich.*

*Habitat - - - e Museo D. Lyonnet.*

*Testa diaphana, conico-revoluta, compressa, tenuissima: Sulcis transversis, numerosis, costarum instar. Dorsum carinatum membrana duplici tenuissima, in crenulas excisa. Limbus testæ sinuatus. Apertura ad dorsum angulo acuto.*

- lacustris. 769. P. testa integerrima ovali membranacea, vertice mucronato reflexo. *Fn. suec.* 2200.

*List. angl. 151. t. 2. f. 32.*

*Gualt. test. t. 4. f. AA.*

*Habitat in Europæ aquis dulcibus, adherens plantis.*

\* \* \* \* Integerrimæ absque vertice mucronato.

- pellucida. 770. P. testa integerrima obovata gibba pellucida: radiis quatuor cæruleis.

*Habitat in M. Mediterraneo. E. Brander. in Norvegia. Martin.*

*Testa facie P. lacustris, sed major muticæque, livida, glaberrima radiis cæruleis nitidissimis; ad posticum marginem quasi vertex obsoletus. Ex hac patet colorem cæruleum etiam dari in Cochleis.*

- testudina- 771. P. testa integerrima ovata lævi glaberrima. *M. L.*  
ria. *U.* 693. n. 420. \*

*List. conch. 4. f. 1. c. 2. t. 2.*

*Gualt.*

*Gvalt. test. t. 8. f. B.*

*Argenv. conch. t. 6. f. P. Clypeus testudinarius.*

*Habitat - -*

compressa. 772. *P. testa integerrima ovali oblonga striata lævi: dorso compressa.*

*Habitat - - e Museo Tessiniano.*

*Testa inter maximas generis numeranda, longa digit. 4, lata digit. 3, alta digit. 3, a vertice ad marginem longitudinaliter striata, vix transversim striata, flavescens.*

rustica. 773. *P. testa integerrima conica: striis quinquaginta obtusis. M. L. U. 694. n. 421. \**

*List. conch. 4. f. 1. c. 4. t. 1.*

*Gvalt. test. t. 8. f. P. ♂ t. 9. f. C?*

*Habitat - -*

fusca. 774. *P. testa integerrima ovata obtusa: striis elevatis. M. L. U. 694. n. 422. \**

*Habitat - -*

notata. 775. *P. testa integra striata: vertice submucronato erecto, intus alba: macula atra cordata medio albida.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa striis elevatis levibus fuscis: Intus alba margine fusco maculato; sub fornice macula spatulata nigra, medio alba.*

cruciata. 776. *P. testa integerrima ovali subconvexa fusca cruce alba picta. M. L. U. 695. n. 423. \**

*Habitat - -*

reticulata. 777. *P. testa integra conica compressa venoso-reticulata. M. L. U. 695. n. 424. \**

*Habitat in M. Mediterraneo.*

\* \* \* \* \* *Perforatæ vertice.*

Fissura. 778. *P. testa ovali striato-reticulata, vertice recurvo, antice fissâ.*

*List. conch. t. 543. f. 28.*

*Pet. gaz. t. 75. f. 2.*

*Klein. ostr. 116. Patella reticulata exigua alba, fissura notabili in margine.*

L 1115

*Habi-*

*Habitat ad Angliam rarius. Lister; ad Algiriam frequentior. E. Brander.*

*Testa fissura linearis, a margine antico ad lateris medium incisa.*

Pustula. 779. P. testa ovali gibboso - convexa striato-reticulata, margine crenulato, vertice perforato.

*Pet. gaz. t. 3. f. 12.*

*Klein. ostr. t. 8. f. 3.*

*Habitat in M. Mediterraneo. Brander.*

*Testa simillima precedenti, apertura margini postico propior.*

græca. 780. P. testa ovata convexa: margine introrsum crenulato, vertice perforato.

*Bonan. recr. 1. t. 6.*

*Tournef. iter. 1. t. 94.*

*List. conch. t. 527. f. 1, 2.*

*Argenv. conch. t. 6. f. I.*

*Klein. ostr. t. 8. f. 3.*

*Adans. seneg. 1. t. 2. f. 7.*

*Gualt. test. t. 9. f. N.*

*Regensf. conch. 6. t. 2. f. 23.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

nimbosa. 781. P. testa ovata striata rugosa fusca, vertice oblongo-perforato. *M. L. U. 696. n. 425. \**

*List. conch. 4. f. 1. c. 1. t. 1, 2.*

*Gualt. test. t. 9. f. P, Q, R, S, T.*

*Argenv. conch. t. 6. f. C.*

*Column. aqu. 11. t. 12. f. 3.*

*Bonan. recr. 1. n. 3.*

*Pet. gaz. t. 3. f. 11. & t. 85. f. 8.*

*Ginan. adr. 2. t. 2. f. 19.*

*Adans. seneg. 1. t. 2. f. 6.*

*Habitat in M. Europæ australis, Americæ.*

Nubecula. 782. P. testa subovata rugosa alba rubro radiata, vertice ovato-perforato.

*Habitat in M. Mediterraneo frequens.*

*Differt a precedenti testa minore, altiore, alba rubro radiata, apertura minus oblonga & intus fusca.*



332. DENTALIUM. *Animal Terebella.*

*Testa univalvis, tubulosa, re-  
cta, monothalamia, utraque  
extremitate pervia.*

Elephan- 783. D. testa decem-angulata subarcuata striata. *M. L.*  
tinum. *U. 699. n. 426. \**

*Bonan. recr. 1. t. 8.*

*List. conch. 4. f. 2. f. 3.*

*Rumph. mus. t. 41. f. 1. Denticulus elephantis.*

*Pet. amb. t. 16. f. 33.*

*gaz. t. 13. f. 9.*

*Gvalt. test. t. 10. f. 1.*

*Argenv. conch. t. 7. f. H. Dentalis.*

*Ginan. adr. 2. t. 1. f. 1.*

*Habitat in Oceano Indico, Europæo.*

aprinum. 784. D. testa decem-angulata subarcuata lævi.

*Habitat in O. Indico.*

*Testa alba D. Elephantino angustior, sulcis profun-  
dioribus absque striis,*

Dentalis. 785. D. testa viginti-striata subarcuata interrupta.

*Rumph. mus. t. 41. f. 6.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testæ apex valde acuminatus & ruber est.*

Entalis. 786. D. testa tereti subarcuata continua lævi. *Fn. succ.*

*2201. M. L. U. 669. n. 427. \**

*Bonan. recr. 1. t. 9.*

*List. conch. 4. f. 2. f. 3.*

*Rumph. mus. t. 41. f. 5.*

*Ginan. adr. 2. t. 1. f. 2.*

*Gvalt. test. t. 10. f. F.*

*Argenv. conch. t. 7. f. C. Antalis.*

*Habitat in O. Europæo, Indico.*

●orneum. 787. D. testa tereti subarcuata interrupta opaca.

*Habitat in O. Africano.*

*Testa simillima D. Entali, sed cornu colore obscura,  
sapius interrupta.*

788. D.

politum. 788. D. testa tereti subarcuata continua: striis annularibus confertissimis.

*Gualt. test. t. 10. f. F.*

*Habitat in Indiis.*

*Simillima D. Entali, sed lactea, nitida, striis innumeris confertissimis.*

eburneum. 789. D. testa tereti subarcuata continua: annulis remotis.

*Habitat in India.*

*Simillimum D. Entali, eburnea albedinis, lætissima, nitida: Striis convexis, annularibus, numerosissimis, aequaliter remotis.*

minutum. 790. D. testa tereti erectiuscula lævi minuta.

*Planc. conch. t. 2. f. 2.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa tam parva, ut genus nisi armatis oculis non conspiciatur.*

### 333. SERPULA. *Animal Terebella.*

*Testa univalvis, tubulosa, adhaerens, (sæpe isthmis integris passim intercepta).*

Seminulum. 791. S. testa regulari ovali libera glabra.

*Planc. conch. t. 2. f. 1?*

*Gualt. test. t. 10. f. S.*

*Habitat in M. Adriatico; minuta.*

*Testa recedit a congeneribus, quod libera sit nec adhaereat aliis corporibus, quamvis anfractus inter se uniti, & quod apertura in mea non conspicua.*

planorbis. 792. S. testa regulari orbiculata plana æquali. *Fn. succ. 2102.*

*Habitat in Conchis pelagicis.*

*Testa vix manifesta, nisi squamula orbiculata arde adnata, absque omni spirarum rudimento externo, at fracta discedens horizontaliter, intus ostendit spiram peregrina testæ, cui insidebat, insculptam, tamquam circulos concentricos.*

spirillum. 793. S. testa regulari spirali orbiculata pellucida, anfractibus teretibus sensimque minoribus. *Fn. succ. 2203.*  
*Planc.*

*Planc. conch. t. 1. f. 8.*

*Ginan. adr. 2. t. 1. f. 7.*

*Habitat in Oceano super Sertularias & Zoophyta alia.*

*Differt a sequenti, cui simillima, quod triplo minor;  
quod pellucida, nec opaca; quod ad latus inferius  
vix manifeste canaliculata; quodque anfractus omni-  
no teretes, nec a latere centrum respiciente obsolete  
canaliculati.*

spirorbis. 794. S. testa regulari spirali orbiculata, anfractibus supra  
introrsum subcanaliculatis sensimque minoribus. *Fn. svec. 2204.*

*It. wgoth. t. 170.*

*Pet. gaz. t. 35. f. 8.*

*Baster. subs. 1. p. 79. t. 9. f. 3.*

*Planc. conch. 18. n. 3.*

*Gualt. test. t. 10. f. 0.*

*Ginan. adr. 2. t. 1. f. 8.*

*List. conch. 4. f. 3. t. 2.*

*Habitat in Oceani & Pelagi Fucis, Zoophytis.*

triquetra. 795. S. testa repente flexuosa triquetra. *Fn. svec. 2206.\**  
*M. L. U. 698. n. 428. \**

*It. wgoth. 170.*

*Gualt. test. t. 10. f. P.*

*E. N. C. 1727. p. 315. t. 10.*

*Baster subs. 1. t. 9. f. 2.*

*Habitat in Oceano supra Testas, Lapides, Naves,  
Fucos.*

intricata. 796. S. testa filiformi scabra tereti flexuosa.

*Habitat in M. Mediterraneo super Pinnae atque re-  
crementa marina.*

*Testa instar fili tenuioris varie flexa, cinerea, oculo  
armato valde rudis & fere scabra observanda.*

filograna. 797. S. testis capillaribus fasciculatis ramoso-glomeratis  
cancellatisque.

*Raj. hist. 1. p. 65. Reticulatum tophaceum.*

*Bocc. mus. 228. t. 7. f. 2. & t. 2. f. 13. Rete ma-  
rinum.*

*Planc. conch. add. ad. p. 18. Tubularia filograna.*

*Seb. mus. 3. t. 100. f. 8.*

*Act. petrop. v. 7. p. 374. t. 16. f. 3. Tubipora.*

*Pall. zooph. p. 239. Serpula corallifica.*

*Habi-*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testæ filiformes, albæ, fasciculatim convexæ in cancellos varios.*

granulata-798. S. testa tereti spirali glomerata, latere superiore sulcis tribus elevatis.

*Habitat in O. septentrionali supra Lapides & Testas.*

*Testæ magnitudine seminis Coriandri, confertæ, spirales, sed irregulares.*

contortu-799. S. testa semitereti rugosa glomerata carinata. *Fn.*  
plicata. *svæc.* 2205. *M. L. U.* 698. n. 429. \*

*Argenv. conch. t. 29. f. D.*

*Habitat in O. Europæo.*

glomera-800. S. testa tereti decussato-rugosa glomerata. *Fn. svæc.*  
ta. 2207. *M. L. U.* 699. n. 430. \*

*Gualt. test. t. 10. f. T.*

*Argenv. conch. t. 29. f. B.*

*Habitat in O. Europæo.*

lumbrica-801. S. testa tereti flexuosa: apice spirali acuto. *M. L.*  
lis. *U.* 699. n. 431. \*

*List. conch. 4. f. 3. f. 1.*

*Rumph. mus. t. 41. f. I.*

*Gualt. test. t. 10. f. Q.*

*Argenv. conch. t. 29. f. I.*

*Ginan. adr. 2. t. 2. f. 14.*

*Baster. subs. 2. p. 80. t. 9. f. 3.*

*Habitat in Indiis.*

polythala-802. S. testa tereti diaphana lævi rectiuscula polythalamia.  
mia. *Rumph. mus. t. 41. f. E.* Solen arenarius.

*Habitat in Indiis.*

*Testa lactea, crassitie digiti, intus passim dissepimentis hinc convexis, inde concavis interrupta, sed non perforatis.*

arenaria. 803. S. testa articula integra distincta subtus planiuscula.  
*M. L. U.* 700. n. 432. \*

*Bonan. recr. 1. t. 20. f. C, B.*

*Gualt. test. t. 10. f. L. N.*

*Argenv. conch. t. 29. f. H.*

*Habitat in Indiis.*

804. S.

anguina. 804. *S. testa teretiuscula subspirali, fissura longitudinali subarticulata. M. L. U. 701. n. 433. \**

*Rumph. mus. t. 41. f. H. Solen anguinus.*

β. *List. conch. 4. f. 3. f. 2.*

*Rumph. mus. t. 41. f. 2.*

*Gualt. test. t. 10. f. Z.*

*Habitat in India.*

*Polymorpha, sed distinctissima rima sua articulata, quamvis magnitudine diversissima. Variat Tubo tereti & angulato.*

vermicularis. 805. *S. testa tereti subulata curvata rugosa.*

*Ellis. corall. t. 38. f. 2. Tubus vermicularis.*

*Habitat in O. Europæo.*

*Animalis proboscis interior e fundo exterioris pro lubitu exseritur, referens Lichenempyridatum. D. Skene.*

Penis. 806. *S. testa tereti recta, extremitate radiata: disco poris cylindricis. M. L. U. 702. n. 434. \**

*Bonan. kirch. 1. t. 38.*

*List. conch. 4. f. 3. f. 3.*

*Rumph. mus. t. 41. f. 7.*

*Gualt. test. t. 10. f. M.*

*Argenv. conch. t. 7. f. G. Penicillus marinus.*

*Habitat ad Javam.*

*Animal Molluscum hujus etiamnum ignotum est.*

334. TEREDO. *Animal Terebella: Maxille duæ calcaræ, hemisphæricæ, antice excisæ, subtus angulatæ.*

*Testa teres, flexuosa, lignum penetrans.*

navalis. 807. TEREDO.

*Fn. succ. Tereido intra lignum testa flexuosa.*

*Vallisn. nat. 2. t. 4.*

*Sellii monogr. ultraj. 1733. quart. t. 1.*

*Planc. conch. 17. n. 2.*

*Habitat intra lignum Navium & palorum marinarum; calamitas navium ex Indiis in Europam propagata.*

335. Sa-

335. SABELLA. *Animal* Nereis. *Os* ringens.  
*Tentacula* duo crassiora pone  
 caput.

*Testa* tubulosa, contexta ex arenulis, confertim membranæ vaginali impositis.

scruposa. 808. S. testa solitaria libera simplici curvata: granis lentiformibus nitidis.

*Habitat in* Indiis.

*Testa subulata, obtusa, modice curva, crassitie pennæ cygneæ & ultra, constructa ex arena lentiformi, alba, polita, magnitudine conformi.*

granulata. 809. S. testa solitaria libera simplici curvata: granis arenaceis fuscis.

*Habitat in* Oceano Septentrionali, locis profundis. J. G. König.

*Testa crassitie pennæ Anserinæ, obscuri coloris.*

scabra. 810. S. testa solitaria basi fixa, simplici curvata; granis radiato-scabris.

*Aff. petrop.* 1766. p. 353. t. 9. f. 1, 2. Dentalium arcuatum spongiosum superficie tuberculis contiguis exasperata.

*Habitat in* O. Americano.

ringens. 811. S. testa subramosa fixa erecta.

*Syst. nat.* 10. p. 788. n. 703. Serpula ringens.

*Baker. micr.* t. 8. f. 2-5.

*Baster subs.* 1. p. 80. t. 9. f. 4.

*Schæff. minogr.* 1755. t. 1, 2. Blumen - polypen i syssen Wasser.

*Pall. zooph.* 46. Brachionus tubifex.

*Habitat in* Europæ lacubus; minutissima.

*Testa saepe ramum unum alterumve cum animalculo exserit; utrum vero hic ramus sit progenies propria ex animali ramificante, aut pullus innatus, vix dicam.*

alveolata. 812. S. testa composita concamerationibus numerosis poro communicantibus.

*Syst. nat.* 10. p. 790. Tubipora arenosa.

Ellis.

*Ellis cor. 90. t. 36. Tubularia arenosa anglica.*

*Habitat in Oceano Britannico, gregaria, ex arenulis formans nidum communem, concamerationibus compositum.*

*Genus hoc multa habet communia cum Nereidibus, sed ♂ as ♂ tentacula oris diversissima; at tentacula duo pone caput crassiuscula differunt, ut Testam, artificialem licet, taceam, quæ inædificata membranae vaginanti, animalculo propriæ.*

Chryso- 813. S. testa subcylindrica testaceo-papyracea.

don.

*Berg. aff. stockb. 1765. p. 228. t. 9. f. 1-3. Tere-  
do Chrysodon.*

*Habitat in Oceano ad Cap. b. speci.*

Penicil- 814. S. testa membranacea erecta radicata.

lus.

*Syst. nat. 10. p. 788. n. 702. Serpula penicillus.*

*Rond. inf. 2. p. 76.*

*Ellis. cor. 92. t. 34. Corallina tubularia melitenus,*

*Baster. subs. 2. p. 178. t. 9. f. 1.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

## IV. LITHOPHYTA.

*Animalia Mollusca, composita.*

*Corallium calcareum, fixum, quod inædificarunt animalia affixa.*

336. TUBIPORA. *Animal Nereis?*

*Corallium tubis cylindricis, cavis, erectis, parallelis.*

- musca.* 1. T. tubis fasciculatis combinatis: dissepimentis transversis membranaceis distantibus.  
*Hort. cliff.* 481. Tubipora membranis transversis tubos perpendiculares connectens.  
*Imper. nat.* 821. Tubularia purpurea.  
*Aldr. mus.* 291. Pseudo-Corallium rubrum.  
*Baub. hist.* 3. p. 808. f. 2. Alcyonium fistulosum rubrum.  
*Bonan. kirch. t.* 289. f. 14. Tubularia purpurea.  
*Best. mus.* 23. Alcyonium maris rubri.  
*Velsch. becaft. t.* 44. Tubularia coralloides.  
*Morif. hist.* 3. f. 15. t. 10. f. 22. Alcyonium fistulosum rubrum.  
*Pet. gaz. t.* 67. f. 10, 11. Tubularia purpurea vulgaris.  
*Tournef. inst. t.* 342. Tubularia purpurea.  
*Shaw. afr.* 37. Madrepora tubis coagmentatis ruberrimis.  
*Rumph. amb.* 6. p. 236. t. 85. f. 2. Alcyonium rubrum indicum.  
*Seb. mus.* 3. t. 110. f. 89.  
*Argenv. conch. t.* 29. f. A.  
*Edu. av. t.* 93.  
*Pall. zooph.* 199. Tubipora purpurea.  
*Habitat in Oceano Indico, rubro.*

- catenula.* 2. T. tubis parallelis connatis in laminam contortuplicatam.

*Amaz.*

LITHOPHYTA *Animalcula materiam corallinam deponere & pro celulis uti, & Madreporarum Animalcula Stellis incumbentiæ sibi continuo substernendo materiam lapideam elevare & habitaculum suum augere, recte statuit Peyssonel.*



*Amœn. acad.* 1. p. 103. t. 4. f. 20. Millepora tubis ovatis longitudinaliter reticulatim concatenatis.

*Bromel. lithogr. sp.* 2. t. 23, 24, 25, 26, 27. Tubularia gothlandica.

*Helv. lith.* t. 5. f. 1, 6. & t. 6. f. 1. Lapis albidus catemula corallina.

*Buttn. corallogr.* t. 1. f. 2. Corallium laterulatum.

*Wolk. filif. subt.* t. 58. f. 7. & t. 20. f. 3.

*Habitat* - - *projicitur frequens ad Littora M. Balthici.*

Corallium constans Membranâ erectâ, varie contortuplicata, anastomozata in mœandros, fastigiata margine poris, simplici serie, catenæ instar digestis. Tubi enim plurimi paralleli, æquales, filiformes, lateribus oppositis connexi, confecere parietes. Diaphragmata nulla, cujus loco anastomozatio parietum connectit tubos.

Serpens. 3. T. tubulis cylindricis erectis brevissimis distantibus axillaribus, basi repente dichotoma divaricata.

*Syst. nat.* 10. p. 790. Tubipora serpens.

*Amœn. acad.* 1. p. 105. t. 4. f. 26. Millepora dichotoma repens teres, poris axillaribus solitariis eminentibus.

*Mus. tess.* t. 3. f. 3. Millepora repens teres, poris solitariis eminentibus.

*Habitat* - - *rejjcitur ad littora M. Balthici; similem sed minutam e M. Mediterraneo.*

*Si Tubuli in hac longiores essent & canlis repentis articuli breviores, manifeste constaret genus Tubulariæ Tubis basi tantum connexis; Subtrahatur itaque pro- portio, ut Genus palpabile evadat.*

Fascicu- 4. T. tubis filiformibus fasciculatis: lateribus passim ana-  
laris. stomosantibus.

*Habitat* - - *rejjcitur ad littora Gotlandiæ, passim etiam in montibus calcareis.*

Corallium filiforme, fasciculatum, crassitie pennæ passerinæ, minus rectum s. strictum: anastomoses passim undique transverse connectunt tubos ipsæ tubulose, sed angustiores.

337. MADREPORA. *Animal* Medusa. *Ellis. cor.*  
*t. 32. Donat. mar. t. 6.*  
*f. F.*

*Corallium* cavitatibus lamel-  
 lofo-stellatis.

\* SIMPLICES *stella unica.*

verruca- 5. *M. simplex*, stella orbiculari planiuscula sessili: disco  
 riz. cylindris flosculofo; limbo radiato.

*Ginan. adr. 10. t. 4. f. 10. Fungus marinus.*  
*Pall. zooph. 164.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Corallium magnitudine pisi dimidiati, sessile, planum,*  
*album. Discus ex tubis aggregatus, uti flos com-*  
*positus. Limbus s. ambitus explanatus, exaratus*  
*striis more floris radiati. Media inter Milleporas,*  
*Madreporas & Tubiporas.*

turbinata. 6. *M. simplex turbinata lævis*, stella hemisphærico-concava

*Amæn. acad. 1. p. 87. t. 4. f. 1, 2, 3, 4, 7.*

*Lang. figurat. 52. t. 12.*

*Brom. lith. t. 36, 38, 33, 32. Fungites major or-*  
*bicularis gotlandicus.*

*Helw. lith. t. 5. f. 9, 10, 11, 13, 15, 17.*

*Wolff. bass. t. 10. f. 3, 4. Columellus turbinatus.*

*Pall. zooph. 176. Madrepora trochiformis.*

*Habitat in M. Balthico; copiosissime quotannis ad lit-*  
*tora Gotlandiæ rejicitur.*

Porpita. 7. *M. simplex acaulis*, stella convexa: centro depresso  
 orbiculari, subtus plana marginata lævi.

*Scheuch. lith. f. 43, 44. Lens lapidea striata.*

*Buttn. corall. 24. t. 3. f. 5. Fungi marini capitulum.*

*Amæn. acad. 1. p. t. f. 5. Madrepora simplex orbi-*  
*culata plana, stella convexa.*

*Bromel. lith. 2. p. 33. f. a-b.*

*Lbwyd. lith. 151. Porpita minor nummularis.*

*Habitat - - frequens inter Petrificata Europæa.*

*Hæc nequit esse Semen Madrepore ejusdam; minus*  
*operculum aut impressio petrificata M. turbi-*  
*nata. Differt a M. Fungita magnitudine minima;*  
*marginè orbiculi inferioris, centro stellæ orbiculari*  
*depressæ.*

*fo, nec oblongo. Convenit magnitudine, orbiculo inferiore marginato, stella striis, centro depresso cum Medusa porpita, ut demto Medusæ peristromate villoso caduco, nulla differentia, nisi soliditatis. Magnitudo semen Lupini non superat.*

- Fungites. 8. *M. simplex* acaulis orbiculata, stella convexa: lamellis simplicibus longitudinalibus, subtus concava.  
*Hort. cliff.* 481. Madrepora simplex acaulis orbiculata convexa: lamellis denticulatis.  
*Clus. exot.* 125. f. 1. Fungus lapidosus.  
*Bauh. hist.* 3. p. 801. f. 1, 2. Fungus lapideus.  
*Best. mus.* t. 26. f. 3. Fungus marinus lapideus.  
*Olear. mus.* 74. t. 34. f. 2. Fungites IV.  
*Bonan. kirch.* 268. t. 287. f. 17. Fungus petrificatus.  
*Boerh. lugdb.* 1. p. 2. Fungus coralloides pileatus lamellatus.  
*Rumph. amb.* 6. p. 247. t. 88. f. 1, 4. Fungus faxeus.  
*Seb. mus.* 3. t. 110. f. 6, b. & t. 111. f. 1, 2. & t. 112. f. 28, 29, 30.  
*Shaw. afr.* 6. Fungus coralloides *M. rubri*.  
*Pall. zooph.* 165.  
*Habitat in M. rubro, & Indiæ orientalis.*  
*Stella simplex, convexa, centro concavo. Lamellæ acute, inæquales, basin versus isthmis connexæ. Subtus scabra.*  
*Animal (figura Priapi referente Forskøblø) hoc corallium, uti cochlea suam testam, sub se fabricatur, nec crescit more vegetabili zoophytorum.*

- Pileus. 9. *M. simplex* acaulis oblonga, stella convexa conglomerato-lamellosa: lamellis abbreviatis, subtus concava.  
*Rumph. amb.* 6. p. 248. t. 88. f. 2, 3. Mitra polonica.  
*Tournef. aët. paris.* 1700. p. 30. Mitra neptuni.  
*Seb. mus.* 3. t. 111. f. 3, 5. Pileus neptuni.  
*Pall. zooph.* 166. t. 112. f. 31.  
*Habitat in M. Indiæ orientalis.*  
*Stella simplex, acanlis, disco composito e Stellulis excavatis: Radiis palmatis, centrum & peripheriam respicientibus; Radii alterni stellularum altiores, margine bifariam crenato; alterni humiliores depressiores. Centrum sulco oblongo.*

M m m m 3

10. M.

labyrinthi-10. *M. simplex acaulis*, stella repando-labyrinthiformi, futura obtusa.

*Hort. cliff.* 481. Madrepora composita labyrinthiformis hemisphærica, lamellis duplicato ordine integris obtusis, sinibus æqualibus.

*Olear. mus.* t. 26. f. 1, 2.

*Best. mus.* t. 9. f. 1. Massa maris fluctus representans.

*Boccon. epist.* t. 142. Astroites undulatus.

*Pet. gaz.* t. 68. f. 11. Corallium cerebri facie.

*Gualt. test.* t. 10, 29, 27. Mæandrites.

*Seb. mus.* 3. t. 112. f. 1, 4, 5, 7, 6.

*Pall. zooph.* 171. Madrepora mæandrites.

*Habitat in M. utriusque Indiæ.*

mæandri-11. *M. simplex acaulis*, stella repando-labyrinthiformi, futura acuta.

*Gualt. test.* t. 51. Mæandrites.

*Seb. mus.* 3. t. 109. f. 10. & t. 112. f. 2.

*Pall. zooph.* 172. Madrepora labyrinthica.

*Habitat in Oceano Americano.*

arcola. 12. *M. simplex acaulis*, ambulacris pinnatifidis, pulvillis angustis truncatis.

*Clas. exot.* 125. Fungus lapideus minor.

*Baub. hist.* 3. p. 801. f. 3.

*Pet. pterigr.* t. 20. f. 16. Corallium album fungoides ovale.

*Sloan. jam.* 2. p. 56. t. 18. f. 5. Fungus lapideus undulatus.

*Rumph. amb.* 6. p. 244. t. 87. f. 1. Amaranthus faxens.

*Seb. mus.* 3. t. 108. f. 5. & t. 112. f. 23-27.

*Pall. zooph.* 171.

*Habitat cum præcedente.*

Stella convexa; Ambulacris profundis, latissimis, pinnatis, inæqualibus, Pulvillis elevatis, angustis, compressis, truncatis; Præcedenti valde affinis, sed subtus lavis, nec ut illa scabra.

Agarici-13. *M. composita acaulis* sulcata: sulcis carinatis, stellis concatenatis.

*Seb. mus.* 3. t. 110. f. 6. c.

*Pall. zooph.* 167.

*Habitat in Oceano Americano.*

Cori-

Corallium e lamellis variis, divergentibus, semiorbiculatis utrinque sulcis plurimis, repandis, in quorum fundo Stellæ concatenatæ.

favosa. 14. M. composita, stellis angulosis concavis coadunatis.

*Amœn. acad.* 1. p. 96. t. 4. f. XVI.

*Gvalt. test.* t. 19.

*Bocc. mus.* 1. t. 5. f. 3. Astroites.

*Seb. mus.* 4. t. 112. f. 8.

*Pall. zooph.* 187. Madrepora favites.

*Habitat in O. Indico.*

*Transversim dissecta ostendit rete grossum punctis pertusum, & maculas saepe latitudine extimi pollicis saepeque piso minores radiatas. Latera striata sunt. Color albus.*

Ananas. 15. M. composita, stellis angulosis convexis: disco concavis.

*Amœn. acad.* 1. p. 92. t. 4. f. IX, VIII. 2.

*Bocc. mus.* t. 9. f. 7.

*Helw. lith.* 53. t. 5. f. 22. Corallium album superne figuris asteriformibus propemodum oblitteratis.

*Seb. mus.* 3. t. 109. f. 11. duæ in bask.

*Pall. zooph.* 189.

*Habitat in O. Americano; rejicitur ad littora Gotlandiæ.*

Corallium componitur & coadunatur ramulis obovatis, terminatis stella gibba, radiata, disco demerso striato; ubi hi ramuli lateribus connectuntur oritur sutura. Caterum rami hi plures ex inferioris stellæ disco concavo oriuntur. Hoc corallium transverse dissectum refert chartas lusorias a tergo earum s. rete album non punctis pertusum, sed maculis sexangularibus & intra singulas maculas annulum album cum striis inter rete & annulum, non vero intra ipsum annulum.

polygona. 16. M. composita, stellis minutis confertis: immixtis majoribus perforatis fundo concavo-cylindrico.

*Amœn. acad.* 4. p. 258. t. 3. f. 15.

*Habitat in India orientali. Specimen meum tegit totam testam magni Mytili margaritifera.*

Corallium crusta nivea, crassitie 2 pollicum, adspersa Asteriscis minutis, confertis, 12-radiatis, obtusiusculis. Inter hos passim Stellæ crassitie minimi digiti,

M m m m 4

giti,

giti, gibbosiores, similiter striis radiatae, centro per-  
tuso foramine ovali latitudine pollicis; sub hac stella  
cavitas cylindrica longitudine & crassitie digiti in-  
fantis bimestris, laevissima. Intra hanc cavitatem  
nulla testa Lepadis, quae si adfuisset, nequaquam exi-  
re potuisset per minimum foramen; nec potuisset Le-  
pas claudere cavitatem (si adfuisset) stellâ radiata,  
reliquisque stellis conformi, licet majore.

arenosa. 17. M. composita, stellis contiguâ planiusculis subare-  
naceis.

*Habitat in M. Algiriam alluente. E. Brander.*

Lapides corallini, albi, absque internis figuris, pi-  
lli exus stellis vix elevatis, majusculis, minime  
distinctis, quae oculo armato constant atomis arena-  
riis; color stellarum ochraceus; variat stellis parum  
elevatis & verrucosis.

interstin- 18. M. composita, stellis immersis teretibus distantibus;  
sta. interstitio punctato.

*Habitat - -*

Corallium subrotundum, gibbum, solidum. Stellae po-  
riformes, parvae, teretes, immersae, fundo radiati.  
Superficies inter Stellas punctis vix conspicuis, ex-  
cavatis adpersa.

Astroites. 19. M. composita, stellis confertissimis immersis disco  
concavo-cylindrico.

*Seb. mus. 3. t. 112. f. 17.*

*Pall. zooph. 190. Madrepora radians.*

*Habitat in Oceano Americano.*

Corallium album, subglobosum, undique tectum stel-  
lis parvis, immersis.

acropora. 20. M. composita, stellis confertis annularibus promine-  
lis crenatis.

*Habitat - -*

Corallium hemisphaericum, tectum stellis s. annulis  
parvis, confertis, elevatis, crenulatis, fundo pro-  
fundioribus.

caverno- 21. M. composita, stellis immersis hypocateriformibus:  
sa. limbo striato, interstitiis futura elevata.

*Seb. mus. 3. t. 112. f. 19. & v. 4. t. 112. f. 19.*

*Pall. zooph. 188. Madrepora astroites.*

*Habi-*

*Habitat in O. Americano.*

Corallium stellis confertis. Stellæ discus cavo-cylindricus, profundior; Limbus truncatus, striatus. Suturae tamquam rete pentagonum, stellis elevatis, lateribus striatum, stellas distinguunt.

punctata. 22. M. composita, punctis stellaribus confertis conflatis e punctis denis.

*Habitat in Oceano Europæo.*

Corallium rotundatum, album, friabile. Puncta stellaria conferta, parva, inequalia: singula conflata ex poris 10 f. 12 intrasis.

calycularis. 23. M. aggregata, cylindris coadunatis, stellis excavatis centro prominulo.

*Pall. zooph. 186. Madrepora calycularis.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

Corallium subrotundum, fuscum, ex cylindris coadunatis. Stellæ profunde concavae, disco medio prominulae. Cylindri laterales saepe distincti, extus transverse rugosi.

truncata. 24. M. fasciculata: articulis turbinatis proliferis radio pluribus margine coadunatis, stellis truncatis disco concavo-cylindrico.

*Amœn. acad. 1. p. 93. t. 4. f. X: 3.*

*Habitat - - rejicitur ad Gotlandia littora Balthica.*

Corallii Articulus turbinatus, parum rugosus, longitudine & latitudine equalis. Stella tota radiata, truncata disco concavo cylindrico; ex hujus margine nascuntur plures alii articuli conformes, & sic ulterius; articuli hi coalescunt summo margine.

stellaris. 25. M. fasciculata: articulis proliferis centralibus solitariis, stellis margine dilatato-coadunatis.

*Amœn. acad. 1. p. 94. t. 4. f. XI: 4.*

*Habitat - - rejicitur ad littora Gotlandiæ.*

Corallii Caules simplices, palmares & ultra, crassitie digiti, cortice obsolete striato, erecti, paralleli. Articuli cyathiformes s. superne crassiores, inferne angustiores, basi dilatata, longitudine pollicis transversi. Stella dilatata margine fere in membranam; basis articuli tegit discum stellæ subjacentis articuli; margo stellæ concrevit cum lateralibus.

M m m m 5

26. M.

Organum:

26. *M. fasciculata*, corallis cylindricis laevibus distantibus, combinatis: membranis deflexis.  
*Amœn. acad.* 1. p. 96. t. 4. f. VI. 1.  
*Habitat* - - *rejecitur e M. Balthico ad littora.*  
 Corallii Caules *crassitie culmi secalis, paralleli, laeves.*  
*Diaphragmata equali spatio remota, quasi a caulibus penetrata; sed ad caulem deflexa, & stellarum striis radiata.*
- musicalis. 27. *M. fasciculata*, corallis cylindricis striatis distantibus: combinatis membranis confertissimis transversis.  
*Ellis. atl. angl.* v. 53. p. 432. t. 20. f. 14.  
*Barlac. cornub.* 241. t. 27. f. 7. Corallium tubulatum fasciculatum.  
*Pall. zooph.* 185. Madrepora organum.  
*Habitat* - - *rejecitur ad littora Hiberniæ.*  
*Differt a præcedenti culmis striatis, nec laevibus; diaphragmibus passim confertissimis, nec deflexis; Culmis fere tubulosis & lacteis. &c.*
- cæspitosa. 28. *M. fascicularis*, corallis teretibus subramosis striatis approximatis, stellis turbinato-concavis reticulatis.  
*Gvalt. test.* t. 61. Acropora cæspitosa albida ramosa.  
*Imperat. nat.* 818. Porus matronalis.  
*Aldr. mus.* 292. Pseudo-Corallium album fungosum.  
*Worm. mus.* 235. Millepora imperati.  
*Mercat. metall.* 134. Juncus lapideus.  
*Pall. zooph.* 184. Madrepora flexuosa.  
*Habitat in M. Mediterraneo.*
- flexuosa. 29. *M. fascicularis*, corallis cylindricis scabris flexuosis approximatis, stellis convexis striatis.  
*Amœn. acad.* 1. p. 96. t. 4. f. XXIII. 5.  
*Habitat* - - *rejecitur ad littora M. Balthici.*
- fascicula- 30. *M. fascicularis*, corallis rectis cylindricis glabris & ris. vergentibus.  
*Imperat. nat.* 817. Millepora  
*Barrb. hist.* 3. p. 795. Corallio affinis Madrepora.  
*Bonan. kerch.* t. 5. f. 1.  
*Gvalt. test.* t. 106. f. G.  
*Rumph. mus.* 6. p. 245. t. 87. f. 3. Caryophyllites saxum.  
*Seb. mus.* 3. t. 108. f. 9.  
*Pall. zooph.* 183. Madrepora caryophyllites.  
*Habitat in O. Indico.*



porites. 31. *M. subramosa* composita scabra, poris substellatis confertis.

*Imperat. nat.* 802. t. 814. *Corallium stellatum*.

*Bauh. hist.* 3. p. 805. *Corallium stellatum minus album*.

*Bocc. mus.* t. 9. f. 1, 4.

*Morif. hist.* 3. f. 15. t. 10. f. 12. *Porus albus pumilus ramulior stellatus*.

*Pet. pterigr.* t. 20. f. 15. *Corallium porosum typhoides stellatum*.

*Gualt. test.* t. 20. *Madrepora alba brassicam floridam referens*.

*Seb. mus.* 3. t. 109. f. 11.

*Pall. zooph.* 192. *Madrepora porites*.

*Habitat in Oceano Indiae utriusque*.

*Corallium scabrum, lynceo inspectum videtur constare punctis acutis inter stellas*.

damicornis. 32. *M. ramosa* composita verrucosa, poris sparsis confertis immersis margine solo crenatis.

*Imperat. nat.* 626. *Species Corallii*.

*Bauh. hist.* 3. p. 805. *Corallium candidius verrucosum punctatum*.

*Bauh. pin.* 366. *Corallium album verrucosum punctatum*.

*Morif. hist.* 3. f. 15. t. 10. f. 11. *Porus f. Astroites humilior, ramis latis compressis*.

*Shaw. afr.* t. 1. f. 33. *Madrepora astroites ceratiformis*.

*Rumph. amb.* 6. p. 240. t. 86. f. 3. *Lithodendrum littoreum*.

*Gualt. test.* t. 104. *Madrepora candida ramosa, damæ cornua referens, foraminibus rotundis*.

*Pall. zooph.* 197. *Madrepora damicornis*.

*Syst. nat.* 10. p. 791. n. 9. *Millepora damicornis*.

*Habitat in O. Africano & Indico*.

*Rami ramosi, sæpius, verrucis ramulosi. Pori sparsi, impressi, fundo verrucosi, patentes, subcrenati interiore margine. Hanc cum præcedente, si quis ad Milleporas referat, forte facilius tum reperiat.*

muricata. 33. *M. ramosa* composita subimbricata, stellis oblique truncatis prominentibus adscendentibus.

*Hort. cliff.* 481. *Millepora ramosissima, punctis subtus semi-ovatis prominulis, ramis acutis*.

*Mus.*

- Mus. Tassin.* 118. Madrepora spinosa & corymbosa.  
*Syst. nat.* 10. p. 792. n. 14. Millepora muricata.  
*Clus. exot.* 123. Planta faxea abrotanoides.  
*Baub. hist.* 3. p. 807. Abrotanoides faxea planta.  
*Bonán. kirch.* 285. n. 8.  
*Worm, mus.* 233. Corallium tuberosum punctatum.  
*Calceol. mus.* 12.  
*Morif. hist.* 3. f. 15. t. 10. f. 3, 9, 10. Porus albus.  
*Petiv. pterigr. t.* 18. f. 7. Corallium porosum muricatum.  
*Sloan. jam.* 1. t. 18. f. 3. & t. 17. f. 4. Corallium album porosum.  
*Rumph. amb.* 6. p. t. 86. f. 1, 2. Lithodendron calcareum.  
*Gualt. test. tab. ante* 20. Madrepora albida digitata.  
*Seb. mus.* 3. t. 108. f. 6. & t. 114. f. 1. & t. 116. f. 5.  
*Pall. zooph.* 194. Madrepora muricata.  
*Habitat in O. Indiæ utriusque.*

Rami albi: testis poris exefis, adspersi undique mucronibus ovatis, concavis, supra oblique truncatis, interne substellatis. Corallium sæpe format pulcherrime ramis suis corymbum rosaceum.

- fastigiata. 34. M. caulescens rudis subdichotoma fastigiata, stellis extus decorticatis.

*Pall. zooph.* 175. Madrepora fastigiata.

*Seb. mus.* 3. t. 109. f. 1. & t. 110. f. 3 & t. 116. f. 4.

*Habitat in O. Americano.*

Stellæ terminales referunt M. turbinatam, sed extus quasi decorticata s. porcata, pollice crassiores. Affinis M. areolata.

- ramosa. 35. M. caulescens pinnata undulato-striata, stellis terminalibus. *Fn. svec.* 2216.

*Imper. nat.* 651. Porus matronalis ramosus.

*Bonán. kirch.* t. 285. f. 6.

*Worm. mus.* 233. Madrepora ramosa.

*Best. mus.* t. 26. Corallium maximum truncatum.

*Baub. hist.* 3. p. 807. Porus magnus.

*Baub. pin.* 367. Corallio affinis Porus magnus.

*Morif. hist.* 3. f. 15. t. 10. f. 1. Porus magnus.

*Pet. gaz.* t. 76. f. 7. Corallium striatum nodosum.

*Tournef. inst.* t. 340. Madrepora maxima ramosa.

*Marsf. mar.* t. 30. f. 136-139. & t. 31. f. 141-146.

*Shaw.*

*Shaw. afr. t. 1. f. 36.*

*Donat. adr. t. 6. cum animasti.*

*Pall. zooph. 176.*

*Habitat in M. Mediterraneo & Norvegico.*

*Caules magni, solidi, simplices, bifariam alternim ramosi, ramis truncatis. Stella terminalis solitaria cujusvis rami.*

oculata. 36. *M. caulescens tubulosa glabra flexuosa oblique substriata, ramis alternis, stellis immeris bifariis.*

*Gualt. test. n. 3. (ante Tab. I.). Acropora alba, foraminibus stellatis amplioribus.*

*Imper. nat. 815. Corallium album fistulosum.*

*Best. mus. 25. Corallium album indicum.*

*Bauh. hist. 3. p. 805. Corallium album oculatum officinarum.*

*Rumph. amb. 6. p. 233. Accabarium album verrucosum.*

*Seb. mus. 3. t. 116. f. 1, 2.*

*Pall. zooph. 179.*

*Habitat in O. Indiae orientalis. Corallium album officinarum. Corallium intus perforatum est.*

virginica. 37. *M. caulescens subdichotoma recta solida, stellis alternis eminentibus.*

*Imper. nat. 809. Corallium album.*

*Bocc. mus. t. 9. f. 6. Corallium fistulosum imperati.*

*Pet. gaz. t. 76. f. 8. Corallium album majus stellatum radiatum.*

*Marfil. mar. t. 30. f. 140.*

*Pall. zooph. 180.*

*Habitat in M. Americano, Mediterraneo.*

prolifera. 38. *M. ramosa subdichotoma reticulato-coalescens, stellis latere proliferis terminalibus concavis.*

*Pall. zooph. 178.*

*Best. mus. t. 35. Corallium immaculatum.*

*Edw. av. t. 194.*

*Seb. mus. 3. t. 116. f. 3. bona.*

*Habitat in O. Norvegico. D. Gunnerus.*

*Corallium niveum (& Madrepora oculata) sed longe majus, terminatum stella turbinata s. superne paulo ampliore. Rami 2 f. 3, ad latera hujus stellae, similes & sic multoties usque in pedalem altitudinem & ultra excrescunt; ubicunque hi rami se tangunt, reticulatim connectuntur. Inde stellae terminales*

*nales & axillares, omnes exstantes. Stellæ admodum profunda excavata lamellis quibusdam ipsa stella altioribus.*

infundibuli-39. *M. turbinata* infundibuliformis subprolifera.

*formis. Syst. nat. 10. p. 789. Tubipora infundibuliformis.*

*Hort. cliff. 480. Millepora cyathiformis turbinata interius prolifera.*

*Gvalt. test. t. 42. Choana saxea crispata rugosa, minimis poris.*

*Pall. zooph. 195. Madrepora Crater.*

*Habitat in O. Indico.*

*Affinis M. muricata.*

### 338. MILLEPORA- *Animal Hydra.*

*Corallium* poris turbinatis teretibus.

alcicornis-40. *M. ramosa* compressa recta, poris sparsis obsoletis.

*Roy. lugab. 526. Millepora plana ramossissima ramorum fastigio digitata.*

*Gesn. figur. 132. Gypsum coralloides.*

*Baub. hist. 3. p. 896. Corallium asperum candicans adulterinum.*

*Worm. mus. 232. Aleis cornu figura corallium.*

*Morif. hist. 3. f. 15. t. 10. f. 24, 27. Corallium album fragile polyschides.*

*Sloan. jam. 1. t. 17. f. 1. Corallium asperum candicans.*

*Petiv. pterig. t. 18. f. 13. Corallium porosum latum planum.*

*Rumph. amb. 6. p. 243. Lithodendrum saccharaceum album.*

*Pall. zooph. 161.*

*Habitat in O. Indiæ utriusque.*

*Corallium pedale & ultra, album, compressum, late expansum, obtusum, fragile, quasi ex gypso confectum. Pori sparsi, remoti, minimi, vixque conspicui.*

aspera. 41. *M. ramosa* subcompressa muricata, poris eminentibus hinc filis.

*Gvalt test. t. 55. Madrepora dense furculosis palmatis crispis verrucose hirsutis.*

*Marfil.*

*Marsil. mar. t. 32. f. 152, 157.*

*Habitat in M. Mediterraneo, Norvegico.*

*Corallium erectum, bifarium, teretiusculum, vix compressum. Rami adpersi poris confertis, eminentibus; hi pori latere inferiore fissi sunt.*

solida. 42. *M. turbinata, poris confertissimis angulatis.*

*Habitat - - ad littora Gotlandiæ rejecta.*

*Pororum tubi intus dissepimentis transversis.*

truncata. 43. *M. caulescens dichotoma erecta, ramis truncatis.*

*Marsil. mar. t. 32. f. 154.*

*Donat. adr. 55. t. 7. Myrizoum.*

*Pall. zooph. 153.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Corallium erectum, ramis perfecte dichotomis, subdivaricatis, apice & quasi stella obsoleta terminatis. Pori undique sparsi. Rami diffracti, Madreporæ more poroso-striati.*

compressa. 44. *M. caulescens subdichotoma compressiuscula, ramis distantibus, poris undique prominulis scabris.*

*Habitat in M. Mediterraneo. D. Kabler.*

lichenoides. 45. *M. caulescens decumbens bifarie dichotoma, ramis denticulatis binis porosis scabris.*

*Marsil. mar. t. 33. f. 163, 162, 164.*

*Ellis coral. 95. t. 35. f. B. b.*

*Seb. mus. 3. t. 110. f. 10.*

*Pall. zooph. 150.*

*Habitat in M. Mediterraneo, Norvegico.*

*Corallium decumbens, ramosissimum, dichotomum, compressum: ramis compressis, denticulatis, hinc levibus, inde scabris, poris mucronatis.*

lineata. 46. *M. caulescens dichotoma teres, poris multiplicatis seriatis.*

*Marsil. mar. t. 32. f. 152?*

*Habitat - -*

*Corallium filiforme, ramosissimum, dichotomum, divaricatum ramis anastomosantibus. Pori per series longitudinales, retrorsum digitis scabri.*

fascialis. 47. *M. membranacea ramosa flexuosa utrinque porosa.*

*Marsil. mar. t. 33. f. 160. f. 1, 2, 3.*

*Ellis*

*Ellis. cor.* 71. n. 3. t. 30. *A. a. b.* Eschara foliacea millepora extremitatibus hinc inde irregulariter coalescentibus.

*Pall. zooph.* 9. Eschara fascialis.

*Habitat in* O. universo.

reticulata. 48. *M. membranacea*, ramis anastomosantibus depressis linearibus, hinc poris prominentibus asperis.

*Imper. nat.* 821. Frondipora; Porus frondosus.

*Baub. hist.* 3. p. 809. Frondipora.

*Marsil. mar. t.* 34. f. 165, 166.

*Pall. zooph.* 147. Millepora frondipora.

*Habitat in* M. Mediterraneo.

*Corallium horizontale*, subpeltatum, convolutum, ramosissimum ramis linearibus, compressis, reticulatis. Rami subtus laeves, supra scabri poris acuminatis, confertis.

cellulosa. 49. *M. membranacea reticulata umbilicata turbinato-undulata*, hinc porosa pubescens.

*Imper. nat.* 821. Retepora.

*Rond. aquat.* 2. p. 133. Eschara.

*Baub. hist.* 3. p. 809. Eschara.

*Benan. kirch. t.* 286. f. 10.

*Mars. mar. t.* 133. f. 161-12. Madrepora forma rosa.

*Ginan. adr.* 9. t. 4. f. 9.

*Rumph. amb.* 6. p. 247. t. 87. f. 5. Reticulum marinum.

*Seb. mus.* 3. t. 100. f. 11. & t. 101. f. 5, 6.

*Ellis cor.* 72. t. 25. f. D. d.

*Aubert. misc. t.* 23. Manchette de Neptune.

*Pall. zooph.* 148. Millepora retepora.

*Habitat in* O. Europæo & Indico.

*Corallium membrana lapidea, convulso-turbinata* f. varie plicata, perforata foraminibus ovatis, inaequalibus, innumeris, quincuncialibus; supra punctata, subtus lavis.

Reticulum. 50. *M. filis ramosissimis anastomosantibus cancellatis.*

*Habitat in* Testis Concharum M. Mediterranei.

*Fila calcarea, crassitie capilli, undique anastomosantia in modum retis Araneæ, pulcherrime & confertim cancellata; sed nulli pori mihi visi.*

Spongi- 51. *M. caulescens erecta, ramis angulatis imbricatis ana-*  
tes. stomozantibus. *Mus.*

*Musf. Tess.* 118. t. 11. f. 2. *Corallium reticulatum.*

*Habitat* - -

*Corallii longitudo saepe pedalis, crassities ramarum digiti. Poros nullos vidi. Statura multum accedit Spongiae, sed omnino lapidea.*

coriacea. 52. *M. submembranacea semiorbicularis subhorizontalis rarius porosa.*

*Imper. nat.* 840. *Muscus lapidosus.*

*Bonan. kirck.* 289. f. 16.

*Shaw. afric. t.* . f. 1. *Alcyonium candidum cretaecum lamellatum.*

*Pall. zooph.* 762. *Millepora agarici formis.*

*Habitat in Oceano omni ad Cap. b. spei, Fucum cartilagineum incrustans.*

*Conficit quasi concamerationum tecta in Coralliis variis. Pori sparsi in pagina inferiori, sed rarius.*

polymorpha. 53. *M. crassacea polymorpha solida, poris nullis.*

*Bonan. kirck.* 289. f. 15.

*Best. mus. t.* 23. *Alcyonium album.*

*Musf. mar. t.* 3. f. 12, 14, 13.

*Sloan. jam. 1. t.* 18. f. 2. *Corallium album pumilum.*

*Ellis. cor.* 76. t. 27. f. C. *Corallium pumilum album.*

*Seb. mus. 3. t.* 108. f. 8. & t. 116. f. 6, 7.

*Pall. zooph.* 163. *Millepora calcarea.*

*Habitat in omni Oceano; Cor. subrotundum, coralliforme, ramosum, tuberculatum, securiforme, semper crassum, nec membranaceum; in Norvegiae littoribus nucis juglandis figura, unde calcem conficiunt.*

### 339. CELLEPORA. *Animal Hydra.*

*Corallium forarhintulis urceolatis, submembranaceis.*

ramulosa. 54. *C. dichotomo-fasciculata, ramulis teretibus obtusis, tubis confertissimis cylindricis.*

*Habitat in Oceano Norvegico. D. Gunnerus.*

*Corallium fragilissimum, quasi ex arena compositum ramulis copiosissimis; at armato oculo constati sunt rami poris cylindricis.*

N n n n

55. C.

Spongites. 55. *C. lamellis simplicibus undulato-turbinatis cumulatis, cellulis seriatis: osculo marginato.*

*Pall. zooph. 11.*

*Mercat. metall. 112. Adarce.*

*Imperat. nat. 632. Porus anguinus.*

*Best. mus. t. 28. Lapis spongiæ.*

*Gualt. test. t. 70, 71. Porus anguinus.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Stratum membranaceum, multiplex, superficie striata, nitida. Cellulæ per series subalternæ, ovali-subquadratæ, osculo declinato marginato. P.*

pumicosa. 56. *C. corallio dichotomo subcompresso erectiusculo scabro.*

*Marsf. mar. t. 31. f. 149.*

*Ellisf. cor. 75. n. 7. t. 27. f. G. & t. 30. f. D. D.*

*Pall. zooph. 157. Millepora pumicosa.*

*Habitat in Oceano; ex O. Norvegico. D. Gunnerus.*

verrucosa. 57. *C. cellulis subrotundo-glomeratis ovatis, ore subtridentato.*

*Syst. nat. 10. p. 789. Tubipora verrucosa.*

*Pall. zooph. 13. Eschara annularis?*

*Habitat in M. Mediterranei Fucis aliisque marinis.*

*Corallium f. glomer albus, lynceo inspicendus ut uti tubulorum pateant.*

ciliata. 58. *C. cellulis convexis, ore septemdentato.*

*Pall. zooph. 6. Eschara ciliata.*

*Habitat in O. Europæi plantis submarinis.*

hyalina. 59. *C. cellulis subglobosis diaphanis, ore obliquo simplic.*

*Habitat in Milleporæ coriacea pagina inferiore, frequens in Oceano.*

*Cellulæ confertæ, in plano dispositæ, ore vix marginato, rarius in apice cellula, sæpius obliquo; ad laterum alterum magis verso.*



## V. ZOOPHYTA.

*Animalia composita, efflorescentia.**Stirps vegetans, metamorphosi transiens in florens Animal.*340. ISIS. Flores Hydræ, sparsi e floribus laterali-  
bus.*Stirps radicata, lapidea, rigida, sæpe  
articulata.*Hippuris. 1. I. stirpe corallina, articulis striatis, geniculis attenua-  
tis. *Fn. suec.* 2220.*Hort. cliff.* 480. Sertularia ramosissima articulis sul-  
catis.*Mus. Tessin.* 118. Sertularia eadem.*Clus. exot.* 124. Hippuris faxea.*Bauh. hist.* 3. p. 788.*Best. mus.* 78. t. 23.*Olear. mus.* 76. t. 35. f. 4.*Rumph. amb.* 6. p. 228. t. 84. Accabarium album.*Gvalt. test.* 118. f. 16. Lithophyton articulatum in-  
ternodiis striatis.*Edw. av.* t. 93.*Seb. mus.* 3. t. 110. f. 1, 2.*Pall. zooph.* 145.*Habitat in O. omni.*dichoto- 2. I. stirpe corallina, articulis lævibus, geniculis decor-  
ma. ticatis.*Pet. gaz.* 7. t. 3. f. 10. Hippuris coralloides cornæa  
capentis, geniculis limosis.*Seb. mus.* 3. t. 106. f. 4.*Pall. zooph.* 143. Isis dichotoma.*Habitat in O. Æthiopico.*Ochracea. 3. I. stirpe corallina, articulis decorticatis, geniculis no-  
dosis.

N n n n 2

*Hort.*


---

Zoophyta non sunt, uti Lithophyta, authores sue testæ s. trunci, sed testæ ip-  
sorum; sunt enim Stipites vere plantæ, quæ metamorphosi transiunt in flores  
animatos (vera Animalcula), confectos ex generationis organis & motus in-  
strumentis, ut motum, quem extrinsecus non habent, a se ipsis obtineant.

*Hort. cliff.* 480. *Lithoxylon ramosum erectum articulatum rigidum, ramis saepius liberis oppositis compressis, geniculis crassiusculis.*

*Rumph. amb.* 6. p. 234. t. 85. f. 1. *Accabarium rubrum.*

*Seb. mus.* 3. t. 192. f. 1.

*Ellis. act. Angl.* v. 50. p. 188. t. 3.

*Pall. zooph.* 144. *Isis ochracea.*

*Habitat in O. Indico.*

**Entrocha. 4.** I. stirpe testacea tereti, articulis orbiculatis perforatis, ramis verticillatis dichotomis.

*Habitat in Pelago.*

*Stirps crassitie digiti, confertissime articulata ex orbiculis planis, centro perforato foramine pentagono, disco utroque e centro substriato, superficie exteriori s. corticali inaequali, ordine tuberculorum cincta (quae ramorum decedentium cicatrices). Rami tenues, continui nec articulati, dichotomi, unde Entrochi & Coralloides ejusdem speciei petrificata.*

**Asteria. 5.** I. stirpe testacea articulata pentagona, ramis verticillatis: stella terminali dichotoma.

*Ellis. encrin.* 1764. quart. t. 13. f. 14. *Encrinus capite stellato ramoso dichotomo, stipite pentagono e-quisetiformi.*

*Act. Angl.* v. 52. t. 14.

*Habitat in Oceano Barbados alluente.*

*Conf. Act. Paris.* 1761. *Palma marina e martynica Guettardi.*

*Asteria columnaris hujus vertebra s. articulus, frequens inter Europaea petrificata, hinc etiam in Pelago Europaeo obvia.*

**nobilis. 6.** I. stirpe corallina aequali continua, striis obsoletis obliquis, ramis vagis.

*Syst. nat.* 10. p. 797. *Madrepora rubra.*

*Pall. zooph.* 142. *Isis nobilis.*

*Bauh. pin.* 366. *Corallium rubrum.*

*Tournef. inst.* 572. t. 339.

*Worm. mus.* 231.

*Ellis. corall.* 93. t. 35. f. A-C.

*Donat. mar.* 43. t. 5.

*Ginan. adr.* 1. p. 7. t. 1. f. 1.

*Habitat in Mari Mediterraneo; Corallium rubrum officinarum.*

Media inter Ifides & Gorgonias; his accedit Corallio non articulado; illis calcareo. Asterias oblitteratas corallio passim insculptas vidi; at papillas sparsas, ore octolobo. Pall.

### 341. GORGONIA. Flores Hydræ, sparsi e poris lateralibus.

*Stirps* radicata, cornea, continua, ramosa; basi explanata, cortice obducta.

*Lepadifera*. 1. *G. dichotoma*, floribus sparsis confertis reflexis campanulatis imbricatis.

*Clus. exot.* 122. t. 123. Planta resedæ facie.

*Worm. mus.* 329. Planta marina resedæ facie.

*Best. mus.* 24. Reseda marina.

*Gunner. act. nidros.* 2. p. 321. t. 9. Gorgonia resediformis. egregie.

*Baster. subs.* 2. p. 130. t. 13. f. 1.

*Pall. zooph.* 131. Gorgonia reseda.

*Habitat in Pelago Norvegico. D. Gunnerus, Episc. Nidros.*

*Stirps sesquipedalis, bifariam dichotoma, basi lapidea, Ramis cartilagineis. Cortex membranaceus, albidus. Flores Lepadibus Balanis simillimi, squamis imbricatis, turbinato-campanulatis, clausi valvulis 8 lanceolatis, conniventibus, confertim sparsi, reflexi.*

*verticilla*. 2. *G. pinnata* ramosa, ramulis alternis parallelis, floribus verticillatis incurvis.

*Marf. mar.* 101. t. 20. f. 94-96.

*Ellis. corall.* 60. t. 26. f. S, T, V.

*Pall. zooph.* 109.

*Habitat in M. Norvegico, Mediterraneo.*

*Stirps subramosa, pinnata ramis filiformibus, flexilibus.*

*Flores verticillati, 3-5, squamosi, ore arcu incurvati versus ramum, verticillis remotis.*

N n n n 3

3. G.

GORGONIAE manifesta metamorphosi e Vegetabili in Animale mutantur. Planta enim Radicata more Fuci excrevit in Caulem ramosum, Cortice indutum deponente Librum indurandum in Lignum secundum annulos concentricos, intra quos Medulla animata, que prodit in Animalcula florida, sponse se claudenda, aperientia, moventia, sentientia, alimentum affluens colligentia, per os ingurgitantia.

Placo-  
mus.

- 3.
- G. bifaria*
- , ramis flexuosis rarius anastomosantibus, floribus conicis eminentibus.
- Fw. suec.*
- 2223.

*Breyn. prodr.* 3. t. 29. *Lithoxylon fuscum subhirsutum.**Gunner. act. nidrosf.* 3. p. 1. t. 1. *Gorgonia flabelliformis.**Pall. zooph.* 129.*Clus. exot.* 122. *Frutex marinus ericæ facie.**Marf. mar.* t. 17.*Ellis. corall.* 67. t. 27. f. a. 1.*Habitat in Pelago Europæo.**Stirps lignosa, bifariam varie ramosa, ramis passim rariusque confluentibus anastomosibus. Cortex papposus. Flores stellati, basi immerfi, radiis 8 setaceis eminentibus.*

Abies.

recta.

- 4.
- G. simplex scabra paniculata*
- , ramis recurvatis.

- a.
- G. paniculata*
- , ramis muricato-scabris.
- Syst. nat.*
10. p. 802.

*Rumph. amb.* 6. p. 207. t. 80. f. 2. *Cupressus marina.**Seb. musf.* 3. t. 106. f. 1.*Pall. zooph.* 138. *Antipathes cupressina.*

Spiralis.

- β.
- Gorgonia simplicissima spiralis scabra.*
- Syst. nat.*
10. p. 800.

*Rumph. amb.* 6. p. 202. t. 78. f. C. *Palmjuncus anguinus.**Pall. zooph.* 141. *Antipathes spiralis.**Habitat in O. Indico.**Stirps atra, teres, adspersa punctis acutis, per series digestis. Rami sparsi, recurvati, debiles, angustii, scabri, punctis acuminatis, minutis, subimbricatis.**Culmus in β volubilis dextrorsum sinistrorsumque.*

ænea.

- 5.
- G. paniculata*
- , culmo flexuoso, ramis alternis confertis dichotomis.

*Rumph. amb.* 6. p. 227. t. 80. f. 2.*Seb. musf.* 3. t. 100. f. 17, 18, 19.*Pall. zooph.* 139. *Antipathes orichalcea.**Habitat in Pelago Indiæ orientalis.**Stirps flexuosa, inferne nuda, superne paniculata: panicula ovata. Rami confertim alterni, dichotomi, subdiaphani, ænei ut stirps, desinentes in ramulis capillares.*verato-  
phyta.

- 6.
- G. subdichotoma*
- , axillis divaricatis, ramis virgatis bifurcatis, cortice rubro poris bifariis.

*Musf.*

*Mus. Tessin.* 118. Lithophyta ramis virgatis atris, cortice albido poroso.

*Bauh. hist.* 3. p. 806. Coralloides fruticosa planta marina erectior.

*Bauh. pin.* 366. Corallina fruticosa purpurea.

*Pluk. phyt.* 2. 454. f. 13.

*Pet. gaz.* 2. 31. f. 8. Coralloides epispongiosa, virgulis dilute purpureis.

*Marfil. mar.* 2. 19. f. 83. Lithophyllum IV.

*Catesb. car.* 2. 2. 13. Corallina fruticosa erectior.

*Seb. mus.* 3. 2. 107. f. 3.

*Pall. zooph.* 117.

*Habitat in* O. Atlantico, Americano.

elongata. 7. *G. dichotoma* divaricata, cortice rubro poris papulosis sparsis subimbricatis.

*Pall. zooph.* 111. *Gorgonia elongata*.

*Habitat in* O. Atlantico.

verruco- 8. *G. bifaria*, ramis flexuosis, cortice calcareo albido poris prominulis.

*Bauh. hist.* 3. p. 808. 2. 809. Coralloides granulosa alba.

*Bauh. pin.* 366. Corallina alba nodosa.

*Worm. mus.* 234. Frutex verrucarius s. vermicularis.

*Raj. angl.* 32. Ceratophyton flabelliforme cortice verrucoso.

*Sloan. act. Angl.* v. 44. 2. 478. p. 51. 2. 2.

*Marfil. mar.* 2. 16, 18, 21.

*Seb. mus.* 3. 2. 106. f. 3.

*Pall. zooph.* 126. *Gorgonia verrucosa*.

*Habitat in* O. Americano, Mediterraneo.

*Cortex huic calcareus; Placoma stuposus.*

Antipa- 9. *G. paniculato-ramosa* ligno extus flexuose striato.

*Bauh. pin.* 366. Corallium nigrum.

*Ginan. adriat.* 2. 7. f. 20. Ibis Palma.

*Rumph. amb.* 6. p. 196. 2. 77. Accabarium nigrum. ramosum.

*Seb. mus.* 3. 2. 104. f. 2. Frutex marinus fuscus.

*Pall. zooph.* 124.

*Habitat in* O. Indico. *Veterum* Corallium nigrum officinis.

Stirps durissima, rigens, crassa, atra, sub cortice glabra, flexuoso-striata.

N n n n 4

10. *G.*

- anceps.** 10. *G. paniculata* subdichotoma, cortice compresso calcareo margine poroso.  
*Petiv. pterigr.* t. 18. f. 12. Epicorallum virgulis alatis.  
*Sloan. jam.* 1. t. 22. f. 4. Corallina fruticosa, ramulis & caulibus compressis.  
*Catesb. car.* 2. t. 34. Lithophyton compressum obscure lutescens, marginibus purpureis.  
*Ellis. cor.* 68. t. 27. f. 2. Keratophyton dichotomum, caule & ramulis leviter compressis.  
*Pall. zooph.* 115. *Gorgonia anceps*.  
*Habitat in* M. Americano, Anglico.
- pinnata.** 11. *G. compressiuscula* pinnata: ramis compressis simplicissimis, cortice rubro poris oblongis. *Fr. fr.* 2224.  
*Hort. cliff.* 489. Lithoxylon pinnato-ramosum erectum compressum flexile, ramulis setaceis.  
*Breyn. prod.* 3. p. 34. t. 30. Lithoxylon incrustatum, ramis compressis setosis pinnatis.  
*Seb. mus.* 3. t. 114. f. 3.  
*Aubent. ic.* 48.  
*Pall. zooph.* 106.  
*Habitat in* O. Africano, Norvegico.
- setosa.** 12. *G. teres* pinnata, ramulis sparsis, cortice purpurascente.  
*Olear. mus.* t. 35. f. 1. *Quercus marina*.  
*Best. mus.* t. 24. *Quercus marina*.  
*Sloan. jam.* 1. p. 57. t. 22. f. 1, 2, 3. Corallina fruticosa elatior, ramis quaquaversum expansis teretibus.  
*Breyn. ic.* 3. t. 30. Lithophyton incrustatum, ramis compressis setosis.  
*Catesb. car.* 2. t. 35. Lithophyton pinnatum purpureum asperum.  
*Pall. zooph.* 105. *Gorgonia acerosa*.  
*Habitat in* O. Americano.
- petechizans.** 13. *G. subdichotoma* ramosissima, cortice flavo bisulcate poris rubris.  
*Pall. zooph.* 125. *Gorgonia petechizans*.  
*Habitat -*.
- pectinata.** 14. *G. teres*, ramis secundis parallelis simplicissimis, cortice rubro poris gibbis sparsis. †  
*Seb. mus.* 3. t. 105. f. 1: a.  
*Pall. zooph.* 110.  
*Habitat -*.

ventalina. 15. *G. reticulata*, ramis lateribus externe compressis, cortice rubro.

*Hort. cliff.* 840. *Lithoxylon retiforme*, ramulis oppositis compressis.

*Rumph. amb.* 6. p. 205. t. 79. f. 1. *Flabella marina*.

*Pall. zooph.* 101. *Gorgonia Ventilabrum*.

*Habitat in O Indico.*

Rami non versus ramulos, sed a lateribus exterioribus compressi, contrario ac in sequenti modo.

Flabellum. 16. *G. reticulata*, ramis interne compressis, cortice flavo.

*Hort. cliff.* 480. *Lithoxylon retiforme*, ramis parallele compressis.

*Clus. exot.* 120. *Frutex marinus elegantissimus*.

*Baub. hist.* 3. p. 798.

*Worm. mus.* 234. *Frutex marinus elegantissimus*.

*Best. mus.* t. 24.

*Oleir. mus.* 69. t. 35. f. 2.

*Calceol. mus.* 16.

*Ellis corall.* 61. t. 26. f. K. *Ceratophytum Flabellum veneris* Linnæi.

*Pall. zooph.* 104.

*Habitat in Oceano omni.*

342. ALCYONIUM. Flores Hydræ, sparsi intra corticem, Epidermide vesiculari poris pertusa.

*Stirps* radicata, stuposa, tunicato-corticata.

arborescens. 1. *A. stirpe arborescens*, ramis obtusis, poris papularibus.

*Fn. suec.* 2225.

*Mus. Tessin.* 120. t. 10. *Lithoxylon Norvegicum*.

*Clus. exot.* 119. t. 119. *Arbuscula marina coralloides*.

*Baub. hist.* 3. p. 797. *Planta marina coralloides rubra*.

*Worm. mus.* 230. *Planta marina coralloides*.

*Ad. Petropol.* 7. p. 345. t. 13-16.

*Pall. zooph.* 202.

*Habitat in Pelago Norvegico.*

exos. 2. *A. stirpe arborescente coriacea coccinea superne ramosa*, papillis stellatis.

N n n n 5

Gesn.

*Gesn. pisc.* 155. b. Manus marina.

*Bauh. hist.* 3. p. 805. Palma.

*Barr. icon.* 1294, 1293. f. 1. Fungus Amanita marinus.

*Marfil. mar.* t. 38, 39. Manus latronis f. leprosi.

*Ginan. adr.* 1. p. 45. t. 50.

*Schæff. polyph.* 1755. t. 3. e *Marfilio*.

*Bohad. mar.* 114. t. 9. f. 6, 7. Penna ramosa pin-  
nis carens.

*Gall. zooph.* 203. Alcyonium palmatum.

224. Spongia floribunda.

*Habitat in* M. Mediterraneo.

**Epipetrum.** 3. A. stirpe cavata carnosâ rufescente.

*Gesn. paral.* 27. Epipetrum.

*Rond. pisc.* 2. p. 130. Malum insanum marinum.

*Jonst. exsangu.* t. 20. Epipetrum.

*Ellis. act. Angl.* v. 53. p. 434. t. 21. f. 3-5.

*Pall. zooph.* 221. Pennatula Cynomorium.

*Habitat in* M. Mediterraneo; ad Fretum Herculeum.  
*Vandelli.*

**Agaricum.** 4. A. stirpe filiformi, pileo reniformi.

*Ellis. act. Angl.* v. 53. p. 427. t. 19. f. 6-10.

*Pall. zooph.* 222. Pennatula reniformis.

*Habitat in* O. Carolinam alluente.

**digitatum.** 5. A. acaule oblongum coriaceum rugosum. *Fn. suv.*  
2226.

*Bauh. pin.* 366. Fucus Palma marinus.

*Barr. icon.* 1293, 1294.

*Raj. angl.* 31. n. 2. Manus mortui anglis.

*Juss. act. Paris.* 1742. p. 294 t. 9. f. 1.

*Ellis. corall.* 82. n. 2. t. 32. f. A. a. Alcyonium  
ramoso-digitatum molle, asteriscis undique ornatum.

*Act. Angl.* v. 53. p. 431. t. 20. f. 10-13.

*Pall. zooph.* 205. Alcyonium lobatum.

*Habitat in* O. Europeo.

**Schlosseri.** 6. A. subrotundum stuposum, stellis radio pertusis.

*Schloss. act. Angl.* v. 49. p. 451. t. 14.

*Borlac. cornub.* 254. t. 25. f. 1, 2.

*Pall. zooph.* 208. Alcyonium Schlosseri.

*Habitat in* Oceano Cornubiam alluente. *J. A. Schlosser.*

Sub-



Substantia carnosæ, livida, epidermide tecta. Stellæ sparsæ, grandes, distinctæ, vix protuberantes sub epidermide, Madreporam mentientes, subincarnatæ; Radiis 6-10, equalibus, basi concurrentibus, ad basin poro pertusis.

- Lyncurium. 7. A. globosum fibrosum flavum verrucosum. †  
*Marfil. mar.* 82. t. 14. f. 72, 73.  
*Donat. mar.* 60. t. 10. Tethya sphaerica.  
*Pall. zooph.* 210. Alcyonium aurantium.  
*Habitat in O. Africano, Mediterraneo, primum fixum, demum liberum per mare vagatur.*
- Bursa. 8. A. subglobosum pulposum viride.  
*Bauh. hist.* 3. p. 795. Alga Pomum monspeliensium.  
*Bauh. pin.* 368. Bursa marina.  
*Raj. hist.* 83. angl. 31. Bursa marina.  
*Pall. zooph.* 206. Alcyonium Bursa.  
*Habitat in O. Europæo.*
- Cydonium. 9. A. subrotundum spongiosum flavum læve.  
*Rumph. amb.* 6. p. 259. Vespertum marinum.  
*Donat. mar.* 56. t. 9. Alcyonium 1.  
*Seb. mus.* 3. t. 99. f. 4.  
*Pall. zooph.* 211. Alcyonium cotoneum.  
*Habitat in O. Africano, Mediterraneo, rupibus Corallisque affixum, demum liberum a fluctibus agitur. Nereis in cavernis ejus saepe hospitatur.*
- Ficus. 10. A. obovatum pulposum livens. †  
*Bauh. hist.* 3. p. 817. Alcyonium tuberosum.  
*Raj. angl.* 31. Pulmo marinus alter.  
*Marfil. mar.* 87. t. 16. f. 79. Ficus.  
*Ellis. cor.* 82. t. 17. f. B. Alcyonium pulmonis instar lobatum.  
*Pall. zooph.* 209. Alcyonium Ficus.  
*Habitat in O. Europæo.*
- gelatinosum. 11. A. polymorphum gelatinosum. *Fn. succ.* 2228.  
*Ellis. cor.* 87. t. 32. f. D. Alcyonium ramosum molle.  
*Baster. subs.* 1. t. 1. f. 5.  
*Seb. mus.* 3. t. 99. f. 4.  
*Huds. angl.* 471. n. 26. Fucus gelatinosus.  
*Pall. zooph.* 207.

Habi-

*Habitat in Oceano Europæo, frequens in Fucis, Lapidibus.*

- Manus 12. A. polymorphum, protuberantiis obtusis perforatis.  
diaboli. *Seb. musf. 3. t. 97. f. 3?*  
*Habitat in Islandia. J. G. König.*  
Corpus molle instar pulpæ siccatae *Lycoperdi*, extus late,  
superne protuberans digitis (*Sebæ* duplo minoribus)  
aliquos brevibus, obtusis, perforatis apice tanquam  
penna, ad medium usque rami.

### 343. SPONGIA. Flores. (Foraminibus respirat aquam).

*Stirps radicata, pilis contexta,  
flexilis, bibula.*

- Ventila- 1. S. flabelliformis conformis stuposa, venis lignosis reti-  
bra. culatis, obtectis poris favigineis.  
*Gunner. act. nidros. v. 4. f. 4.* Spongia Ventilabrum.  
*Rumph. musf. 6. p. 253. t. 89.* Baltia marina. an?  
*Seb. musf. 3. t. 95. f. 8. an?*  
*Pall. zooph. 247.* Spongia strigosa.  
*Habitat in M. Norvegico. D. Gunnerus.*  
Statura, ramificationis figura *Gorgoniae flabelli*, sed albida,  
friabilis, tota vestita stuposa substantia ex solis poris  
angulatis, per ramulos intrantibus corticem, adeoque  
figura & ramificatio *Gorgoniae*; cortex *Spongiae*.
- flabelli- 2. S. flabelliformis conformis orbiculata, fibris cartilagineis  
formis. dense reticulatis.  
*Hort. cliff. 480.* Spongia flabelliformis, caule teretis-  
sculo, disco compresso-plano vix diviso.  
*Rumph. amb. 6. t. 80. f. 1.* Flabellum marinum arvense.  
*Boerb. lugd. 1. p. 6.* Keratophyton majus nigrum.  
fibris tenuioribus densissime reticulatum.  
*Pet. gaz. t. 32. f. 1.* Rete philippense nigrum, telis  
quadrangulis.  
*Seb. musf. 3. t. 95. f. 2, 4.*  
*Pall. gaz. 226.* Spongia flabelliformis.  
*Habitat in Oceano Indico.*
- infundibu- 3. S. infundibuliformis turbinata flexilis.  
liformis. *Gunn. act. nidros. v. 4. f. 4.* Spongia infundibuliformis.  
*Clus. exot. 125.* Spongia elegans.

Baa

*Baub. pin.* 369. Spongia forma infundibuli.

*Baub. hist.* 3. p. 502.

*Rumph. amo.* 6. p. 254. t. 90. f. 1. Spongia infundibuli forma.

*Worm. mus.* 236. Spongia elegans.

*Richt. mus.* 384. t. 14. f. P.

*Pall. zooph.* 246. Spongia foliifera.

*Habitat in M. Norvegico. D. D. Gunnerus.*

*Junior perfecte infundibuliformis; adultior rumpitur saepius bifariam & plana evadit. Substantia minus S. officinali tenax.*

**fistularis.** 4. S. tubulosa simplex fragilis sensim ampliata.

*Hort. cliff.* 380. Spongia tubulosa simplex cavernosa.

*Sloan. jam.* 1. p. 62. t. 24. f. 1. Spongia dura fistulosa, fibris crassioribus.

*Seb. mus.* 3. t. 95. f. 1, 7.

*Pall. zooph.* 232.

*Habitat in Oceano Indico.*

*Cylindrica sensim versus basin angustata, pedalis & ultra, intus cava laevis; extus muricata, intertexta fibris corneis griseis, duriori compressione fragilibus.*

**aculeata.** 5. S. tubulosa ramosa tenax foraminulata subaculeata.

*Roy. lugdb.* 522. Spongia tubulosa cavernosa extus aculeata.

*Sloan. jam.* 1. p. 63. t. 23. f. 4. Spongia dura f. spuria, apicibus acutis exstantibus, intus cavernosa.

*Pluk. phys.* t. 112. f. 4. Spongia marina fistulosa maxima muricata.

*Rumph. amb.* 6. p. 255. t. 90. f. 2. Chirotheca marina.

*Pall. zooph.* 242. Spongia villosa.

*Habitat in O. utriusque Indiae.*

**tubulosa.** 6. S. tubulosa ramosissima fastigiata tenax.

*Roy. lugdb.* 522. Spongia tubulosa ramosissima tenax fastigiata.

*Boerb. lugdb.* 1. p. 9. Spongia ramosa fistulosa millepora.

*Seb. mus.* 3. t. 97. f. 2.

*Pall. zooph.* 241. Spongia fastigiata.

*Habitat in O. Indico.*

**cancellata.** 7. S. tubulosa foraminulata, fibris cancellatis.

*Habitat in Oceano.*

*Spongia rarioris texture quam reliqua, unde fibrae quasi*

*quasi cancellatæ, distantes: color ferrugineus, superficies muricata, tubo crassitie digiti, foraminibus lateralibus raris, latitudine pennæ anserinæ.*

officinalis. 8. *S. foraminulata subramosa difformis tenax tomentosa.*  
*Mat. med.* 527. *Spongia tenax subramosa, ramis difformibus pertusis.*

*Imper. nat.* 828. *Spongia globosa.*

*Bauh. pin.* 392. *Spongia globosa.*

*Bauh. hist.* 3. p. 818. *Spongia compressa Schiaccatz.*

*Pall. zooph.* 234.

*Habitat in M. Mediterraneo.*

oculata. 9. *S. foraminulata ramosissima erecta tenax, ramis teretiusculis obtusis.*

*Hort. cliff.* 480.

*Bauh. pin.* 369. *Spongiosus Fucus.*

*Bocc. mus.* 258. t. 116. *Spongia ramosa oculata viridis fruticosa.*

*Ellis. cor.* 80. n. 1. t. 32. f. F. *Spongia ramosa britannica.*

*Seb. mus.* 3. t. 97. f. 5, 6, 7. *Spongia ramosa erecta subtilis.*

*Pall. zooph.* 239.

*Habitat in M. Britannico.*

muricata. 10. *S. foraminulata ramosissima angulata tenax: poris cylindricis subulatis prominentibus æqualibus multifidis hispidis.*

*Mus. Tessin.* 118. t. 11. f. 1. \*

*Seb. mus.* 3. t. 99. f. 7. *Spongia, ramis crassiusculis tenax.*

*Pall. zooph.* 237.

*Habitat in O. Æthiopico.*

nodosa. 11. *S. foraminulata subramosa difformis scabra tenacissima ramis nodosa cavernosa.*

*Roy. lugdb.* 522.

*Mercat. armam.* 106. *Alcyonium 5 generis.*

*Sloan. jam.* 1. p. 63. t. 23. f. 5. *Spongia minor mollior medullæ panis similis, fibris tenuissimis.*

*Seb. mus.* 3. t. 96. f. 2.

*Pall. zooph.* 238. *Spongia rubens.*

*Habitat in O. Americano.*

12. S.

*Vermis Spongiæ efformans. Peyson, act. angl. v. 50. (1750) part. 2. p. 590? vix videtur*

tomento- 12. *S. porosa subaculeata tomentosa.*

sa. *Habitat supra Zosteram aliasque plantas marinas.*

*Similis S. oculatae, sed tota tomentosa, extus subaculeata, sparsis poris angustis pertusa, mollissima, densa, belvola, rotundata.*

bacillaris. 13. *S. conformis caulescens erecta, ramis appressis porulosis.*

*Habitat in O. Norvegico.*

*Spongia mea sesquipedalis, teres, crassitie pollicis: rami aliquot minime divaricati, erecti. Tota fere Spongiae officinalis consistentia, sed paulo magis compacta, poris confertissimis, quasi acicula minima pertusis.*

dichotoma. 14. *S. conformis dichotoma erecta disticha bifaria cylindrica flexilis tomentosa.*

*Gunn. att. nidros. v. 4. f. 4. Spongia dichotoma.*

*Rumph. amb. 6. t. 86. f. 3. an? Lithodendrum littoreum.*

*Pall. zooph. 236. Spongia cervicornis.*

*Habitat in O. Norvegico. DD. Gunnerus.*

*Forma Corallii, dichotoma, pedalis, erecta, teres, crassitie pennae, bifariam expansa axillis nonnihil divaricatis, substantia compacta interioris Agarici arborei, tomentoso-villosa, tenax.*

lacustris. 15. *S. conformis repens fragilis, ramis erectis teretibus obtusis. Fl. suec. 1190.*

*Fl. lapp. 535. Spongia ramis teretibus obtusis.*

*Raj. hist. 81. Spongia ramosa fluviatilis.*

*Habitat in Lacubus Sveciae Angliae, sub orgiae profunditate, repens sub aqua; autumnali tempore in hujus poris sparsis globulos caeruleoscentes magnitudine seminum thymi, nitidos in flamma candela fulgurantes observavit C. Blom. MD. an corpora peregrina?*

fluviatilis. 16. *S. conformis erecta fragilis polymorpha.*

*Fl. suec. 1191. Spongia fluviatilis.*

*Læf. pruss. 172. t. 52. Spongia aquatica ceratoides.*

*Pluk. phyt. 112. f. 3. Spongia fluviatilis anfractuosa fragilis ramosissima.*

*Rupp. jen. 308 t. 3. f. 1. Spongia fluviatilis ad conservam accedens.*

*Pall. zooph. 231.*

*Habi-*

*Habitat in Europæ borealioris fluviiis; hujus poris sæpe inherent quasi semina viridia gelatinosa.*

*Differt a priori (cui convenit loco odore piscoso, colore viridi) quod prior caule tereti repente & ramis erectis, cylindricis, distinctis sit, figura Corallii rubri; posterior vero crescit supra ligna, in-formis s. polymorpha, qualem delineavit Pluk.*

### 344. FLUSTRA. Flores Hydræ e cellulis poriformibus.

*Stirps radicata, undique poris cellulosis tecta.*

\* utrinque porosæ.

foliacea. 1. F. foliacea ramosa: laciniis cuneiformibus rotundatis.

*Fn. suec.* 2231.

*Hort. cliff.* 480. Millepora membranacea flexilis ramosissima, ramis distinctis planis obtusis.

*Ellif. corail.* 70. n. 2. t. 29. f. A. Eschara foliacea millepora spongiosa, cellulis arcuatis alternis utrinque instructa.

*Bauh. pin.* 367. Porus cervinus.

*Bauh. hist.* 3. p. 799. Alga marina platyceratos porosa.

*Morif. hist.* 3. p. 646. f. 15. t. 8. f. 16. Muscus marinus scruposus albidus telam sericeam textura sua æmulans.

*Raj. angl.* 42. n. 9. Fucus telam lineam sericeamve textura æmulans.

*Juss. act. paris.* 1742. p. 298. t. 10. f. 3.

*Pall. zooph.* 16.

*Habitat in O. Septentrionali.*

truncata. 2. F. foliacea subdichotoma: laciniis linearibus truncatis.

*Ellif. cor.* 69. t. 28. f. a. Eschara foliacea millepora tenera angustior, foliolis quasi abscissis.

*Raj. angl.* 43. Fucus marinus scruposus albidus angustior: extremitatibus quasi abscissis.

*Morif. hist.* 3. f. 15. t. 8. f. 17. idem.

*Pall. zooph.* 19. Eschara securiformis.

*Habitat in Oceano Europæo.*

*Simillima præcedenti, sed cellulae in lineas longitudinales digestæ, nec dente utrinque notatæ.*

3. F.

- pilosa. 3. F. foliacea varie ramosa: poris infimo dente setaceo.  
*Fn. succ.* 2233. Flustra pilosa.  
*Act. parif.* 1712. p. 42. t. 5. f. 10. Corallina.  
*Læf. act. Stockh.* 1752. p. 118. t. 3. f. 1-4. Mil-  
 lepora crustacea plana adnata punctis quincuncialibus.  
*Seb. mus.* 3. t. 100. f. 10.  
*Ellis. cor.* 73. t. 31. f. A. Eschara millepora.  
*Pall. zooph.* 15.  
*Habitat in O. Septentrionali.*  
*Cellulæ multum affines Sertulariæ parasiticæ.*

\* \* *Pagina altera tantum porosa.*

- papyracea. 4. F. plano-foliacea ramosa adnata hinc cellulis rhombeis.  
*Marsil. mar.* t. 6. f. 25, 26.  
*Pall. zooph.* 18.  
*Habitat in M. Mediterraneo.*  
*Statura Lichenis umbilicati, horizontalis, membranaceo-*  
*foliacea, flavescent, altera tantum pagina porosa f.*  
*cellulosa; altera vero pagina libera, scabriuscula.*

- membrana- 5. F. plano-foliacea indivisa adnata, hinc cellulis qua-  
 nacea. drangulis oblongis.  
*Habitat in M. Balthico, vestiens Fucus, lapides, Tophos.*  
*Membrana tenuissima, non divisa, arte adnata, extus*  
*tantum cellulosa cellulis oblongis, quadrangulis (uti*  
*Ellisii tab. 27. f. A.) ad angulos mucrone prominu-*  
*lo utrinque.*

- lineata. 6. F. plano-foliacea indivisa adnata, hinc cellulis ovalibus.  
*Habitat in O. Fucis.*  
*Membrana simillima precedenti, sed Cellulis ovalibus,*  
*approximatis, transversim seriatis; inter singulas*  
*series spatium latitudine cellularum. Cellulæ cilia-*  
*te sunt dentibus circiter octo.*

### 345. TUBULARIA. Flores Hydræ, terminales, solitarii.

*Stirps radicata, filiformis,  
 tubulosa.*

- indivisa. 1. T. culmis simplicissimis, geniculis contortis.  
*Bocc. mus.* 258. t. 6. f. 5. Fucus vermiculatus.



*Raj.*

*Raj. angl.* 31. n. 4. Adianti aurei minimi facie planta marina.

*Lbnyd. act. Angl.* v. 28. p. 275. t. 6. f. 7. Adiantum aureum marinum.

*Juss. act. Paris.* 1742. p. 296. t. 10. f. 2.

*Ellis. cor.* 31. n. 2. t. 16. f. C. Corallina tubularia calamos arundinaceos referens.

*Baster. subs.* 1. t. 2. f. 3, 4.

*Pall. zooph.* 38. Tubularia calamaris.

*Habitat in Oceano.*

ramosa. 2. T. culmis ramosis, geniculis contortis. *Faun. suec.* 2229.

*Ellis. corall.* 31. n. 3. t. 16. f. A. & t. 17. f. A. Corallina tubularia gracilis & ramosa, axillis ramulorum contortis.

*Pall. zooph.* 41. Tubularia trichoides.

*Habitat in Oceano Europæo.*

fistulosa. 3. T. culmis dichotomis articulatis, impressionibus rhombeis. *Bauh. hist.* 3. p. 811. Corallina fistulosa fragilis crassior.

*Raj. hist.* 65. Corallina eadem.

*Pluk. phyt.* t. 26. f. 2. Corallina fistulosa fragilis, internodiis prælongis lævibus albis, farciminum modo concatenatis.

*Barrel. icon.* 1275. f. 7, 8. Muscus coralloides polygonoides, salicorniæ folio.

*Ellis. cor.* 46. n. 1. t. 2. 3. f. A.

*Fn. suec.* 2232. Flustra fistulosa.

*Pall. zooph.* 21. Cellularia salicornia.

*Habitat in Oceano Europæo.*

fragilis. 4. T. culmis dichotomis, articulis compressis.

*Pluk. alm.* 118. t. 168. f. 4. Corallina fistulosa axillis geniculata mollis americana, segmentis latis compressis.

*Sloan. jam.* 1. p. 61. t. 28. f. 10.

*Pall. zooph.* 430. Corallina tubulosa.

*Habitat in O. Americano.*

Faciès Corallinae, sed tubulosa, mollis.

muscoi- 5. T. culmis subdichotomis, totis annuloso-rugosis. *Fn.*  
des. *suec.* 2230. \*

*Seb. mus.* 3. t. 106. f. 7.

*Ellis.*



*Ellis. cor.* 30. t. 16. f. 6. *Corallina tubularia laryngi similis.*

*Baster. subf.* 1. t. 2. f. 3, 4. & t. 3. f. 2, 3, 4.

*Pall. zooph.* 39.

*Habitat in Oceano.*

Acetabu- 6. *T. culmis filiformibus, pelta terminali striata radiata cal-*  
lum. carea.

*Syst. nat.* 10. p. 793. n. 17. *Madrepora Acetabulum, Hort. cliff.* 480. *Sertularia caule simplici, umbraculo orbiculato peltato.*

*Bauh. pin.* 367. *Androsaces petrae innascens.*

*Besl. mus. t.* 27. *Herba marina Androsaces.*

*Tournef. inst.* 338. *Acetabulum marinum.*

*Donat. cor.* 28. t. 3. *Callophilophorum.*

*Brown. jam.* 74. t. 40. f. A. *Acetabulum caule simplici, cyatho striato.*

*Pall. zooph.* 430. *Corallina Androsace.*

*Habitat in M. Mediterraneo, Americano.*

*Stipites filiformes, simplicissimi, tubulosi, tandem clausi. Stella orbicularis, magna, subplicata, marginata, in cujus centro punctum elevatum; sub centro margo cingit stipitis insertionem.*

Splachnea- 7. *T. culmis capillaribus simplicissimis, pelta terminali lævi membranacea.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Stirps crassitie setæ Equinae, pollices 2 alta, simplicissima (plures tamen ex eadem radice), flexilis.*

*Pelta terminalis, membranacea, non striata, cornu coloris uti stirps, flexilis.*

campanu- 8. *T. reptans, tubis campanularis.*

*lata. Syst. nat.* 10. p. 817. *Hydra campanulata.*

*Trembl. polyp.* 3. p. 209. t. 10. f. 8. 9. *Polypus cristatus.*

*Baker. micr.* 308. t. 12.

*Bæck. æst. Stockh.* 1746. t. 6. f. 5, 6.

*Schæff. monogr.* 1754. t. 1. f. 2.

*Pall. zooph.* 42. *Tubularia crystallina.*

*Habitat in Aquis dulcibus, imprimis in Lemna; minutissima.*

## 346. CORALLINA. Flores - - -

*Stirps* radicata, geniculata,  
filamentosa, calcarea.

- Opuntia*. 1. *C. trichotoma*: articulis compressis subreniformibus.  
*Hort. cliff.* 480. *Sertularia ramosissima*, articulis reniformibus.  
*Ellis. corall.* 53. t. 25. f. a. b.  
*Imper. nat.* 853. t. 854. *Sertularia*.  
*Clus. hist.* 2. p. 250.  
*Bauh. hist.* 3. p. 802. *Scutellaria*, f. *Opuntia marina*.  
*Bauh. pin.* 364. *Fucus folio subrotundo*.  
*Pluk. phyt.* t. 26. f. 1. *Corallina latifolia*.  
*Sloan. jam.* 1. p. 57. t. 20. f. 2. *Corallina opuntioides*.  
*Pall. zooph.* 420.  
*Habitat in* O. Americano, Mediterraneo.
- officina- 2. *C. subbipinnata*, articulis subturbinatis.  
lis. *Fn. suec.* 2234. *Corallina officinalis*.  
*Ellis. cor.* 48. n. 2, 3, 4. t. 24. f. 2.  
*Bauh. hist.* 3. p. 810. *Corallina*.  
*Bauh. pin.* 363. *Muscus marinus*, f. *Corallina officinarum*.  
*Raj. hist.* 65. angl. 33. n. 1. *Corallina*.  
*Morif. hist.* 3. p. 651. f. 15. t. 9. *Corallina spermophoros*.  
*Pluk. phyt.* t. 48. f. 4. *Corallina magis erecta pennata*.  
*Barr. icon.* 1246. n. 1. *Muscus coralloides filicinus*.  
*Seb. mus.* 3. t. 100. f. 13, 14, 15.  
*Pall. zooph.* 422.
- β. *Corallina squamata* bipinnata, articulis obovatis compressis. *Fn. suec.* 2235.  
*Ellis. cor.* 49. n. 4. t. 24. f. C. *Corallina anglica* erecta, ramulis dense pinnatis lanceolæ forma.  
*Habitat in* O. Europæo, Mediterraneo.
- rubens. 3. *C. dichotoma capillaris fastigiata*: articulis superioribus elevatis. *Fn. suec.* 2238.  
*Ellis. cor.* 51. n. 7. t. 24. f. F. *Corallina dichotoma*, capillis densis cristatis, spermophoros.

*Bauh.*

---

*Corallinas ad Regnum Animale pertinere ex substantia earum Calcarea constat, cum omnem Calcem Animalium esse productum verissimum sit.*

*Bauh. pin.* 363. *Musculus capillaceus*, multifido folio, albidus.

*Pluk. phyt.* t. 168. f. 3.

*Sloan. jam.* 1. p. 58. t. 20. f. 5. *Corallina marina capillaria*.

*Barr. icon.* 1296. f. 2. *Musculus coralloides cristatus*.

*Pall. zooph.* 425. *Corallina cristata*.

β. *Corallina spermophoros* dichotoma capillaris inferne pinnata: articulis cylindricis. *Syst. nat.* 10. p. 807.

*Ellif. cor.* 51. n. 8. t. 24. f. G. *Corallina alba spermophoros*, capillis tenuissimis.

*Morif. hist.* 3. p. 651. f. 15. t. 9. f. 9. *Corallina muscosa*.

γ. *Pall. zooph.* 626. *Corallina rubens*.

*Habitat in O. Europæo.*

corniculata. 4. *C. dichotoma inferne pinnata: articulis bicornibus.* *Fn. vec.* 2236.

*Ellif. cor.* 50. n. 6. t. 24. f. D. *Corallina alba exigua*, ramulis dichotomis: segmentis corniculatis.

*Pall. zooph.* 424.

*Habitat in O. Atlantico.*

fragilissima. 5. *C. dichotoma*, articulis filiformibus divaricatis apice basique latioribus.

*Sloan. jam.* 1. t. 20. f. 5. *Corallina minima*, capillaceo folio.

*Pall. zooph.* 429. *Corallina rigens*.

*Habitat in O. Americano.*

Parva, setacea, fragilissima, albissima: articulis longis, rigidis, distantibus.

barbata. 6. *C. dichotoma*, articulis cylindricis, ramulis apice barbatis.

*Ellif. corall.* 59. t. 25. f. C. *Corallina articulata jamaicensis*.

*Sloan. jam.* 1. p. 58. t. 20. f. 3. *Corallina major*, nervo filiformi.

*Pall. zooph.* 428.

*Habitat in O. Americano.*

Penicillus. 7. *C. culmo simplici*, ramis fasciculatis fastigiatis dichotomis flexilibus continuis.

*Seb. mus.* 1. t. 1. f. 10.

*Pall. zooph.* 428.

*Habitat in O. Asiatico.*

O o o o 3

Stirps

*Stirps crassitie penna, longitudine digiti, cortice cutaceo, e cujus apice Fasciculus penicilliformis e Ramulis dichotomis, albis, flexilibus, non geniculatis.*

terrestres. 8. *C. brachiata*, articulis cylindricis, fructificationibus lateralibus pedunculatis transversim rugosis. †

*Pall. zooph. 427.*

*Meesse Frisic. 75. n. 503. t. 1. Lichen fruticulosus ramosus articulatus, articulis longis cylindricis, pelvis pedunculatis.*

*Habitat in Frisæ Ericetis.*

347. SERTULARIA. *Flores Hydræ. Ellis cor. t. 5. f. A; t. 9. f. C; t. 10. f. A; t. 20 f. C.*

*Stirps radicata, fibrosa, nuda, articulata: articulis unifloris.*

\* *Ovariis distinctis & exsertis instructæ.*

rosacea. 1. *S. paniculata* denticulis oppositis truncatis, ramis alternis, ovariis coronato-spinosis.

*Ellis corall. 6. n. 7. t. 4. f. A. Corallina pumila pennata, denticulis teneris albis & oppositis, vesiculis florem lilii vel mali puniceæ se expandentem referentibus.*

*Aët. angl. v. 48. p. 631. t. 23. f. E. G. H. I.*

*Seb. mus. 3. t. 69. f. 6.*

*Pall. zooph. 78. Sertularia nigellastrum.*

*Habitat in Oceano.*

pumila. 2. *S. denticulis oppositis mucronatis recurvatis, ovariis obovatis, ramis vagis. Fn. succ. 2239.*

*Ellis cor. 9. n. 8. t. 5. f. A.*

*Aët. angl. v. 48. t. 631. t. 23. f. 6. FF.*

*Raj. angl. 3. p. 37. n. 19. Corallina pumila repens minus ramosa, denticulis bijugis.*

*Reaum.*

*Sertulariæ & plures affines radicatae sunt more plantarum, radiculis extra se dispersis, quamvis flores harum animati motum, quem a ventis non obtinent, voluntario usû affiguntur omnino animalcula,*

*Reaum. act. paris. 1711. p. 279. t. 11. f. 4. M. M.*  
*Seb. mus. 3. t. 100. f. 1.*  
*Pall. zooph. 79.*  
*Habitat in Oceano.*

opercula- 3. *S. denticulis oppositis mucronatis erectiusculis, ovariis*  
 12. *obovatis operculatis, ramis alternis.*

*Ellis cor. 8. n. 6. t. 3. f. B.*

*Raj. angl. 3. p. 36. n. 18.*

*Plukn. alm. 119. t. 47. f. 11. Corallina muscosa*  
*denticulata procumbens, caule tenuissimo, denticellis*  
*ex adverso sitis.*

*Raj. hist. 79. Moris. hist. 3. p. 650. f. 15. t. 9. f. 3.*  
*Musculus marinus denticulatus procumbens, caule te-*  
*nuissimo, denticellis bijugis.*

*Moris. hist. 3. p. 650. f. 15. t. 9. f. 2. Musculus ma-*  
*rinus lendiginosus minimus arenacei coloris.*

*Pall. zooph. 80. Sertularia usneoides.*

*Habitat in Oceano.*

tamarisca. 4. *S. denticulis suboppositis truncato - subtridenticulatis,*  
*ovariis obovatis bidentatis, ramis alternis. Fn. suec. 2240.*

*Ellis cor. 4. n. 1. t. 1. f. A. Corallina vesiculata,*  
*sparsim & alternatim ramosa, denticulis oppositis cy-*  
*lindricis: oribus crenatis patulis.*

*Pall. zooph. 77. Sertularia tamarisca.*

*Habitat in Oceano.*

abietina. 5. *S. denticulis suboppositis tubulosis, ovariis ovalibus,*  
*ramis pinnato-alternis. Fn. suec. 2241.*

*Ellis cor. 4. n. 2. t. 1. f. B.*

*Raj. angl. 3. p. 35. n. 12. Corallina abietis forma.*

*Pluk. amb. 119. t. 48. f. 5. Corallinae affinis Abies*  
*marina dicta.*

*Moris. hist. 3. p. 650. f. 15. t. 9. f. 1. Musculus ma-*  
*ritimus, filicis folio.*

*Bauh. hist. 3. p. 799. Musci marini genus foliis pin-*  
*natis.*

*Bauh. pin. 365. Abietis similis maritima.*

*Baster. subf. 2. t. 7. f. 2, 3.*

*Pall. zooph. 81.*

*Habitat in Oceano.*

- cupressi-  
na.** 6. *S. denticulis suboppositis alternis subacutis, ovariis ob-  
ovatis, ramis pauculatis longissimis.*  
*Ellis corall.* 7. n. 5. t. 3. f. A. Corallina cupressi  
forma, denticulis obtusis paululum alternis, ramis in  
exigua & rariora capillamenta sparsis, vesiculis bi-  
dentibus.  
*Seb. mus.* t. 101. f. 2.  
*Pall. zooph.* 89.
- argentea.** β. *S. denticulis suboppositis mucronatis, ovariis ovalibus,  
ramis alternis paniculatis.* *Syst. nat.* 10. p. 809. n. 7.  
*Ellis cor.* 6. n. 4. t. 2. f. C. & t. 38. f. 1.  
*Raj. angl.* 3. p. 36. n. 17. *Plukn. alm.* 119. t. 48.  
f. 3. Corallina muscosa altera vice denticulata, ra-  
mis in creberrima capillamenta sparsis.  
*Morif. hist.* 3. p. 650. f. 15. t. 9. f. 4. Muscus ma-  
rinus minor, denticulis alternis.  
*Bosc. mus.* 1. p. 259. t. 6, f. 6. Muscus marinus  
argenteus coralloides ramosus erectus.  
*Habitat in O. Europæ & Americæ.*  
*Refert Conservam geniculatam, ramosissimam, pedalem.*
- rugosa.** 7. *S. denticulis alternis obsoletis, ovariis rugosissimis, ra-  
mis vagis.*  
*Ellis corall.* 26. n. 23. t. 15. f. A. Corallina exigua  
repens, denticulis alternis, fructus medicæ cochleatæ  
æmulis.  
*Pall. zooph.* 75.  
*Habitat in Oceano.*
- halecina.** 8. *S. denticulis alternis obsoletis, calycibus biarticulatis,  
ovariis ovalibus, caulibus coadunatis.* *Faun. suec.*  
2242.  
*Ellis cor.* 17. n. 15. t. 10. Corallina erecta tubulo-  
sa pennata, halecis spinæ facie.  
*Raj. angl.* 3. p. 36. n. 15. Corallina scruposa pen-  
nata, cauliculis crassiusculis rigidis.  
*Edw. av.* t. 286.  
*Pall. zooph.* 64.  
*Habitat in Oceano.*
- Thuja.** 9. *S. denticulis distichis adpressis, ovariis obovatis margi-  
natis, stirpe dichotoma disticha.*  
*Ellis cor.* 10. n. 9. t. 5. f. B. Corallina vesiculata,  
caule angulato rigido, ramis dense stipatis & bifurca-  
tis terminantibus, denticulis cauli adpressis.

*Raj.*

- Raj. angl.* 3. p. 50. n. 47. *Sibb. scot.* 2. t. 1. p. 56.  
*Fucus equiseti facie, ostreae testæ adnatus.*  
*Seb. mus.* 3. t. 100. f. 17, 18, 19. & t. 106. f. 2. a.  
*Pall. zooph.* 88.  
*Habitat in Oceano.*

**Myriophyllum.** 10. *S. denticulis secundis acutis, ovariis secundis cylindricis imbricatis, furculis semi-pinnatis incurvatis.*

- Fn. suec.* 2243.  
*Ellis cor.* 14. n. 13. t. 8. f. A. & t. 38. f. 6. *Corallina pennata & falcata, pennas caudæ phasianii referens, caule gibboso.*  
*Barr. ic.* 1292. f. 2. *Corallina fruticosa pennata.*  
*Bauh. pin.* 363. *Muscus maritimus, filicis folio.*  
*Morif. hist.* 3. p. 650. *Muscus marinus pennatus, ramulis & capillamentis falcatis.*  
*Zanich. monogr. venet.* 1714. *Myriophyllum pelagicum,*  
*Ginac. adr.* t. 11. f. 24. *Myriophyllum pelagicum.*  
*Donat. cor.* 24. *Anisocalium.*  
*Pall. zooph.* 96.  
*Habitat in Oceano.*

*Stirps rachin penna referens, a latere anteriore sulco exarata, pennata Radiis e sulco alternis, simplicibus, approximatis, alternato-divaricatis, parallelis, aequalibus, articulatis, incurvis.*  
*Fructificatio solitaria e singulo articulo radii, a latere incurvato, cylindrica, pellucida, ramo approximata, bractea subulata se dimidio brevior.*

**falcata.** 11. *S. denticulis secundis imbricatis truncatis, ovariis ovatis, ramis pinnatis alternis.* *Fn. suec.* 2244.

- Ellis cor.* 12. n. 11. t. 7. f. A. & t. 38. f. 5, 6.  
*Raj. angl.* 3. p. 36. n. 16. *Pluken. alm.* 119. t. 47. f. 12. *Corallina muscosa pennata, ramulis & capillamentis falcata.*  
*Morif. hist.* 3. p. 650. f. 15. t. 9. f. 2. *Muscus pennatus, ramulis & capillamentis falcatis.*  
*Pluk. phyt.* t. 47. f. 12.  
*Pall. zooph.* 90. *Sertularia falcata.*  
*B. Syst. nat.* 813. n. 29. *Sertularia stipulata.*  
*Habitat in Oceano.*

**Pluma.** 12. *S. denticulis secundis imbricatis campanulatis, ovariis gibbis cristatis, furculis pinnatis alternis lanceolatis,*  
*Fn. suec.* 2245.

*Ellis cor.* 13. n. 12. t. 7. f. B. & t. 38. f. 6. Corallina pennata & filiquata, denticulis florum lili convallium referentibus.

*Bocc. mus.* 1. p. 257. t. 6. f. 6. Pinnaria marina imperati.

*Seb. mus.* 3. t. 101. f. 1. Corallina falciformis.

*Pall. zooph.* 93.

*Habitat in Oceano.*

*Ovaria secundum suturas transversas cristatas debiscent in frondes.*

**echinata.** 13. S. denticulis oppositis secundis campanulatis, ovariis gibbis cristatis, surculis pinnatis alternis lanceolatis.  
*Fn. succ.* 2246. \*

*Pall. zooph.* 94.

*Habitat in O. Atlantico.*

**antenni-** 14. S. denticulis verticillato-quaternis setaceis, ovariis ob-  
**na.** lique truncatis verticillatis, stirpibus subsimplicibus.  
*Fn. succ.* 2245.

*Tournef. inst.* 570.

*Ellis cor.* 15. n. 14. t. 9.

*Raj. angl.* 3. p. 34. n. 10, 11. Corallina astaci corniculorum æmula.

*Pluk. alm.* 119. t. 48. f. 6. Coralline affinis non ramosa arenacei coloris, astacorum corniculis instar geniculata.

*Raj. hist.* 79. Muscus marinus equisetiformis non ramosus.

*Ginan. opusc.* 16. t. 11. f. 25. Myriophyllum non ramosum.

*Bocc. mus.* 259. t. 6. f. 2.

*Barr. ic.* 1292. f. 3.

*Pall. zooph.* 91.

**β.** Corallina ramosa cirris obsita. *Raj. angl.* 3. p. 35. n. 11.

*Habitat in Oceano.*

Stirps simplex, spithamea, teres, setiformis, rigidiuscula; verticillata setis quaternis; brevibus, capillaribus, articulatis.

Frustrationes solitariae ad setarum articulos a latere interiore l. superiore.

**verticilla-** 15. S. denticulis obsolete, ovariis campanulatis denticu-  
**ta.** latis erectis, pedunculis longissimis contortis quaternis.

*Ellis*



*Ellis corall.* 23. n. 20. t. 13. f. A. Corallina ramosa, ramis singulis equisetiformibus, in summis capillamentis contortis & verticillatim dispositis, vesiculas campaniformes gerens.

*Pall. zooph.* 66.

*Habitat in Oceano.*

volubilis. 16. S. denticulis obsoletis, ovariis campanulatis dentatis alternis, pedunculis longissimis contortis solitariis.

*Ellis corall.* 24. n. 21. t. 14. f. A. Corallina minima scandens, vesiculas campaniformes in summo caule lineari contorto gerens.

*Baster. subf.* 1. t. 2. f. 2. a. b. d. & f. 4. e.

*Pall. zooph.* 70. Sertularia unidora.

*Habitat in Oceano.*

Syringa. 17. S. denticulis obsoletis, ovariis cylindricis pedunculo integerrimis.

*Ellis cor.* 2. 14. f. B. b.

*Pall. zooph.* 71. Sertularia volubilis.

*Habitat in Oceano.*

Cuscuta. 18. S. denticulis obsoletis, ovariis ovatis axillaribus, ramis oppositis simplicibus.

*Ellis corall.* 28. n. 26. t. 14. f. C. Corallina cuscutæ forma minima ramosa repens, ramulis oppositis, vesiculis minutissimis ovatis confertis geniculis ramorum insidentibus.

*Pall. zooph.* 74.

*Habitat in Oceano.*

Uva. 19. S. denticulis obsoletis, ovariis ovatis racemosis, ramis vagis.

*Ellis corall.* 27. n. 25. t. 15. f. C. Corallina minima repens, vesiculis ovatis uvarum instar ramulis adherentibus.

*Pall. zooph.* 72.

*Habitat in Oceano.*

lendigera. 20. S. denticulis obsoletis, calycibus secundis cylindricis parallelis passim congestis, stirpibus filiformibus. *Fn. succ.* 2248.

*Ellis corall.* 27. n. 24. t. 15. f. B. Corallina exigua, caule geniculato scandens, vesiculis ex unoquoque geniculo sic dispositis, ut syringam panis referant.

*Raj.*

*Raj. angl.* 3. p. 38. n. 3. *Fucoides lendigerum*, capillamentis cuscute instar implexis.

*Pall. zooph.* 73.

*Habitat in Oceano.*

geniculata. 21. *S. denticulis alternis contortis, ovariis obovatis subrostratis, stirpe geniculata flexuosa.* *Fn. suec.* 2249.

*Ellis corall.* 22. n. 19. t. 12. f. B. *Corallina minima repens*, caule nodoso articulado vesiculis alternis instructo.

*Læf. æst. Stockh.* 1752. p. 114. t. 3. f. 5-10. *Madrepora plantæformis mollis*, caule flexuoso ramis alternis turbinatis.

*Fn. suec.* 2241. *Sertularia flexuosa.*

*Pall. zooph.* 68.

*Habitat in Oceano: Babusia.*

dichotoma. 22. *S. denticulis obsoletis, ovariis obovatis axillaribus, pedunculis intortis, stirpe dichotoma geniculata.*

*Ellis corall.* 21. n. 18. t. 12. f. A. & t. 38. f. 3. *Corallina procumbens*, caule corneo longo filiformi articulado, vesiculis ramorum axillis pedunculis contortis insidentibus.

*Pall. zooph.* 69. *Sertularia longissima.*

*Habitat in Oceano.*

spinosa. 23. *S. denticulis obsoletis, calycibus ovato-subulatis, ramis dichotomis spinosis.*

*Ellis corall.* 20. n. 17. t. 11. f. B.

*Pall. zooph.* 65. *Sertularia sericea.*

*Habitat in Oceano.*

pinnata. 24. *S. denticulis obsoletis, ovariis oblongis, stirpe simplici pennata lanceolata.*

*Ellis corall.* 19. n. 16. t. 11. f. A. & t. 38. f. 4. *Corallina setacea instar arundinis geniculata*, capillamentis singulis unicuique geniculo alternatim dispositis.

*Raj. angl.* 38. n. 6, 7. *Fucoides setaceum.*

*Pall. zooph.* 92. *Sertularia setacea.*

*P. Syst. nat.* 813. n. 28. *Sertularia setacea.*

*Habitat in Oceano.*

polyzonias. 25. *S. denticulis alternis subdenticulatis, ovariis obovatis polyzoniis, stirpe ramosa.* *Fn. suec.* 2250.

*Ellis corall.* 5. n. 3. t. 3. f. A. B. & t. 38. f. 1.

*Raj.*

*Raj. angl.* 3. p. 35. n. 13. *Corallina minus ramosa*, alterna vice denticulata, denticulis lineis transversis externe striatis.

*Seb. mus.* 3. t. 102. f. 4. ♂ t. 103. f. 6.

*Pall. zooph.* 76. *Sertularia ericoides*.

*Habitat in Oceano.*

**Pennaria.** 26. *S. denticulis secundis, stirpe contorta bipinnata.*

*Pall. zooph.* 98. *Sertularia speciosa?*

*Habitat in M. Indico. Steller.*

*Caulis sesquipedalis, rudis, contortus, pinnatus Ramis alternis, subpetiolatis, distantibus, parallelis. Rami pennati radiis parallelis, approximatis & fere contiguus (ut in penna); Radii articulati, dorso convexi, sed latere superiore imbricati. Sic rami referunt structura Sert. plumam, sed distincta species magnitudine, compositione, approximatis radiis, facie.*

**Lichenastrum.** 27. *S. denticulis obtusis bifariam imbricatis, ovariis obovatis secundis parallelis, stirpe pinnata, ramis dichotomis.*

*Ellis corall.* 11. t. 6. f. 10. *Corallina erecta pennata, denticulis alternis cauli adpressis, lonchitis l. polypodii facie?*

*Pall. zooph.* 85. *Sertularia lichenastrum?*

*Habitat ad Kamtschatka. Steller.*

*Caules compressi, nudi, remote articulati. Rami distichi prodeunt; sed dichotomi, bifariam imbricati, foliolis obtusis (uti Ellis t. 6. f. A.), ut fere quadrangulares evadant. Ab altero latere tantum ramulorum Ovaria obovata, apice hiantia, sessilia, proxima, parallela & pectinata serie secundum unicum s. interius latus ramuli.*

**cedrina.** 28. *S. denticulis subcylindricis tubulosis quadrifariam imbricatis, ramis vagis quadrangulis sursum incrassatis.*

*Pall. zooph.* 86.

*Habitat ad Kamtschatka. Steller.*

*Caules longiusculi, sordidi & squalentes. Rami vagi, saepe dichotomi, sensim versus apices vix manifeste crassiores, obtusi, toti quadrifariam undique imbricati tubulis cylindricis, flavescentibus, unde rami valde quadrangulares evadunt. Differt a *S. Thuja*, quod squamae non distinctae, sed omnino imbricatae, & quod quadrifariam imbricatae sint, rami quinquesariam, nec bifariam.*

29. *S.*

purpurea. 29. *S. denticulis subovatis tubulosis quadrifariam subimbricatis, ovariis erectis campanulatis, ramis dichotomis quadratis.*

*Pall. zooph. 87.*

*Habitat ad Kamschatka. Steller.*

*Tota atro-purpurea, dichotoma, fastigiata. Rami tetragoni, quadrifariam angulis imbricati squamis tubulosis, ovatis, sed non ita confertis, ut sese tangant. Ovaria (forte) sunt squamæ patentes, sursum instar campanæ sessiles, turbinatæ, quarum margo interior versus ramos brevior. Singularis.*

\* \* *Ovariis non distinctis, sed intra articulos latitantibus. (Cellularia).*

Bursaria. 30. *S. denticulis oppositis compressis fastigiatis, ramis dichotomis. Fn. suec. 2252.*

*Ellis corall. 41. n. 8. t. 22. f. A. Corallina cellifera minima ramosa, cellulis compressis oppositis, filiculæ bursæ pastoris formam æmulans.*

*Pall. zooph. 23.*

*Habitat in Oceano.*

loriculata. 31. *S. denticulis oppositis oblique truncatis obsoletis, ramis dichotomis erectis. Fn. suec. 2253.*

*Ellis corall. 40. n. 7. t. 21. f. B. Corallina cellifera mollis ramosissima, geniculis ad loricæ formam accedentibus.*

*Rai. suppl. 15. Muscus coralloides mollis elatior ramosissimus.*

*Pluken. mant. 56. Corallina geniculata mollis, internodiis rotundis brevioribus.*

*Pall. zooph. 22.*

*Habitat in Oceano.*

fastigiata. 32. *S. denticulis alternis acutis, ramis dichotomis erectis fastigiatis. Fn. suec. 2254.*

*Ellis corall. 33. n. 1. t. 18. f. A. Corallina cellifera erecta ramosissima tenerrima & plumosa.*

*Rai. angl. 3. p. 37. n. 20. t. 2. f. 1. Corallina pumila erecta ramosior.*

*Pall. zooph. 24. Cellularia plumosa.*

*Habitat in Oceano.*

avicularia. 33. S. denticulis secundis suboppositis mucronato-appendiculatis, calycibus globoso-mucronatis sessilibus, ramis dichotomis continuis fastigiatis.

*Ellis corall.* 36. t. 20. A. Corallina cellifera erecta ramosa plumosa, sphaerulas testaceas aviumque capitum formas gerens.

- - - t. 38. f. 7. HH. Corallina cum appendiculis lateralibus, avium capitum forma.

*Pall. zooph.* 26.

*Habitat in Oceano.*

neritina. 34. S. denticulis alternis secundis acutis, ramis dichotomis inæqualibus erectis.

*Ellis corall.* 35. t. 19. f. A. Corallina cellifera americana.

*Pall zooph.* 25.

*Habitat in M. Mediterraneo & Americano.*

seruposa. 35. S. denticulis alternis angulatis spinosis, ramis dichotomis reptantibus. *Fw. suec.* 2255.

*Ellis corall.* 38. n. 4. t. 20. f. C. Corallina cellifera minor repens ramosa & seruposa, cellulis alternis a latere angulatis.

*Att. angl. v.* 48. p. 631. t. 23. f. 7. K. L.

*Pall. zool.* 30.

*Habitat in Oceano.*

reptans. 36. S. denticulis alternis bidentibus, ramis dichotomis reptantibus.

*Ellis corall.* 37. n. 3. t. 20. f. B. Corallina cellifera minor repens ramosa, tubulis lævibus, interdum hamosis sparsim dispositis, fucis testisque alligata.

*Raj. suppl.* 15. Muscus coralloides pumilus ramosus.

*Pall. zooph.* 31.

*Habitat in Oceano.*

*Fila setacea longa passim prodeunt tamquam radices.*

parasitica. 37. S. denticulis verticillantibus turbinatis ciliatis parasiticis.

*Habitat in Oceano, saepe in Corallina rubente.*

Corallina rubens saepius tota, saepe nonnullis ejus rami hac Sertularia undique tecta, ut quisvis primo intuitu crederet Corallina caules esse hujus proprios & hanc totam verticillatam caulescentem; constat verticillis approxi-

Cellarias cum Sertulariis connescunt S. eburnea & coraura, quibus Cellarii ovaria inserta distinctissima, ut difficile distinguantur, quæ a Natura conjunctæ.

*approximatis, ut nullum interstitium; verticillus constat 5-8 Calycibus turbinatis, albis, pellucidis, subpunctatis, erectis, interiori latere corallina adnatis, parallelis, approximatis: margo ciliatus est setis erectis, longitudine ipsius calycis, sed interioribus sapius brevioribus; ceterum hic margo versus latus interior s. corallinam parum fornicatus, versus exteriora vero paulo humilior. Affinis est cellularum structura Flustræ pilosæ, sed tamen diversa.*

- ciliata. 38. *S. denticulis alternis ciliatis infundibuliformibus, ramis dichotomis erectis.*

*Ellis corall. 38. n. 5. t. 20. f. D. Corallina cellifera minima erecta ramosa, cellulis infundibuliformibus basi conjunctis, oribus patentissimis superne ciliatis & alternatim prominentibus.*

*Pall. zooph. 32.*

*Habitat in Oceano.*

- eburnea. 39. *S. denticulis alternis truncatis prominulis, ovaris gibbis rostratis, ramis patulis.*

*Ellis corall. 39. n. 6. t. 21. f. A. Corallina cellifera minima fragilis ramosa vasculifera, colore eburneo, cellis tubiformibus conjunctis paululum arcuatis fere oppositis.*

*Pall. zooph. 33.*

*Habitat in Oceano.*

- cornuta. 40. *S. denticulis alternis truncatis spinis adjectis, ovaris gibbis rostratis, ramis alternis.*

*Ellis corall. 42. n. 10. t. 21. f. C. Corallina cellifera minutissima falcata cristata, cellulis capricorniformibus simplicibus vesiculas gerens.*

*Pall. zooph. 34. Cellularia falcata.*

*Habitat in Oceano.*

- loricata. 41. *S. denticulis secundis concatenatis ore subtus cornuto, ramis alternis.*

*Ellis corall. 42. n. 9. t. 22. f. B. Corallina cellifera minutissima ramosa & falcata, cellulis simplicibus tauri cornu facie invicem insertis.*

*Pall. zooph. 35. Cellularia chelata.*

*Habitat in Oceano.*

anguina. 42. S. denticulis nullis, furculis simplicissimis clavatis obtusis, apertura laterali.

*Ellis corall.* 43. n. 11. t. 22. f. C. Corallina anguiformis minutissima non ramosa.

*Pall. zooph.* 36.

*Habitat in Oceano.*

*Alba, quasi ex pilis brevissimis, obtusis, curvis.*

348. VORTICELLA. *Flos* calyce vasculoso: ore contractili ciliato, terminali.

*Stirps* fixa, in vorticem vibrans florem.

Encrinus. 1. V. composita, floribus octoradiatis, stirpe simplicissima contorto-offea.

*Syst. nat.* 10. p. 80. Isis Encrinus.

*Ellis corall.* 96. t. 37. Hydra marina arctica, corporibus multis octo-tentaculatis basi junctis, scapo prælongo offeo.

*Mylii monogr.* 1753. quart. c. fig. Zoophyton grœnlandicum.

*Ad. angl. v.* 48. p. 305. t. 12.

*Ad. petrop.* 1766. p. 425. t. 11. f. 7.

*Pall. zooph.* 212. Pennatula Encrinus.

*Habitat in Mari Grœnlandico.*

polypina. 2. V. composita, floribus concatenatis, stirpe paniculata subdigitata.

*Syst. nat.* 10. p. 816. Sertularia polypina corpusculis concatenatis pellucidis hyalinis, panicula subdigitata.

*Ellis corall.* 22. n. 22. t. 13. f. B. C. Corallina omnium minima.

*Pall. zooph.* 55. Brachionus ramosissimus.

*Habitat in O. Europæ, imprimis in M. Mediterraneo.*

Anastatica. 3. V. composita, floribus campanulatis, stirpe multiflora rigescente.

*Fa. succ.* 2221. Isis Anastatica.

*Amæn. accd.* 2. p. 64. n. 4, 5.

*Tremb. ad. Angl. v.* 44. p. 637. t. 1. f. 7, 8, 9.

*Brady. ad. Angl. v.* 49. p. 248. t. 7. f. 1-6.

P P P P

*Needh.*

*Needh. micr. t. 7. f. 3, 4, 5.*

*De Geer. act. Stockh. 1747. t. 6. f. 4, 5.*

*Schaff. monogr. 1754. t. 1. f. 3, 4.*

*Pall. zooph. 56.*

*Habitat in Aquis dulcibus super Conchilia, Plantas, unde harum asperitas emortuis animalculis, remanentibus stirpibus rigescentibus, corallinis, ut in specie prima, licet ramosis capillaceis.*

conglomerata. 4. *V. composita, floribus eroso-dentatis, stirpe multiflora crassitie pennæ columbinæ.*

*Amœn. acad. 4. p. 257. t. 3. f. 1.*

*Habitat in Oceano Indiz orientalis.*

pyraria. 5. *V. composita, floribus muticis obovatis: tentaculis bigeminis, stirpe ramosa.*

*Raf. inf. 3. p. 606. t. 92. f. 2. d. c.*

*Pall. zooph. 59.*

*Habitat in Aquis dulcibus.*

cratagaria. 6. *V. composita, floribus muticis globosis: tentaculis binis, stirpe ramosa.*

*Baker. micr. 357. t. 13. f. 15.*

*Raf. inf. 3. p. 604. t. 98. f. 2. a. & f. 3.*

*Lederm. micr. t. 88. f. o. p.*

*Pall. zooph. 58.*

*Habitat in Aquis dulcibus.*

opercularia. 7. *V. composita, floribus muticis ovalibus, stirpe ramosa.*

*Baker. micr. 351. t. 13. f. 13, 14.*

*Raf. inf. 3. p. 609. t. 98. f. 5, 6.*

*Lederm. micr. t. 88. f. W.*

*Pall. zooph. 62.*

*Habitat in Aquis dulcibus.*

umbellaria. 8. *V. composita, floribus ciliatis globosis muticis, stirpe umbellata.*

*Trembl. act. Angl. v. 43. p. 171. t. 11. f. 5, 6, 7.*

*Baker. micr. 348. t. 13. f. 6, 7.*

*Raf. inf. 3. p. 674. t. 100.*

*Lederm. micr. t. 88. f. t. u.*

*Pall. zooph. 57. Brachionus acinosus.*

*Habitat in Aquis dulcibus.*



- berberina.** 9. *V. composita*, floribus ovalibus muticis, stirpe ramosa.  
*Trembl. act. Angl. v. 43. p. 179.* Polypus bipertiens 2.  
*Raf. inf. 3. p. 673. t. 99.*  
*Lederm. micr. t. 88. f. 9. f.*  
*Pall. zooph. 60.* Brachionus berberiformis.  
*Habitat in Aquis dulcibus.*
- digitalis.** 10. *V. composita*, floribus cylindricis unisulcatis semiclauiis, stirpe ramosa.  
*Raf. inf. 3. p. 607. t. 98. f. 4.*  
*Pall. zooph. 61.*  
*Habitat in Aquis dulcibus.*
- convallaria.** 11. *V. simplex gregaria*, flore campanulato mutico: tentaculis bigeminis, stirpe fixa.  
*Trembl. act. Angl. v. 43. p. 474.*  
*Baker. micr. 339. t. 13. f. 1. d, c.*  
*Raf. inf. 3. p. 597. t. 97.*  
*Lederm. micr. t. 88. f. 1.*  
*Pall. zooph. 54.* Brachionus campanulatus.  
*Habitat in Aquis dulcibus.*
- urceolaris.** 12. *V. simplex pedunculata*, ore dentato.  
*Baker. micr. 307. t. 12. f. 7-10.*  
*Schæff. monogr. 1755 t. 2. f. 7-9.*  
*Pall. zooph. 47.* Brachionus capsuliformis.  
*Habitat in Europæ lacubus.*
- stellata.** 13. *V. simplex repens*, flore decemfido, stirpe filiformi.  
*Habitat in O. Africano supra plantas submarinas.*  
*Stirps repens, alba, crassitie capilli, perennans, rarius uno alterove. Stipes f. Pedunculus capillaris, longus lin. 3, erectus, mollis. Corpus subcampanulatum, ultra medium decemfidum, magnitudine seminis Thymi.*
- ovifera.** 14. *V. simplex solitaria*, flore ovali, stirpe simplicissima scabra.  
*Edw. av. t. 356.* Animal-Planta.  
*Habitat in America.*  
*Scapus simplex, pedalis, hirtus, laxis, crassitie straminis. Proles terminalis, ovata, magnitudine pruni, apice debiscens stella cruciata. Foramen laterale juxta basin prolis.*

349. HYDRA. *Flos*: Os terminale, cinctum *Cirris* setaceis.

*Stirps* vaga, gelatinosa, uniflora,  
 basi se affigens,

viridis. 1. H. tentaculis subdenis brevioribus.

*Leuwenh. act. angl. v. 23. n. 283. p. 1494.*

*Trembl. polyp. 1. p. 22. t. 1. f. 1. Polypus 1 f. viridis.*

*Raf. inf. 3. polyp. 531. t. 88, 89. Polypus multibrachiatus viridis.*

*Schaff. regensb. 1755. Polypus viridis.*

*Pall. zooph. 3. Hydra viridissima.*

*Habitat in Europæ rivulis, sub plantis aquaticis.*

fusca. 2. H. tentaculis suboctonis longissimis.

*Trembl. polyp. 1. p. 22. t. 1. f. 3, 4. Polypus 3. Ellis cor. t. 28. f. C.*

*Raf. inf. 3. polyp. 505. t. 84, 85. Polypus fuscus.*

*Schaff. polyp. 1754. t. 3. f. 1.*

*Pall. zooph. 1. Hydra oligactis.*

*Habitat in Europæ aquis dulcibus.*

grisea. 3. H. tentaculis subseptenis longioribus.

*Trembl. polyp. 1. p. 22. t. 1. f. 2.*

*Raf. inf. 3. polyp. 473. t. 78-83. Polypus aurantius.*

*Pall. zooph. 2. Hydra vulgaris.*

*Habitat in Europæ aquis purioribus.*

pallens. 4. H. tentaculis subsenis mediocribus.

*Raf. inf. 3. polyp. 465. t. 76, 77. Polypus stramineus.*

*Pall. zooph. 4. Hydra attenuata.*

*Habitat in Europæ lacubus.*

Hydatula. 5. H. tentaculis quaternis obsoletis, corpore vesicario.

*Barthol. cent. 2. obs. 87. p. 293. Ova in porcis.*

*E. N. C. dec. 1. ann. 7. obs. 206.*

*dec. 2. ann. 4. obs. 73. t. 1. Hydatis animalis.*

AB.

Hydras siccitas reviviscere, mutilatas redintegrari, fissas multiplicari, mixtas inferi, portionculis propagari, vias inverti, seminibus feri, bulbis gemmare, ramis vegetare, docuere hujus seculi curiofi.

*Act. angl. v. 17. n. 193. p. 506.* Lumbricus hydropicus.

*Act. erudit. 1692. p. 535.*

*Pall. zooph. 413.* Tænia hydatigena.

*Habitat in Abdomine Mammalium: Ovium, Sæum, Murium &c. inter peritonæum & intestina, visa a Bartholino, Redi, Stenone, Hardero, Hartmanno, Fischero, Hallero, Muræo aliisque.*

*Vesica lymphatica, pellucida, magnitudine Pruni, petiolata Corpore cylindrico, in cuius apice Os, quod, corpore compresso, movet tentacula vix manifesta,*

Stentorea. 6. H. tentaculis ciliaribus, corpore infundibuliformi.

*Tremb. act. angl. v. 43. p. 180.* Polypi infundibuliformes.

*Baker. micr. 340. t. 13. f. 1. F. G.* Animalculum infundibuliforme.

*Raf. inf. 3. p. 594. t. 94. f. 7, 8.* Pseudo-polypus tubiformis.

*Lederm. micr. t. 88. f. h. 1.*

*Pall. zooph. 52.* Brachionus stentoreus.

*Habitat in Aquis dulcibus.*

socialis. 7. H. mutica torosa rugosa.

*Brady act. Angl. v. 49. p. 249. t. 7. f. 1.*

*Raf. inf. 3. p. 584. t. 95, 96, 94. f. 1-6.*

*Lederm. micr. t. 88. f. F.*

*Pall. zooph. 53.* Brachionus socialis.

*Habitat in Aquis dulcibus.*

*Ultimæ duæ proximæ sunt Vorticellæ, similiterque moventur, cum autem & liberæ sint & Capsa destituta, vel sub hoc genere militabunt, vel sub proprio.*

350 PENNATULA. Flores Hydræ, ad marginem denticulatum pinnarum.

*Stirps libera, subulata, apice pinnata.*

grisea. 1. P. stirpe carnosâ, rachi lævi, pinnis imbricatis plicatis spinosis.

*Ellis act. Angl. v. 53. p. 429. t. 21. f. 6-10.*

P P P P 3

Bohadf.

*Bobadfs. mar.* 109. t. 9. f. 1-3. Penna grisea.

*Seb. musf.* 3. t. 16. f. 8.

*Pall. zooph.* 214. Pennatula grisea.

*Habitat in M. Adriatico.*

*Pinnulæ referunt Piscium pinna pectorales.*

- phospho- 2. P. stirpe carnosâ, rachi scabra, pinnis imbricatis.  
rea. *Fn. suec.* 2260. Pennatula phosphorea.  
*Amœn. acad.* 4. p. 256. Pennatula phosphorea.  
*Musf. Ad. Fr.* 1. p. 69. Penna marina.  
*Barr. icon.* t. 1273, 1274. Penna marina.  
*Bauh. hist.* 3. p. 802. Penna marina.  
*Bauh. pin.* 363. Muscus pennæ similis.  
*Shaw. afr. app.* 5. Fucus pennam referens.  
*Ginan. adr.* 1. t. 55. f. 114. Penna marina.  
*Seb. musf.* 3. t. 6. f. 1.  
*Ellis act. Angl.* v. 53. p. 429. t. 19. f. 1-5.  
*Habitat in Oceano, fundum illuminans luce phosphorea.*  
*Flosculi e pinnularum denticulis apice ostiendi.*
- filosa. 3. P. stirpe subcarnosa, rachi utrinque pennata, basi ten-  
taculis duobus filiformibus.  
*Ellis act. Angl.* v. 53. t. 20. f. 15.  
*Bocc. musf.* 1674. p. 286. t. 286.  
*Habitat in M. Mediterranei Xiphiis.*  
*Tentacula 2 filiformia, ad basin racheos pinnata in-*  
*serta, rachi ipsa longiora.*
- rubra. 4. P. stirpe carnosâ, rachi pennata, pinnis imbricatis lz-  
vibus.  
*Bobadfs. mar.* 101. t. 8. f. 1-3. Penna rubra.  
*Ellis act. Angl.* v. 53. p. 434. t. 21. f. 1, 2.  
*Pall. zooph.* Pennatula rubra.  
*Habitat in M. Mediterraneo.*  
*Pinnulæ fusiformes, carnosæ.*
- mirabilis. 5. P. stirpe filiformi, rachi distiche pennata: pinnis luna-  
tis remotis alternis. *Fn. suec.* 2261.  
*Musf. Ad. Fr.* 1. p. 96. t. 19. f. 4. \*  
*Amœn. acad.* 4. p. 256. \*  
*Ellis act. angl.* v. 53. t. 20. f. 17.  
*Pall. zool.* 216. Pennatula mirabilis.  
*Habitat in O. Norvegico.*
- Sagitta. 6. P. stirpe filiformi, rachi utrinque approximate pennata,  
apice nudo. *Amœn.*

*Amæn. acad.* 4. p. 257. t. 13. f. 13.

*Ellis. act. angl.* v. 53. t. 20. f. 16.

*Pall. zool.* 217. *Pennatula juncea*.

*Habitat in Pelagi Lophiis Histriionibus, basi intrusa lateribus eorundem.*

antennina. 7. P. stirpe subtrigona setiformi hinc pinnata, flosculis confertis.

*Bobad. mar.* 112. t. 9. f. 4. *Penna piscis Pavonis*.

*Ellis. act. angl.* v. 53. p. 431. t. 20. f. 8.

*Pall. zooph.* 219. *Pennatula quadrangularis*.

*Habitat in M. Mediterraneo.*

### 351. TÆNIA. *Stirps* f. corpus liberum, articulat- tum simplici catena.

*Osculum* & propria viscera ad singulum articulum.

Solium. 1. T. osculis marginalibus solitariis. *Fn. suec.* 2264.

*Amæn. acad.* 2. p. 74. t. 1. f. 1.

*Plater. prax.* 993. *Vermis cucurbitinus*.

*Heyd. exper.* 47. t. 47. *Lumbricus latus*.

*Tyson. act. Angl.* 1683. n. 146. t. 1. & 2. f. 2, 6, 10. *Lumbricus latus*.

*Andr. verm. c.* 3. f. 5. *Solium*.

*Bewern. thes.* 202. t. 202. f. 3.

*Bonnet. act. peregr.* 1. p. 511. *Tænia articulis longioribus*.

*Coulet. monogr.* *Lumbricus latus*.

*Pall. zooph.* p. 405 *Tænia cucurbitina*.

*Habitat in Intestinis Mammalium, Piscium.*

vulgaris. 2. T. osculis lateralibus geminis. *Fn. suec.* 2262.

*Amæn. acad.* 2. p. 7. t. 1. f. 2.

P P P P 4

*Plater.*

*Tænia altera extremitate senescit, dum generatur ab altera infinite procedendo, ut radix Graminis. Articuli distincti Vermes Cucurbitini Medicis audiunt, renascentes novis articulis more matris absque termino, cum singulo articulo proprium Os, propria viscera chylopoietica. Animalia hæc sunt composita simplici catena, uti Sertularia composita, latente intra singulum articulum animalculo cum sua fructificatione. Ex hisce illustratur affinitas descendens & ingratitudo ascendens.*

Caput serpentiforme ad extremitatem crassiorem fixerunt Tyson, Andry, Tulpius, sed fallunt, cum omnis articulus propria vita gaudeat, nec ullus vermis capite insensatur, quod canicidiis constat.

Plater. prax. 992. Lumbricus latus f. Tænia intesti-  
norum.

Spigel. monogr. Lumbricus latus.

Schenk. obs. 111. p. 408. Tænia.

Cleric. lumbr. 129. t. 6. f. 2. Lumbricus latus.

Fabric. obs. 2. c. 70. Lumbricus latus.

Aët. Haffn. 2. p. 148. t. 39. Lumbricus latus.

Andr. lumbr. t. 9. Tænia vulgaris.

Gadd. satag. 88.

Pall. zooph. 408. Tænia grysea.

Habitat in intestinis Mammalium; inque fontibus li-  
mosis, sed multo minor.

lata. 3. T. osculis lateralibus solitariis. Fn. suec. 2263.

Amæn. acad. 2. p. 80. t. 1. f. 3.

Plater. prax. c. 14. Tænia prima.

Bonnet. act. peregr. 1. p. 478. Tænia articulis bre-  
vioribus.

Pall. zooph. 410. Tænia lata (exclusa varietate β).

Habitat in Intestinis Mammalium.

canina. 4. T. osculis marginalibus oppositis. Fn. suec. 2265.

Amæn. acad. 2. p. 81. t. 1. f. 4.

Aët. Stockb. 1747. t. 5. f. a.

Ruysch. obs. 84.

Pall. zooph. 408. Tænia canina.

Habitat in Intestinis Mammalium.

352. VOLVOX. Corpus liberum, gelatinosum, ro-  
tundatum, artubus destitutum,  
vertiginoso-gyratile.

Proles rotundatæ, sparsæ, nidulan-  
tes intra poros.

Beroe. 1. V. ovatus: angulis ciliatis novem.

Syst. nat. 10. p. 66q. Medusa Beroe.

Brown. jam. 384. t. 43. f. 2. Beroe.

Bastcr. subs. 3. p. 123. t. 14. f. 5. Medusa ovata.

Habitat in Pelago Americam Europamque interjecta.

Generis hujus esse a motu ejus vertiginoso judico.

2. V.

---

Quemadmodum Tæniæ natos suos seroque nepotes concatenata serie longitudinaliter  
producunt, sic etiam Volvoces natos intra se inclusos progenierunt in quindam  
progeniem.

- bicauda- 2. *V. octagonus*, tentaculis duobus elongatis.  
tus. *Gron. act. belv.* 3. p. 36. Berce corpore octagono,  
tentaculis longissimis.  
*Baister. subf.* 3. p. 126. t. 14. f. 6, 7.  
*Habitat in O. Europæo.*

Globator. 3. *V. globosus*. *Fn. suec.* 2266.

*Baker. micr.* 322.

*Raf. inf.* 3. p. 617. t. f. 1-3. *Globo-Animal.*

*De Geer. act. Stockh.* 1761. p. 111. t. 3. f. 1-5.

*Pall. zooph.* 417. *Volvox Globator.*

*Habitat in Europæ Lacubus.*

Genus ob proles exeuntes ad *Animalia composita*, potius  
quam ad *Mollusca* amandavi.

*Globator diaphanus* intra se gerit natos nepotesque in  
quintam progeniem, ut *Aphides*, *Proleptis* planta-  
rum, *Qualitates sensibiles*.

- dimidia- 4. *V. incessu hemisphæricus*.  
tus. *Wilk. act. Stockh.* 1762.

*Habitat sæpius in Caudis Larvarum Ranae temporariae*,  
*volutans in Aqua hemisphæricus*, *quiescens globosus*.

353. *FURIA*. Corpus liberum, lineare, æquale,  
utrinque ciliatum: aculeis refle-  
xis, corpori appressis.

- infernalis. 1. *FURIA*. *D. C. Solander act. Ups. ined. Fn. suec.*  
2070. †

*Amæn. acad.* 3. p. 322.

*Habitat in Bothniæ, Sveciæ septentrionalis vastis pa-  
ludibus cæspitosis, ex athere decidua sæpe in corpora  
Hominum, mammaliumque, quæ, momento citius  
penetrat, summo omnium dolore, immo interdum in-  
tra quadrantem horæ præ dolore occidit; quo & i-  
pse Lundini 1728 laboravi. Animal non nisi rude  
ficcatum vidi; Historiam dedit Solander. Animalibus  
Chaoticis videtur proprietatibus affine. Quomodo  
aëra petat, unde decedit a solstitio æstivali in hye-  
male, nullus dixit.*

354. CHAOS. *Corpus* liberum, uniforme, redivivum: Artubus sensusque organis externis nullis.

redivi- 1. *C. filiforme* utrinque attenuatum.  
vum. *Baker. micr.* 2. c. 3. §. 1.  
*Needb. micr.* 99. t. 5. f. 7.  
*Lederm. micr.* 33. t. 17.  
*Habitat in Aceto & Glutine Bibliopegorum.*  
*Reviviscit ex aqua per annos exsiccatum, oviparum*  
*& vivipara.*

Protheus 2. *C. gelatinosum* polymorpho-mutabile.  
*Raf. inf.* 3. t. 101. f. A-T.  
*Lederm. micr.* 88. f. 48.  
*Habitat in Aquis dulcibus.*  
*Figura propria determinataque nulla, assumens cita-*  
*tissime figuras millenas anomalas.*

Fungo- 3. *C. Fungorum* seminum. *Munch. haufv.* 1. p. 149.  
rum. *Habitat, uti Semen Lycoperdi, Agarici, Boleni, Ma-*  
*coris reliquorumque Fungorum, in sua matre, usque*  
*dum dispergatur & in aqua exclusum vivit & mo-*  
*ritur, demum figitur & in Fungos excrescit, obser-*  
*vante illustr. Oth. Munchhausen Lib. Bar.*  
*Zoophytorum metamorphosis e Vegetabili in Animale;*  
*Fungorum itaque contrario ex Animalis in Vegetabile.*

Ustilago. 4. *C. fructificationis vegetabilis, pulveraceum.* *Munch-*  
*haufv.* 1. p. 149.  
*Habitat in destructis granis Hordei, Tritici, Grami-*  
*numque aliorum, inque Flosculis Tragopogonis, Scor-*  
*zonerae, forma nigri pulveris. Hic pulvis aliquot*  
*dies in aqua tepente maceratus transit in Animalcula*  
*oblonga, hyalina, piscium instar ludentia, armata*  
*oculo videnda. Munch. conser. Dissert. nost. de*  
*Mundo invisibili.*

infusori- 5. *C. rerum variarum liquoribus infusarum.*  
um. *Habitat in variis Liquoribus aquosis, mixtis Piperis*  
*alii-*

---

TRITICI Grana abbreviata illa & rotundata, exsiccata etiam post annos, in qua tepidiuscula intra horulam egerminant in ascaridiformem quasi vermicum; animatum vix diverso.



*aliisque infusis, quod movetur tamquam vivum, cujusmodi referti sunt Libri Micrographorum: Harris, Hooke, Grunzel, Bonann, Leuwenhoek, Cuno, Baker, Needham, Adams, Hill, Joblot, Walker, Ræsel, Leedermüller. An sufficienter distinctum a*  
*C. Fungorum: Mucoris?*

*obscura* etiamnum latent plurimæ molecule vivæ, quæ forte ad hanc familiam spectant, posteris relinquendæ.

α. Februm Exanthematicarum *contagium?*

β. Februm Exacerbantium *causâ?*

γ. Siphilitidis *virus humidum?*

δ. Spermatici vermiculi *Leuwenb.?*


ε. Æthereus nimbus *mensæ florentiæ suspensus?*

ζ. Fermentum Putredinisque *septicum Munch.?*

*Sed*

Animadverti immensum Opus DEI  
 non posse *Hominem* assequi,  
 quamvis laboriose quærat.

*Eccl. XVIII: 2-5.*




---

Pauca hæc vidimus operum DEI,  
 Multa abscondita sunt minora his majora.

*Syrac. XLIII: 36.*

---

## ò JEHOVA!

Omnia ista ANIMANTIA in TE sperant,  
ut des illis Escam tempore suo;  
TE ipsis dante illam colligunt,  
aperiente manum Tuam satiantur bono;  
TE recipiente Spiritum eorum pereunt,  
& in Pulverem revertuntur;  
TE emittente Spiritum tuum creantur,  
& renovas faciem Terræ.  
Gloria Domini erit in Secula,  
& lætatur Jehova operibus suis.  
Canam Jehovah in diebus vitæ meæ,  
reflectam Sapientiæ Ejus radios, quamdiu superero.

*David. Psalm. CIV: 27.*

NOMI-

# NOMINA GENERICA.

- A**carus 1022.  
 Acipenser 403.  
 Aëtia 1088.  
 Alauda 287.  
 Alca 210.  
 Alcedo 178.  
 Alcyonius 1293.  
 Amia 500.  
 Ammodytes 430.  
 Ampelis 297.  
 Amphibæna 392.  
 Anarichas 430.  
 Anas 194.  
 Anguis 390.  
 Anomia 1150.  
 Aphis 733.  
 Aphrodita 1084.  
 Apis 953.  
 Aranea 1030.  
 Arca 1140.  
 Ardea 233.  
 Argentina 518.  
 Argonauta 1161.  
 Alcaris 1076.  
 Ascidia 1087.  
 Asilus 1006.  
 Asterias 1098.  
 Atherina 579.  
 Attelabus 619.  
**B**alæna 105.  
 Balistes 404.  
 Blatta 687.  
 Blennius 441.  
 Boa 373.  
 Bombylius 1009.  
 Bos 98.  
 Bradypus 50.  
 Bruchus 604.  
 Buccinum 1196.  
 Bucco 168.  
 Buceros 153.  
 Bulla 1181.  
 Buphaga 154.  
 Buprestis 659.  
 Byrrhus 568.  
**C**æcilia 393.  
 Callionymus 433.  
 Camelus 90.  
 Cancer 1038.  
 Cancroma 233.  
 Canis 56.  
 Cantharis 647.  
 Capra 94.  
 Caprimulgus 346.  
 Carabus 668.  
 Cardium 1121.  
 Cassida 574.  
 Castor 78.  
 Cellepora 1285.  
 Centriscus 415.  
 Cepola 445.  
 Cerambyx 621.  
 Certhia 184.  
 Cervus 92.  
 Chætadon 460.  
 Chaos 1326.  
 Chama 1137.  
 Charadrius 253.  
 Chermes 737.  
 Chimæra 401.  
 Chion 1106.  
 Chrysis 947.  
 Chrysomela 586.  
 Cicada 704.  
 Cicindela 657.  
 Cimex 715.  
 Clio 1094.  
 Clupea 522.  
 Cobitis 499.  
 Coccinella 579.  
 Coccus 739.  
 Coluber 375.  
 Columba 279.  
 Colymbus 220.  
 Conops 1004.  
 Conus 1165.  
 Coracias 159.  
 Corallina 1304.  
 Coryphæna 446.  
 Corvus 155.  
 Cottus 451.  
 Crax 269.  
 Crotalus 372.  
 Crotophaga 154.  
 Cuculus 168.  
 Curculio 606.  
 Cyclopterus 414.  
 Cynips 917.  
 Cypræa 1172.  
 Cyprinus 525.  
**D**asyus 53.  
 Delphinus 108.  
 Dentalium 1263.  
 Dermestes 561.  
 Didelphis 71.  
 Didus 267.  
 Diodon 412.  
 Diomedea 214.  
 Donax 1126.  
 Draco 358.  
 Dytiscus 664.  
**E**cheneis 446.  
 Echinus 1102.  
 Elater 651.  
 Elephas 48.  
 Elops 518.  
 Emberiza 308.  
 Empis 1003.  
 Ephemera 906.  
 Equus 100.  
 Erinaceus 75.  
 Efox 515.  
 Exocætus 520.

Falco

# NOMINA GENERICA.

- F**alco 124.  
 Fasciola 1077.  
 Felis 60.  
 Fistularia 515.  
 Flustra 1300.  
 Forficula 686.  
 Fornica 962.  
 Fringilla 317.  
 Fulgora 703.  
 Fulica 257.  
 Furia 1325.  
**G**adus 435.  
 Gasterosteus 489.  
 Gobius 449.  
 Gordius 1071.  
 Gorgonia 1287.  
 Gracula 164.  
 Gryllus 692.  
 Gymnotus 427.  
 Gyrinus 567.  
**H**æmatopus 257.  
 Haliotis 1255.  
 Helix 1241.  
 Hemerobius 911.  
 Hippobosca 1010.  
 Hippopotamus 101.  
 Hirudo 1079.  
 Hirundo 343.  
 Hippa 603.  
 Hister 566.  
 Holothuria 1089.  
 Homo 28.  
 Hydra 1320.  
 Hystrix 76.  
**I**chneumon 930.  
 Isis 1287.  
 Julus 1064.  
**L**abrus 473.  
 Lacerta 359.  
 Lampyrus 643.  
 Lanius 134.  
 Laplyfia 1082.  
 Larus 224.  
 Lemus 44.  
 Lepas 1106.  
 Lepisma 1012.  
 Leptura 637.  
 Lepus 77.  
 Lernæa 1092.  
 Libellula 901.  
 Limax 1081.  
 Lophius 402.  
 Loricaria 508.  
 Loxia 299.  
 Lucanus 559.  
 Lumbricus 1076.  
**M**adrepore 1272.  
 Madra 1125.  
 Manis 52.  
 Mantis 689.  
 Medusa 1096.  
 Meleagris 268.  
 Meloë 679.  
 Mergus 207.  
 Merops 182.  
 Millepora 1282.  
 Monoculus 1057.  
 Monodon 105.  
 Mordella 683.  
 Mormyrus 522.  
 Moschus 91.  
 Motacilla 328.  
 Mugil 520.  
 Mullus 495.  
 Muræna 425.  
 Murex 1213.  
 Mus 79.  
 Musca 979.  
 Muscicapa 324.  
 Mustela 66.  
 Mutilla 966.  
 Mycæria 232.  
 Mya 1112.  
 Myrmæleon 913.  
 Mytilus 1155.  
 Myxine 1080.  
**N**autilus 1161.  
 Necydalis 641.  
 Nepa 713.  
 Nereis 1085.  
 Nerita 1257.  
 Noctilio 88.  
 Notonecta 712.  
 Numida 273.  
**O**estrus 969.  
 Oniscus 1059.  
 Ophidium 431.  
 Oriolus 160.  
 Ostracion 407.  
 Ostrea 1144.  
 Otis 264.  
 Ovis 97.  
**P**alamedea 232.  
 Panorpa 915.  
 Papilio 774.  
 Paradisca 166.  
 Parra 259.  
 Parus 116.  
 Patella 1257.  
 Pavo 267.  
 Pediculus 1016.  
 Pegasus 418.  
 Pelecanus 225.  
 Pennatula 1321.  
 Perca 481.  
 Petromyzon 394.  
 Phaëton 219.  
 Phalæna 808.  
 Phalangium 1027.  
 Phasianus 270.  
 Phoca 55.  
 Phœnicopterus 230.  
 Pholas 1110.  
 Phryganea 908.  
 Phyleter 107.  
 Picus 173.  
 Pinna 1159.  
 Pipra 338.  
 Platalea 231.  
 Pleu-

# NOMINA GENERICA.

|                       |                      |                      |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Pleuronectes 455.     | Sipunculus 1078.     | Teuthis 507.         |
| Plotus 218.           | Sirex 928.           | Thrips 743.          |
| Podura 1013.          | Sitta 177.           | Tipula 970.          |
| Polynemus 521.        | Solen 1113.          | Todus 178.           |
| Procellaria 212.      | Sorex 73.            | Trachinus 435.       |
| Psittacus 139.        | Sparus 467.          | Trichechus 48.       |
| Psophia 163.          | Sphex 941.           | Trichiurus 429.      |
| Ptinus 565.           | Sphinx 796.          | Trigla 496.          |
| Pulex 1021.           | Spondylus 1136.      | Tringa 247.          |
| <b>R</b> ana 354.     | Spongia 1296.        | Triton 1092.         |
| Raja 395.             | Squalus 397.         | Trochilus 189.       |
| Rallus 261.           | Staphylinus 683.     | Trochus 1229.        |
| Raphidia 916.         | Sterna 227.          | Trogon 167.          |
| Recurvirostra 256.    | Stromateus 432.      | Tubipora 1270.       |
| Rhamphallos 150.      | Strombus 1207.       | Tubularia 1301.      |
| Rhinoceros 104.       | Strix 131.           | Turbo 1232.          |
| Rynchops 228.         | Struthio 265.        | Turdus 291.          |
| <b>S</b> abella 1268. | Sturnus 290.         |                      |
| Salmo 509.            | Sus 102.             | <b>U</b> pupa 183.   |
| Scarabæus 541.        | Syngnatus 416.       | Uranoscopus 434.     |
| Sciæna 480.           | <b>T</b> abanus 999. | Ursus 69.            |
| Sciurus 86.           | Taenia 1323.         |                      |
| Scolopendra 1062.     | Talpa 73.            | <b>V</b> enus 1128.  |
| Scomber 492.          | Tanagra 313.         | Vespa 948.           |
| Scolopax 242.         | Tantalus 240.        | Vespertilio 46.      |
| Scorpæna 452.         | Tellina 1116.        | Viverra 63.          |
| Scorpio 1037.         | Tenebrio 674.        | Voluta 1186.         |
| Scyllaea 1094.        | Tenthredo 920.       | Volvox 1324.         |
| Sepia 1095.           | Terebella 1092.      | Vorticella 1317.     |
| Serpula 1264.         | Teredo 1267.         | Vultur 121.          |
| Sertularia 1306.      | Terres 1015.         |                      |
| Silpha 569.           | Testudo 350.         | <b>X</b> iphias 432. |
| Silurus 501.          | Tethys 1089.         |                      |
| Simia 34.             | Tetrao 273.          | <b>Y</b> unx 172.    |
|                       | Tetrodon 410.        |                      |



NOMI-

# NOMINA SPECIERUM propria.

- A**canthias 397.  
*Acathina* 1186.  
*Aëcon* 541.  
*Acus* 418.  
*Ædilis* 628.  
*Æglefinus* 435.  
*Ægocephalus* 246.  
*Agama* 367.  
*Aguti* 80.  
*Ahætulla* 387.  
*Ajaja* 231.  
*Albellus* 209.  
*Albeola* 199.  
*Albicilla* 123.  
*Alburnus* 432, 531.  
*Albula* 512, 520.  
*Alces* 92.  
*Alchata* 276.  
*Alcyonium* 180.  
*Alle* 211.  
*Allector* 269.  
*Aloëus* 542.  
*Alopex* 59.  
*Alola* 522.  
*Aluco* 132.  
*Amandava* 319.  
*Ameiva*. 362.  
*Amia* 495.  
*Ammiralis* 1167.  
*Ammodytes* 376.  
*Ammon* 97.  
*Ampulla* 1183.  
*Anableps* 499.  
*Anastatica* 1317.  
*Anatifera* 1109.  
*Anhinga* 218.  
*Ani* 154.  
*Annulus* 1179.  
*Anser* 197.  
*Anthias* 474.  
*Antipathes* 1291.  
*Anguilla* 42.  
*Anus* 1218.  
*Apedia* 35.  
*Apella* 41.  
*Aphya* 450, 528.  
*Apiafter* 182.  
*Apiarius* 620.  
*Apus* 344, 1058.  
*Aquila* 124.  
*Aquilus* 216.  
*Aracari* 151.  
*Araneus* 1044.  
*Ararana* 139.  
*Arctica* 211.  
*Argus* 272, 464, 1083,  
 1173.  
*Argo* 1164.  
*Arquata* 242.  
*Aries* 97.  
*Armadillo* 1062.  
*Ascida* 505.  
*Asellus* 1061, 1178.  
*Asinus* 100.  
*Asilus* 1059.  
*Asio* 132.  
*Asotus*. 501.  
*Asper* 482.  
*Aspius* 530.  
*Alpis* 378.  
*Aspredo* 502.  
*Astacus* 1051.  
*Asteria col.* 1288.  
*Astrild* 303.  
*Atlas* 542.  
*Atomos* 1056.  
*Atricilla* 225.  
*Atricapilla* 326, 332.  
*Attinga* 412.  
*Auricularia* 686.  
*Avofetta* 256.  
*Aureola* 339.  
*Aurata* 467.  
*Auratus* 527.  
*Aura* 122.  
*Aygula* 39.  
**B***abylonicus* 1220.  
*Babyrouffa* 104.  
*Batrianus* 90.  
*Bagre* 505.  
*Balaus* 1107.  
*Ballerus* 532.  
*Barbatula* 499.  
*Barbus* 525.  
*Basiliscus* 366.  
*Batrachus*. 502.  
*Bassanus* 217.  
*Batis* 395.  
*Belone* 517.  
*Belfebul* 37.  
*Bernhardus* 1049.  
*Bernicla* 198.  
*Bera* 1324.  
*Berus* 377.  
*Bison* 99, 547.  
*Bombina* 355.  
*Bonasia* 275.  
*Bonafus* 99.  
*Boops* 106, 469.  
*Boschas* 205.  
*Brama* 531.  
*Brandaris* 1214.  
*Bretilia* 314.  
*Bubalis* 99.  
*Bubo* 354.  
*Bufo* 131.  
*Buteo* 127.  
*Bursa* 1295.  
**C***aballus* 100.  
*Cabrilla* 488.  
*Calappa* 1048.  
*Calandra* 1234.  
*Calcar* 1162.  
*Calendula* 337. *Calli.*

# NOMINA. TRIVIALIA.

|                           |                              |                             |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <i>Calidris</i> 242, 329. | <i>Cerdo</i> 629.            | <i>Corona christi</i> 1252. |
| <i>Callaris</i>           | <i>Cernua</i> 487.           | <i>Corax</i> 155.           |
| <i>Callichrys</i> 506.    | <i>Cervicapra</i> 96.        | <i>Cor bovis</i> 1137.      |
| <i>Callorynchus</i> 402.  | <i>Cervus</i> 559.           | <i>Cordylus</i> 361.        |
| <i>Calotes</i> 367.       | <i>Chabrus</i> 1044.         | <i>Cornix</i> 156.          |
| <i>Camelus</i> 265.       | <i>Chalcides</i> 369.        | <i>Cotinga</i> 298.         |
| <i>Camelpardalis</i> 92.  | <i>Chavaria</i> 260.         | <i>Coturnix</i> 277.        |
| <i>Capania</i> 321.       | <i>Chamaeleon</i> 363.       | <i>Crepidula</i> 1257.      |
| <i>Cangrom</i> 1052.      | <i>Chersea</i> 377.          | <i>Crex</i> 261.            |
| <i>Cancerophaga</i> 233.  | <i>Cbione</i> 1130.          | <i>Cricetus</i> 82.         |
| <i>Candelaria</i> 703.    | <i>Cbiragra</i> 1207.        | <i>Crista galli</i> 1155.   |
| <i>Canicula</i> 399.      | <i>Chloris</i> 304.          | <i>Crocodylus</i> 359.      |
| <i>Cancharus</i> 1053.    | <i>Chromis</i> 470.          | <i>Cromis</i> 479.          |
| <i>Canrena</i> 1251.      | <i>Chrysodon</i> 1269.       | <i>Crux</i> 705.            |
| <i>Cantharis</i> 470.     | <i>Chrysactos</i> 125.       | <i>Cuculus</i> 497.         |
| <i>Caput medusæ</i> 1101. | <i>Chrysis</i> 551.          | <i>Cultellus</i> 1114.      |
| <i>Capreolus</i> 94, 560. | <i>Cia</i> 310.              | <i>Caniculus</i> 77.        |
| <i>Cardiffa</i> 1121.     | <i>Ciconica</i> 235.         | <i>Cupheus</i> 1045.        |
| <i>Capucinus</i> 562.     | <i>Cidaris</i> 1103.         | <i>Cupido</i> 274.          |
| <i>Carapó</i> 427.        | <i>Cimex</i> 1233.           | <i>Curruca</i> 329.         |
| <i>Carabus</i> 1052.      | <i>Cinclus</i> 251, 290.     | <i>Curfor</i> 630, 675.     |
| <i>Carcharias</i> 400.    | <i>Circia</i> 204.           | <i>Curvirostra</i> 299.     |
| <i>Carcinus</i> 1051.     | <i>Ciris</i> 313.            | <i>Curucuri</i> 167.        |
| <i>Caretta</i> 351.       | <i>Cirlus</i> 311.           | <i>Cyanus</i> 296.          |
| <i>Carocolla</i> 1243.    | <i>Citellus</i> 80.          | <i>Cygnus</i> 194.          |
| <i>Carbo</i> 216.         | <i>Citrinella</i> 309, 320.  | <i>Cymbium</i> 1161.        |
| <i>Cardinalis</i> 300.    | <i>Clangula</i> 201.         | <i>Cynocephalus</i> 37.     |
| <i>Carassius</i> 526.     | <i>Clarias</i> 504.          | <i>Cynomolgus</i> 37.       |
| <i>Carpio</i> 525, 510.   | <i>Clathrus</i> 1237.        | <b>D</b>                    |
| <i>Caryocatactes</i> 157. | <i>Cobella</i> 378.          | <i>Dactylus</i> 1110.       |
| <i>Castor</i> 209.        | <i>Coccothraustes</i> 299.   | <i>Dama</i> 93.             |
| <i>Casuarius</i> 265.     | <i>Cochlus</i> 1233.         | <i>Dea</i> 181.             |
| <i>Catenularia</i> 1270.  | <i>Cochlearia</i> 233.       | <i>Delphinus</i> 108, 1236. |
| <i>Catta</i> 44.          | <i>Colon</i> 564, 578.       | <i>Dentatus</i> 1263.       |
| <i>Catus</i> 62.          | <i>Colius</i> 301.           | <i>Dentex</i> 471, 531.     |
| <i>Catulus</i> 400.       | <i>Collurio</i> 136.         | <i>Diadema</i> 1103, 1108.  |
| <i>Cataractes</i> 226.    | <i>Colubris</i> 191.         | <i>Diana</i> 37.            |
| <i>Gatodon</i> 107.       | <i>Colus</i> 1221.           | <i>Dione</i> 1123.          |
| <i>Caudiverbera</i> 359.  | <i>Conger</i> 426.           | <i>Diogenes</i> 1049.       |
| <i>Cela</i> 343.          | <i>Constrictor</i> 373, 385. | <i>Diplas</i> 386.          |
| <i>Centrine</i> 398.      | <i>Contra</i> 290.           | <i>Dobula</i> 528.          |
| <i>Cephalus</i> 527, 520. | <i>Coprus</i> 630.           | <i>Dorcac</i> 96.           |
| <i>Cephus</i> 39.         | <i>Corall. alb.</i>          | <i>Dormia</i> 1043.         |
| <i>Cerastes</i> 376, 391. | rubr.                        | <i>Dominican</i> 301, 316.  |
|                           | nigr. 1288.                  | <i>Draco</i> 435.           |
|                           | Q q q q                      | <i>Draca-</i>               |

# NOMINA TRIVIALIA.

*Dracena* 360.  
*Dracuncul.* 434.  
*Dromedarius* 90.  
*Dryinus.* 372.  
*Ductor* 489.  
*Durissus* 372.  
*Dysera* 1130.

**E***lephas* 699.  
*Ephippium* 1149, 1150.  
*Emeria* 136, 316.  
*Emerita* 159, 1055.  
*Encrinus* 1317.  
*Encrasicollis* 523.  
*Ensis* 1114.  
*Entalis* 1263.  
*Entomon* 1060.  
*Enucleator* 299.  
*Entrocha* 1288.  
*Eperlanus* 511.  
*Epidromus* 1211.  
*Epipetrum* 1294.  
*Epos* 183.  
*Equifelis* 447.  
*Eremita* 557, 1049.  
*Erithacus* 335.  
*Ermineum* 68.  
*Erythrinus* 469.  
*Erytrophth.* 530.  
*Eupatria* 142.  
*Excubitor* 135.

**F***aber* 454, 622.  
*Falcinellus* 241.  
*Fareus* 532.  
*Fario* 509.  
*Fatuellus* 41.  
*Faunus* 36.  
*Fedoa* 242.  
*Fiatola* 432.  
*Fiber* 78, 218.  
*Filograna* 1265.  
*Fissura* 1261.  
*Fissurella* 1212.  
*Ficedula* 330.

*Ficus* 1184, 1295.  
*Fleclus* 457.  
*Folium* 1148.  
*Fosfor* 548, 675.  
*Francollinus* 275.  
*Fragum* 1123.  
*Fregata* 212.  
*Frons* 1155.  
*Furo* 68.  
*Fur* 566.  
*Fusus.* 1207.

**G***aderopus* 1136.  
*Galeus* 399.  
*Gallus* 454, 1209.  
*Gallopavo* 268.  
*Gallina* 1130.  
*Gallinago* 244.  
*Galbula* 160, 182.  
*Galgulus* 150.  
*Gammarus* 1050.  
*Garrula* 159.  
*Garrulus* 297.  
*Gambetta* 248.  
*Garzetta* 237.  
*Gazella* 96.  
*Gecko* 365.  
*Genetta* 65.  
*Gideon* 541.  
*Gennanus* 1168.  
*Gigas* 549, 674, 689,  
 1137, 1210.  
*Gladus* 432.  
*Glanis* 501.  
*Glaucus* 401, 494.  
*Glaucium* 201.  
*Glis* 87.  
*Glycymoris* 1143.  
*Globator* 1325.  
*Globulus* 1102.  
*Glottis* 242.  
*Gobius* 452, 526.  
*Gottorugine* 442.  
*Gonorynchos* 528.  
*Gratilla* 1102.

*Graculus* 158, 227.  
*Grapsus* 1048.  
*Gridagine* 529.  
*Grisola* 328.  
*Grus* 234.  
*Gryllotaipa* 693.  
*Gryllus* 220.  
*Gryphus* 121, 1151.  
*Guarantia* 242.  
*Guira* 335.  
*Gulo* 67.  
*Gunellus* 443.  
*Gurhardus* 497.  
*Gyrola* 315.

**H***aje* 387.  
*Haliætus* 129.  
*Hamadryas* 36.  
*Harpa* 1201.  
*Harpya* 121.  
*Harengus* 522.  
*Hausstellum* 1213.  
*Hepatus* 474, 506.  
*Hepserus* 517, 519.  
*Hercules* 541.  
*Hespera* 644.  
*Histrion* 403.  
*Hitnantopus* 255.  
*Hippoglossus* 456.  
*Hippurus* 446.  
*Hippolais* 330.  
*Hippocampus* 417.  
*Hippopus* 1137.  
*Hipnale* 373.  
*Hippocastanum* 1219.  
*Hircus* 99.  
*Hippuris* 1287.  
*Hirundo* 227, 497,  
 1159, 1178.  
*Histrion* 403, 717.  
*Homarus* 1053.  
*Horticala* 555.  
*Hucho* 510.  
*Hurta* 469.  
*Huso* 404.

**Hyæna**



# NOMINA TRIVIALIA.

Myæna 58.  
Hydatula 1320.  
Hydrocharis 103.  
Hysterita 1155.  
Hystrix 413.

Jacapa 313.  
Jacana 259.  
Jacarina 314.  
Jacchus 40.  
Jaculus 85.  
Janthina 1246.  
Ibex 95.  
Ibis 241.  
Ichneumon 63.  
Icterus 161.  
Idbarus 529.  
Idus 529.  
Iesus 530.  
Iguana 366.  
Immer 35.  
Interpres 248.  
Inuus 35.  
Irus 1128.  
Isabella 1177.  
Isogonum 1149.  
Iulis 476.

Labrax 482.  
Lagopus 274.  
Lambis 1208.  
Lampas 1216.  
Lanarius 129.  
Lanius 557, 710.  
Laternaria 703.  
Latro 1049.  
Lavaretus 512.  
Lazarus 1139.  
Lemmus 80.  
Leo 60.  
Leucorodia 231.  
Leuciscus 528.  
Lima 1147.  
Limanda 457.  
Limosa 243.

Linaria 312.  
Lincina 1239.  
Linguatula 457.  
Liparis 414.  
Lithophaga 1156.  
Lixula 1102.  
Locusta 1055.  
Loculator 240.  
Lotenia 188.  
Loligo 1096.  
Lota 440.  
Lotor 70.  
Lory 145.  
Lucifer 33.  
Lucioperca 481.  
Lubanus 1209.  
Lucius 516.  
Lucerna 407.  
Lucunter 1103.  
Lupus 430, 58.  
Luscinia 329.  
Lutra 66.  
Lumpus 414.  
Lyncurium 1295.  
Lynx 62.  
Lyra 433.

**M**acao 239  
Macaco 44.  
Mazandrites 1274.  
Mæna 468.  
Manas 1043.  
Maja 301, 321, 1046.  
Maimon 35.  
Malleus 1147.  
Mammilla 1252.  
Manacus 340.  
Manatus 49.  
Mango 191.  
Mantis 1054.  
Manus diab. 1296.  
Mappa 1173.  
Marila 196.  
Marica 1130.  
Marmota 81.

Marfupialis 71.  
Martes 67.  
Melanctus 124.  
Melanurus 468.  
Melba 319, 345.  
Meles 70.  
Meleagris 273.  
Mellivora 193.  
Meleleptus 554.  
Melengena 1220.  
Melops 477.  
Menidia 519.  
Merganser 208.  
Meroe 1132.  
Merlangus 438.  
Merlucius 439.  
Merula 295.  
Midas 42.  
Miliaria 308.  
Millepeda 1208.  
Milvus 126.  
Mimas 545.  
Miraletus 306.  
Mitra 1193.  
Mitella 1108.  
Mitu 270.  
Modiolus 1158.  
Molitor 674.  
Moloffus 543.  
Mola 412.  
Molva 439.  
Momota 152.  
Mongol.  
Mongoz 44.  
Monachus 122.  
Monax 81.  
Monedula 156.  
Mora 1178.  
Monitor 360.  
Montifring 318.  
Monoceros 105, 681.  
Morphus 436.  
Morio 722, 1193, 1221.  
Mysica 1194.  
Morinellus 254, 249.

Morta

Q q q q 2

# NOMINA TRIVIALIA.

- M**orta 42.  
 Mormyrus 472.  
 Mosquitus 152.  
 Motmot 271.  
*Musica* 1270.  
 Mustela 440.  
 Mustelus 400.  
 Mydas 350.  
 Mystus 502. 524.  
 Mysticetus 105.  
 Myrus 426.  
**N**aja 382.  
 Narica 64.  
 Nasua 64.  
 Nasus 530.  
*Nasator* 567.  
 Natrix 380.  
 Nengeta 135.  
 Nencrates 446.  
 Nisus 130.  
 Nivalis 308.  
*Noctiluca* 643. 651.  
 1085.  
 Novacula 447.  
*Nucleus* 1143.  
*Nussatella* 1170.  
 Nycticorax 235.  
**O**crophus 250.  
 Otopodia 1095.  
 Oedicephalus 255.  
 Oedippus 41.  
 Oenias 279.  
 Oenanthe 332.  
*Oestrum* 1059.  
*Olive* 1188.  
*Olearium* 1196. 1216.  
 1235.  
 Onca 60.  
*Oniscus* 1210.  
 Onocrotalus 215.  
 Ophis 425.  
 Ophidion 417.  
*Opilio* 1027.  
 Opossum 72.  
*Orbicularis* 1105.  
 Orca 108.  
 Orfus 530.  
 Orphus 469.  
 Orpheus 293.  
 Orix 309.  
*Orthocera* 1164.  
 Oryzivora 302.  
 Ossifraga 124.  
 Ostralega 257.  
 Othus 132.  
*Ovum* 1181.  
 Ourissa 191.  
 Oxyrinchus 395.  
**P**aca 81.  
 Pacos 91.  
 Paganellus 449.  
 Pagodus 1234.  
 Pagrus 469.  
 Pagurus 1044.  
 Palumbus 282.  
 Paniscus 37.  
 Papa 122.  
*Paphia* 1129.  
 Pardalis 62.  
 Pardus 60.  
 Paru 432.  
 Passer 459.  
 Pastinaca 396.  
 Pauxi 270.  
 Pestunculus 1143.  
*Pediculus* 11058. 1180.  
 Pegasus 192.  
 Pelarnis 482.  
 Pelasgia 345.  
*Pelaronia* 1254.  
 Pendulinus 343.  
 Penelops 202.  
*Penis* 1267.  
 Penicillus 1269.  
 Perdix 276.  
 Percnopterus 123.  
*Perna* 1113.  
*Perspectiva* 1227.  
*Perversa* 1246.  
 Petronia 322.  
*Phantapus* 1089.  
 Phoenicurus 335.  
 Philander 72.  
 Phocæna 108.  
 Pholis 443.  
 Phoxinus 528.  
 Phycis 442.  
 Physalus 106. 1090.  
 Pica 157. 1235.  
*Pileus* 1273.  
*Pilula* 568.  
 Pipa 354.  
*Pinnophylax* 1039.  
*Pinnotheres* 1040.  
 Piscator 217.  
 Pitanga 136.  
 Pithecia 40.  
*Placenta* 1154.  
*Placomus* 1290.  
 Plagiufa 455.  
*Planorbis* 1242.  
 Plateia 456.  
 Plecostomus 508.  
 Podiceps 223.  
 Polaechius 439.  
 Polyglotta 293.  
*Polyphemus* 1057.  
 Polytmus 189.  
*Pomatia* 1244.  
 Pompadora 298.  
 Pompilus 447. 1161.  
*Pomum* 1197.  
 Porcus 103.  
 Porcellus 79.  
*Porpita* 1096.  
 Porzana 262.  
 Porphyrio 258.  
 Porpila 1272.  
 Pratincola 345.  
 Prester 377.  
*Priapus* 1090.  
 Pristis 401.

Pro-

# NOMINA TRIVIALIA.

- Promerops* 184.  
*Proscarabeus* 679.  
*Protheus* 1326.  
*Pstittacus* 448.  
*Psora* 1060.  
*Puffinus* 213.  
*Pugnax* 247.  
*Pugilis* 1209.  
*Pulex* 1055. 1058.  
*Pungitius* 491.  
*Pupus* 699.  
*Putorius* 67.  
*Pyralis* 644.  
*Pygargus* 126.  
*Pyrrhula* 300.  
*Pyrrhocorax* 158.  
*Pyrum* 1195. 1218.  
**Q**uelea 310.  
*Querquedula* 203.  
*Quiscula* 165.  
**R**allus 83.  
*Rana* 1216.  
*Rapa* 1184.  
*Reduvius* 1022.  
*Regulus* 338.  
*Remies* 1119.  
*Remora* 446.  
*Rhea* 266.  
*Rhinoceros* 153. 544.  
*Rhinobatos* 397.  
*Rhombus* 458.  
*Ricinus* 1023. 1219.  
*Rosalia* 41.  
*Rosinarius* 49.  
*Rubeta* 355.  
*Rubetra* 332. 339.  
*Rubeola* 337.  
*Ruficilla* 326.  
*Rutilus* 529.  
*Rupicapra* 95.  
*Rupicola* 338.  
**S**agitta 1322.  
*Salamandra* 371.  
*Salpa* 470.  
*Salicaria* 321.  
*Salvelinus* 511.  
*Salmarinus* 511.  
*Sargus* 467.  
*Satyrus* 34.  
*Satyra* 269.  
*Saurus* 511. 518.  
*Sayaca* 316.  
*Scalpellum* 1109.  
*Scarabeus* 1241.  
*Scarus* 473.  
*Scorpius* 1208. 1215.  
*Schach* 136.  
*Schoenobenus* 329.  
*Schoenichus* 311.  
*Schreitler* 487.  
*Scelopax* 415.  
*Scomber* 492.  
*Scorpius* 452.  
*Scrophia* 192. 453.  
*Scytale* 392. 374.  
*Scyllarus* 1054.  
*Seps* 363.  
*Serinus* 320.  
*Stalis* 336.  
*Silenus* 36.  
*Siligua* 1113.  
*Simson* 542.  
*Sipunculus* 1164.  
*Smaris* 468.  
*Solare* 1229.  
*Solea* 457.  
*Solium* 1323.  
*Sphinx* 35.  
*Sphyræna* 515.  
*Spasma* 47.  
*Spatagus* 1104.  
*Spectrum* 46.  
*Sponsa* 207.  
*Spinacia* 492.  
*Spinax* 398.  
*Spinus* 322. 471.  
*Spinoletta* 288.  
*Spirula* 1163.  
*Spitza* 186.  
*Spongites* 1284. 1286.  
*Sprattus* 522.  
*Squatina* 398.  
*Squilla* 1051.  
*Stapatzina* 331.  
*Stellio* 361.  
*Stercus muse.* 1169.  
*Sternicla* 524.  
*Stincus* 365.  
*Stockerus* 715.  
*Strepticeros* 98.  
*Sturio* 403.  
*Sula* 218.  
*Subis* 344.  
*Sutor* 628.  
*Sylvanus* 34.  
*Sylvia* 321.  
*Syricta* 44.  
*Synagris* 470.  
*Synodus* 516.  
*Sycophanta* 670.  
**T**adorna 195.  
*Tania* 445. 499.  
*Tajacu* 103.  
*Talpa* 1174.  
*Tapera* 345.  
*Tarandus* 93.  
*Tarantula* 1035.  
*Tarda* 164.  
*Tatao* 315.  
*Taurus* 98. 547.  
*Telescopium* 1231.  
*Teguixin* 368.  
*Telemus* 1059.  
*Terebratula* 1153.  
*Testiculus* 1199.  
*Testudinaria* 1108.  
*Tetrax* 264.  
*Terebra* 1239.  
*Tetrix* 274.  
*Thalia* 1090.  
*Thous* 60.  
*Thrissa* 526.

Q q q q 3

Thy-

# NOMINA TRIVIALIA.

Thymalus 311.

Thyridus 483.

Tibicen 707.

Tiburo 399.

Tieris 601. 1176.

Tinea 457. 526.

Tintinabulum 1108.

Tor 331.

Tutus 342.

Tobianus 430.

Torquilla 172.

Torda 210.

Torpedo 395.

Totanus 242.

Trapetium 424.

Tribulus 1214.

Trachinus 419.

Trionis cornu 1225.

Trochilus 338.

Troglodytes 33.

Troile 220.

Trutta 309.

Tucanus 151.

Tulipa 1172. 1223.

Turbinellus 1195.

Turdus 478.

Tursco 107.

Turtur 284.

Typhoeus 543.

Tyrannus 136. 325.

Typhle 416.

**V**acca 547.

Vagina 1113.

Vampyrus 46.

Vanellus 248.

Vesella 1098.

Ventilabra 1296. 1293.

Vespertilio 402. 1194.

Vespillo 569.

Veter 36.

Vetula 406. 169.

Vipera 375.

Vimba 512. 331.

Virgo 234.

Vitellus 1252.

Vormer 454.

Vulcella 1113.

Vulpes 59. 516.

**U**ca 1041.

Ulula 133.

Umbra 511.

Umbra 367. 480.

Urogallus 273.

Ustilago 1326.

Uva 1238.

**Z**ebra 101.

Zenex 320.

Zibellina 68.

Zibeta 65.

Zibeticus 79.

Zingel 482.

Zygona 309.

## PAPILIO.

**A**casta 83.

Acelle 191.

Achilles 42.

Aëtion 261.

Adippe 212.

Aidea 68.

Ageria 143.

Agistis 48.

Æneas 16.

Æropus 128.

Agamemnon 22.

Agenor 14.

Aglaja 211.

Ajax 31.

Alimena 178.

Almana 132.

Amaltea 174.

Amphinome 176.

Anacardii 74.

Anchises 11.

Ancea 184.

Anthiochus 1068.

Antiochus 35.

Antiope 165.

Aonis 134.

Apollo 50.

Arcanius 242.

Argus 232.

Argiolus 234.

Ariadne 170.

Arion 230.

Arfalte 91.

Assimilis 194.

Asterie 133.

Astroites 1276.

Atalanta 175.

Athemon 243.

Augias 257.

**B**elia 84.

Belle 220.

Bixa 264.

Boeticus 226.

Bolina 188.

Brassica 75.

Briseis 139.

Butes 261.

**C**. album 168.

C. aureum 169.

Caneus 111.

Calliope 56.

Camilla 187.

Canace 173.

Car

# NOMINA TRIVIALIA PAPHLIONUM:

Canthus 129.  
 Cardamines 85.  
 Cardui 157.  
 Carica 244.  
 Cassia 120.  
 Castus 125.  
 Cepheus 54.  
 Cereus 273.  
 Charitonia 65.  
 Chrysiptus 119.  
 Cinxia 205.  
 Cleopatra 105.  
 Clio 66.  
 Clytia 189.  
 Clytus 124.  
 Comma 256.  
 Crategi 72.  
 Cupido 217.  
 Cydippe 163.  
 Cytherea 210.  
**D**amone 93.  
 Daphnigce 81.  
 Dejanira 154.  
 Deiphobus 9.  
 Demoleus 46.  
 Demophite 82.  
 Demophiton 47.  
 Dia 207.  
 Dido 192.  
 Diomedes 23.  
 Dirce 171.  
 Diffimilis 195.  
**E**cclipsis 107.  
 Echion 224.  
 Elea 183.  
 Electra 101.  
 Eucedonia 90.  
 Enceladus 112.  
 Erato 70.  
 Eribote 115.  
 Eubule 102.  
 Euippe 87.  
 Eupheno 88.

Euphrosine 214.  
 Euryphylus 49.  
 Euryta 69.  
 Euterpe 61.

**F**erona 140.  
 Fidia 138.

**G**alathea 147.  
 Glaucippe 89.  
 Glaucus 9.

**H**ecabe 96.

Hector 2.  
 Hedonia 153.  
 Helena 19.  
 Helenus 4.  
 Helieta 94.  
 Hellica 78.

Helie 152.  
 Hermione 149.

Hero 255.  
 Hippothoe 254.

Horta 54.  
 Hyale 100.

Hyparete 92.  
 Hyperantus 127.

Hyperbius 130.  
 Hypermnestra 198.

**I**anassa 185.

Janira 156.  
 Jalius 26.

Jason 38.  
 Jatropha 172.

Idea 73.  
 Idmone 182.

Idmoneus 45.  
 Jo 131.

Iphieta 181.  
 Iris 161.

Jurtina 155.

**L**amperia 160.

Laomedea 145.  
 Lara 238.

Lathonia 213.  
 Leda 151.

Leilus 31.  
 Lemonias 136.

Lena 206.  
 Levana 201.

Leucorhoe 179.  
 Libye 146.

Ligea 144.  
 Lucina 203.

Lysippus 250.

**M**achaon 33.

Madon 43.  
 Mera 141.

Megera 142.  
 Malva 267.

Marfyas 223.  
 Matura 204.

Melite 57.  
 Melpomene 71.

Memnon 13.  
 Menelaus 20.

Metis 245.  
 Midamus 108.

Mineus 126.  
 Mississippi 118.

Mneme 59.  
 Mnemosyne 51.

Mopsa 59.  
 Monuste 80.

**N**api 77.

Nauplia 197.  
 Nearca 190.

Neleus 246.  
 Nefea 199.

Nestor 40.  
 Niavius 109.

Nioble 215.  
 Niphe 208.

Nireus 28.  
 Niso 270.

Orti

Q q q q 4

# NOMINA TRIVIALIA PAPILIONUM.

**O**britus 113.  
 Oenone 135.  
 Oileus 269.  
 Orithya 137.  
 Orontes 27.  
**P**alano 99.  
 Pammon 8.  
 Pampilius 239.  
 Pandarus 18.  
 Panope 196.  
 Paphia 209.  
 Panthous 17.  
 Paris 3.  
 Palithoe 33.  
 Patrochilus 24.  
 Perius 116.  
 Peleus 249.  
 Phædra 150.  
 Phærusa 180.  
 Phalerot 272.  
 Pherecius 248.  
 Phidias 263.  
 Phidippus 37.  
 Philea 164.  
 Philiasus 135.  
 Philocles 240.  
 Philoctetes 29.  
 Phlæas 252.  
 Philomelus 123.  
 Piera 32.  
 Pinthæus 124.  
 Pipleis 159.  
 Pirithous 235.  
 Pitho 266.  
 Plexippus 117.

Podalirius 36.  
 Polybe 218.  
 Polycletus 265.  
 Polycloros 166.  
 Polydamas 12.  
 Polydorus 10.  
 Polytes 5.  
 Polymnia 58.  
 Populi 162.  
 Priamus 1.  
 Priassus 251.  
 Prorsa 202.  
 Protefilus 39.  
 Proteus 259.  
 Protumnus 258.  
 Pruni 221.  
 Psidii 64.  
 Pyranthe 98.  
 Pyrene 86.  
 Pyrrhus 25.

**Q**uercus 222.

**R**apæ 76.  
 Rhamni 106.  
 Ricini 63.  
 Rubi 237.  
 Rumina 1200.  
**S**arpedon 15.  
 Scylla 95.  
 Semele 148.  
 Senna 103.  
 Similis 193.  
 Sibilla 186.  
 Sinapis 79.

Sophora 121.  
 Spio 271.  
 Stelenes 30.

**T**ages 268.  
 Talaus 247.  
 Telamon 225.  
 Telemachus 41.  
 Tersicore 55.  
 Tefbis 236.  
 Teucer 44.  
 Thallo 61.  
 Thalia 67.  
 Thamyras 229.  
 Thero 219.  
 Thrax 260.  
 Thyra 227.  
 Thysbe 228.  
 Timantes 241.  
 Tiphia 164.  
 Tritæ 97.  
 Troilus 6.  
 Tulbagia 158.

**V**anilla 216.

Venilia 177.  
 Virgaurea 253.

**U**lysses 21.

Urania 60.

Urtica 167.

**X**anthus 122.

Xuthus 34.

Zetes 110.

Zeuxo 231.

## PHALÆNA.

**A**bsinthii 133.  
 Aceris 137.  
 Æsculi 83.  
 Affinis 144.  
 Algira 98.

Alni 134.  
 Anastomosis 53.  
 Ancilla 93.  
 Antiqua 56.  
 Aprilina 138.

Arenacea 65.

Atra 49.

Atriplicis 173.

Atlas 1.

Aulica 68.

Balis

# NOMINA TRIVIALIA PHALÆNARUM.

**B**atis 97.  
*Brassica* 163.  
 Bimaculosa 184.  
 Bucephala 31.  
**C**. nigrum 162.  
 Cæruleocephal. 59.  
 Caja 38.  
 Catix 27.  
 Camelina 80.  
 Capucina 79.  
 Castrensis 36.  
 Cecropia 3.  
 Celsia 77.  
 Chi 136.  
 Chrystitis 126.  
 Chrysorrhoea 45.  
 Circumflexa 128.  
 Citrugo 189.  
 Comma 156.  
 Complana 115.  
 Conspicillaris 149.  
 Coryli 50.  
 Cossus 63.  
 Crategi 48.  
 Crepuscularis 113.  
 Cribrum 76.  
 Curtula 52.  
**D**ecora 1068.  
*Delphinii* 189.  
 Depuncta 191.  
 Derasa 158.  
 Dictæa 68.  
 Disparis 146.  
 Dispar 44.  
*Dipsacæ* 185.  
 Dominula 90.  
 Dromedaria 82.  
 Dumeti 26.  
**E**xclamationis 155.  
 Exsoleta 151.  
**F**agi 30.

Fascelina 55.  
 Fenestra 9.  
*Festuca* 131.  
 Fimbria 123.  
 Flavicornis 182.  
*Fraxini* 125.  
 Fuliginosa 95.  
 Fullonica 16.  
 Fulvago 190.  
 Fulvia 96.  
 Furcula 51.  
**G**amma 127.  
 Glyphica 105.  
 Gonostigma 57.  
 Gothica 159.  
*Graminis* 73.  
 Grammica 75.  
**H**ebe 40.  
 Hecta 87.  
 Heliconia 112.  
 Hepatica 169.  
 Hera 91.  
 Hesperus 2.  
*Humuli* 84.  
*Jacobæ* 111.  
 Illicifolia 19.  
 Interrogationis 129.  
 Interrupta 116.  
 Jota 130.  
**L**. album 134.  
 Lanestris 28.  
 Lectrix 89.  
 Leporina 109.  
 Leucomelas 183.  
 Libatrix 78.  
 Litura 162.  
 Lota 70.  
 Lubricipeda 69.  
 Lucipara 187.  
 Ludifica 143.  
 Lucerneæ 102.

Luna 5.  
 Lunus 6.  
 Luforia 74.  
*Lupulina* 86.  
**M**aterna 117.  
 Matronula 92.  
 Maura 124.  
 Mendica 47.  
 Meticulosa 32.  
 Mi 106.  
 Militaris 12.  
 Mori 33.  
 Morio 66.  
 Monacha 43.  
 Mundana 17.  
*Myrtili* 167.  
**N**arbonca 103.  
 Neustria 35.  
 Nictitans 141.  
 Nigricans 178.  
 Nivea 108.  
 Nupta 119.  
**O**o 81.  
 Occidia 14.  
 Occulta 147.  
 Ocularis 100.  
 Odora 11.  
 Oleracea 171.  
 Ornatix 110.  
*Oxyacantha* 165.  
**P**acta 120.  
 Pallens 167.  
 Palpina 64.  
 Paphia 3.  
 Paranymphe 122.  
 Parthenias 94.  
 Pascaria 142.  
 Pavonia 7.  
 Pellex 104.  
 Perpicua 10.  
 Perpicillaris 148.

*Pini*

Q q q q 5

# NOMINA TRIVIALIA PHALÆNARUM.

*Pini* 24.  
*Pinastri* 160.  
*Pisi* 172.  
*Plebeja* 168.  
*Plectra* 157.  
*Plantaginis* 42.  
*Polymita* 180.  
*Populi* 34.  
*Potatoria* 23.  
*Polyodon* 170.  
*Præcox* 174.  
*Processionea* 37.  
*Pronuba* 121.  
*Pruni* 22.  
*Pudibunda* 54.  
*Punctigera* 15.  
*Purpurea* 67.  
*Putris* 152.  
*Pyramidea* 181.

**Q**uadra 114.

**A**lniaria 205.

**A**mataria 201.

**A**tomaria 214.

**B**esularia 217.

**C**assraria 228.

**D**olabraria 207.

**E**linguaria 211.

**F**alcataria 204.

**F**alcitaria 216.

**J**atropharia 229.

*Quercifolia* 18.

*Quercus* 25.

**R**etusa 193.

*Rubi* 21.

*Rubicollis* 113.

*Ruffa* 1068.

*Ruffina* 72.

*Rumicis* 164.

*Russula* 71.

**S**alicis 46.

*Sanguinolenta* 101.

*Satellitita* 176.

*Sponia* 118.

*Strix* 82.

*Strigilis* 161.

*Sylvina* 87.

**T**au 8.

*Trapetzia* 99.

**L**acertinaria 204.

**L**actearia 194.

**M**acularia 213.

**M**elanaria 212.

**P**apilionaria 225.

**P**antaria 218.

**P**ennaria 209.

**P**iniaria 210.

**P**rosapiaria 222.

**P**runaria 208.

**P**ulveraria 215.

**P**unctaria 200.

**P**urpuria 221.

**P**usaria 223.

*Tragopoginis* 177.

*Tremula* 58.

*Triplaria* 145.

*Tritici* 179.

*Turca* 140.

*Typica* 186.

**U**mbatica 159.

**V**accinis 166.

*Verbasci* 153.

*Vericolor* 32.

*Villica* 41.

*Vinula* 29.

*Virgo* 39.

*Virens* 139.

*Vitis idæa* 88.

**Z**iczac 61.

**P**utaria 196.

**S**acraria 229.

**S**ambucaria 203.

**S**triagaria 197.

**S**yringaria 206.

**T**hymiaria 199.

**T**ricinctaria 227.

**T**ripunctaria 226.

**V**ernaria 195.

**V**espertaria 224.

**V**ibicaria 198.

**W**asaria 219.



# NOMINA TRIVIALIA PHALÆNARUM

**A**stuta 241.  
Albicilata 255.  
Alchemillata 253.  
Aversata 251.

Bilineata 245.  
Bromata 281.

**Cherophyllata** 237.  
**Chenopodiata** 246.  
Cingulata 280.  
Clathrata 238.  
Comitata 247.  
**Cratægata** 243.

Dealbata 256.  
Didymata 269.  
Dubitata 235.

Emarginata 236.

Flaveolata 240.  
Fluctuata 260.

**A**ltroemeriana 314.  
*Americana* 298.  
Arcuata 296.  
*Avellana* 297.

Bergmanniana 307.  
Branderiana 302.  
Brunnichiana 319.

Cereana 282.  
Christianniana 303.  
Clorana 287.  
Cruciana 323.

Fabriciana 324.  
Fasiana 283.  
Fortkoleana 304.

Gnomana 294.

**Grossulariata** 242.

Hastata 254.  
Hyalinata 279.

Janata 259.  
Immorata 265.  
Immutata 264.  
Incanata 263.  
Juniperata 261.

Lemnata 278.  
Limbata 273.

Margaritata 231.  
Marginata 257.  
Miata 249.

Notata 232.  
Nymphæata 274.

Oculata 271.

\* \* \* \* \*

Gouana 318.

Hamana 290.  
Hartmanniana 306.  
Hastiana 311.  
Heraciiana 326.  
Holmiana 308.

Kekeritziana 291.

Lediana 313.  
Lecheana 301.  
Literana 288.  
Lœtlingiana 305.  
Logiana 317.

Ministrana 300.  
Moderiana 321.

Ocellata 258.

Paludata 277.  
Plagiata 248.  
Populata 244.  
Porata 233.  
*Potamogata* 275.  
*Prunata* 250.

Rectangulata 270.  
Remutata 266.  
Repandata 234.

Sordiata 262.  
*Stratiolata* 276.  
Strigilata 268.  
Subcœnuciata 267.

Tristata 252.

Viridata 230.  
Undulata 239.  
Urticata 272.

Operana 292.

Pariana 320.  
*Piceana* 299.  
Prasinana 285.  
Pupillana 325.

Rolandriana 309.  
Rosana 293.

Schalleriana 315.  
Schreberiana 316.  
Solandriana 310.  
Uddmanniana 322.  
Viridana 286.  
Walbomiana 312.  
Uncana 284.  
*Xylosteana* 295.  
*Zergæana* 289.

Barba-

# NOMINA TRIVIALIA PHALÆNARUM.

**B**arbalis 329.

Duplaris 343.

Farinalis 327.

Forficulis 334.

Fruentalis 337.

Glaucinalis 328.

Pinguinalis 336.

Proboscidalis 331.

Purpuralis 342.

Reticularis 341.

Rostralis 332.

Sanguinalis 339.

Secalis 338.

Sticticalis 340.

Sulphuralis 333.

Tentacularis 339.

Verticalis 335.

**A**lbinella 435.

Arbutella 380.

Argentella 421.

Aristella 416.

Asperella 397.

Bella 348.

Bicostella 387.

Bonnetella 441.

Bracteella 415.

Brunnichella 448.

Evonymella 350.

Frischella 433.

Foenella 369.

Fuscella 409.

Gelatella 344.

Geoffrella 430.

Gemmella 414.

Gødartella 436.

Grænella 377.

Minutella 410.

Mouffietella 431.

Nemorella 364.

Nisella 374.

Occultella 451.

Oxyacantella 357.

Padella 351.

Paracentella 384.

Pascuella 359.

Pedella 420.

Pellionella 372.

Petiverella 423.

Pinetella 358.

Podacella 428.

Pomonella 401.

Populella 399.

Pratella 360.

Proletella 379.

Porrectella 419.

Pulchella 349.

Punctella 386.

Puscella 347.

Capitella 418.

Calibella 422.

Caudella 417.

Cembrella 405.

Carnella 363.

Cinctella 390.

Cinerella 392.

Clerkella 450.

Colonella 346.

Corticella 411.

Crasegella 353.

Cucullatella 376.

Culmella 361.

Cynofuscella 368.

Harrisella 449.

Irrorella 354.

Jungiella 442.

Junsperella 408.

Lappella 378.

Leucatella 391.

Levenhookella 437.

Leyonetella 440.

Linneella 446.

Listerella 432.

Lichenella 452.

Lutarella 355.

Degerella 426.

Dodecella 404.

Elongella 385.

Mellonella 375.

Mesomella 356.

Merianella 438.

Mercurella 400.

Rajella 447.

Ramella 366.

Reaumurella 425.

Resinella 406.

Rhediella 444.

Rhom.

# NOMINA TRIVIALIA PHALÆNARUM.

|                       |                  |                       |
|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Rhombella 394.        | Serratella 398.  | Tetrapodella 388.     |
| Robertella 429.       | Sociella 345.    | Trigonella 393.       |
| Roesella 445.         | Stipella 412.    | Turionella 403.       |
| Rorella 362.          | Strobilella 402. |                       |
| Rusticella            | Swamerdam. 424.  | Unguicella 365.       |
| <i>Salicella</i> 367. | Sultzella 427.   | Ustella 383.          |
| Sarcitella 373.       | Sylvella 413.    | Vestianella 370.      |
| Scabrella 396.        | Tapetzella 371.  | Vittella 382.         |
| Schæfferella 443.     | Tedella 407.     | Wilkella 439.         |
| Scopolella 343.       | Tertianella 395. | <i>Xylobella</i> 389. |
| Sequella 352.         | Tessella 381.    |                       |

## SYNONYMA.

|                            |                       |                        |
|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>A</b> brotanoides 1280. | Alexis 772.           | <i>Aracacanga</i> 139. |
| <i>Abucatnia</i> 454.      | Alga 1300.            | Araneus aquaticus      |
| Acanthus 322.              | Algazel 96.           | 714.                   |
| Acarus 1021. 1028.         | <i>Aloebichi</i> 161. | <i>Araranna</i> 140.   |
| Accabarium 1281.           | Altica 611.           | Architalassus 1167.    |
| 1287.                      | Aluco 132.            | Arctica 226.           |
| Achatina 1175.             | <i>Amandabal</i> 319. | Arctopithæcus 50.      |
| Acridium 693.              | Amaranthus 1274.      | Ardea 222.             |
| Acropora 1278. 1281.       | Ammiralis 779.        | Arenaria 248. 249.     |
| Actinia 1088.              | Amusium 1145.         | Arethusa 1090.         |
| Acus 515.                  | Ani 1296.             | Argentina 517.         |
| Adarce 1286.               | Anas campestris 264.  | Argus 1178.            |
| Adill 59.                  | Anastatica 1317.      | Armadillo 54.          |
| Aefalon 128.               | Androsaces 1303.      | Armadillus 52.         |
| <i>Aguti</i> 80.           | <i>Anchima</i> 232.   | Ascarides 1076.        |
| Ai 50.                     | Angelfisk 463.        | Asellus 1061.          |
| Ajax 1216.                 | Anguilla 1085.        | Asilus 1003. 1009.     |
| <i>Ajuracuran</i> 147.     | Amisocalium 1309.     | Aspis 377.             |
| Alata 1211.                | Antalis 1263.         | Aspredo 504.           |
| Alauda marina 252.         | Anthorax 981.         | Astacus 1051.          |
| Albatros 214.              | Anthribus 574.        | Asterias 130.          |
| Albellus 209.              | Anthus 306.           | Asterolepas 1258.      |
| Albula 513.                | Antipathes 1290.      | Astroites 1275.        |
| <i>Alchalaalli</i> 180.    | Apiaster 182.         | <i>Astur</i> 130.      |
| Alchata 276.               | Apis 945.             | <i>Atingacu</i> 172.   |
| Alcyon 179. 216.           | Aporrhias 1208.       | Autelabus 599. 601.    |
| Alcyonium 1270.            | Aquila 124.           | 681.                   |
| 1285. 1298.                | <i>Aracari</i> 151.   | Aurata 471.            |

Auris

# SYNONYMA.

- Auris* 1218. 1356.  
*Aurissa* 191.  
*Aurora* 761.  
*Avicula* 150. 332.  
 1859.  
*Avis arctica* 226.  
     *nivis* 306.  
     *paradisi* 325.  
     *polyglotta* 294.  
     *rabo* 216.  
     *rebus* 219.  
     *venti* 208..  
**B**  
*Baboon* 35.  
*Balanus* 741. 1108.  
*Balearica* 233. 234.  
 235.  
*Baliles* 415.  
*Bargi* 246.  
*Bassanus* 217.  
*Battia* 1296.  
*Beetle* 660.  
*Belladonna* 775.  
*Bengalus* 319. 323.  
*Bibio* 977.  
*Binoculus* 1057.  
*Blatta* 570. 676.  
*Blumen polypen* 1268.  
*Balbuzardus* 129.  
*Bombylius* 959.  
*Bombyx* 1169.  
*Bonasia* 274. 275.  
*Booby* 218.  
*Boschas* 203. 206.  
*Botervegie von boer*  
 1168.  
*Botrachus* 502.  
*Bourpres* 1049.  
*Brachionus* 1268.  
 1317.  
*Brandgaas* 195.  
*Buccinum* 1189.  
 1192. 1222. 1237.  
*Bufo* 354. 356..  
*Buprestis* 566. 589.  
 591. 597. 657. 698.  
*Burhus* 565.  
*Bursa* 1295.  
*Butyracea* 793.  
**C**  
*Canigara* 103.  
*Cabechon* 1257.  
*Cacatua* 144.  
*Cæcilia* 370. 392.  
*Cagni* 40. 41.  
*Castaia* 41.  
*Calao* 153.  
*Calidris* 245. 251.  
 252. 255.  
*Callophilophorū* 1303.  
*Calva* 1107.  
*Camisole* 1228.  
*Canarium* 1210. 1213.  
*Cancellus* 1029.  
*Cancrophagus* 236.  
*Canis galeus* 399.  
     *volans* 46.  
*Cannavarola* 330.  
*Cantharis* 617. 642.  
 644. 646. 659. 680.  
*Canutus* 251.  
*Caprema* 447.  
*Capra* 91.  
*Capra moschus* 93.  
*Capri-cerva* 96.  
*Capricornus* 637.  
*Capriolus moschi* 91.  
*Capucinus* 1168.  
*Capus* 343.  
*Caput mortuum* 799.  
     *serpentis* 1176.  
*Capybara* 103.  
*Caquantotl.* 298.  
*Carabus* 660. 661.  
*Cardinalis* 301. 314.  
 316.  
*Cardium* 1126.  
*Carduelis* 320.  
*Cares* 350.  
*Cariacaca* 240.  
*Cariama* 232.  
*Carigue* 71.  
*Cars-pira* 216.  
*Carmoran* 217.  
*Carte* 1173.  
*Caryocatactes* 157.  
*Cassicus* 161.  
*Cassida* 571. 573.  
 597. 644. 1197.  
*Cassis* 1198.  
*Castor* 209.  
*Catarractes* 219. 226.  
*Catinga* 135.  
*Cato-pardus* 62.  
     *simius* 45.  
*Catulus* 399.  
*Cavia cobaya* 79.  
*Cay* 42.  
*Cellularia* 1302. 1314.  
*Cenchris* 373.  
*Cencostolli* 294.  
*Cephus* 226.  
*Cerambyx* 637. 659.  
 668.  
*Ceratophyllum* 1293.  
*Cercopithecus* 34. 44.  
*Cercola* 1166.  
*Cervus* 92.  
*Cete* 107.  
*Chætodon* 484. 507.  
*Chama* 1122. 1141.  
*Charax* 513. 514.  
*Chelifer* 1028.  
*Chermes* 739. 742.  
*Chevalier* 248.  
*Chilcanauhli* 201.  
*Chilsootl.* 314.  
*Chirotheca* 1297.  
*Chloris* 313. 321. 324.  
*Chlorton* 160.  
*Choane* 1282.  
*Chrysomela* 564.  
*Cidaris* 1102.  
*Cimex* 734.  
**Ch.**

# SYNONYMA.

- Cinclus* 244. 449.  
 250.  
*Circus* 130.  
*Cirlus* 310. 311.  
*Clakis* 198.  
*Clangula* 20.  
*Clarias* 502.  
*Clypeus* 1262.  
*Coati* 64. 70.  
*Coccinella* 567. 587.  
*Coccothraustes* 300.  
*Cochlea* 1081. 1162.  
 1196. 1241.  
*Cocos* 237.  
*Cocujas* 651.  
*Collurio* 135.  
*Colubri* 192.  
*Colius* 134.  
*Colum* 1088.  
*Columba* 211.  
*Colomellus* 1272.  
*Concha* 1115. 1155.  
 1175.  
*Conchylium* 1211.  
*Conger* 121.  
*Conus* 1212.  
*Coprotheres* 226.  
*Cor bovis* 1122. 1133.  
 veneris 1121.  
*Coracias* 158.  
*Coracinus* 474.  
*Corallina* 1291. 1307.  
*Corallium* 1271. 1275.  
 1282. 1285.  
*Coralloides* 1291.  
*Coregonus* 512.  
*Coretta* 493.  
*Coridon* 774.  
*Corlien* 245.  
*Corlis* 243.  
*Cornix* 155. 159.  
*Cornuta* 1208.  
*Corona* 1165. 1196.  
*Corregonoides* 513.  
*Corvus* 324. 153. 164.  
*Cotinga* 298.  
*Coturnix* 277. 278.  
*Cottus* 423. 434.  
 453. 491.  
*Cuzcuzquimbli* 122.  
*Crabro* 920.  
*Cratium* 1155.  
*Crax* 270.  
*Crex* 245.  
*Crotalophorus* 372.  
*Cryptocephalus* 597.  
*Cuanda* 76.  
*Cucujus* 660. 703.  
 659.  
*Cugapuguscu* 486.  
*Cuniculus* 78.  
*Cunur* 121.  
*Cupressus* 1290.  
*Curculio* 604. 621.  
*Curruca* 326. 329.  
 330. 332. 334.  
*Currucis* 328.  
*Cyanecula* 336.  
*Cyclogaster* 415.  
*Cygnus cucullatus*  
 867.  
*Cylinder* 1188.  
*Cymbium* 1161. 1258.  
*Cynædus* 468. 471.  
*Cynchramus* 309.  
*Cynoecephalus* 36.  
*Cynops* 984.  
**D**  
*Dactylus* 1156.  
*Damier* 213.  
*Dendrofalco* 127.  
*Dentalium* 1267.  
*Denticulus* 1263.  
*Dermostes* 568. 591.  
 609.  
*Dialbird* 165.  
*Diodon* 411. 414.  
*Diomedea* 217. 213.  
*Dipsacus* 1203.  
*Distorsio* 1218.  
*Doda* 267.  
*Doris* 1082.  
*Dorado* 447.  
*Dracunculus* 1075.  
*Dromæ* 267.  
*Druinus* 376.  
*Dytiscus* 567.  
**E**  
*Echinometra* 1103.  
*Egretta* 137.  
*Elan* 96.  
*Emberiza* 163. 316.  
*Empis* 1004.  
*Emen* 265.  
*Entomon* 1061.  
*Epipetrum* 1294.  
*Equus marinus* 413.  
*Erax* 1007.  
*Eriocercis* 600. 603.  
*Eruca* 1084. 1225.  
*Etchara* 1284. 1286.  
 1300.  
*Exocætes* 433.  
**F**  
*Faber* 463.  
*Faunus* 772.  
*Fedoa* 246. 255.  
*Felis* 45. 60.  
*Ficedula* 293. 326.  
 329. 341.  
*Ficus* 1295.  
*Fimbriata* 1200.  
*Fisk-symphen* 452.  
*Flabella* 1293.  
*Flabellum* 1296.  
*Flustra* 1302.  
*Folium* 706. 1117. 1137.  
*Forbicina* 1012.  
*Francolins* 275.  
*Fratereula* 211.  
*Frigata* 216.  
*Fringilla* 163. 302.  
 313. 314.  
*Fron dipora* 1284.  
*Fucoides* 1312.  
 Fucus

# SYNONYMA.

- Fucus** 1294. 1295.  
 1300.  
**Fulica** 250.  
**Fuligula** 196.  
**Fungites** 1272.  
**Fungus** 1294.  
**Fur** 222 165.  
**Fufus** 1221.f  
**G**  
**Gaayara** 690.  
**Gacaperuca** 403.  
**Galbula** 160.  
**Galericula** 587.  
**Galera** 67.  
**Galeus** 397. 401.  
**Gallina** 243. 1155.  
**Gallinula** 245. 250.  
 260. 262. 345.  
**Galgulus** 159. 160.  
**Gallus** ferus 338.  
 grunniens 457  
**Garrulus** 156. 157.  
**Garzetta** 237.  
**Gasteroplectus** 524.  
**Gavia** 224. 225.  
**Gelgorfla** 309.  
**Genesefche toot** 1168.  
**Gerbo** 85.  
**Giraffa** 92.  
**Glareana** 288.  
**Glareola** 252. 345.  
**Glaucion** 202.  
**Glaucius** 198.  
**Glis** 47. 83.  
**Glottis** 245.  
**Godwell** 247.  
**Gorfugel** 210.  
**Gorgonia** 1289.  
**Graculus** 156.  
**Grus** 233.  
**Gryllus** 690.  
**Guacuc-cupa** 403.  
**Guainumbi** 90. 191.  
 192. 193.  
**Gnapizotl.** 103.  
**Guara** 242. 493.  
**Guaracopema** 449.  
**Guariba** 37.  
**Guata-cupa** 479.  
**Guerucu** 708.  
**Guillemot** 220.  
**Guinetta.** 251.  
**Guinpuaguara** 385.  
**Guiracareba** 188.  
**Guira-quacu-beraba.**  
 336.  
**Guiraguainumbi** 152.  
**Guira-jenoia** 316.  
**Guira tangeima** 161.  
**Guiratirica** 301.  
**Gurnardus** 433.  
**Gymnogaster** 429.  
**Gypium** 1282.  
**H**  
**Halietus** 129.  
**Hamster** 82.  
**Harengus** 519.  
**Harpago** 1207.  
**Hauftellum** 1214.  
**Hector** 1216.  
**Hemerobius** 909. 914.  
 916.  
**Hericus** 1219.  
**Heros** 629.  
**Himantopus** 255.  
**Hippopotamus** 49.  
**Hircus bezoarticus** 96.  
 ferus 95.  
 laniger 98.  
**Hirundo** 346.  
**Hoitzlacmatzin** 76.  
**Hortulanus** 308. 312.  
**Hydra** 1096. 1303.  
 1317.  
**Hydrocantharis** 665.  
**Hydrocorax** 153.  
**Hydrophilus** 664.  
**Hystrix** 75. 1214.  
**J**  
**Jabiru-guacu** 232.  
**Jacana** 259.  
**Jacapa** 314.  
**Jacarini** 314.  
**Jacupema** 269.  
**Jaguara** 61.  
**Jambos** 1182.  
**Japuruca** 1063.  
**Jataronnis** 1139.  
**Ibis** 241.  
**Icterus** 161. 165. 290.  
 329.  
**Ierbua** 85.  
**Ipecu** 173.  
**Isatis** 59.  
**Isis** 1317.  
**Ispida** 178.  
**Junco** 296. 312.  
**Jupujuba** 161.  
**Jurucuja** 351.  
**K**  
**Kakurlacko** 33.  
**Katrakas - Katrakas**  
 271.  
**Kerathophytum** 1296.  
**Kernell** 203.  
**Kinmodsius** 206.  
**Kroonhoorn** 1165.  
**Krot** 257.  
**L**  
**Labrus** 464. 465.  
 488.  
**Lacerta** 53. 358.  
**Lacertus** 52. 362.  
 363. 369.  
**Lagopus** 274. 275.  
**Lampetra** 502. 1080.  
**Lanius bengal.** 165.  
 carbo 314.  
 garrulus 297.  
 minimus 342.  
**Lapboorn** 1209.  
**Lapillus** 1205.  
**Lapwing** 256.  
**Lario** 604.  
**Larus** 227. 249.  
 Latina

# SYNONYMA.

**Latina** 1196.  
**Laurus** 213.  
**Leerwisch** 530.  
**Lens** 1272.  
**Lepas** 741.  
**Lepra** 1075.  
**Lepturus** 219.  
**Lepus** 80. 1082. 1089.  
**Lerneæ** 1082.  
**Leucoradiæ** 237.  
**Libelluloides** 914.  
**Lichen** 1306.  
**Lignum** 1194.  
**Ligula** 1078.  
**Limax** 1077. 1083.  
     1106.  
**Limosa fusca** 243.  
**Linaria** 315. 322.  
**Literata** 1128.  
**Lithodendrum** 1279.  
     1282. 1299.  
**Lithophyton** 1287.  
**Lithoxylon** 1288.  
     1290.  
**Littera** 1188.  
**Lividus** 1062.  
**Locusta** 695.  
**Loligo** 1095.  
**Lomæia** 220.  
**Lucerna** 1243.  
**Lucioletta** 1085.  
**Lumbricus** 1327.  
**Lumme** 220.  
**Lunda** 211.  
**Lupus marinus** 58.  
**Luscineola** 329.  
**Lynx** 61.  
**Lyra** 433.  
**Lyfing** 439.  
**Macucagna** 264.  
**Madrepora** 1270.  
     1282. 1288. 1303.  
     1312.  
**Maja** 301.

**Mal** 501.  
**Male** 1189.  
**Malle mucks** 213.  
**Malum** 1294.  
**Manacus** 330. 334.  
**Manchette de neptu-**  
     **ne** 1284.  
**Man of war** 216.  
**Mantis** 600. 692.  
**Manucodiata** 166.  
**Manucordiata** 225.  
**Manus** 1294.  
**Mapael** 70.  
**Maracana** 140.  
**Marocoani** 1041.  
**Marita caca** 71.  
**Martuitæ** 253.  
**Maucanco** 45.  
**Maymania** 329.  
**Mea** 1046.  
**Mellisuga** 190.  
**Mellivora** 189.  
**Melolontha** 598.  
**Merganser** 200.  
**Mergus** 209.  
**Merle** 208.  
**Merops** 165.  
**Merula** 138. 162.  
     164. 177. 189. 292.  
     313. 314.  
**Miliaria** 308. 309.  
**Millepoda** 1086.  
**Millepora** 1271. 1278.  
     1286. 1300.  
**Milvus** 130.  
**Mirabilis** 1054.  
**Mitella** 1083. 1257.  
**Mitra** 1212. 1233.  
**Mitæ** 296. 270.  
**Mockin-bird** 293.  
**Monedula** 156. 165.  
**Monoceros** 405.  
**Montanellus** 332.  
**Mordella** 594. 660.  
     674.

**Moreca** 199.  
**Morinellus** 248. 299.  
**Morio** 777.  
**Morum** 1202.  
**Morphnos** 129. 130.  
**Mors** 49.  
**Mortex** 210.  
**Moscheutus** 131.  
**Motacilla** 320.  
**Motmot** 271.  
**Monciu** 1091.  
**Moylen** 269.  
**Mudferse** 500.  
**Murex** 1184. 1191.  
     1207. 1210.  
**Murvijs** 1075.  
**Mus aquaticus** 79.  
     araneus 74.  
     indicus 70.  
**Musca** 641. 723. 911.  
**Muscicapa** 137. 314.  
     333.  
**Muscipeta** 332.  
**Musculus** 1158.  
**Muscus** 1285. 1300.  
     1308. 1322.  
**Musica** 1169.  
**Musquetæ** 1002.  
**Mustela** 63. 68. 87.  
     394. 399.  
**Mutellus** 397. 398.  
**Myriophyllum** 1309.  
**Myriozoum** 1283.  
**Myrmecophagus** 52.  
**Mytus** 502.  
**Nasus alberti** 530.  
**Naucoris** 714.  
**Necydalis** 649.  
**Nereis** 1078.  
**Nerita** 1219.  
**Nigella** 1172.  
**Nijen** 108. 131.  
**Noctua** 132. 133.  
**Noturus** 681.

R r r r

Nube-

# SYNONYMA.

Nubecula 1172.  
Nucifraga 157.  
Numenius 241. 243.  
246.

Nux 1181.

**O**dobenus 49.  
Oenanthe 326. 331.  
Ocrophus 250.  
Olivaris 1236.  
Oniscus 1062.  
Ophidion 445.  
Opoffum 71.  
Oranien admiral 1170.  
Oriolus 161.  
Ortygometra 261.  
Oryzivora 302.  
Or 1219. 1234.  
Oscabron 1106.  
Osmerus 511.  
Ostracion 406. 411.  
412.

Ostrea 1138.  
Ostreum 1140. 1151.  
1155.

Ovis 91.

**P**aca 81.  
Pagurus 1048.  
Pallium 1145.  
Palma 1288. 1294.  
Palmiuncus 1290.  
Palumbus 283.  
Pannus 1171.  
Pappagallo 146.  
Papyrus 1194.  
Paradisea 163.  
Parus 187. 298. 314.  
322. 339.  
Passer 191. 277. 302.  
308. 314. 319. 329.  
333. 458.  
Passerculus 319.  
Patella 1106. 1151.  
1256.

Pecten 1144.  
Pediculus 734. 740.  
1015. 1028. 1059.  
1093.

Peintade 273.  
Pelicanus 240.  
Pelon ichiati 91.  
Peltis 571.  
Pendulinus 342. 343.  
Penguin 210. 214.  
219.

Penicillus 1267.  
Penna 1294. 1322.  
Pennatula 1294. 1317.  
1322.

Perca 453. 472. 473.  
475. 491.  
Perdix 276. 277. 281.  
Perrocello 142.

Peterel 212.  
Petimbuaba 515.  
Petrocosyphos 294.  
Petronia 322.

Phacopus 243.  
Palaris 258.  
Phalaena 797.  
Phalaropus 249.

Phalacrocorax 216.  
Phascas 203.  
Phasianus 268.  
Philander 71. 72.

Philodetus 52. 53.  
Phoenicurus 335. 336.  
Pholas 1156.  
Phycis 437.

Physalis 1084.  
Piabucu 511.  
Pica 135. 156. 324.  
Picea 738.

Picus 161. 185.  
Pied-chaffinch 308.  
Pileus 1273.  
Piloti 490.  
Pimpeltes 1219.

Pinara 441.  
Pinnotheres 1039.  
Pinuum dasypus 61.  
Piquetinga 517.  
Pira-aca 405.  
Piscis aureus 527.  
Pitangua guacu 137.  
Placenta 1139.  
Planorbis 1245.  
Planta 1280. 1289.  
Platyceros 561.  
Plautus 211.  
Plecostomus 506.  
Pluvialis 245. 252.  
254.

Polcat 64.  
Poliquiquixi 1859.  
Polygonum 741.  
Polymeda 768.

Polypus 1095. 1319.  
1320.  
Polytmus 189. 190.  
Pompador 298.

Porcellana 1173. 1176.  
Porcellio 1181.  
Porcus 75. 77.  
Porphyrio 241. 259.

Porus 1278. 1286.  
1300.  
Praticola 345.  
Priapus 1038.

Pricka 394.  
Princeps 788.  
Principissa 786.  
Pristis 401.

Prunella 329.  
Pryck 394.  
Pseudo - architalassus  
1167.

Psylla 738.  
Pterophoenicus 161.  
Pterophorus 899.  
Pudendum regale  
1084.

Puffinus 211. 213. 214.  
Pugi-



# SYNONYMA.

Pugilis 1209.  
Pulex 567. 1013.  
Pulmo 1295.  
Pungitius 492.  
Purpura 1214.  
Pynogonum 1028.  
Pygarpus 128.  
Pyrrhocorax 158.  
Pyrrhula 302. 306.

**Q**uadringenta lin-  
gux 294.  
Quadrupes vol. 88.  
Quan 269.  
Quatomie 173.  
Quauhzonecolin 277.  
Queice 1075. 1292.  
Querquedula 203.  
Querquera 199.  
Quici 627.  
Quickbatch 71.

**R**abiborcado 216.  
Racoon 70.  
Radius 1182.  
Radula 1145.  
Ranatra 705.  
Rangifer 93.  
Rallus italorum 257.  
lariformis 228.  
Raphus 267.  
Rattus moscharus 79.  
Regulus 337. 338.  
Remies 1116.  
Remiz 343.  
Retepora 1284.  
Refeda 1289.  
Rete 1296.  
Reticulum 1284.  
Rex vulturum 122.  
Rhomboida 454.  
Rhodopus 250.  
Rading 510.  
Rosmarus 49.  
Rostrum 1115.

Rotie 212.  
Rubecula 336. 337.  
Rubeta 354.  
Rubetra 335. 337.  
Rubicilla 300. 316.  
Ruticilla 326. 336.  
Rutilus 530.

**S**alamandra 360.  
365. 370. 371.  
Salpa 470.  
Sanderling 252.  
Sarcelle 203.  
Satyrus 771.  
Saularis 165.  
Saurus 490. 513.  
Scalare wenteltrap  
1237.  
Scarabæus 562. 567.  
569. 575. 580. 589.  
608. 621. 628. 638.  
648. 651. 661. 665.  
669. 683. 686.  
Scheniscus 214.  
Schoenicios 251.  
Schraitser 488.  
Sciaena 468. 487.  
Scineus 372. 371.  
Sciucus 85.  
Scolopax 243.  
Scolopendra 1065.  
1085.  
Scomber 489. 490.  
Scops 132.  
Scorpio 764. 915.  
1029.  
Senegallus 303.  
Senembi 366.  
Seps 370.  
Serpula 1265. 1268.  
Serra marina 401.  
Sertularia 1287. 1303.  
Seta 1075.  
Sicus 1006.  
Silfverfisk 519.

Silpha 678.  
Silurus 440.  
Skya boyeri 226.  
Sloth 50.  
Soco 239.  
Sokuse 1088.  
Soland 217.  
Solarium 1228.  
Solea 459.  
Solen 1266.  
Solenostomus 515.  
Solita 1176.  
Solum 1323.  
Sorciere 1228.  
Sorex 84.  
Souris 1175.  
Sparus 466. 476.  
487.  
Spinus 322.  
Spipola 287. 288.  
Spongia 1294.  
Sqvato-raja 397.  
Staparola 328.  
Stella 1099.  
Stenoconus 630. 639.  
Sterna 214.  
Stomoxoides 1006.  
Stoparola 330. 332.  
Stratiomys 980.  
Strau zendt 207.  
Strelet 405.  
Strepsiceras 96.  
Strix cinerea.  
Strombus 1205. 1226.  
Struthio 267.  
Sturnus 160.  
Subbuteo 126.  
Sula 217.  
Sylvia 335.  
Syrinx 1078.

**T**acob 240.  
Taenia 1321.  
Taisle 220.  
Tamandua 51. 52.  
Tama-

# SYNONYMA.

*Tamaru-guncu* 1054.  
*Tamatja* 233.  
*Tangera* 34. 315.  
*Tanglake* 443.  
*Tapera* 345.  
*Tarantula* 1029. 1035.  
*Tardigradus* 50.  
*Taton* 53. 54.  
*Tauroceros* 543.  
*Taurus* 99. 560.  
*Taxus* 58. 64. 70.  
*Tellina* 1109.  
*Tentredo* 917.  
*Teperotl.* 269.  
*Terebellum* 1170.  
*Teredo* 1269.  
*Tethya* 1295.  
*Tethys* 1082. 1088.  
*Tetragonopterus* 513.  
*Tetrax* 289.  
*Textile* 1172.  
*The godwallor* gray  
 201.  
*The sterit* 252.  
*Thiara* 1194.  
*Thoracium* 1178.  
*Thynnus* 493.  
*Tigris* 61. 1168.  
*Timicu* 517.  
*Tipula* 732.  
*Tlaquazin* 71. 72.  
*Todtenfoge* 332.  
*Tomineio* 191.  
*Torculum* 1239.  
*Totanus* 245. 248.  
*Tomahotoll.* 315.  
*Toverfisch* 453.  
*Trachinus* 449.  
*Trachurus* 493.  
*Tribulus* 1214.  
*Trigla* 495.  
*Trochilus* c. b. f. 186.  
 337.

*Trompette* 264.  
*Truen* 226.  
*Trutta* 511.  
*Tubipora* 1265. 1268.  
 1286.  
*Tubularia* 1265. 1269.  
 1270. 1302.  
*Tubus* 1267.  
*Tucan* 250.  
*Tui-apute-juba* 142.  
*Funga* 1021.  
*Turbo* 1194. 1208.  
*Turdus* 160. 164. 249.  
 406. 472. 474. 507.  
*Turricula* 1192.  
*Turris* 1219.  
*Turtur* 281.  
*Tye piranga* 314.  
*Tye guacu* 339.  
*Tzintzean* 167.

**U**  
*bor* 1252.  
*Uca una* 1081.  
*Ulka* 452.  
*Uluca* 133.  
*Umbella* 1145.  
*Umbilicata* 1229.  
*Unicornu marinum.*  
 105.  
*Unique* 1222. 1246.  
*Upupa* 159.  
*Uranoscopus* 433.  
*Urataurana* 121.  
*Uria* 211. 220.  
*Urogallus* 274.  
*Urtica* 1088. 1090.  
 1098.  
*Uruba* 122.

**V**  
*acca villosa* 99.  
*Vagellus* 213.  
*Vallvoy* 49.  
*Vanellus* 252. 259.

*Variolæ* 1181.  
*Vaxbill* 303.  
*Vegflecklin* 336.  
*Velum* 1098.  
*Vena* 1075.  
*Vermis* 371. 679. 1078.  
 1084. 1323.  
*Verruca* 1108.  
*Verrucosa* 1195.  
*Vespa* 945.  
*Vespertilio* 45.  
*Vespertum* 1295.  
*Vidua* 312. 313.  
*Vitellus* 1252.  
*Vitiflora* 331.  
*Vitulus* 1075.  
*Viverra* 68.  
*Voluta* 1229. 1166.  
 1168.  
*Volvata* 1252. 1255.  
*Wood-cak* 243.  
*Vulpanser* 195.  
*Vulpi affinis* 70.  
*Vultur marinus* 216.  
*Vydenguckerlin* 336.

**X**  
*xanthornus* 161.  
*Xiphosura* 1057.  
*Xochiatolt.* 162.  
*Xolitzcuimtl.* 60.

**Y**  
*llowtaill* 495.  
*Yvana* 366.  
*Tzquauhtli* 121.  
*Tzquiepatl.* 65.

**Z**  
*Zanthurnus* 471.  
*Zeus* 452.  
*Zivolo* 309.  
*Zonnehoorn* 1229.  
*Zoopterygius* 1094.

TER.

# TERMINI ARTIS.

**A**canthopterygius 44.  
 Accipitres 115. 121.  
 Abdominales 422.  
 499.  
 Abomasus 91.  
 Aculeus 21.  
 Adiposa pinn. 420.  
 Aer 11.  
 Affectus 17.  
 Albumen 15.  
 Alepidotus 420.  
 Ala 110.  
 Aluta 111.  
 Alimentum 16.  
 Amphibia 19. 347.  
 Anfractus 1070.  
 Animata 16.  
 Animal 15.  
 Antenna 533.  
 Anus 1070.  
 Anseres 115. 194.  
 Apertura 1070.  
 Apodes 422. 425.  
 Aptera 356. 1012.  
 Aqua 11.  
 Arma 22. 112.  
 Armilla 111.  
 Attaci 808.  
 Aves 19. 109.  
 Aurata 845.  
 Auris 16.  
 Auricula 22.  
 Authores  
     *Zoologi* 23.  
     *Ornithologi* 113.  
     *Ichthyologi* 421.  
     *Entomologi* 535.  
     *Vermium* 1070.  
     *Amphibiologi* 348.

**B**arba 21.  
 Belluz 24. 100.

Bombyces 812.  
 Branchiæ 409.  
 Branchiostega 420.  
 Brachia 111.  
 Bruta 24. 48.  
**C**ardo 1070.  
 Calcar 111.  
 Callus 21.  
 Capistrum 109. 110.  
 Caruncula 110.  
 Cataphractum 419.  
 Catetoplateum 419.  
 Cauda 22.  
 Cera 110.  
 Cete 24. 105.  
 Chela 534.  
 Chondopteryg 348.  
 Cirrus 419.  
 Classis 13.  
 Cochlea 1070.  
 Concha 1070.  
 Coleoptera 541.  
 Columella 1070.  
 Compedes 111.  
 Composita 1070. 1071.  
 Cornu 22.  
 Cor 19.  
 Corpus 16.  
 Corallium 1070.  
 Crissum 110.  
 Crista.  
 Cursorius 111.

**E**lementa 11.  
 Elytrum 534.  
 Equites 744.

**F**acultates 16.  
 Fenestrata 809.  
 Feræ 24. 55.  
 Festivæ 842.  
 Fissipes 111.  
 Fulcrum 21.

**G**audium 17.  
 Gallinæ 116.  
 Geniale 16.  
 Geometra 858.  
 Generatio 15.  
 Genus 13.  
 Glires 24. 76.  
 Grallæ 115. 230.  
 Gressorius 111.

**H**alter 534.  
 Heliconii 754.  
 Hemelytra 534.  
 Hemiptera 687.  
 Historia av. 113.  
 Homo 12.  
 Hymen 1070.  
 Hymenoptera 917.

**I**gnis 11.  
 Imago 534.  
 Impennis 110.  
 Intestina 1069. 1075.  
 Insecta 20. 533.  
 Interanea 15.  
 Ira 17.  
 Jugulares 422. 433.

**L**abrum 1070.  
 Laniarius 22.  
 Lapis 11.  
 Larva 534.  
 Lepidoptera 744.  
 Linea later. 420.  
 Lithophytum 1070.  
 Lingua 16. 23.  
 Limbus 1070.  
 Lobatus 111.  
 Lorum 109.

**M**acroura 111.  
 Moeror 17.  
 Malocopterygius 421.

Mammæ

# TERMINI ARTIS.

**Mammæ** 23.  
**Mammalia** 19. 21.  
**Manus** 21.  
**Mandibula** 110.  
**Metamorphosis** 534.  
**Methodus** 13.  
**Metus** 17.  
**Migrationes** 112.  
**Molares** 22.  
**Mollusca** 1069. 1080.  
**Monogama** 23. 112.  
**Mucro** 1070.  
**Mutica** 22. 111.  
**Myrax** 110.  
**Nantes** 349. 394.  
**Nates** 1070.  
**Natus** 16. 22.  
**Natatorius** 111.  
**Natura quid** 11.  
     *Scientia* 13.  
     *Regna* 12.  
     *Oeconomia* 18.  
     *Politia* 17.  
     *Respublica* 17.  
     *Operationes* 18.  
     *Vivarium* 20.  
     *Ministri* 17.  
     *Inquisitores* 18.  
**Naturalia** 11.  
**Neutrum** 534.  
**Neuroptera** 901.  
**Nictitans** 22. 110.  
**Nobiles** 783. 819.  
     **Noctiluæ** 643. 651.  
         703.  
**Noctua** 833.  
**Nympha** 1070.  
**Nymphales** 769.  
**Oculus** 46. 22.  
     **Ocellus** 534.  
**Omasus** 91.  
**Operculum** 419. 1070.  
**Orbita** 110.  
**Ordo** 13.  
**Organa** 16.

**Ovum** 15.  
**Paginæ** 534.  
     **Paganæ** 852.  
**Palpus** 533.  
**Palma** 21.  
**Palmatus.**  
**Passeris** 115. 279.  
**Paxwax** 48.  
**Pecora** 24. 90.  
**Penna** 109.  
**Pes** 21.  
**Phosporei** 1069.  
**Pilus** 21.  
**Pises** 419. 20.  
**Pinnatus** 111.  
**Picæ** 115. 139.  
**Plagioplatei** 419.  
**Plebeji** 787.  
**Planta** 21.  
**Pluma** 109.  
**Polygama** 23. 112.  
**Primates** 24. 28.  
**Primores** 22.  
**Proboscis** 22.  
**Pupa** 534.  
**Pubes** 1071.  
**Punctum** fal. 15.  
**Pyralides** 881.  
**Quisquiliæ** 1070.  
**Rachis** 109.  
**Radius** 421.  
**Recumbens** 420.  
**Rectrix** 109. 111.  
**Remex** 109. 111.  
**Reptilia** 347. 350.  
**Reticulum** 91.  
**Reversus** 534.  
**Rostrum** 110.  
**Rumeu** 91.  
**Rusticæ** 852.  
**Scanforius** 111.  
**Scutum** 21.  
**Scutellum** 348.  
**Semipalmatus** 111.

**Senecta** 347.  
**Sensus** 22.  
**Serpentes** 347. 372.  
**Species** 13.  
**Speculum** al. 110.  
**Spira** 1070.  
**Spiraculum** 533.  
**Spina** 110.  
**Squama** 21. 420.  
**Stemina** 533.  
**Stigma** 534.  
**Sutura** 21. 1070.  
**Succenturiatæ** 21.  
**Syltema** 13.  
**Tactus** 16.  
     **Tædrix** 110.  
**Telum** 347.  
**Tellus** 11.  
**Terra** 12.  
**Testa** 350.  
**Thoracici** 422. 445.  
**Tinæ** 883.  
**Tortrices** 875.  
**Vadantes** 111.  
     **Varietas** 13.  
**Varix** 1070.  
**Vegetabile** 11.  
**Vermes** 20. 23.  
**Verruca** 21.  
**Vesica** aer. 420.  
**Venus** 23.  
**Vestitus** 21.  
**Vibrissæ** 21. 110.  
**Vita** 15.  
**Viventia** 15.  
**Vitellus** 15.  
**Vulva** 1070.  
**Umbilicus** 1070.  
**Umbo** 1070.  
**Unguis** 21.  
**Ungula** 21.  
**Uropygium** 111.  
**Zoophyta** 1070.

APPEN.

# APPENDIX SYNONYMORUM.

Absoluto hoc opere duo præstantiores accessere Entomologi, quibus aliquot Synonyma eligere juvat; videlicet:

SEBÆ *Musei tomus quartus*, Exotisorum præprimis Papilionum collectione stupenda, Figuris bonis, Descriptionibus inanibus.

SCHÆFFERI *Iconum Insectorum Ratisbonensium* s. Europæorum varii generis Species, Tabulis centum, Figuris plurimis accuratis, vivisque coloribus vestitis, absque descriptione.

Litteris mediocribus *Schæfferi*, minutioribus *Sebæ* Figuræ allegatæ sunt.

## SCARABÆUS.

*Aëon* XC: 3, 4. XCI: 3.

Typhæus XXVI: 4.

bilobus LXIII: 2, 3.

Taurus LXIII: 4.

Schæfferi III: 8.

Schreberi LXXIII: 6.

nuchicornis LXXIII: 2-5.

fimetarius XXVI: 9.

stercorarius XXIII: 9.

conspurcatus XXVI: 8.

agricola LXIII: 1.

Eremita XXVI: 1.

Horticola XXIII: 4.

Melolontha XCIII: 1, 2.

solstitialis XCIII: 3.

Fullo XXIII: 2.

fasciatus I: 4.

auratus XXVI: 3-7; L: 8, 9.

## LUCANUS.

parallelip. LXIII: 7.

caraboides VI: 8; LXXV: 7?

## DERMESTES.

lardarius XLII: 3.

Pellio XLII: 4.

murinus XLII: 1, 2.

## HISTER.

pygmæus XLII: 10.

4-maculatus III: 9.

## SILPHA.

Vespillo IX: 4.

atrata XCIII: 5; LXXV: 5?

thoracica LXXV: 4.

opaca XCIII: 6.

ferruginea XL: 7.

grossa LXXV: 3.

## CASSIDA.

viridis XXVII: 5.

nebulosa XXVII: 4.

nobilis XCVI: 6.

## COCCIONELLA.

bipunctata IX: 9.

5-punctata IX: 8.

7-punctata IX: 7.

13-punctata XLVIII: 6?

14-punctata LXII: 6.

ocellata I: 2.

14-guttata IX: 11.

18-guttata IX: 12.

oblongogutt. IX: 10.

4-pustulata XXX: 16, 17.

6-pustulata XXX: 12.

14-pustulata XXX: 10.

tigerina XXX: 9.

## CHRYSOMELA.

cerealis I: 7.

campestris LII: 9, 10.

Graminis XXI: 9?

Polygoni LI: 5.

polita LV: 9.

Populi XLVII: 4, 5.

10-punctata XXI: 13.

lapponica XLIV: 2.

Boleti LXXVII: 6.

collaris LII: 11, 12.

sanguinolenta XXI: 15.

niridula LXXXVII: 5.

tridentata LXXVII: 5.

# APPENDIX SYNONYMORUM.

- 4-punctata VI: 1. 3.  
 morai XXX: 5.  
 6-punctata XXX: 1. 3.  
 10-maculata LXXXVI: 7.  
 12-punctata IV: 5.  
 4-maculata XXXVI: 14.
- CURCULIO.**  
*Palmarum* XCV: 1. 3.  
*depressus* XCV: 4.  
*Alliarum* VI: 4.  
*Pini* XXV: 7.  
*Abietis* XXV: 1.  
*paraplecticus* XLIV: 1.  
*germanus* XXV: 2.  
*Bacchus* XXXVII: 3?  
*viridis* LIII: 6.  
*Nucum* L: 4.  
*Ligustici* II: 12.  
*nebulosus* XXV: 3.
- ATTELABUS.**  
*Avellanae* LVI: 5. 6.  
*curculioides* LXXV: 8.  
*Apiarius* XLVIII: 11.  
*mollis* LX: 2.
- CERAMBYX.**  
*longimanus* XC: 7-9.  
*barbicornis* LXXXIII: 3.  
*kahleri* LXXXII: 11.  
*köhleri* I: 1.  
*meridianus* III: 13. LXXIX: 7.  
*ebulinus* IV: 12.  
*scalaris* XXXVIII: 5.  
*testaceus* LXIV: 6.  
*femoratus* LV: 7.  
*Faber* LXXII: 3.  
*Coriarius* IX: 1. LXVII: 3.  
*hispidus* XIV: 9.  
*moschatus* XI: 7.  
*edilis* XIV: 7.  
*Textor* X: 1.  
*Inquisitor* II: 10; VIII: 2, 3;  
 LXXXIII: 3.  
*eucharis* XXXVIII: 4.  
*Populneus* XLVIII: 5.
- rusticus* LXIV: 5.  
*curculioides* XXXIX: 1.  
*sanguineus* LXIV: 7.  
*undatus* LXVIII: 1.
- NECYDALIS.**  
*major* X: 10, 11.  
*minor* XCV: 5.  
*umbellator.* XCV: 4.  
*clavipes* LXXXV: 7?  
*glauca* XCIV: 6.  
*caerulea* XCIV: 7.  
*rufa* XCIV: 8.
- LEPTURA.**  
*melanura* XXXIX: 4.  
*sanguinolenta* XXXIX:  
*testacea* XXXIX: 3.  
*rubra* XXXIX: 2.  
*sericea* LXXXIV: 1.  
*4-maculata* I: 7.  
*4-fasciata*  
*attenuata* LXV: 11; XXXIX: 6.  
*nigra* XXXIX: 7.  
*virginea* LVIII: 8.  
*collaris* LVIII: 9.  
*mystica* II: 9.  
*detrita* LXIV: 3; XXXVIII: 9.  
*arictis* XXXVIII: 7.  
*arcuata* XXXVIII: 6.
- LAMPYRIS.**  
*sanguinea* XXIV: 1.  
*coccinea* XC: 4.
- CANTHARIS.**  
*fusca* XVI: 9-12.  
*ænea* XIX: 12, 13.  
*bipustulata* XIX: 14.  
*testacea* LII: 8.  
*navalis* LIX: 1.  
*melanura* XVI: 14.
- ELATER.**  
*ruficollis* XXX: 3.  
*castaneus* XXXI: 42; XI: 9.  
*livens* XI: 8.  
*ferrugineus* XIX: 1.  
*sanguineus* XXXI: 5.  
*murinus* IV: 6.

tesel-

# APPENDIX SYNONYMORUM.

*tessellatus* IV: 7.  
*pectinicornis* II: 5.  
*nebulosus* XLV: 5.  
**CICINDELA.**  
*campetris* XXXIV: 8, 9.  
*hybrida* XXXV: 10.  
*riparia* LXXXVI: 4.  
**BUPRESTIS.**  
*gigantea* LXXXIV: 1, 2.  
*fascicularis* XCV: 19.  
*æruuginosa* XXXV: 7.  
*aurulenta* XXXV: 6.  
*8-guttata* XXXI: 1.  
*mariana* XLIX: 1.  
*rustica* II: 1.  
*nitidula* L: 7.  
**DYTISCUS.**  
*piceus* XXXIII: 1, 2.  
*fuscipes* VIII: 10.  
*cinereus* XC: 7.  
*semistriatus* VIII: 7, 8.  
*fulcatus* III: 3.  
**CARABUS.**  
*germanus* XXXI: 13.  
*coriaceus* XXXVI: 1.  
*granulatus* XVIII: 6.  
*leucophthal.* XVIII: 1?  
*auratus* LI: 1.  
*violaceus* LXXXVIII: 1;  
 III: 1.  
*cephalotes* X: 1.  
*inquisitor* XI: 2?  
*syncophanta* LXVI: 6.  
*crepitans* X: 13.  
*cyanoccephal.* X: 14.  
*vulgaris* XVIII: 2.  
*cærulescens* XVIII: 3, 4.  
*piceus* XVIII: 9.  
*crux major* I: 13.  
*crux minor* XVIII: 8; XLI: 13  
**TENEBRIO.**  
*Molitor* LXVI: 1.  
*mortifagus* XXXVII: 6;  
 LX: 13.

**MELOE.**  
*proscarabæus* III: 5.  
*majalis* III: 6.  
*vesicatorius* XLVII: 1.  
*Schæfferi* LIII: 8, 9.  
**STAPHYLINUS.**  
*hirtus* XXXVI: 6.  
*murinus* IV: 11.  
*maxillofus* XX: 1.  
*erythropt.* XXXV: 9? II: 2?  
*politus* XXXIX: 12.  
*rufus* XXXV: 3.  
*riparius* LXXI: 3.

**BLATTA.**  
*gigantea* LXXVII: 1, 2.  
*lapponica* LXXXVIII: 2, 3.  
**MANTIS.**  
*gigas* LXXVII: 1, 2.  
*phibifica* LXXVIII: 1-4.  
*gongylodes* LXVIII: 9-12.  
*religiosa* LXVII: 7, 8.  
*percaria* LXVII: 3-6.  
*strumaria* LXIX: 7, 8.

**GRYLLUS.**  
*ocellatus* LXXIII: 7, 8.  
*Gryllotalpa* XXXVII: 1.  
*Verrucivora* LXII: 5.  
*stridulus* XXVII: 10, 11.  
*cærulescens* XXVII: 6, 7.  
*italicus* XXVII: 8, 9.

**FULGORA.**  
*Laternaria* LXXVII: 3, 4.  
**CICADA.**

*orni* EV: 14.  
*aurita* XCVI: 3.  
*cornuta* XCVI: 2.  
**NOTONECTA.**  
*glauca* XXXIII: 5, 6.

**NEPA.**  
*cinerea* XXXIII: 7, 9.  
*cimicoides* XXXIII: 3, 4.  
*linearis* V: 5, 6.

**CIMEX.**  
*maurus* XLIII: 3, 4, 15, 16.  
 R r r r s fulig.

# APPENDIX SYNONYMORUM.

fuliginosus XI: 10-12.  
 corticalis XLI: 6, 7.  
 rufipes LVII: 6, 7.  
 hæmorrhoidal. LVII: 8?  
 baccarum LVII: 1, 2.  
 juniperinus XLVI: 1, 2.  
 morio LVII: 11; LXXXII: 6.  
 cæruleus LI: 4.  
 oleraceus XLVI: 4, 5.  
 ornatus LX: 10.  
 trifasciatus XIII: 8.  
 acuminatus XLII: 11.  
 personatus LXVII: 9;  
 XIII: 6, 7.  
 Hyoscyami XIII: 1.  
 equestris XLVIII: 8.  
 crassicornis XIII: 10.  
 Pini XLII: 12.  
 Rolandri LXXXVII: 7.  
 striatus XIII: 14.  
 lineatus II: 3.  
 gothicus XIII: 5.

## PAPILIO.

*Aceste* XXVII: 1, 2; XXX: 7, 8.  
*Achilles* XXIV: 1, 2.  
*Actæon* XLI: 17, 18.  
*Adippe* LXI: 0.  
*Ægeria* LXV: 1, 2.  
*Æneas* VII: 25, 26; XX:  
 17, 18.  
*Æropus* IX: 3, 4.  
*Agænor* XLVI: 11, 12, 19, 20.  
*Aglaja* LXI: 0.  
*Aglaja* VII: 1, 2.  
*Alimena* XI: 13, 14.  
*Anacardii* XXXV: 13, 14.  
*Anchises* VII: 27, 28; XI: 11, 12.  
*Anthiopa* LXX: 1, 2.  
*Anthilochus* XXX: 1, 2, 5, 6.  
*Anthemon* XXVII: 25, 26.  
 XXX: 3, 4.  
*Apollo* XXXVI: 4, 5.  
*Argus* XXIX: 3, 4.  
*Arion* XCVIII: 5, 6.

*Bolina* XXV: 15, 16.  
*Brassicæ* XL: 3, 4.  
*Calliope* VII: 5, 6; XXIX:  
 17, 18.  
*Cardamine* XCI: 1-3.  
 LXXIX: 2, 3.  
*Cardui* XCVII: 5, 6.  
*Chrysippus* VI: 9-12; XIII:  
 13, 14.  
*Cleopatra* XXVI: 7, 8.  
*Cupido* XXXIII: 5-8.  
*Cythæra* XIII: 11, 12;  
 XXXI: 5, 6.  
*Daphlidice* XXIII: 11, 12, 15,  
 16; LIX: 16, 17.  
*Deiphobus* XLVII: 5, 6.  
*Demoleus* XXXVII: 17, 18;  
 XLIV: 6-9.  
*Demophile* XXVIII: 13, 14.  
*Demophon* XVIII: 2, 3;  
 XXVI: 11-15.  
*Dido* IV: 13, 14; XXVIII:  
 17, 18.  
*Diomedes* XLVII: 11, 12.  
*Dirce* X: 1, 2, 7, 8;  
 XIII: 9, 10.  
*Erato* XXIX: 5, 6.  
*Eubule* XXXVIII: 19, 20.  
*Euippe* XXVI: 1, 2.  
*Eurypylus* XXXV: 15, 16.  
*Euryta* XXIX: 15, 16.  
*Feronia* X: 15, 16.  
*Galathea* XII: 5, 6; XXX:  
 9, 10.  
*Galathea* XCVIII: 7-9.  
*Glaucippe* XLV: 5, 6, 13, 14.  
*Heacabe* XVIII: 4, 5.  
*Hector* XXVIII: 23, 24.  
*Helenus* XLVI: 17, 18?  
*Helcira* XVIII: 8, 9;  
 XXVII: 19, 20.  
*Helena* XLVI: 9-12.  
*Hermione* LXXXII: 1, 2.  
*Hippothoe* XCVII: 7.  
*Horta* XXXIX: 4-9.

*Hyalæ*



# APPENDIX SYNONYMORUM.

*Hyale* LXI: N.  
*Jafius* XLVI: 21, 22?  
*Idas* XCVIII: 3, 4.  
*Idomeneus* XXIV: 7, 8.  
*Jo* XCIV: 1.  
*Iphiclus* XIII: 5, 6; XXX:  
 15, 16.  
*Jurtina* LVIII: 2, 3.  
*Lathonia* I: H.  
*Leda* XLII: 5, 6.  
*Leilus* XXXVI: 1, 2.  
*Leucorhoe* XLV: 1, 2.  
*Lucina* III: b.  
*Lyfippus* XXX: 1, 2.  
*Machaon* XLV: 1, 2.  
*Alachaon* XXXII: 9, 10;  
 LIX: 12, 13.  
*Mera* III: c.  
*Marsyas* V: 9, 10; XXXIV:  
 15, 16.  
*Maturna* III: a.  
*Melite* XVII: 8, 9; XX: 8, 9;  
 XXXV: 5, 6.  
*Melpomene* XIII: 15, 16; XXIX:  
 13, 14.  
*Menelaus* XVII: 13, 14; XVIII:  
 15, 16; XXXI: 1, 2.  
*Memnon* V: 6; XVI: 10, 11.  
*Midamus* XIX: 13, 14.  
*Missippus* VI: 17, 18.  
*Mneme* XXVII: 15, 16.  
*Mnemofyne* XXXIV: 6, 7.  
*Neleus* XXX: 11, 12.  
*Nereus* IX: 21, 22; VI: 21, 22.  
*Obrinus* XXXIX: 10, 11.  
*Oenone* XIV: 15, 16; XXX:  
 17, 18.  
*Oritbya* V: 13, 14.  
*Oropetes* XVI: 1, 2; XLVII: 7, 8.  
*Pammon* XXVII: 21, 22;  
 XLI: 11, 12.  
*Panthous* XLV: 17-20.  
*Paphia* XCVII: 3, 4.  
*Patroclus* XLVII: 13-16.  
*Pheroclus* XXIV: 9-10.

*Philoctetes* IV: 9, 10; XXI:  
 7, 8.  
*Piera* VIII: 9, 10.  
*Pipileis* XLIV: 12, 13, 16, 17-  
 XLVI: 13, 14.  
*Plexippus* VI: 15, 16; XLI:  
 9, 10, 13, 14.  
*Podalirius* XLV: 3, 4.  
*Podalirius* XXXII: 11, 12.  
*Polydamas* XXXIX: 2, 3.  
*Polydorus* XXVIII: 21, 22.  
*Polytbes* XXVII: 23, 24;  
 XLVI: 17, 18.  
*Populi* XL: 8, 9.  
*Populi* XII: 25, 26; XIX:  
 3, 4; XXI: 12, 13.  
*Protesilaus* XXXVI: 11, 12.  
*Pruni* XIV: 1, 2.  
*Pyrrhus* XLVII: 2, 3.  
*Ricini* XXIX: 3, 4.  
*Rubi* XXIX: 5, 6.  
*Sarpedon* XXXVII: 3, 4, 15, 16.  
*Scylla* XXVIII: 19, 20.  
*Semele* II: c.  
*Sennæ* X: 13, 14; XLIV: 1, 2.  
*Sophora* XI: 8, 9; XV: 10, 11.  
*Sinapis* XCVII: 8-11.  
*Talaus* LVII: 18, 19.  
*Tencer* XXXI: 3, 4.  
*Tipha* XIX: 1, 2.  
*Trite* XXIII: 17, 18.  
*Tulbaghia* XIX: 11, 12?  
*Venilia* XVI: 3, 4, 8, 9.  
*Ulysses* XLVI: 9, 10; XLVII:  
 9, 10.  
*Xanthus* XI: 1, 2; XV: 5, 6;  
 XX: 15, 16.

## SPHINX.

*Atropos* XCIX: 1, 2.  
*Convolvuli* XCVIII: 1, 2.  
*Nerii* C: 3, 4.  
*ocellata* XCIX: 5, 6.  
*Populi* C: 6.  
*Tiliæ* C: 1, 2.

Euphor-

# APPENDIX SYNONYMORUM.

- Euphorbia* LXXVIII: 1, 2;  
 XCIX: 3, 4.  
*Elpanor* XCVI: 4, 5.  
*Stellatarum* XVI: 2, 3.  
*fuciformis* XVI: 1.  
*Filipendula* XVI: 6, 7.  
*Ephialtes* LXXI: 1.  
*castra* LXXX: 4, 5.  
**PHALÆNA.**  
*Atlas* LVII: 1, 3; LVIII:  
 6, 10.  
*Hesperus* LVII: 4, 6; LVIII:  
 12, 13.  
*Cecropia* LVIII: 4, 5.  
*Paphia* XXIII: 5, 6.  
*Pavonia* LXXXIX: 2-5.  
*Pavonia* LX: 11, 12; 9, 10,  
 13, 14.  
*Fullonica* XXII: 5, 6; XLII:  
 13, 14.  
*Strix* XXXIX: 12, 14;  
 LVII: 7, 9.  
*Ornatrice* XXXIX: 19, 20.  
*fulvia* XLIII: 27, 28.  
*maura* I: 5, 6.  
*Hebe* XXVIII: 1, 2.  
*Dominula* LXXVII: 3, 4.  
*purpurea* LIX: 4, 5.  
*Hera* XXIX: 1, 2.  
*Tau* LXXXV: 4-6.  
*Pini* LXXXVI: 1-3.  
*lanestris* XXXVIII: 10, 11.  
*Quercus* LXXXVII: 1-3.  
*quercifolia* LXXI: 4, 5.  
*coffus* LXI: 1, 2.  
*bucephala* XXXI: 10, 11.  
*ziczad* LXIX: 2, 3.  
*pedionda* XLIV: 9, 10.  
*dipar* XXVIII: 3-6.  
*Æsculi* XXX: 8, 9.  
*Monacha* LXVIII: 2, 3.  
*Caja* XXIX: 7, 8.  
*grammica* XCII: 2.  
*l. album* XCII: 4?  
*quadra* XXIX: 9, 10.  
*lubricipeda* XXIV: 8, 9.  
*rubicollis* LIX: 8, 9.  
*Jacobæ* XLVII: 2, 3.  
*russula* LXXXIII: 4, 5.  
*parthenias* XCII: 5, 7.  
*Gamma* LXXXIV: 5.  
*Aprilina* XCII: 3.  
*exsoleta* XXIV: 6, 7.  
*leucomelas* LI: 11, 12.  
*flavicornis* XC: 3.  
*Sambucaria* LXIII: 8.  
*macularia* XII: 3.  
*falcataria* LIV: 1, 2.  
*putataria* LXVII: 10, 11.  
*vibicaria* XII: 5.  
*laccertinaria* LXVI: 2, 3.  
*Betularia* LXXXVIII: 5, 4.  
*Atomaria* XVII: 2, 3.  
*Wauvaria* LVIII: 2, 3.  
*purpuraria* XIX: 16.  
*Grossulariata* LXVII: 1, 2.  
*Chenopodiata* LXXVI: 4, 5.  
*plagiata* XII: 1, 2.  
*Sulphuralis* IX: 14, 15.  
*farinalis* XCV: 8, 9.  
*pingualis* LX: 8, 9.  
*forticalis* LI: 8, 9.  
*Petiverella* XLIII: 13.  
*didactyla* XCIII: 7.  


---

**LIBELLULA.**  
*4-maculata* IX: 13.  
*flaveola* IV: 1.  
*rubicunda* XCII: 1.  
*depressa* LII: 1.  
*grandis* LX: 1.  
*junceæ* II: 4?  
*fasciata* LXVIII: 3.  
*dimidiata* LXXXVIII: 7, 8;  
 LXXXVI: 19.  
*umbrata* LXXXVI: 21.  
*capensis* LXXXVI: 17.  
**EPHEMERA.**  
*vulgata* IX: 5.

PHRY.

# APPENDIX SYNONOMORUM.

## PHRYGANEÆ.

- rhombica XC: 5, 6.
- bimaculata XLIV: 4, 5.
- bicaudata XXXVII: 4, 5.

## MYRMELEON.

- barbarum L: 1, 2, 3.
- barbarum* LXXXVI: 2.
- Formicaleo XXII: 1, 2.

## HEMEROBIUS.

- Perla V: 7, 8.
- chrysops IX: 2?
- phalænoides III: 10-12.
- lutarius XXXVII: 9, 10.

## PANORPA.

- communis LXXXVIII: 7.

## RAPHIDIA.

- ophiopsis XCV: 1, 2.

## CYNIPS.

- amerina XC: 8, 9.
- nitens XI: 4.
- Pini LXVIII: 7, 8.
- rustica VII: 3.
- Scrophulariæ LXXI: 7.
- atrata L: 6.
- viridis LVI: 3.
- Rosæ LV: 10, 11.
- livida VII: 7, 8.
- erythroceph. XCVI: 9.

## SIREX.

- Gigas X: 2, 3.
- Gigas LIII: 15.
- Spectrum IV: 9, 10.

## ICHNEUMON.

- extensorius XLIII: 1, 2.
- saturatorius LXI: 4.
- Pisorius XX: 8; LXX: 6.
- volutatorius XX: 13?
- persuasorius LXXX: 2.
- demigrator XX: 4, 5.
- desertor XX: 2, 3.
- compunctor XLIX: 4.
- glaucopterus LXXXII: 3.
- affector LX: 4.
- luteus I: 10.

## SPHEX.

- Spirifex XXXVIII: 1.
- fabulosa V: 2. LXXXII: 1.

## CHRYSIS.

- ignita LXXIV: 7, 8.
- aurata XLII: 5, 6.
- cyanca LXXXI: 5.

## VESPA.

- Crabro LIII: 5.
- vulgaris XXXV: 4.
- gallica XXXV: 5.
- muraria XXIV: 3.
- arvensis XCIII: 8.
- parietina XXIV: 4.

## APIS.

- longicornis XLIV: 3.
- cincreria XXII: 5, 6.
- rufa LXXXI: 6.
- succinea XXXII: 5.
- manicata XXXII: 11, 12.
- ruficornis L: 10.
- terrestris LXIX: 7.
- lapidaria LXIX: 9.
- muscorum LXIX: 8.
- acervorum LXXVIII: 5.

## FORMICA.

- heracleana V: 4?
- cephalotes XCIX: 6.
- atrata XCIX: 7.

## OSTRUS.

- bovis LXXXIX: 7.

## TIPULCA.

- crocata XV: 5.
- hortorum XV: 3, 4.
- atrata XXXII: 1.
- annulata XLVIII: 7?
- Marci XV: 1, 2.

## MUSCA.

- chamæleon XIV: 16.
- hydroleon XIV: 14.
- morio LIII: 3.
- maura LXXXVI: 9.
- hottentotta LXXVI: 6.
- mythæa X: 9.

nemo-

## APPENDIX SYNONYMORUM.

nemorum XCI: 4?  
 Oestracea X: 6.  
 dipthalthma LXXVII: 4.  
 Ribesii LXXXIII: 7.  
 scripta XXXVI: 11, 12.  
 pellucens X: 4, 5.  
 cæsar LIV: 3.  
 vomitoria LIV: 9.  
 carnaria XL: 1, 2.  
 rotundata LIV: 8.  
 stercoraria LIV: 2.  
 Arnica LXXXIX: 8.  
 florescentia LIII: 13?  
 floralis LIV: 11.  
**TABANUS.**  
 Bromius VIII: 4-6.  
 pluvialis LXXXV: 8, 9.  
 cæcutiens VIII: 1.  
**ASILUS.**  
 crabroniformis VIII: 15.  
 gibbosus VIII: 11.  
 flavus LI: 2.  
 gilvus LXXVIII: 6.  
 vericolor VIII: 13.  
 germanus XLVIII: 9, 10.  
**BOMBYLIUS.**  
 medius LXXIX: 5.  
 minor XLVI: 9.  
 capensis LXXVIII: 3.  
 morio LXXIX: 6?

**CONOPS.**  
 subcoleoptratus LXXI: 6.  
**HIPPOBOSCA.**  
 Equina XI: 5, 6.  
 Hirundinis LIII: 1, 2.

---

**ACARUS.**  
 holosericeus XXVII: 3.  
 baccarum XXVII: 1.  
 coleoptrator XXVII: 2.  
**PHALANGIUM.**  
 cornutum XXXIX: 13.  
**ARANEÆ.**  
 diadema XIX: 9.  
 arundinac. XIX: 12.  
 domestica XIX: 10.  
 labyrinthica XIX: 8.  
 redimita, LXIV: 8.  
 scenica XLIV: 11.  
 virescens XLIX: 8.  
 4-lineata XIX: 13.  
**ONISCUS.**  
 Afellus XIV: 5, 6.  
 Armadillo XIV: 3, 4.  
**SCOLOPENDRA.**  
 forficata XLVI: 12.  
**JULUS.**  
 fabulosus LXXXVIII: 8.

---

## ADDENDA.

11 - 12.

barbarus. 22. **MUS** cauda mediocri, corpore fusco striis decem  
 pallidis, palmis tridaëtylis, plantis pentadaëtylis.  
*Habitat in Barbaria. E. Brander.*  
 Corpus *M. Musculo minus supra fuscum. Abdomen*  
*pallidum. Dorsum striis decem pallidis & sæpe li-*  
*neola vix manifesta inter strias laterales. Pedes an-*  
*tici digitis tribus unguiculatis; præterea pollice ob-*  
*soleto; sub planta ipsa rudimentum quinti digiti.*  
 Cauda nudiuscula, subverticillata, longitudine cor-  
 poris.

19-20.

## ADDENDA.

19 - 20.

islandica. 24. *TRINGA* rostro pedibusque fuscis, corpore subtus ferrugineo, remigibus secundariis margine albis.

*Habitat in Islandia. J. G. König.*

Corpus magnitudine *Turturis*, totum scolopacinum s. e nigro ferrugineoque confertim maculatum. Subtus vero totum ruffo-ferrugineum. Alarum, rectrices margine exteriori albæ, at sub alæ rectrices albæ, notatæ nigro. Uropygium albidum nigro undulatum. Crissum albidum striis aliquot nigris. Remiges omnes nigrae rachi albæ; secundariæ insuper margine exteriori etiam albæ. Rectrices cinereæ, rachi albæ; nullæ harum acutæ.

(395. ad finem paginæ adde.)

### MEANTES.

*Branchiæ & Pulmones simul.*

*Pedes brachiati, unguiculati.*

SIREN. Corpus bipedum, caudatum, nudum.

*Pedes brachiati, unguiculati.*

Lacertina. 1. SIREN, de qua pag. 371. lin. ult. & *Dissert. Siren. Upsal. 1766. c. fig.*

*Habitat in Carolinæ paludosis, DD. Garden inventor. Dubius hâc utrum hac esset Larva Lacertæ cujusdam, quam potissimum refert; an declaratum Animal? hoc suadent Manus unguiculatæ & Vox cantillans, at ulterius hoc urget inventor speciminibus sesquipedalibus missis, cum in tota Carolina nulla sit Lacerta, excepto Crocodylo, ultra spithamum longa.*

Pag.

82. *MUS Cricetus*. Pedes 4-5 anterioribus subtus cum pollicis rudimento unguiculato.

153. *BUCEROS Rhinoceros*. Rostrum modice incurvum, album, subserratum, facie *B. bicornis*, basi inferiore gibba. Cornu rostri ascendens, compressum, longitudine ipsius rostri album, linea nigra utrinque versus latus inferius.

221. *COLYMBUS glacialis*. *Gunner. act. Nidros. 3. p. 125. \**  
*Colymbus maximus caudatus Authorum.*

224. *LARUS Rissa*. Varietas forte *Lari tridactyli*, junior primi anni.

239. *ARDEA major*. Axillæ nigrae. Alarum margo albus.

248.

## ADDENDA.

- Pag.**  
 248. *TRINGA striata*. Tringa rostro pedibusque flavis, corpore fusco undulato, abdomine albo. *Ström. act. nidrosf.* 3. p. 440. t. 6. \*  
 272. *PHASIAN. Argus*. *Edw. act. Angl.* 1765. p. 88. t. 3. \*  
*Olear. mus.* t. 14. f. 4.  
 369. *LACERTA chalcidica*. *Pedibus tridactylis, minime pentadactylis.*  
 412. *TETRODON Mola*. *Alt. Petrop.* 1766. p. 337. t. 8. f. 2, 3.  
*Pinn. D. 15; P. 13; V. 0; A. 16; C. 0.*

## ERRATA.

- Pag.**  
 183. - - - - - adde philippinus.  
 162. - - 13. mexicanus, lege Xanthorus.  
 749. - - 16. Jafon, lege Jafius.  
 796. - - 273. Cæneus, lege cæneus.  
 872. - - 271. ocellata, lege oculata.  
 600. - - 100. cuprea, lege caprea.  
 390. - - 60. bp. es, lege bipes.  
 526. - - 4. Trinca, lege Tinca.  
 604. - - 4. muticus, lege mutica.  
 410. - - 9. cubitus, lege cubicus.  
 482. - - 4. punctatus, lege punctata.  
 242. - - 6. alber, lege albus.  
 676. - - 14. gigas, lege gages.  
 1049. - - 55. ircupofus, lege scrupofus.  
 35. - - 7. caudata, lege semicaudata.  
 123. - - 8. Albiulla, lege Albicilla.  
 780. - - 179. Clerck. citat. deleatur.  
 391. - - 349. Paragraphus deleatur tota Angu. ventralis.  
 1326. - - 3. moritur lege movetur.











